

# جغرافيتا العالم دراسة إقليمية

الدكتور محمد السيد غلاب    الدكتورة دوليت احمد صادق    الدكتور جمال الدين البيضاوي

المجلد الثاني  
إفريقية وأستراليا

مراجعة

الدكتور محمد السيد غلاب

جامعة القاهرة

الطبعة الرابعة - ١٩٨٩

الناشر

مكتبة الأنجلو المصرية

# تقديم

هذه طبعة جديدة مراجعة بمنتهى الدقة ، لكى تواكب التغيرات العديدة التى حدثت فى قارة أفريقية ، ولاسيما بعد أن حصلت معظم أقطارها على استقلالها ، فعملت على تنميتها الاقتصادية والاجتماعية ، وسرت فيها نهضة شاملة ، وبدأ الكشف فيها عن ثروات طبيعية جديدة • بل أنه قد بدأ لشعوبها أن تغير كثيرا من أسماء الأعلام فيها وتستبدل بأسماء المستعمرين الأوربيين أسماء وطنية ، تعمل على التغير المستمر والتطور الدائم فى الاحصائيات •

ولهذا فهذه الطبعة منقحة مزيدة ، معلوماتها محدثة •

محمد السيد غلاب

# مقدمة

قد يكون من التعسف العلمى أن نتلمس مميزات من شأنها أن تضىف على قارة ما خصائص تنفرد بها دون سائر القارات الأخرى ، ذلك لأن تقسيم اليابس الى قارات مختلفة انما هو تقليد لا يقوم فى أكثر الأحيان الا على محض الاصطلاح التاريخى ، ولكن اذا جاز لنا أن نبحث عن طابع مميز لكل قارة فقد تبدو قارة أفريقية فى مقدمة القارات التى لا يعوزها توافر مميزات فريدة سواء فى ظروفها الطبيعية أى البشرية ، فقد ميزتها العزلة ، ذلك لأنه اذا غضضنا النظر عن قربها من العالم القديم فى أوراسيا فى الشمال والشمال الشرقى ، ألفينا سواحلها الجنوبية والغربية بصفة خاصة وقد نأت عن العالم الجديد فى غربها فظلت هذه الجهات مجهولة غير مطروقة فترة طويلة .

وإذا كانت قد خلعت عليها هذه العزلة نوعا من الوحدة ، الا أنه قد أصبح قلبها بمنأى عن الاتصال بالخارج ، وذلك بفضل الدروع التى تمثلها سواحلها المنفرة والحافات الهضبية الصعبة المرتقى التى تحف بهذه السواحل ، فتتحطم على صخرة هذه السواحل وتلك الحافات الاتصال بين الداخلى وبين السواحل ، كما ضاعف من تمزيق تلك الوحدة - رغم ما يبدو عليها من تجانس ظاهر - امتداد الصحراء الكبرى فى أكثر من نصف القارة الشمالى ، فقد كانت تمثل حقا عقبة كأداة شطرت أفريقية الى « أفريقيتين » أحدهما أفريقية القوقازية التى كانت مهد حضارات عريقة متقدمة ، والتى أولت ظهرها لبقية القارة الأفريقية أو أفريقية المدارية الى حد بعيد ، ذلك أن أفريقية القوقازية كانت فى أكثر عصور تاريخها جزءا من جنوب غرب آسيا أو الشرق الأوسط حيننا ، أو من العالم المحيط بالبحر المتوسط حيننا آخر ، كما أنها ارتبطت ارتباطا وثيقا بالعالم الإسلامى فى فترة طويلة من ذلك التاريخ ، بل كانت على اتصال وثيق بالعالم الأوربى سواء فى جنوب قارة أوربا أو غربها فى كثير من عصور تاريخها .

أما أفريقية الأخرى فهي أفريقية الزنجية أو أفريقية المدارية ، التي تمثل فى نظر البعض أفريقية الخالصة أو العوالم الأفريقى الحق ، ومن الطريف أن الانفصال بين بعض المناطق الساحلية والجهات الداخلية فى هذه القارة قد تمثل بوضوح كبير فى أفريقية الجنوبية التى تبرز فى شكل شبه جزيرة ، إذ تضافرت ظروف طبيعية خاصة - من السطح والمناخ وشكل السواحل والموقع على طول طرق الملاحة العالمية بين أوروبا والشرق - على أن يتجه هذا الشطر من أفريقية حديثا بعيدا عن نطاق للعالم الأفريقى ، فارتبط فى توجيهه السياسى وطرق حياة بعض عناصر سكانه وتاريخه بالعالم الأوروبى خارج القارة الأفريقية جمعا ، فأصبح يمثل عالما فريدا غربيا يختلف فى ظروفه عما يسود فى قلب أفريقية من ظروف ومشاكل ، رغم أنه يحاول أن يبسط نظمه ومثله بل ويخلق مشاكله فى قلب القارة فى زحفه نحو الشمال متذريا بسيطرة العنصر الأوروبى على هذه البقاع .

ولم تكن قارة أفريقية كما يشاع سقطا بين القارات ، فقد ظهر الانسان فى شرقها وجنوبها وكما تتطور بها عبر الانسان منتصب القامة ثم انسان نياندرتال ثم الانسان العاقل فهى مهد قديم للبشرية ، كما عرف فيها الانسان الزراعة فى موطنين على الأقل هما هضبة الحبشة وغرب أفريقية ، كما شهدت مولد أقدم الحضارات القديمة فى وادى النيل بمصر ، وإذا كان نظام النخاسة قد قوض بناءها الاقتصادية وكيانها الاجتماعى وحرمتها ثمار أعمال أبنائها وجهودهم الا أن هؤلاء قد ساهموا راغبين أو كارهين فى تعمير واستغلال كثير من بقاع العالم الجديد ، وبعض جهات العالم القديم ، فكانوا عمالا وجنودا وزراعا ومعدنين .

وإذا نظرنا الى قارة أفريقية كوحدة لهدت لنسا كهضبة ضخمة ظل التاريخ يتلمس فى سواحلها المستقيمة ثغرة ليؤخذ منها الى قلب القارة ، فلم يتسلل من أضوائه الا القليل على أطرافها ، على حين بقيت الأجزاء الداخلية من القارة مسرحا للمجتمعات الوطنية ، تنتقل فى أرجاء هذه القارة التى تساعد طبيعة سطحها الهضبية وانتشار المراعى فى كثير من أرجائها على حدوث هجرات ضخمة متصلة - وبخاصة أن نسبة كبيرة من

سكانها كانوا ولايزالون من الرعاة الذين ألفوا الظعن والترحال ، أما سكان مناطق السواحل والأطراف فقد ولوا وجوههم شطر البحر ليستقبلوا العناصر الحضارية والثقافية بل والسكان من ورائه ، فحمل المحيط الهندي عناصر الهوفا Hova الذين نزحوا من جزائر الهند الشرقية الى مدغشقر ، كما انتقل العرب من جنوب شبه الجزيرة العربية حاملين حضارتهم وثقافتهم ونظامهم السياسى الى السواحل الشرقية من هذه القنارة ، فبلغ نفوذهم منطقة البحيرات فى الداخل ونهر زمبىزى وخليج صوفالا فى الجنوب ، وربما كان انتظام هبوب الرياح الموسمية فى المحيط الهندي من الأسباب التى وثقت العلاقات بين سكان شواطئ المحيط الهندي من أقصى شرقه الى أقصى غربه فى أفريقية . فلا عجب أن أخذت الدول الكبرى المستعمرة تنظر الى سواحل جنوب افريقية وشرقها وشمالها الشرقى فى بادئ الأمر - لا كجزء من القارة الأفريقية أو كطريق للتغلغل داخل هذه القارة - ولكن كمواقع ونقط ارتكاز ومحطات للتزود بالمياه على طول الطريق الذى بساحل هذه القارة الى الشرق ، فكانت عناية بريطانيا بشمال شرقى القارة وبأبها فى منطقة السويس وبمنطقة شرقى أفريقية وجنوبها تستهدف حماية أملاكها ، والدفاع عن مصالحها. فى شرق القارة الآسيوية وجنوبها ، وفى المناطق الواقعة فى المحيط الهندي . ولا يصدق هذا القول على السواحل الشرقية فحسب ، إذ كانت جزائر كنارى وكيب فر ده مراكز أبحرت منها حملات كشف الأمريكتين ، بل لازالت الولايات المتحدة الأمريكية النى أقامت قواعدها العسكرية على سواحل مراكز المطة على المحيط الأطلنطى وعلى سواحل أفريقية الغربية الفرنسية سابقا تنظر الى هذه المناطق وهاتيك السواحل كنقط ارتكاز ومحطات تقع على الطريق الى العالم الجديد أما فى الشمال فقد كان البحر المتوسط أصرة ربطت البلاد والقارات بين الشمال والجنوب والشرق والغرب ، ولم يقف التشابه والاتصال والتقارب عند التاريخ وأحداثه ، والحضارة ومظاهرها ، والسياسة ومشكلاتها ، فقد شاعت الطبيعة أن تجعل من شبه جزير إيبيريا وبلاد المغرب وحدة لم يفلح البحر فى طمس ما بينها من اتصال وترابط وتشابه فى الظروف ، كذلك كانت مصر وبلاد الشرق العربى القريبة على اتصال وثيق وجد فى التشابه فى الظروف الطبيعية أساسا قويا يقوم عليه. هذا الاتصال . وقد سبق أن أشرنا الى اتساع المحيط الأطلنطى الجنوبي الذى

باعد بين غربى هذه القارة وبين بقية جهات العالم القديم فضلا عن سواحل العالم الجديد المقابلة .

وصفوة القول أن قارة أفريقية قد دخلت التاريخ من أضيق أبوابه « أبواب السواحل » التى كانت مسرحا للتاريخ الذى اتصلت أسبابه بتاريخ السواحل فى القارات الأخرى . أما قلب القارة فقد ظل منطويا على نفسه ، يعيش سكانه فى عزلة وظلمة . وهكذا عاشت تلك القارة وراء حواجز وعقبات من سواحلها مستعصية على الداخل متأبئة على الرواد والمكتشفين .

وتنفرد قارة أفريقية بين القارات الأخرى بأن خط الاستواء يكاد ينصفها الى شطرين متناظرين ، فهى تمتد لمسافة ٢٤٠٠ ميل بين خطى عرض ٢١ °٣٧ فى الشمال و ٣٤٤٥١ ° فى الجنوب ، ولكن هذا لايعنى أن التقابل والتشابه تام بين نصفى القارة الشمالى والجنوبى ، لاختلاف توزيع اليابس بين خطوط العرض فى شمال خط الاستواء والى الجنوب منه ، إذ يقع ثلثا اليابس الأفريقى شمالى القارة ، فامتد النطاق الصحراوى بين سواحل المحيط الأطلنطى وشواطئ البحر الأحمر فى شمالها ، بينما اقتصر فى جنوب القارة على الطرف الجنوبى الغربى الذى تشغله صحراء كاهارى ، فضلا عن أن وقوع الأطراف الشرقية من شمال القارة على كثب من الكتلة الآسيوية قد جعل مناخ هذه المنطقة يخضع لما يسود هذا اليابس الآسيوى من ظروف الضغط وعناصر المناخ ، وإذا كان من الممكن أن يسود قارة نوع معين من أنواع المناخ ، فإن قارة أفريقية يسودها المناخ المدارى، فهى بين قارات العالم القارة المدارية بحق ، إذ يمتد نحو ٩ مليون ميلا مربعا من بين ١١٧٠٠٠٠٠ ميلا مربعا تمثل مساحة القارة بأسرها بين المدارين . ولذلك فإن أهم ما يعترض استغلال الجهات المدارية من مشكلات تتصل حينا بالبيئة الطبيعية وأحيانا بالظروف البشرية ، يعنى هذه القارة المدارية بصفة خاصة .

وتعد أفريقية من أكثر القارات التى عانى التخلف الاقتصادى والتأخر الحضارى - فكانت بالأمس القريب ميدانا فسيحا للصراع الاستعمارى ، ولاتزال - بفضل ثرواتها من المواد الخام الزراعية كالكاكاو والطباق وزيت النخيل والقطن ، والمعدنية كالذهب والنحاس والقصدير والفوسفات - تعتبر

حقلا خصبا لاستغلال الموارد الطبيعية لخير سكان آخرين كأوروبا التي تجد فى ظروف أفريقية الطبيعية المتباينة ، وفى تخلف سكانها مايمكنها من تحقيق سياسة ربط اقتصاد مناطق أفريقية المختلفة بالدول المستعمرة ، بل باقتصاد أوروبا بأكملها الذى ترى أن أفريقية مكملتها لها .

ويعد المناخ فى أفريقية سيذا غير منازع ، فقد ظهرت قسوة المناخ المدارى فى ظروف التربة التى فقدت الكثير من أسباب خصوبتها ، كما اضحى كثير من الحيات مباءة للأمراض المتوطنة الفتاكة ، وأصبحت مساحات شاسعة غير ملائمة لتربية الماشية ، رغم توافر المراعى الجيدة ، ويكفى أن نذكر أن الأقاليم المختلفة فى أفريقية تحمل أسماء ذات دلالة أو مغزى مناخى أو نباتى كالأقليم السودانى و إقليم الغابات الاستوائية ، فلم يطلق عليها أسماء تدل على ظاهرات السطح كما هو الحال فى أوروبا .

ظلت هذه القارة تضم شتاتا من الجماعات المتباينة فى مستواها الحضارى وعاداتها ونظمها الاقتصادية ، فتداخلت دراسة الجغرافى وعالم الأجناس ، وهكذا تعددت الجماعات التى عاشت فى عزلة فى أكثر الأحيان، أى أنها لم تندمج أو تذوب فى جماعات أكبر ، ومن ثم لم يسد التجانس أو الوحدة السياسية والحضارية مساحات كبيرة كما حدث فى آسيا مثلا ، كما أن قسوة المناخ وشدته وطأته قد جعل استيطان الكثير من العناصر الأوربية متعذرا أو صعبا فى كثير من أرجاء القارة ، فظل الأفريقى يمثل العنصر السائد ، وان لم يكن السيد فى كثير من أنحاء القارة ، حقا تعرضت القارة لحروب استعمارية ومنازعات دامية بين قبائلها ، كما فتكت الأمراض المتفشية بكثير من سكانها ، بل حمل قسرا كما قضى نحوه عدد كبير من أبناء هذه القارة حين اجتاحتها حملات النحاسين ، ولكن لازال الأفريقى بفضل ملامته للظروف الطبيعية وبخاصة المناخية لحياته لا يجد منافسة حادة من العناصر غير الأفريقية ، إذ يقدر أن ٩٧٪ من سكان أفريقية من الوطنيين الأفريقيين ، على حين لا يزيد عدد المستوطنين الذين ينحدرون من أصل أوربى على خمسة ملايين أو ٢٨٪ من مجموع سكانها .

وقد لبس الاستعمار لبوسا جديدا ، واتخذ من نواحي القصور وقلة

الخبرة وندرة الخبراء والأموال فى بلاد أفريقية ذريعة لابقاء قدمه ، والمضى فى امتصاص خيرات الشطر الأعظم من أرض القارة والسيطرة على بعض بلادها وأقطارها ، فلا غرو أن امتاز اقتصادها بالطابع الاستخراجى ، وارتبط بالتجارة العالمية وحاجات الدول الاستعمارية وسياساتها الاقتصادية ، ويكفى أن نذكر أن هذه القارة تنتج جزءا كبيرا من الانتاج العالمى من بعض الحاصلات الزراعية التى تزرع للاتجار وتصديرها بصفة خاصة ، فأفريقية تنتج ٧٥.٧٥% من السيزال و ٧٠% من زيت النخيل و ٦٧% من الكاكاو وشطرا كبيرا من المعادن الثمينة التى تستخرج للتصدير مثل الماس ( ٩٨.٤% ) والكوبلت ( ٨٠.١% ) والذهب ( ٥٩% ) والكلومبييت ( ٩٩% ) وغسيرها كثير ، ولكن أخذ عدد الدول - التى ظفرت باستقلالها السياسى - يتزايد ، ولأزالت القارة مسرحا للجهد فى سبيل التحسّر من ربة الاستعمار ، والتخلص من اسر التحكم ولاستكمال مقومات الاستقلال الاقتصادى والسياسى ، وقد أشرقتم شمس الحرية على القارة جميعا فيما عدا جنوب القارة التى لاتزال فى قبضة يد الأقلية البيضاء ، والتى لاتزال تسيطر على ناميبيا ، وبعد أن عرضنا للسمات المميزة للقارة الأفريقية يجمل بنا أن نتناول النواحي المختلفة لهذه القارة فيما بعد .



## الباب الأول

### مقدمة

الفصل الأول : البنية

الفصل الثانى : المناخ

الفصل الثالث : السكان والجماعات والاستعمار فى أفريقية



## الفصل الأول

### البيئة

قلما نجد قسارة يبدو فيها أثر الظروف الطبيعية من أنواع الصخور ومظاهر السطح وأشكاله ونظام صرف المياه وأنواع التربة وما يسودها من ظروف نباتية ومناخية واضحا فى نشاط الانسان وحياته ، وما يمارسه من صرف شأن القارة الافريقية ، بل تلقى هذه الظروف الطبيعية ، وفى مقدمتها البنية الضوم على ظروف توزيع السكان والعمران فى الجهات المختلفة .  
• وإذا كانت اقتصاديات القارة تعتمد - كما أشرنا - على مايكمن فى باطنها ، ومايستخرج منه من معادن ، يتاثر توزيعها بنظام البنية السائد ، فلا غرو أن أصبح لهذه البنية وطبيعة السطح التى تنعكس فى نظام تصريف المياه ، وما يتصل به من مشاكل استغلال مواردها للرى والملاحة وتوليد الكهرباء - أهمية بالغة .  
• وربما كانت قوة قبضة البيئة الطبيعية التى وقف الانسان البدائى فى افريقية حيالها لا حول ولا قوة ، مما يفسر بعض أسباب التخلف الحضارى ، والتفكك السياسى ، والتأخر الاقتصادى التى وضحت فى كثير من جهات هذه القارة .

تمتاز بنية القارة الافريقية ببساطتها التى انعكست على نظام السطح البسيط ايضا ، فتأثير الكتلة القديمة المعروفة بقارة جندوانا يبدو بوضوح فى أكثر أرجاء القارة التى تتكون من صخور هذه الكتلة القديمة وهكذا تمثل الصخور البللورية قاعدة هذه القارة ونواتها ، فالصخور النارية كالجرانيت والمتحولة من الرسوبية القديمة أو النارية كالمشست والنيس تنتشر فى أرجاء هذه القارة ، بل تبدو هذه الصخور القديمة على سطح القارة فى كثير من الجهات بين ساحل غانة غربا والصومال شرقا ، وبين جنوبى مصر شمالا ، وجنوب افريقية جنوبا .  
• وإذا كانت هذه الصخور القديمة الصلبة قد قاومت الالتواء اثناء عصور جيولوجية متطاولة ، وظلت ثابتة بوجه عام لترد غائلة طغيان البحر الذى لم يترك رواسبه الا فى أطرافها ، فقد تصدعت هذه الكتلة القديمة تحت تأثير حركات الشد والضغط فهبطت بعض جهاتها حيناً

وارتفعت حيناً آخر وكونت جبالا انكسارية ، ولكنها رغم ذلك كانت تتألف فى بادئ الأمر من التواءات قديمة تعرضت لعوامل التعرية حتى أصبحت تمثل سهلا تحتيا فى كثير من أرجائها وقد نشأت الجبال الالتوائية على اطراف القارة حيث توافرت الرواسب البحرية فى شمال القارة الغربى ، فظهرت جبال الأطلس فى الزمن الثالث ، على حين تكونت فى الجنوب جبال الكاب فى الزمن الثانى . كما ظهرت رواسب قارية فى الجهات الداخلية من القارة ، وفى الأحواض الداخلية فى المياض المعذبة أو فى خلجان بحرية ملحة ، أو فى جهات اختلطت فيها المياض الملحة بالمعذبة تكونت رواسب اشتركت فى ارسابها عوامل التعرية والارساب المختلفة من جديد ورياح وأمواج وغيرها ، وهكذا تعددت أنواعها من ركام جليدى الى طبقات من الفحم والجبس الى رمال وصخور رملية الى رواسب من الحصى والرمال التى أرسبت فى أحواض الأنهار ، ويبدو أن معظم شمال افريقية كان جافا فى أكثر عصور تاريخه الجيولوجى فظهر أثر التحات المتصل فيه ، كما كان يسوده الاستقرار نسبيا ، فظلت تكويناته أفقية لم تتعرض لكثير من الحركات العنيفة من انكسارات وهبوط وخروج اللافا ، وما نشأ عن ذلك كله من تكوين الأخاديد والأحواض الداخلية والمخروطات والقمم البركانية والهضاب أو السهول التى تغطيها اللابة كما حدث فى شرق افريقية بوجه خاص .

ومن ثم كان الاستواء وانتشار السطوح المتسمة المكشوفة التى يغلب عليها شكل الهضاب مما يميز شمال القارة ( أنظر شكل ١ ) ويمكن أن نلخص تاريخ القارة الجيولوجى على النحو الآتى :

١ - تنتمى أكثر صخور الكتلة القديمة الى أصل رسوبى ، ولكن هذه الصخور تعرضت للتحويل الشديد أثناء تاريخها الجيولوجى الطويل ، وتتألف أقدم هذه التكوينات - وتسمى تكوينات ما قبل الكمبرى السفلى - من الجرانيت والنيس ، ويبدو فيها التحويل التام ، أما تكوينات ما قبل الكمبرى الوسطى فقد تعرضت للالتواءات ، وأهم أنواع الصخور هى الجرانيتية : الجرانيت القديم ، وهو غنى بالذهب والجرانيت الحديث الذى يحتوى على القصدير ، أما ما قبل الكمبرى العلوى فيتكون من صخور قليلة التحويل والالتواء ، وقد تعرضت بعض جهات هذه القارة لتأثير الجليد الذى

وجدت آثاره فى جنوب غرب أفريقية فى تكوينات وتوترزاند كما عثر على بقايا رواسبه فى شرق أريقية \*

٢ - غمرت مياه البحر بعض أطراف الكتلة الأفريقية منذ العصر الديفونى بصفة خاصة ، وتعد تكوينات العصر الديفونى التى تتألف من الصخور الجيرية أكثر الرواسب الغنية بالحفريات انتشارا فى القارة ، وكان يمتد خليج يتعمق فى شمال القارة من البحر المتوسط القديم بين الخين والآخر ، وتنتشر صخور هذا العصر فى ولاية الكاب فى جنوب أفريقية ، وفى الصحراء الكبرى والسودان الغربى ، وتوجد تكوينات العصر الفحمى ، وأكثرها من الحجر الجيرى منتشرة على أطراف القارة التى تعرضت لطغيان البحر أيضا الى جانب تكوينات قارية تنتمى للعصر الفحمى الأعلى تسمى بتكوينات الكارو السفلى Lower Karoo فى جنوب أفريقية ، وتحتوى هذه التكوينات على الفحم الذى لا يقتصر على تلك الجهات بل يوجد فى ملاوى وزيمبابوى وتانزانيا . \*

٣ - أما فى الزمن الثانى فقد امتد البحر ليطغى على سساحل شرق أفريقية فى العصر الترياسى ، ومن ثم تنتشر صخور العصر الجوراسى الذى يليه فى كينيا وتانزانيا وأوغندا ، أما جزيرة ملجاش التى تتكون نواتها من الصخور الجرانيتية والنيس شأن بقية القارة القديمة فتنتشر فى غربها صخور العصر الجوراسى البحرية الأصل التى يقساؤها فى شرق أفريقية صخور مشابهة مما يدل على انفصال مدغشقر عن بقية القارة فى هذا العصر ، الذى تكون على أثره مضيق موزمبيق القديم \* أما بحار العصر الكريتاسى وتكويناته فقد انتشرت فى مساحات شاسعة فى شمال القارة فى منطقة جبال أطلس وفى الأجزاء الوسطى من الصحراء الكبرى وجنوب نيجيريا والكمرون حتى أنجولا ، كما عثر على هذه التكوينات فى جنوب شرق القارة \*


٤ - أما فى الزمن الثالث فقد امتد خليج بحرى من البحر المتوسط القديم عبر الصحراء الكبرى حتى نيجيريا والكمرون ، فأرسبت صخور عصر الأيوسين من الحجر الجيرى فى منطقة متسعة ، ممتدة شمال القارة بين شمال مصر ومراكش ، ولكن من أهم الأحداث الجيولوجية التى تعرضت

لها القارة تكوين الأخدود الأفريقي العظيم ، وما ترتب على تكوينه وما صحبه من آثار واضحة عميقة فى مظاهر السطح والبنية ونظام تصريف المياه والتوجيه الجغرافى من الناحية الطبيعية .

ويلاحظ أن القارة الأفريقية تتكون فى جملتها من سطوح هضبية تحاتية أو سلسلة من الهضاب التحاتية التى يبدو عليها القدم والتشابه ، وتتناكل سطوحها فى بطء شديد ، بعد أن أوفت دورة التعرية فيها على النهاية ، وظهرت عليها مميزات النضوج من الثبات والاستقرار النسبى . ولكن هذا الحدث الجيولوجى الكبير قد جدد من شباب تلك المنطقة الشرقية ، فظهرت الأخاديد العميقة والجبال الانكسارية الضخمة ، كما ترتب على ذلك اضطراب شديد فى النظام الهيدرولوجى إذ انفصلت أنهار كانت متصلة وأغلقت بحيرات كانت تنساب مياهها الى البحر ، كما نشأت بحيرات جديدة ، وجفت بحيرات قديمة . ويمتد هذا الانكسار لمسافة سدس محيط الكرة الأرضية من جبال طوروس فى الشمال حتى ميناء بيرا فى شرق أفريقية ، ويشمل الأخدود وادى ابيقاع على نحو مايرى البعض ، وأخدود الغور ، والبحر الميت ، ووادى العربية ، وخليج العقبة ، والبحر الأحمر ، وخليج العقبة ، وخليج عدن . ولكن مياه البحر الأحمر التى تغطى على الأخدود فى شماليه حيث يتسع عرض البحر لا تغطى الا جانبا من الأخدود فى الجزء الجنوبى منه حيث يظل الجانب الغربى بين المساحل الأفريقي والصافة الشرقية لهضبة الحبشة يابسا يدعى منخفض الدناقل . والواقع أنه رغم أن بوغاز باب المنذب لا يتجاوز عرضه ٢٢ كيلومترا - فيبدو ضيقا اذا قورن بشمال البحر الأحمر - فان عرض الأخدود الحقيقى فى الجنوب الذى يمثله المسافة المحصورة بين حافة هضبة بلاد العرب الانكسارية ، وحافة هضبة الحبشة لا يقل عن عرضه فى الشمال ، ويفصل الأخدود بين كتلة الصومال القديمة التى تمثل هضبة قافزة وبين هضبة الحبشة ، ويخترق وادى هواش الأخدود الذى يفصل بين الجزء الجنوبى من هضبة الحبشة فى بلاد الجالا ، وبين بقية الهضبة الحبشية فى الشهاال والغرب ، ويبدو التباين فى اتساع الأخدود وما أصاب حافته الانكسارية القافزة من ارتفاع ، كما يختلف قاع الأخدود بين بقعة وأخرى لتعدد الانكسارات الالتوائية وانتظامها أحيانا ، بحيث يمكن رؤية أحد جانبي الحافة الانكسارية من

الجانب المقابل ، الا أن تعدد الانكسارات الثانوية من شأنه أحيانا أن يجعل هذه الحافات الانكسارية غير واضحة ، ويدع الانتقال بين الحافة وقاع الأخدود غير محسوس . كما أن وجود الفوالق المستعرضة كثيرا ما يؤدي الى تباين سطح قاع الأخدود . وعلى حين تبدو حافته الغربية واضحة تجد حافته الشرقية أقل انتظاما ووضوحا ، ورغم أن عوامل التعرية لم تتح لها المدة الكافية ليبدو تأثيرها واضحا فقد تعاونت مع ماتعرض له الأخدود من اضطرابات بركانية كخروج اللابة مما جعل قاع الأخدود غير منتظم السطح . فعلى حين أدت عوامل التعرية الى انطماش حافات الأخدود الانكسارية فى بحيرة تنجانيقا ، فان جوانبه فى بحيرة نياسا تعود للظهور . وتنتشر فى هذا الفرع الشرقى من الأخدود بحيرات عديدة . أهمها بحيرة رودلف ، ونهر أرمو ، وبحيرة بارنجو ، والمنتيقا ، ونيفاشا ، وناكورو ، ونطرون فى الشمال . أما فى الجنوب فتوجد بحيرة نياسا العميقة التى يبلغ طولها ٥٧٠ كيلومترا ، ولا يقل عرضها عن ٢٤ كيلومترا ، وتنصرف مياه بحيرة نياسا جنوبا عن طريق نهر شيرى Shire الذى يقع شأن بحيرة نياسا فى قاع الأخدود الذى يمتد جنوبا حتى ينتهى عند ميناء بيرا فى موزمبيق . أما الفرع الآخر ، وهو الغربى ، من الأخدود فيتوجه نحو الشمال الغربى وتعد حافته أكثر وضوحا من حافات الفرع الشرقى وبخاصة حافته الغربية ، وتقع بحيرات تنجانيقا وكيفو وأدوارد وجورج وألبرت ونهر سمليكى حتى قرب مدينة نيمولى فى بحر الجبل فى قاع الأخدود ، وقد تكونت مجموعة جبال مومبيري البركانية لتفصل بين بحيرة كيفو وأدوارد ، أما جبل رونزورى التى اندفعت كتلته الى أعلا نحو ٤ كيلومترات - لأن ارتفاعه يبلغ ٥ كيلومتر على حين يبلغ مستوى قاع الأخدود ١٠٠٠ متر فوق سطح البحر - فقد تكون نتيجة لحدوث ثنية عمودية ، وانكسارات فى الشمال التى قد تبدو على الجانبين من النوع السلمى ، وهى ذات تأثير ثانوى محدود فى اندفاع كتلة رونزورى من صخور الهضبة ، ولكن يرجح أن تغيير نوع الصخور هنا الجرانيت الى نيس قد نجم عنه ذلك الالتواء العمودى بدلا من حدوث الانكسار الذى يسود فى جهات الهضبة الأخرى .

وهناك نظريتان لتفسير حدوث الأخدود ، فالبعض يرى أنه نشأ نتيجة لحركات الشد ، فهبط الجزء الأوسط من التكوينات بفعل الجاذبية ، ويقال



( خريطة رقم ١ )  
أفريقية - تكوينات السطح



أن أكثر الانكسارات من هذا النوع ، وبخاصة فى الفرع الشرقى من الأخدود حيث يظهر التتبع على جوانب الأخدود فى الهضبة الأفريقية مما يدل على أن الأخدود ربما ظهر نتيجة لوجود قوة شد الى أسفل ، أما الآخرون فيعززون هبوط الأخدود الى اندفاع نتيجة لضغط جاء من الجانبين فهبط الجزء الأوسط الى أسفل لاندفاع الجانبين الى أعلا . ومما يؤيد هذا التفسير ما ينتشر فى الفرع الغربى من الأخدود من صخور متحولة ورحف الصخور من الجانبين لتغطى الرواسب البحرية الواقعة فى قاع الأخدود .

ولما كانت القارة الإفريقية قد تعرضت منذ العصرين الكرسونى والبرمى أى منذ تكونت طبقات الكارو فى جنوب القارة لحركات اندفاع يعقبها نشاط متصل عنيف لعوامل التعرية حتى تنتهى دورة التعرية بوصول السطح المرتفع لهضبة الى مستوى منخفض . فقد امتازت بوجود عدة سطوح للتعرية . بلغ أعلاها الى ارتفاع ٢٨٠٠ متر كما هو الحال فى مرتفعات بأسوتو Basuto Highlands ولكن هذا الارتفاع مع انتشار تكوينات رسوبية من السهل تحتها قد تمخضا عن تكوين أحواض ذات صرف داخلى كانت تغليها بحيرات أو بحار ، داخلية ، لازالت بقايا بعضها تظهر فى شكل بحيرات كبحيرة تشاد وبحيرة تومبا وليوبولد فى حوض الكنغو ومستنقعات الصد فى حوض نهر النيل . وتعد هذه الرواسب البحرية التى تغطى الأحواض الداخلية للأنتهار من أحدث التكوينات القارية التى ترجع للزمن الرابع وللعصر الحديث منه بصفة خاصة . كما أن نشاط عوامل التعرية وبخاصة التعرية الجافة تد ادى الى تكوين طبقة من الرواسب الهوائية كسطوح الرمال السافية والكثبان الرملية والسطوح الحصوية ، ومن ناحية أخرى حدث فى الزمنين الثالث والرابع كثير من أنواع النشاط البركانى سواء فى منطقة جبال الكمرى البركانية أو فى هضبة الحبشة وهضبة البحيرات ، كما توجد بعض الرواسب التى أرسبت فى مياه البحر الملحة أو المختلطة بمياه العذبة على سواحل القارة الشمالية والشرقية بصفة خاصة ، وقد تكونت هذه الأحواض الساحلية التى تغطىها الرواسب البحرية حين كانت المناطق أقل ارتفاعا مما هى عليه الآن ، وهكذا تغطى مساحة كبيرة من سطح القارة رواسب حديثة بعضها قارى تكون فى قاع بحيرات أو بحار داخلية . جغرافيا . العالم .

أو أرسنبته الرياح التي جالبت تكوينات بركانية ، والبعض الآخر بحرى تكون فى مناطق محدودة من السواحل .

ومن أهم الظاهرات التي تميز بنية القارة وجود سطوح تحتية تنتمى لحركة رافعة واحدة حدثت فى عصر جيولوجى معين أعقبها نشاط فى عوامل التعرية حتى تآكل السطح وأصبح مستويا أو شبه مستو وأهم هذه السطوح هى :-

١ - سطح جندوانا لند : تكون فى أواخر الجوراسى وأوائل الكريتاسى حين كانت قارة جندوانا لازالت موجودة ، ويتراوح ارتفاع السطح بين ٢٦٠٠متر ٢٣٠٠متر . ويتمثل ذلك السطح فى قمم الجبال المستوية ذات المنحدرات الوعرة . وتبدو هذه التلال مبعثرة لطول الفترة التي تعرضت فيها للتعرية . ومن بقايا هذا السطح التلال ذات القمم المستوية فى السودان التي كثيرا ماتندمج فى شماله لتكون سهلا متصلا ، يختلف أحيانا أسفل تكوينات من الرواسب السميكة . ويزداد هذا السطح التحتى ارتفاعا نحو الغرب حتى يصل الى نحو اربعة كيلومترات أحيانا فوق سطح البحر ، وكثيرا ماتغطيه طبقات سميكة من تكوينات الملائيت تحت تأثير المناخ الحار الرطب فى بعض فصول السنة .

٢ - سطح الأفريقية : تعرض ساحل سطح جندوانالند للاندناء فهبط تحت سطح البحر ، بل وغطى البحر على بعض أطرافه حيث تراكمت عليه رواسب بحرية . وتنتمى هذه الرواسب فى المنطقة الممتدة بين الصومال وتنزانيا للعصر الجوراسى ، ولكنها ترجع للعصر الكريتاسى بين موزمبيق وأنجولا . والواقع أن نشاط الدورة الأفريقية من دورات التعرية التي تمخضت عن تكوين السطح الأفريقى قد ظهرت مبتدئة من منطقة الساحل التي أصبحت بعد تعرضها للالتواء ذات جوانب مرتفعة ، وهكذا تآكلت بفعل التعرية المنطقة التي تعرضت للاندناء والتي كانت تصل بين سطح جندوانا لند القديم فى الداخل وكان لايزال سائدا حينئذ - وبين المنطقة القريبة من الساحل . ثم أخذت هذه الدورة من دورات التعرية تسير متوغة فى أفريقية متتية مجارى الأنهار الكبرى لتحل محل دورة جندوانا لند فى الداخل ، ورغم أن هذه الدورة لم تفلح فى أن تحل محل الدورة السابقة ، فقد

استطاعت أن تنتشر في منطقة واسعة في جنوب أفريقية في الفترة التي أعقبت أول العصر الكرييتاسي .

وبعد هذا السطح المتحاتى أكثر سطوح القارة التحاتية اتساعا ، وأهمها : وينخفض مستواه بنحو ٤٠٠ متر عن سطح جندوانا لند السالف ، ومن أهم الجهات التي يتمثل فيها هذا السطح سطح هضبة البحيرات التحاتى ، الذى يسمى سطح بوجندا التحاتى ، ويعد من أكبر سهول أفريقية التحاتية ويتراوح ارتفاعه بين ١٢٠٠ و ١٥٠٠ متر ، وتغطيه طبقة من اللاتريت أقل سمكا من الطبقة التي تغطى سطح جندوانا لند وذلك لحداثة تكوينه نسبيا . وقد ظهر هذا السطح التحاتى نتيجة تفكك قارة جندوانا فى العصر الكرييتاسي الأدنى وظهور ساحل جديد للقارة ، فقد ترتب على ذلك نشاط النحت النهري الذى كان يصعد متراجعا نحو منابع الأنهار فلم يستطع النحت فى جوانب وديان الأنهار مسايرته ، وهكذا نجد أن تكوين هذا السطح لم ينشأ نتيجة لانخفاض منسوب البحر أو ارتفاع منسوب الأرض كما هو مألوف . ولم تخلف الدورة الأفريقية سطوحا تبلغ من الاستواء مابلغته سطوح دورة جندوانا لند ، ومن ثم كثيرا ما توجد بها تلال منعزلة ، ويعتبر هذا السطح التحاتى هو السائد فى وسط قارة أفريقية وجنوبيها .

٣ - سطح الميوسين : تكون نتيجة لحركة الانثناء والرفع العنيفة التي كان شرق أفريقية مسرحا لها فى عصر الميوسين ، ولكن هذا الارتفاع لم يكن متجانسا فى كل الجهات ، واستمر الارتفاع فى حوض كلهارى فلم يتأثر الجزء الداخلى من القارة بالارتفاع على حين زاد الارتفاع على الساحل . واستمر نشاط هذه الدورة الميوسينية حتى البلايوسين ، ويقل ارتفاع هذا السطح عن السطح الأفريقي بمقدار ١٥٠ مترا فى أوغندا ، ويرى البعض أن الحواجر المنخفضة نسبيا والتي تفصل بين أجزاء الأنهار الكبرى كالكونغو والزمبيزى ليست الا بقايا السهل التحاتى للميوسينى .

ويبدو أن وسط الكتلة القديمة فى أفريقية كان أكثر جهات قارة جندوانا ارتفاعا ، أما السهول فهى من تكوينات الزميين الثانى والثالث من الرواسب البحرية التي تحيط بهذه المنطقة القديمة ، ورغم أن الكتلة القديمة قد تحولت

أعلى سهل تحاتى فقد تتابع أندفاعها حتى بلغ متوسطها عامة ٩٠٠ متر فوق منسوب البحر .

وإذا كانت أفريقية تمثل قارة السطوح التحاتية المكونة من هضاب مستوية تمتد لمسافات كبيرة ، وإذا كانت هذه الهضاب التي تعرضت لحركات رافعة دفعتها إلى أعلى دون أن تؤدي إلى تكوين سلاسل جبلية قد حافظت على سطحها المستوى إلى حد كبير ، فإن تعاقب حركات الرفع التي تخللتها دورات النحت العنيفة ، قد أدت إلى ظهور الصخور القديمة التي تكونت على أعماق كبيرة من الأرض قريبة من هذا السطح .

ولعب التفاوت في مقاومة الصخور المختلفة لعوامل التعرية دورا كبيرا في تشكيل سطح القارة الذي أصبح اقرب إلى أحواض تفصلها حواجز مرتفعة قليلا أو كثيرا منه إلى هضاب تمتد بينها سهول منخفضة محدودة المساحة . وتندمج هذه الأحواض التي تعرضت في شرق القارة إلى حركة تكوين الأخدود في شكل هضاب ، وقد لوحظ أن هذه الأحواض تمتد عبر الكتلة الأفريقية في اتجاهات متوالية من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى ، وقد يعزى ذلك إلى وجود انكسارات في شكل خطوط متقاطعة لا يصل أثرها إلى سواحل القارة فحسب بل يعدوها إلى جهات المحيط الغربية من هذه السواحل من جهة ، كما يمتد أثرها إلى بقية اليابس الذي تتكون منه كتلة أفريقية القديمة وذلك في جنوب غرب آسيا أى في سببه الجزيرة العربية من جهة أخرى . وأهم هذه الأحواض هى المنخفض الذى يقع أمام ساحل مراكش فى المحيط الأطلنطى ممتدا إلى موريتانيا ، ومنخفض يقع قبالة ساحل غانة تقع على امتداده منخفضات صغيرة مثل منخفض الجوف فى الصحراء الكبرى فمنخفض بسكره ، أما المنخفض الذى يقع قريبا من مصب النيجر فى المحيط الأطلنطى أيضا فيقابله على اليابس حوض النيجر ومنخفض تشاد ومنخفض صحراء ليبيا وحوض بادية الشام ، أما منخفض مصب الكونغو قريبا من ساحل أنجولا فيقع على امتداده حوض الكونغو وحوض بحر الجبل والغزال ومنخفض يقع جنوب غرب هضبة نجد فى بلاد العرب ، أما المنخفض الذى يقع قريبا من ساحل جنوب غرب القارة فيقابله منخفض صحراء كلهارى أما فى شرق القارة فتوجد منخفضات أخرى فى المحيط الهندى أهمها : منخفض يقع شرق جزيرة مدغشقر وآخر عند ساحل

الصومال يقع على امتدادهما بعض المنخفضات فى اليابس . وسنتحدث فى شئ من الايجاز عن الهضاب والأحواض لأن أفريقية يمكن أن توصف بحق أنها قارة الأحواض والهضاب .

أما الأحواض فاهمها حوض الكونغو وتغطية رواسب الكارو والقارة التى تكونت منذ أواخر العصر الفحسمى حتى العصر الجوارسى ، وهى تنحدر نحو داخل الحوض نتيجة لحركات التواء خفيفة . ويعد هذا الحوض قلب القارة ومنطقتها المركزية ، وقد شق نهر الكونغو طريقه عبر حافة القارة الأفريقية فانحدر على مايعرف باسم جبال كريستال ، وهو ليس حوضا سهليا منخفضا كما قد يتبادر الى الذهن بل هو منخفض لا يقل ارتفاع منسوبه فوق مستوى سطح البحر عن ٣٣٠ مترا . وقد استطاع النهر أن يتلمس له منصرفا للمحيط ، فخلف وراءه بحيرة أو بحرا داخليا كان يغمر هذا الحوض ، أما حوض الأورنج فهو لا يقتصر على حوض هذا النهر بل يضم جانبا من جنوب صحراء كلهارى الذى ينحدر نحو هذا الحوض ، وكثيرا ما تتراكم الأمطار التى تسقط فى الجزء الأوسط من حوض النهر غلا تنصرف اليه ، وإنما تكون بحيرات ضحلة . أما فى شمال القارة فتوجد بعض الأحواض الداخلية كحوض تشاد الذى يصب فيه نهر شارى الذى ينبع من الحافة الجنوبية للحوض ، ورغم شدة البحر فان هذه البحيرة المغلقة عذبة المياه وتغضى بعض جهاتها النباتات المائية ، وتدرج ميساد البحيرة لمسافة ١٠٥٠ كم للشمال لتمد واحات بورقو بالمياه الباطنية . أما حوض السودان فيجرى فيه نهر النيل الذى استطاع فى النصف الشمالى لهذا الحوض فى منطقة النوبة أن يخرج بمشقة من الحوض مستعينا حيننا بالنحت التراجعى والأسر النهري وحيننا آخر بالدوران حول المرتفعات التى تعترضه ، أما فى الطرف الجنوبى فالحوض مخلق بفضل تقارب هضبة الحبشة من الشرق ومرتفعات خط تقسيم المياه بين الكونغو والنيل من الغرب وهضبة البحيرات من الجنوب ، ويقع مركز الحوض فى منطقة السدود ومستنقعات بحر الجبل . وقد تكونت هذه المستنقعات من الأتار الباقية لبحيرة كبيرة كانت تغضى مساحة كبيرة من هذا الحوض كما يرى البعض .

أما الهضاب فتشمل شبه جزيرة جنوب القارة التى تتمثل فى هضبة

مرتفعة يعلو أكثر أجزائها على ١١٠٠ متر وقليل جدا منها يقل مستواه عن ٣٣٠ مترا ، أما السهول السناحلية التي تضيق بها بقية القارة فتتسع فى وسط موزمبيق فتصل الى ٢٢٠ كم ، أما الاحواض التي يزيد ارتفاع قاعها على ٢٣٠ مترا ، مثل حوض الكونغو والأورنج والزمبيزى الأعلى فنتركز فى الجانب الغربى حيث تحيط بها تماما هضاب أكثر ارتفاعا ، يصل منسوب بعضها الى نحو كيلومتر أما الى الشرق من هذه الاحواض فتوجد هضاب عظيمة الارتفاع ، يتراوح ارتفاعها بين ١٢٠٠ و٢٦٠٠ متر ، وهكذا تقع هضبة شرق افريقية على امتداد حوض الكونغو ، كما أن هضبة الفلد العليا High Veld فى ولاية الأورنج الحرة والبرتغال ، والتي يزداد ارتفاعها كثيرا فى كتلة باسوتولاند Basutoland Massif تنتهى فى أقصى الشرق بحافة دراكنزبرج التي لا تمثل الا حافة الهضبة الافريقية وهى تبدو كحائط عظيم الارتفاع من الشرق وهكذا يتألف جنوب القارة من هضبة بوجه عام تزداد ارتفاعا فى الشرق والجنوب ، ومن أحواض مرتفعة فى الغرب .

أما نصف القارة الافريقية الشمالى ، فيحمل طابع الهضبة الفسيحة التي يقدر متوسط ارتفاعها بنحو ٣٠٠ متر ، والتي تشيع فى أرجاء هذه المنطقة لونا من التجانس والتشابه ، ولكن لا تخلو الحياة النباتية والبشرية ، والمواد التي تغطى السطح من تباين يعزى فى أكثر الأحيان الى اختلاف فى طبيعة السطح . فمن الشرق تمتد مرتفعات الى غرب الشمالى الغربى ، وأهم هذه المرتفعات تقع فى هضبة الحجار التي يفصلها نجد اقل اتساعا وارتفاعا يمتد جنوبى فزان ليصل الى تلال تبستى ، وهى فى الواقع بقايا أو جذور سلسلة جبال التوائية قديمة جدا تركت آثارها فى هذا الاتجاه الذى لا زال واضحا فى هذه المرتفعات ، ولكن يعزى بقايا هذه الجهات مرتفعة الى صلابة الصخور وثدة مقاومتها لعوامل التعرية فضلا عن حركات رافعة تالية وما تراكم عليها من صخور رسوبية وبركانية .

أما حافات هضبة الصحراء الكبرى فيظهر فيها التباين واضحا ، فمن حوض بيسكره ، ووادى درعة ، ومنطقة موريتانيا المنخفضة ، وجبال أطلس المرتفعة فى الشمال والغرب الى جبال الكمرون وحوض النيجر وجبال فوتا جالون وهضبة الحبشة ومنطقة السود ومنخفض عفار وعيسى جيبوتى فر

الجنوب والشرق . ولكن يجب ألا يطغى اهتمامنا بما تمتاز به منطقة الأطلال من تباين على التشابه الذى أضفته هضبة الصحراء الكبرى على نصف القارة الشمالى . ( انظر شكل ٢ ) .

ورغم ما يميز القارة الافريقية بوجه عام من تقارب فى ارتفاع أجزائها المختلفة التى يتراوح منسوبها أكثرها بين ٦٠٠ و ١٢٠٠ متر ، وذلك فى مناطق واسعة باستثناء ما حدث من تباين فى شرق القارة نتيجة لحدوث الأخدود الافريقى فيمكن أن نميز منطقتين من حيث السطح ، هما . أفريقية العليا ، وأفريقية السفلى . ولكن قبل أن نحاول أن نتلمس خطأ يفصل بينهما ، يجب أن نذكر أن من التعسف تقسيم القارة الواحدة الى أقاليم متميزة . وبخاصة أننا نلجأ فى هذا التقسيم الى وضع خطوط على حين أن الاختلافات لا تحدث الا تدريجيا فى شكل مناطق انتقالية ، ومما يضاعف من صعوبة تقسيم القارة الافريقية قلة التباين فى تضاريسها وبنيتها .

فأفريقية العليا التى يزيد ارتفاعها على ١٠٠٠ متر فى أكثر الأحيان تقع الى الجنوب والغرب من خط يمتد من بلدة لواندا على خط عرض ٨٠° جنوبا على ساحل أنجولا ليمر فى أعالي نهر لوالابا ولوالبولا من روافد نهر الكونغو ، ومنها الى بحيرتى بنجويلو وموبرو ويتجه هذا الخط شمالا محاذيا الحافة الغربية للأخدود الغربى حتى بلدة غندو كرو . ثم يتجه نحو الشمال الشرقى ليحف بالجانب الغربى من هضبة الحبشة . تم يساير قمم جبال البحر الأحمر حتى يعبر شبه جزيرة سيناء فى وسطها نحو الشرق ، ورغم وجود مناطق مرتفعة تقع الى شماله كجبال دارفور وتبستى والحجار فأكثر هذه الجهات الى شماله وغربه منخفضة تقل ١٠٠٠ متر . بل يقع أكثرها على مستوى يقل عن ٥٠٠ متر . ويغلب على أفريقية العليا أنها مكونة من صخور بللورية قديمة متحولة الى جانب كثير من اللابة والصخور البركانية ، كما أنها اذا تورنت بأفريقية السفلى تعد أكثر تعرضا للانكسارات سواء فى الساحل أو فى الداخل ، كما يظهر فى منطقة الأخدود الافريقى . وقد أصاب بعض جهات أفريقية العليا كهضبة الحبشة التعميد فغطت الصخور الأركية القديمة صخور رسوبية بحرية من الحجر الجيرى والحجر الرملى تراكمت عليها بعد ذلك طفوح بازلتية ومدقوفات من اللابة وصخور بركانية .

ولا يوجد هنا من الأحواض سوى حوض كلهارى الذى تغطيه رواسب أكثرها  
قارية قد تراكمت بفعل الرياح فى الزمنين الثالث والرابع . ولكن لم تخل  
أطراف أفريقية العليا من رواسب بحرية قديمة التوت فكونت منها جبال  
تسفاتبرجن Swarteborgen ولانجبرجن Langebergen  
فى جنوب ولاية الكاب .

أما أفريقية السفلى فتعد منطقة الهضاب والسلاسل الجبلية النحاتية  
المنعزلة وتبدو منطقة الأحواض التى لازال بعضها جافا كحوض ليبيا ،  
بينما الأخر كانت تشغله مساحات مائية انكشبت كحوض الكونغو حتى  
أصبحت مقصورة على بحيرات صغيرة ، وتنتشر بها التكوينات الرسوبية  
السطحية الحديثة نسبيا . ثم أفريقية الصغرى أو منطقة الأطلس التى  
تجعلها الظروف الطبيعية بل والبشرية امتدادا لما يسود فى جنوب أوربا الى  
الشمال من حوض البحر المتوسط الغربى ، فرغم أنها فى مجموعها تمثل  
سلاسل جبلية حديثة فهى تتضمن نواة مكونة من صخور اركسية قديمة  
لما يجعلها امتدادا للهضبة الأفريقية فى الصحراء الكبرى .

### خصائص البنية والتضاريس :

١ - أكثر جهات أفريقية المرتفعة عبارة عن سطوح تحاتية ، أى أن  
ارتفاعها يعزى الى صلابتها صخورها فظلت مرتفعة نسبيا ولكن يوجد فى  
الشرق بصنفة خاصة هضاب نشأت نتيجة حركات دفع أو خروج المصهورات  
البركانية من باطن الأرض كما حدث فى هضبة الحبشة ، وهضبة شرق  
أفريقية ، فلا غرو ان كانت أكثر جبالها بركانية أو انكسارية ، ولا يشذ فى  
ههيم القارة عن ذلك الا كتلة رونزورى التى تعرضت للتواء عمودى .

٢ - يشغل أكثر مساحة القارة الكتلة الأركية الهضبية التى لم تترك  
كسلايتها وقربها من الساحل مجالا واسعا لتكوين سهول ساحلية أو سهول  
هضبية عظيمة كما يشاهد فى جنوب شرق آسيا أو الأمريكيتين ، فقلما يربو  
التساع السهل الساحلى على ٣٠ كم ، ولا يشذ عن ذلك الا منطقتان : الأولى  
منطقة موزمبيق الوسطى حيث يبلغ اتساع السهل نحو ٣٢ كم ، ثم حوض  
النيجر الأدنى حيث تتسع السهل الفيضى وتمتد دلتا هذا النهر بين حافة




المهضبة والمحيط ، والواقع أن كلمة « السهل الساحلى » الذى يميز القارات  
بأنه لا يعنى هنا « هلا بمعنى الكلمة ، وإنما تطلق على المدرجات المرتفعة  
التي تليها حافة القارة الى الساحل .

١ - قد ترتب على هذا النوع من البنية استقامة السواحل أو ندرة  
بمواجهتها وهلة الجزر التي تصدب من الساحل وندرة أشباه الجزر التي تمتد  
من القارة ، ولا يستثنى من ذلك سوى جزيرة مدغشقر التي كان اتصالها  
بالساحل الغربي المغايل التي انفصلت عنه من الناحية الجيولوجية منذ  
واحد العرن الثاني محدودا ، وجزيرة زنجبار التي تقع على كتب من الساحل  
مارة من شرفها ارتباطا وثيقا بالساحل الأفريقي ، وقد لعبت رغم صغر  
حجمها في تاريخ هذا الساحل دورا جديرا بالاهتمام ، أما الجزائر الشمالية  
الواقعة في البحر المتوسط فقد تأثرت بما ساد من حضارة وما سيطر عليه  
من تيارات سياسية كانت ولا تزال أوبية الصبغة الى حد كبير حتى لتعد  
ملحمة بالتقارر الأوربية الى حد بعيد .

بالساحل مرتفع والأرض الواقعة خلفه مباشرة وعرة ، والأنهار التي  
تصبها وهي قليلة لا تصلح للملاحة لكثرة جنادلها ومساقطها حين تعبر هذه  
السهلة المرتفعة للهضبة ، والجفاف قد ساد مسافات طويلة من سواحل القارة  
من ثم أوراقى ، ثم على الساحلين الشرقي والغربي فلا عجب ان كان للظروف  
المناخية يد طولى في تأخير أعمال كشف القارة واستغلالها ، أما في ساحل  
مناخه بين سيراوون ودلتا نهر النيجر فتتضافر عوامل غير ملائمة لقيام موانئ  
مطبوقة من استقامة الساحل ، وندرة وجود مواقع صالحة لقيام موانئ أمينة  
عميقة ، الى انتشار الحواجز الرملية التي تساعد التيارات المائية التي  
تعد بسواحل القارة على تكوينها ، والتي تغذيها رواسب الأنهار ، الى جانب  
نشرة المستنقعات الموجودة بدالات هذه الأنهار ، والواقع أن أكثر أنهار  
التي تدعى بدالات ذات سواحل منخفضة ضحلة كثيرة المستنقعات - إذا  
استثنى الكونغو - ونهر زيمبزي والنيجر والنيل .

وإذا كانت بنية القارة القديمة الهضبية هي التي حرمتها التعاريج ،  
فلا غرو أن مايسود شمال غرب القارة من نظام للبنية وللتضاريس خاص ،  
قد أدى الى ظهور سواحل كثيرة التعاريج ، صالحة لقيام الموانئ ،



تضاريس أفريقيا

خريطة رقم ( ٢ )

مما اجتذب السكان الى البحر ، على نقيض مايميز قارة أفريقيا بوجه عام من توزع سكان السواحل للاتجاه نحو الداخل ، وعدم اهتمامهم بالنشاط البحري أو انشاء الموانئ . وقد سبق أن ذكرنا أن قلب القارة يمثل كتلة ضخمة يابسة متصلة لا ينفذ اليها خليج أو يقترب منها ساحل ، فعلى حين خمس كل كيلومترا من السواحل ٤٦٠ كيلومترا مربعا من مسافة القارة في

أوروبا تنخفض هذه النسبة الى كيلومترا لكل ٥٠٠٠ كيلومترا مربعا فى افريقية ، بينما تصل الى ميل فى كل ٧٢٠٠ كيلومترا مربعا فى أمريكا الجنوبية اكثر القارات شبيها بأفريقية .

٤ - قد أدت السواحل الانكسارية وندرة الالتواءات أو السواحل المنعمورة الى ضيق الرصيف القارى ، فالانتقال المفاجيء من الشواطىء الى اعماق المحيط المجاور اذا استثنينا سواحل البحر المتوسط وساحل الكاب فى أقصى الجنوب مما يميز القارة الأفريقية ، فلا تتجاوز المسافة بين ساحل المحيط الأطلنطى فى الغرب وبين خط عمق ١٠٠٠ قامة أكثر من ٨٠ كيلومترا .

ويبلغ الرصيف القارى أقصى اتساعه فى المثلث الذى تمتد قاعدته بين رأس الرجاء وبورت اليزابيث بينما تبعد قمته نحو الجنوب لمسافة ١٦٠ كم جنوب كيب أجولهاس Cape Agulhas

نظام صرف المياه : مهما تلمسنا وجود نظام للتضاريس فى القارة فان دراسة أشكال السطح فى القارة الأفريقية تدل على أن المنخفضات والمرتفعات أى الأحواض وما يفصلها من مرتفعات تقسيم المياه تتتابع دون نظام فتبدو مختلفة متداخلة ( انظر شكل ٣ ) ، ولكن مع ذلك فان الطابع العام للقارة التى تشبه « طبقا » مقلوبا هو تعاقب الساحل الضيق وحافة الهضبة التى تشقها مجارى الأنهار الدنيا يليها نحو الداخل كتلة الهضبة نفسها بسطحها المنخفض نسبيا ، فلا عجب ان وجدنا منابع كثيرة المستنقعات كانت تغلها بحيرات واسعة اختفى بعضها على حين لازل البعض الآخر مخلفا وراءه بقية . ويعزى عدم توافر انحدار يكفى لانتظام صرف المياه الى وجود ظاهرتين : الأولى هى تردد المياه فى اتجاهها وانتشار ظاهرة الأسر النهري فى منابع الأنهار ، أما الثانية فهى عدم انصراف مياه الأنهار مباشرة الى البحر متتبعه اقصر الطرق ، فكثيرا ماتبدو الأذهار كأنما تولى ظهرها نحو البحر سالكة طريقا طويلا حتى تعود لتفرغ مياهها فى البحر ، بل أن كثيرا من هذه الأنهار يفقد مياهه فى مستنقعات الأجراء العليا ، ولا يستطيع أن يصب فى البحر . وهكذا تجد أن اكثر من نصف القارة تنصرف مياهه فى الداخل ، وتعزى تلك الظاهرة الى ضيق السهل الساحلى الذى لا يمثل منسوبا قاعديا شديدا الجاذبية والقوة يجتذب اليه مياه الأنهار ، فضلا عن

اندفاع سطح القارة فى عصر جيولوجى حديث نسبيا الى أعلى مما اعترضه.  
مياه الأنهار التى تضطرب الى أن تمهد طريقها من جديد بعد أن كانت قد  
بلغته أو كادت من قبل . وفى ضوء هذا الوصف لسطح القارة يمكن أن  
نصف النهر المثالى فى افريقية - وهو بدع من الأنهار التى تخضع للقاعدة  
العامة لنظام جريان المياد - بأن مجراه الأعلى طويل كثير المستنقعات  
والبحيرات قليل الانحدار بطيء التيار ، كثيرا ما يتعذر أن نحدد وجهته  
بوضوح أما مجراه الأوسط فهو قصير تعترضه الجنادل لأنه يهمل المنطقة  
التي يعبر فيها النهر حافة الهضبة ، أما الجزء الأدنى فهو قصير سرعان  
ما ينتهى بدلتا تتخللها فروع النهر .

والواقع أن الأحواض الكبرى التى تمثل ظاهرة مهمة فى أفريقية  
تشغلها أنها ضخمة حتى يقدر أن ثلثى سطح هذه القارة تنصرف مياهه عن  
طريق سبع مجموعات نهريّة كبرى دون أن تترك مجالا كبيرا لأنهار صغيرة  
تنتشر فى أرجاء افريقية شأن غيرها من القارات .

وأهم الأنهار هى :

١ - نهر الأورانج : وينبع من منحدرات حافة دراكنزبرج نحو الغرب  
ليتصل به رافده الفال Vaal وينحدر نهر الأورانج كغيره من الأنهار  
الأفريقية فوق سلاسل أوغراييس (Aughrabics Falls) قبل أن  
يصب فى المحيط الأطلنطى ولكن كثيرا ما يجف قاع النهر قبل وصوله الى  
مصبه حيث صحراء ناميب عند الساحل ولكن هذا النهر الذى قد يمتلىء  
بالمياه أثناء فيضانه أحيانا لا تجرى المياه طول العام فى منابعه حتى فى أكثر  
هذه الجهات مطرا فى منطقة الفلد الأعلى High Veld

٢ - نهر الزمبيزي : الذى يعد بحق مثالا للنهر الأفريقى فمنابعه العليا،  
تسير فى حوض ضحل متسع فوق سطح الهضبة قد غطته رواسب من الطمي ،  
وتتنوع المنابع ، فمن منابع دائمة الجريان الى منابع تجف أحيانا تأتي من  
أقصى الغرب فى داخل الهضبة ، ثم تتابع الانكسارات التى شقت للنهر طريقا  
ضيقا وعرا ، يمثل خانقا تسقط فيه الميساه بنحو ١١٠ مترا فيما يسمى  
بشلالات فكتوريا Victoria Falls ولكن المجرى الأدنى من النهر

يعد صالحا للملاحة لمسافة طويلة قبل ان يصب فيه نهر شيرى Shire حاملا مياه بحيرة نياسا ، ومن ثم فان منابع الزمبيزى يمكن ان تستخدم فى الرى ، وان لم تكن قد استغللت لهذا الغرض ، كما انها تصلح للملاحة لمسافات طويلة .

٢ - نهر الكونغو : وهو نهر افريقى بحسق ، ولو انه يختلف عن الزمبيزى بفخزل وقرعه فى قلب افريقية المدارية المطيرة فهو يجرى بطيئا على سطح الهضبة وتنتشر فى منابعه بحيرات بنجويلو ومويرو ، كما يوجد حوض داخلى مرتفع القاع كان يهتل بحيرة او بحرا داخليا ينحدر نهر الكونغو على جانبه فى طريقه نحو المصب ، نتمتضه شلالات ستانلى ولكن يعود مجراه متموقه الجنادل والشلالات حين يهبط من مجراه الأوسط على حافة القارة الافريقية فى طريقه الى السهل الساحلى الضيق .

٤ - نهر النيجر : وهو يشبه انهار افريقية الأخرى وبخاصة الزمبيزى ، الذى ينبع من مرتفعات فوتاجالون قريبا من المحيط اذ لا تبعد منابعه عن المحيط بأكثر ٣٣٠ كم ، ولكنه يسير لمسافة ٥٦٠٠ كم قبل أن يصب نى المحيط . وثابت منابعه تمثل الأجراء العليا من نظام نهري قديم كان يصب فى بحيره جفت واصبحت تنتشر كأنها مستنقعات اثناء فترة الفيضان ، وتنتشر هنا رواسب مايسمى بدلتا النيجر الداخلية ، وتزحف منابع نهر بنوى ، «Benue» تدريجيا نحو بعض منابع نهر شارى ، زحفا قد ينتهى بأسرها .

٥ - نهر النيل : وهو أعظم انهار افريقية قاطبة ، وان كان فى الواقع يمثل نظاما نهري قديمة ، ارتبطت بعضها ببعض الآخر بواسطة النحت تارة والحركات التكتونية تارة اخرى بحلقات تبدو عليها الجدة ، ويتكون النهر فى الغالب من اجزاء تتأثر بظروف السطح والبنية فى كل بقعة يسير فيها . والنيل فى هضبة البحيرات افريقى فى نظامه ، سواء فى وجود بحيرة مسحة عند منابعه هى بحيرة فكتوريا ، أو بطئه ، وكثرة المستنقعات التى تنتف بعض روافد هذه البحيرة ، ويجرى هذا النهر على سطح الهضبة حتى ينادى انتهى الى مصيره فى بحيرات كيوجا ، ولكن انكسارات مرتشيزون ، بطئه ، كما ينادى مصيرها بنظام طريف يسير فى قاع الأخدود وهو النظام النابرى حتى ينتهى النيل فى هضبة البحيرات عند غندكرو عند حافة هضبة

البحيرات ، ليجد عيوباً تكتونية مكنته من أن يتابع سيره فى حوض داخلى ضخم فى السودان الجنوبى والأوسط ، وهو هنا لا يختلف عن حوض النيجر الأوسط أو الكونغو الأوسط كما يغطى هذا الحوض الداخلى رواسب قارية ، ولكنه بعد أن كاد يصل الى نهايته فى نهاية النيل الأبيض يلتقى به النيل الأزرق ليجدد من نشاطه ، فأستطاع أن يشق طريقه عبر منطقة الجنادل فى النوبة حتى اذا اجتازها ألفيناه يجد مجالاً واسعاً ليكون سهولاً فيضية ويشذ فى هذه المنطقة عن انهار الافريقية . لوجود التكوينات الرسوبية القليلة الانحدار التى تفصل حافة الهضبة الافريقية عن ساحل البحر المتوسط مما يتيح له المجال ليسير مسافة طويلة فى واديه ودلتاه .

### التربة :

تعد التربة احدى المنح الطبيعية بل أهمها بعد موارد المياه ، فالتربة وسط حى تتفاعل فيه عناصر اشتقت من الأغلفة الثلاثة المحيطة بالأرض : الغلاف الجوى ، وبخاصة الحرارة والرطوبة والغلاف اليابس من صخور ومعادن ، والغلاف الحيوى من كائنات حية نباتية وحيوانية ، تعيش فى التربة . هذا الوسط المتغير يتأثر دائماً بالتاريخ المورفولوجى للمنطقة من انحدار الأرض ورطوبة التربة ونظام صرف المياه بها ، وكثيراً ماتجلو التربة أكثر مما يوضح السطح هذا التاريخ : وكما يعتبر النبات الطبيعى دليلاً محسوساً يحمل فى تضاعيف تكوينه نتيجة تفاعل عناصر البيئة الطبيعية المختلفة وينم عنها فالتربة من أهم العناصر التى تؤثر فى هذا النبات سواء بصفتها عنصراً مهماً من عناصر الوسط الطبيعى الذى ينمو فيه النبات ، أو لأن العناصر المناخية تتخذها طريقاً لتؤثر على النبات تأثيراً غير مباشر .

يتكون شطر كبير من القارة الأفريقية بوجه عام من هضبة مستوية تتألف من صخور بلورية نارية ومتحولة شديدة الصلابة ، ولذلك فالاستواء الشديد لم يساعد كثيراً على نقل فتات هذه الصخور الصعبة التفكك حتى أصبحت التربة هنا مشتقة من الصخور المحلية غالباً ، وتتألف فى أكثر الأحيان من ذرات الرمال وبخاصة من الكوارتز ذات حواف حادة كثيراً ماتلحق من أطرافها القوية الضرر البليغ بالآلات الحرث لتأكلها السريع .

بولذلك ظل الزارع فى أمريقية لا يجد سوى العجبا اليدوية ليستخدمها فى زراعتها ، كما أن استخدام الجرارات يؤدي الى اندماج حبيبات هذه التربة ، وتماسكها فتفقد مساميتها ، وتنشط فى ظل المناخ الحار الذى يسود أكثر أنحاء القارة العمليات الكيماوية فى التربة ، وهكذا يؤدي ارتفاع درجة حرارة التربة والهواء الى تغلغل المياه من التربة السطحية الى أعماقها ، وكثيرا ماتتمخض ظاهرة ذوبان المعادن وغسيلها من سطح التربة لتترسب فى باطنها «Leaching» عن فقد التربة لمساميتها ولكثير من مواردها العضوية والمعدنية النافعة من الطبقة السطحية ، ولكن فى فصل الجفاف أو فى الجهات الجافة تنشيط حركة صعود الأملاح خلال مسام التربة الى سطحها فتنتشر البقع الملحية فى التربة ، كما تتلف المواد العضوية لأن توفر الحرارة العالية يضاعف من تأثير عملية التأكسد ولذلك لا يتكون الكثير من الدبال أو المواد العضوية التى توفر للنبات غذاءه كما فى الجهات المعتدلة ، ومن العاريف أن بعض العمليات الزراعية كالحرث التى تساعد على تهوية التربة فى الجهات المعتدلة قد تلحق الضرر بالتربة فى هذه الجهات المدارية إذ تؤدي الى سرعة تحلل المواد العضوية ، بل كثيرا ماتتقضى على المواد المخضبة فتصبح التربة جدياء ، لأن إزالة الغطاء النباتى تتيح لمواد التعرية وبخاصة المياه التى تسقط فى صورة سيول جارفة أن تكتسح التربة المفككة ، فما يبدو على التربة فى جهات الغابات الاستوائية من خصوبة انما يأتى نتيجة لنمو الغابات الاستوائية التى توفر بفروعها وأوراقها التربة السطحية الغنية بالمواد العضوية ، فاذا أزيلت الغابات تكشفت من تحتها تربة يملية تكاد تكون جدياء ، والواقع أن مشكلة المسامية هنا معقدة لأن نقص المواد العضوية وسقوط المطر الغزير كثيرا مايساعد على زيادة تماسك التربة التى تصبح قليلة المسامية ، والحقيقة أن ظروف تكوين التربة فى الجهات المدارية وخصائصها وطرق الزراعة التى تختلف تماما عن الظروف السائدة فى الجهات المعتدلة لازالت موضع جدال واختلاف فى الرأى ، فتنطهير التربة من الحشائش قد يؤدي الى اكتساح التربة فى الجهات المدارية ، ولازال علماء التربة فى حيرة من أمر زراع الجهات المدارية الذين يلجأون لاحتراق النباتات لتنطهير الأرض قبل زراعتها وهل تضيف تلك الطريقة بعض البوتاس المخضب للتربة أم تنطوى على بعض الأضرار .

كذلك فان نشاط البكتريا والكائنات العضوية التى تعيش فى التربة لازال موضوع جدال ، فالأرضة التى تترك خلفها أكواما غنية بالجير الذى تفقده تربة هذه الجهات المدارية كثيرا ما يعزى اليها سرعة استهلاكها للمواد العضوية التى تتأكسد بسرعة . ويرى البعض أن غمر الأرض بالمياه لزراعة الأرزق يقى التربة شرر التعرية ولكن لا بد أن يكشف المتخصصون ما يحدث لنشاط البكتريا والكائنات العضوية الدقيقة عن تغيير تحت سطح المياه . وتعد ظاهرة التعرية من أهم الظواهر التى تهدد التربة فى افريقية بالدمار . ولذلك يستحسن الابقاء على العطاء النباتى من الغابات أو الحشائش بل يرى البعض ادخال زراعة حشائش تصلح علفا للحيوان وعدم تحديد مواطن رعى للمواطنين من الرعاة داخل نطاق محدود دون تقييد لعدد مايربونه من رؤس الماشية ، كما أن طرق زراعة قطع متناثرة يفصلها جهات تترك لتنمو بها النباتات الطبيعية واتجاه خطوط الحرث على طول الخطوط الكنتورية من الوسائل التى تتخذ للمحد من تعرية التربة ومكافحتها .

**أنواع التربة فى افريقية :** استطاع ماربوت رشاتس Marbut, Shantz أن يقوما بأول محاولة لدراسة وتصنيف وتوزيع التربة فى افريقية ، ولكن استندت دراستهما على فحص نحو اثنتى عشرة عينة من التربة فحسب ، هذا الى جانب بضع دراسات محلية تفصيلية فى جهات متفرقة تتناول بلادا كتنزانيا وكينيا وزانير وغينيا ، وقد أمكن الوصول الى نتائج على ضوء العلاقات التى ظهرت فى دراسات قادت فى الولايات المتحدة للربط بين المناخ والنبات الطبيعى والتربة - وقد حدا ذلك بالكثيرين أن لا يقرروا ما وصل اليه هذان العالمان من نتائج . وأهم أنواع التربة فى افريقية :-

**أنواع التربة فى الأقاليم الاستوائية والمدارية :** تتشابه التربة بوجه عام فى منطقة متسعة فى افريقية الوسطى بين السودان الجنوبى واقليم السفانا فى أنجولا وجنوب حوض الكونغو وزامبيا . وتتميز التربة هنا بأنها ضاربة للحمرة غالبا لوجود أكاسيد الحديد والألنيوم ، وبينما نجد الطبقة السطحية خفيفة تظل التربة السفلى ثقيلة مكونة غالبا من الصلصال، وتؤدى ارتفاع الحرارة وشدة الرطوبة الى فقد التربة السطحية لكثير من المواد العضوية والمعدنية بدرجات متفاوتة ، ولكن غالبا ماتفقد هذه التربة،



محتوياتها من المواد الجيرية . مما ينقص من قيمتها الزراعية ، بل كثيرا ماتفقد المواد المشتقة من الصخور المحلية خصائصها الأصلية تماما ، وتفقد هذه التربة عن طريق الذوبان الشديد الذى تتعرض له المواد القابلة للذوبان الى رمال ظامئة جافة يقع أسفلها تربة صلصالية صماء ، كما تتحلل وتفسد المواد العضوية وتتعرض للتربة بعد اختفاء الغطاء النباتى الطبيعى ، ولذلك يجب الاحتفاظ بهذا الغطاء أو استبداله بغيره من النباتات المزروعة ، أو تركها بورا لتسترد خصوبتها التى تفقدها سريعا ، لأن الغابات تمتص جزءا من المواد الغذائية ، ولذلك قد يكون ترك الأرض بورا طبقا لمنظام الزراعة المتنقلة السائد أمرا مرغوبا فيه ومن أهم أنواع التربة هى : -

١ - اللاتريت «Laterite» : قد أثار استخدام كلمة اللاتريت كثيرا من التناقض والغموض حتى اقترح البعض أن يطلق على أنواع تربة اللاتريت التى توجد فى صور نطاقات متعددة تعبيراً جامعاً هو «Latosol» وقد ميز شانيس وماربوت بين الأنواع الآتية من تربة اللاتريت التى تمتاز بوجود طبقة صلبة متماسكة لتعاقب التشبع بالرطوبة والجفاف .

( ١ ) اللاتريت ويعنى بها أنواع التربة التى تضرجت ، أى تأثرت بعوامل التربة فتحولت عناصرها فأصابها من التغيير الكثير ، وهى مقصورة على بقاع محدودة فى الجهات التى يصيبها قدر من المطر لا يقل عن مترين فى العام كسفوح جبال فوتا جالون فى المنطقة الواقعة بين غينيا وسيراليون وليبيريا .

( ب ) الطفل الأحمر اللاتريتي «Lateritic Red Loams» وهى تمثل أنواع التربة التى بلغت المرحلة الوسطى من النضوج والتطور ، وعلى حين تخلو التربة الحديثة العهد بالتكوين من أيدروكسيد الألومنيوم ترتفع نسبته الى حد ما فى هذا النوع من التربة ، هذا وأن كانت تظل دون نسبته فى تربة اللاتريت التامة النضج ، وتعد هذه التربة صالحة للزراعة وهى تنتشر فى وسط الكونغو والجهات المجاورة من أفريقية الاستوائية .

(ج) أنواع التربة الطفلية الحمراء «Red Loams» وهى تربة

جغرافيا العالم

اللاتريت: الحديدية التكوين وهي تكاد تخلو من أيروكسيد الألومنيوم ، وهي أقل تعرضت للتعرية ، كما أن مقدار ما يذوب من طبقتها السطحية أقل مما يذوب من أنواع اللاتريت السابقة ، وهذه التربة خصبة صالحة للزراعة ، وتنتشر في الجهات التي ينالها قدر متوسط من المطر لا يربو على ٣٠ متر في العام ، ولذلك فهي توجد حيث تقتصر النباتات الطبيعية على سفانانا البساتين في زامبيا وجنوب الكونغو كينشاسا وزائير وأنجولا بوجه عام .

٢ - تربة الطفل الأحمر الحديدية التكوين في المرتفعات : تنتشر هذه التربة عند سفوح المرتفعات في هضبة شرق أفريقية بوجه خاص ، وتكفل التعرية النشيطة للتربة توافراً مواتاً مفتتة ، وتكثر في المناطق الجبلية بين المدارين كمرتفعات الكمرن وجبال كلمنيارو وكينيا . وتعد هذه التربة صالحة للزراعة كما تنتشر بها مزارع الوطنيين والأوروبيين على السواء .

توجد تربة سوداء قليلة الخصوبة لزجة إذا سقط المطر تنتشر حيث تنمو حشائش السفانانا ، تناظر التربة السوداء في إقليم الأستبس المعتدلة . هذه التربة التي تعرف أحياناً باسم التربة السوداء المدارية أو تربة القطن تسود أواسط السودان وجنوبه وأوغنده وبعض جهات شرق أفريقية .

**التربة في إقليم البحر المتوسط :** لا يتفق موسم الحرارة مع فصل اطر ، ففي الصيف الجاف يصيب سطح التربة الجفاف كما يبطئ النشاط الكيماوى فيها ، أما في الشتاء المطير فيحول انخفاض الحرارة دون نشاط عوامل تكوين التربة التي تصبح حينئذ رقيقة غير ناضجة ، ولذلك فكثيراً ما تقتصر التربة في الجهات الجبلية المنتشرة في إقليم البحر المتوسط سواء في جبال أطلس الكاب على تراكم فتات الصخور في الشقوق على حين تظل القمم الجبلية عارية من التربة . ويمكن تمييز نوعين منها من حيث طبيعة التكوين الأول هو الطفل Loam والثانى الطفل الرملى Sandy Loam . أما الجهات الغزيرة المطر نسبياً فتوجد بها التربة

السمراء كما في جبال أطلس ، وتتراكم رواسب الطفل أو الطفل الرملى في جنوب أفريقية في الوديان ، ولكن المطر لا يبلغ من الغزارة حداً يذيب كل المواد العضوية من الطبقة السطحية لتتراكم في الطبقات العميقة ، أما في موسم الجفاف فإن هذا الجفاف لا يشتد كثيراً حتى يؤدي إلى كثرة تراكم

الكربونات على سطح التربة من جراء صعودها من باطن التربة الى هذا السطح .

هذه التربة فقيرة فى المواد المخصبة كالنتروجين والفوسفور والبوتاس مما يجعل تسميدها ضروريا للمحافظة على قدرتها الانتاجية وخصوبتها ، أما الجهات التى ينالها قدر أقل من المطر فهى أقل خصوبة ، وأكثر تعرضا لتراكم الأملاح وتكوين بقع صماء على سطحها ، وتسمى هذه التربة بالتربة السمراء الكستنائية أما التربة السوداء فتوجد فى مناطق الأطراف المحدودة المساحة بسبب تراكم المواد العضوية بها ، ولايد لكى تظهر أن تتوافر أسباب التعادل أو التوازن بين عملية الاذابة من السطح وبين تأثير تصاعد المواد المختلفة من باطن الأرض ، كما يقع عند الأطراف الجافة المتاخمة للصحراء تربة صحراوية تنتشر فى الجهات الجافة فى جنوب بلاد المغرب أو قريبة من صحراء كلهارى فى جنوب القارة : ويمكن أن نميز بوجه عام بين تربة الحجر الجيري المذاب فى شكل التربة الحمراء Terra Rossa الذى ينتشر فى الجبل الأخضر بصفة خاصة ، والتربة السوداء للرمادية الداكنة التى تتكون من الطفل السهل المفتت وتنجح بها زراعة الكروم والزيتون .

**التربة فى الجهات الصحراوية :** تختلف باختلاف نظام المطر القليل النادر ونظام الصرف ونوع الصخور فى المنطقة التى نشأت بها التربة ، وتمتاز التربة فى الجهات الصحراوية بارتفاع نسبة الرمل بها ، وكثيرا ما يختلط حطام الصخور والحصى مع الرمال الخشنة التى فتتها عوامل التعرية ، وكثيرا ما يكون سطحها مغطى بالأملاح التى تتصلب وتصبح متماسكة ، وان كانت تفقد تماسكها اذا أصابتها السيول ، كما يغطى صخور الحجر الجيري نتيجة لتفاعل مركبات الحديد لتعاقب الحرارة والبرودة ، طبقة من المادة السوداء التى تشبه الطلاء ، وتمثل التربة الجيرية الطفلية الصحراوية التربة فى الصحراء حقا ، وتتكون فى ظل ظروف مناخية أكثر رطوبة مما يسود حاليا ، وقد تتكون فى هذه التربة نتيجة لتراكم الرواسب الفيضية فى أحواض البحيرات والأنهار وكثيرا ماتتكون طبقة ملحية لا تسمح بنمو نباتات البتة وتسمى بالتربة القلوية البيضاء أو « Solonchalk » .

وقد تتعاون عوامل التعرية الجوية والرياح على تفتيت الصخور الى حبيبات دقيقة للغاية تتألف من الرمال الناعمة التى يضاف اليها مواد أدق قد تكون قد أرسبتها المياه من الطمى والصلصال ، وتعد هذه التربة خصبة ولا يعوزها لكى تغل محصولا كبيرا اذا زرعت الا توفر مياه الري العذبة حتى لا تتعرض لتراكم الأملاح .

**التربة فى الجهات ذات المناخ المعتدل الدقىء :** توجد التربة الطفلية الحمراء فى منطقة نائال الساحلية بين جبال دراكنز برج وساحل المحيط الهندى ، ومع أن امطار تختلف من بقعة لأخرى ومن عام لآخر فانها تزيد على ثلاثة ارباع متر عادة يسقط أكثرها فى الصيف .

وقد نشأت مواد التربة من تلمت الصخور المحلية ، لأن الأنهار السريعة الجريان ذات تأثير محدود فى نقلها ، وقد اثبتت أكثر هذه المواد من الصخور البللورية النارية والمتحولة ، وان كان القليل منها يرجع أصله الى تفتت الحجر الرملى والصلصال الرقيق «Shale» ويمكن أن نميز نوعين من التربة : التربة السوداء «Chernozem» وتوجد حيث تتوافر أسباب التعادل بين مقدار ما يذاب من التربة ليترسب فى باطنها وما يصعد الى سطحها ، أما اذا أربى تأثير العامل الأول على الثانى فتظهر تربة حمراء تشبه الى حد كبير التربة الحمراء فى الجهات المدارية ، ويؤدى عمق هذه التربة فى الجهات المنخفضة بفضل ما يتراكم فيها من مواد مفتتة الى تجديد خصوبتها ، كما يؤدى توافر المناخ الملائم للانتساج الى زيادة مقدرتها الانتاجية ، غالبا ماتكون فقيرة فى المواد الجيرية ، وكثيرا ما ينقصها البوتاس والفسفور ، والواقع أنه لا بد من تسميدها بأضافة المخصبات اليها حتى يمكن ممارسة الزراعة فيها بصفة متصلة .

**التربة فى مناطق السفانا المثلجة :** توجد فى منطقة الفلد المرتفعة High Veld فى ولايتى الأورانج الحرة والبترنسفال الجنوبية ، ويتراوح ما يسقط بها من المطر نصف وثلاثة ارباع متر . وتصلح لنمو جشائش السفانا التى يسقط بها المطر الذى لا يبلغ من الغزارة حدا يؤدى الى ذوبان المواد الدقيقة من سطح التربة ، وليس من البقلة بحيث يؤدى الى نشاط صمود الأملاح والكربونات لتتراكم على سطح التربة .

وهى تربة غنية بالمواد العضوية بل تعد من أكثر أنواع التربة خصوبة  
تفى قارة أفريقية فهى غنية بالنروجين والجير وحامض الفوسفوريك ، ولكن  
من عيوب هذه التربة تشققها السريع وقت الجفاف ، بعد أن تكون لزجة فى  
موسم المطر مما يعرض ماتحتويه التربة السفلى من رطوبة الى الفقد عن  
طريق البخر خلال الشقوق ، وتصبح هذه التربة هى التربة السوداء المعروفة  
التي يوجد بها نطاق الذرة فى جنوب أفريقية ، إذ تتوافر الظروف الملائمة  
لوجودها وهى : نظام المطر الفصلى وتنمو الحشائش وسقوط المطر فى شكل  
شأبيب غزيرة ، وقد تضرب هذه التربة للحمرة قليلا لارتفاع درجة الحرارة  
وقد توجد تربة سوداء لا تشبه التربة السوداء فى أمريكا الشمالية أو  
روسيا ، لأن اللون الأسود ليس الا نتيجة لتراكم الكربونات التى لو أزيلت  
لفقدت التربة هذا اللون .

## الفصل الثانى

### المناخ

تعد قارة أفريقية أكثر القارات « مدارية » ويكفى أن نذكر أن خط الاستواء يكاد يخرقها فى الوسط ، فبينما يقع أقصى بقاعها تطرفا نحو الشمال على Cape Blanco شمالا عند رأس « بن سقا » الى الغرب مباشرة من الرأس الأبيض على كذب من بنزرت فى تونس ، يصل أبعد جهاتها عن خط الاستواء صوب الجنوب عند رأس أجولهاس Cape Agulhas فى جنوب أفريقية عند خط عرض ٥١ ٣٤ جنوبا فى ولاية الكاب ، وهكذا تمتد نحو ٣٦٤٠ كم جنوبى خط الاستواء و ٣٩٦٠ كم الى شمالية ، فلا غرو أن ظهر التناظر بين نصفى القارة فى شمال خط الاستواء وجنوبيه ، سواء فى النواحي المناخية أو النباتية ، ولكن هناك عوامل لا تسمح بأن يكون هذا التناظر تاما فعلى حين نجد أن قرب السواحل الشمالية الشرقية من جنوب غرب آسيا يجعل هذا الجزء من أفريقية خاضعا لتأثير اليايس الآسيوى ، يمتد نصف القارة الجنوبي فى شكل شبه جزيرة قليلة الاتساع نسبيا على جانبيها مياه المحيطين الأطلنطى والهندي ، ولكن تجانس السطح وعدم تعمق المياه فى نصفى القارة لم يفسد امتداد الأقاليم المناخية والنباتية فى صورة نطاقات موازية لخطوط العرض ومتناظرة فى نصفى القارة ، فالإقليم السودانى الذى يمتد فى السودان شمالى خط الاستواء يقابله إقليم السفانا فى روديسيا فى جنوبه ، ثم إقليم الصحراء الكبرى يناظره إقليم صحراء كلهارى ، وإقليم البحر المتوسط فى شمال غربى القارة وشماله الشرقى يشبه إقليم الكاب فى أقصى جنوب غرب القارة . ولكن اختلاف الظروف المحلية بين نصفى القارة ، وتفاوت امتداد نصفى القارة بين العروض المختلفة من شأنه أن يؤدي الى أن الأقاليم فى النصف الشمالى أكثر اتساعا ومميزاتها أكثر وضوحا من نظيراتها فى النصف الجنوبى .

فمدار السرطان يمتد فى أكثر جهات القارة عرضا لأن ثلثى القارة

الأفريقية يقع شمال خط الاستواء ، كما أن قرب النصف الشمالي من اليابس الآسيوى قد جعله معرضا لهبوب الرياح الشمالية الشرقية الجافة ، على حين يتعرض نصف القارة الجنوبي لهبوب الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة التى تجد يابسا أكثر ارتفاعا وأقل اتساعا مما تمخض عنه ضيق نطاق الجهات الجافة فى الجنوب كما يبدو فى صغر مساحة صحراء كلهارى التى يعد جفافها أقل وطأة من الصحراء الكبرى ومن الظاهرات الواضحة وجود كتلتين من الهضاب المرتفعة فى شرق القارة هما هضبة الحبشة وهضبة شرق أفريقية اللتان أثرتا على نظام المناخ وتوزيع الأقاليم النباتية فظهرت أقاليم مناخية ونباتية جديدة تحت تأثير الارتفاع ، كما اعترضت هذه المناطق انتظام امتداد الأقاليم المناخية والنباتية فى شرق القارة .

وقد سبق أن ذكرنا أن أفريقية أكثر القارات حرارة إذ يسودها المناخ المدارى . كما يبدو فى وقوع أكثر القارة بين المدارين ، ماعدا القمم المرتفعة شرقها أو أطرافها المعتدلة فى أقصى شمالها وجنوبها .

### مناخ أفريقية

يتأثر مناخ أفريقية بالمعالم الرئيسية للدورة الهوائية التى تحدث فوقها . وهذه الدورة جزء من نظام الضغط الجوى وتوزيع الرياح فى العالم القديم ويتميز هذا النظام بوجود نطاقين كبيرين أحدهما للضغط المرتفع ويقع فى دوائر العرض دون المدارية ، والآخر للضغط المنخفض ويقع حول خط الاستواء ، ويمتد فوق حوض الكونغو ضاربا فى الجزء الشمالى من أفريقية الجنوبية .

هذان النطاقان يتحركان شمالا وجنوبا تبعاً لحركة الشمس الظاهرية . ينحركان شمالا وراء عمودية الشمس المتجهة نحو مدار السرطان فى الصيف الشمالى والشتاء الجنوبى ، ويتحركان جنوبا وراء هذه العمودية المتجهة نحو مدار الجدى فى الشتاء الشمالى والصيف الجنوبى .

وفى كل الأحوال تتجه الرياح من مناطق الضغط المرتفع نحو مناطق الضغط المنخفض . مع خضوعها للقانون العام الذى يجعل الرياح تنحرف

الى يمين اتجاهها اذا عبرت خط الاستواء فى نصف الكرة الشمالى والى يسار اتجاهها اذا عبرته فى نصف الكرة الجنوبى .

أما شرق أفريقيا والقرن الإفريقى فهو يتأثر بالنظام الموسمى لتأخيمته لقارة آسيا . أى يتأثر بمنطقة الضغط المنخفض الآسيوى الكبيرة الجائمة فوق آسيا صيفا وبمنطقة الضغط المرتفع الآسيوى الكبيرة الجائمة فوق آسيا شتاء .

توزيع مناطق الضغط اذن وحركتها الموسمية هى المسئولة عن تحركات الكتل الهوائية الكبيرة فوق القارة والمسئولة عن توزيع الأمطار تبعا لذلك . وتحركات الكتل الهوائية ، او تيارات الهواء الرئيسية هى :

١ - الرياح التجارية الشمالية الشرقية التى تهب من نطاق الضغط المرتفع الأزورى نحو الجنوب الغربى ، وهذه تشمل : ( أ ) التيار الأطلنطى الجاف ، ( ب ) ورياح الهرمتان التى تهب من الصحراء الكبرى جافة نحو الجنوب الغربى ، ( ج ) والرياح الأثيزية أو الشمالية التى تهب على وادى النيل .

٢ - الرياح التجارية الجنوبية الشرقية التى تهب من كتل الضغط المرتفع المتكونة فوق المحيط الهندى والمحيط الأطلنطى نحو نطاق الضغط المنخفض الاستوائى ، وعندما تعبر خط الاستواء تتحول نحو الشمال الشرقى وهى ذات تأثير موسمى مطير فوق غرب أفريقيا . ويزداد نطاقها غربا فتشمل نطاق السودان كله من السنغال الى البحر الأحمر . وهى التى تسبب أمطاره الصيفية .

٣ - الرياح العكسية الغربية ، وتهب فوق نطاق البحر المتوسط ما بين دائرتى عرض ٣٠ - ٤٠ شمال خط الاستواء وجنوبه . وذلك فى فصل الشتاء عندما تتعامد الشمس على مدار الجدى ( بالنسبة للنصف الشمالى من القارة ) وعلى مدار السرطان ( بالنسبة للنصف الجنوبى من القارة ) وهى فى الحالتين تسبب الأعاصير المحملة ببخار الماء وتسقط أمطارا فى فصل هبوبها وهو فصل الشتاء .



ولما كانت قارة أفريقية تخلو من السلاسل الجبلية المرتفعة ، فإن الانتقال الفجائى بين الأقاليم المناخية غير مشاهد بل على النقيض نجد أن الانتقال تدريجى غير ملموس يمتد فى مساحات شاسعة .

وسندتناول الآن بالدراسة بعض العوامل التى تؤثر فى المناخ أهمها :

**تأثير البحار :** يمر بسواحل قارة أفريقية تيارات مائية متباينة التأثير ، فتتخفف الحرارة ويكثر الضباب ويقل المطر فى منطقة الساحل فى شمالى غرب القارة لمرور تيار كناريا البارد الذى يتجه جنوبا ، ويبدو التفاوت واضحا بين الساحل واليابس فى الداخل ، لأن هذا التيار ينتقل الى جهات ذات هواء أكثر دفئا ، كما أن الرياح التى تهب من اليابس المجاور تزيح المياه السطحية لتطفو مكانها مياه عميقة باردة ، ويبلغ تأثير هذا التيار خط ١٢ شمالا فى الجنوب ، وان كان لا يتوغل الى جنوب خط ١٧ شمالا فى أغسطس ، فعلى حين تصل درجة الحرارة الى ٣٠° م تبلغ درجة حرارة رمال الصحراء فى الداخل نحو ٦٠° م ، أما تيار بنجويلا البارد فتظهر آثاره المماثلة لآثار تيار كناريا البارد من جفاف وانخفاض الحرارة وكثرة الضباب فى المنطقة الساحلية الممتدة من رأس الرجاء الصالح حتى قرب الاستواء على ساحل القارة الجنوبي الغربى .

أما فى منطقة ساحل غانة فإن تيار غانة الحار يحمل الرطوبة والحرارة الى هذا الجزء من الساحل الغربى متجها نحو الشرق ، ولكن على حين يمتد تأثيره بين نهر غمبيا ورأس لوبيز فى الصيف يقتصر ذلك التأثير على المسافة بين سيراليون وذلك الرأس فى الشتاء .

هذا على السواحل الغربية للقارة ، أما فى شرق القارة فالتيارات أكثر دفئا ، لأن الرياح تهب هنا من البحار الدفيئة ، الى الساحل على حين تهب فى الغرب من اليابس الى البحر ، فلا غرو أن يصبح الساحل الشرقى أكثر دفئا بنحو عشر درجات اذا قورن بالساحل الغربى ، بل قد يصل هذا الفرق ٨ - ١٥° م عند رأس دلجادو على طول خط ١٥ جنوبا .

وينقسم التيار الاستوائى الى شعبتين تتجه احدهما شمالا حتى تصل الى خط الاستواء شتاءا بينما تتجاوزه فى الصيف شمالا ، أما الشعبية

الأخرى، فتتجه نحو الجنوب حتى تبلغ رأس أجولهاس طوال العام ، ويخرج منها شعبة تمر شرقي مدغشقر ، أما تيار موزمبيق فيتجه جنوبا حتى ممبسة ثم لورنز وماركيز حيث يندمج في تيار أجولهاس .

أما في شمال خط الاستواء فتتق التيارات تحت تأثير الرياح الموسمية ، ففي الشتاء يتجه التيار نحو الشمال الشرقي موازيا للساحل بين نوفمبر وأبريل ، أما في الصيف فيتجه بعد خروجه الى الشمال من رأس دلجادو قويا واضحا ، ويسمى تيار شرق أفريقية ، ويمر بشبه جزيرة العرب حتى مدخل البحر العربي ، وهو سريع وبخاصة على ساحل الصومال .

وترتفع درجة حرارة مياه المحيط الهندي على السطح تبلغ ٢٨° م شمال خط الاستواء بل قد تصل الى ٣٠° م في أبريل ومايو ، ولكن هناك منطقتان تنخفض فيهما درجة الحرارة عن بقية أنحاء المحيط وذلك بالقرب من سواحل بلاد العرب في البحر العربي ثم على ساحل الصومال حيث تنخفض فيهما درجة الحرارة بمقدار درجتين عن سطح المياه داخل المحيط . ويرجع انخفاض حرارة المياه الى أن التيارات المليئة التي تدفعها الرياح الموسمية الجنوبية الغربية تمر موازية للساحل ، ولما كانت المياه تنحرف عادة بمقدار ٤٥° الى اليمين اتجاه هذه الرياح، فهي تبعد عن الساحل نحو داخل البحر وترتفع مياه البحر الباردة من القاع على طول تلك السواحل ، وهكذا يسود الجفاف على طول سواحل الصومال ويكثر الضباب وتنخفض الحرارة وبخاصة في الصيف ، وتبلغ حركة انبعاث هذه المياه الباردة من جوف البحر أقصاها عند ١٥° شمالا ، ويتجه التيار نحو الشمال الشرقي في نوفمبر ، ويمتد أثره حتى يصل الى خط الاستواء على طول ساحل أفريقية الشرقية ، كما تهبط درجة حرارة المياه على السواحل بمقدار نحو درجتين عن المياه داخل المحيط .

أما البحر الأحمر فان تأثيره محلي لمضيقه ، فهو ملطف الى حد ما للحرارة على سواحله في الصيف ، لأن درجة حرارة الجهات الصحراوية الجافة على جانبيه تصبح لافحة في هذا الفصل ، أما في الشتاء فان مياهه الدفينة تمتد الجهات التي تحفه بالدفء والرطوبة ، ويعد البحر الأحمر منطقتة

بحارة أكثر فصول السنة ، فتتراوح حرارته فى يناير بين  $22^{\circ}\text{م}$  فى الشمال إلى  $25^{\circ}\text{م}$  فى الجنوب ، أما فى يوليو فتتراوح بين  $26.7^{\circ}\text{م}$  و  $21.7^{\circ}$  على التوالى . أما تأثير البحر المتوسط المناخى فهو أكثر وضوحا وأوسع نطاقا فى شمال أفريقية ، ففى الصيف يمتد أثر الضغط المرتفع المدارى فوق مياه البحر مما يساعد على امتداد الصحراء الكبرى ، أما فى الشتاء فان دفع البحر ورطوبة هوائه تساعد على انخفاض ضغطه وتكوين انخفاضات اعصارية تسبب سقوط المطر شتاء فى هذه الجهات ، وتظل هذه الجهات محتفظة بحرارة الصيف المرتفعة فى الخريف التالى الذى يعد أشد دفئا فى جهات البحر المتوسط من الربيع حين تكون حرارة الشتاء قد ارتفعت .  
يبطء شديد \*

**الضغط :** فى الشتاء يؤدى انخفاض الحرارة داخل اليابس الأوراسى الى امتداد مراكز الضغط المرتفع نحو الشمال ، وهكذا يتكون مركزان للضغط المرتفع أحدهما فى أوراسيا والآخر فى أمريكا الشمالية ويربط بينهما قنطرة من الضغط المنخفض وان كان مرتفعا نسبيا فى شمال المحيط الأطلنطى ، أما فى الجنوب فان الضغط المرتفع فى جنوب غرب آسيا وجنوب أوروبا وشمال غرب أفريقية لا يمتد فى منطقة متصلة ، لأن البحر المتوسط الذى يمثل بحيرة منخفضة الضغط يعترض هذا الاتصال ، وهكذا يبدو الضغط المرتفع فى شكل شعبتين تمتد أحدهما جنوب أوروبا ، أما الأخرى فتسود مناطق جبال أطلس وبخاصة هضبة الشطوط المرتفعة فى الجزائر ، أما البحر الأحمر فيسوده أيضا الضغط المنخفض الذى يمتد من شماله حتى يصل الى شرق البحر المتوسط ، وتهب نتيحة لذلك رياح شمالية غربية حتى خط  $30^{\circ}$  شمالا على حين تهب جنوبيه رياح من جنوب الجنوب الشرقى ، وتكثر عند هذا العرض الزوايح الراجعة الماطرة العنيفة ، كما تكثر الانخفاضات الجوية المطرة فى فصل الشتاء فى البحر المتوسط . أما منطقة الضغط المنخفض الاستوائى فتوجد جنوب خط الاستواء ، كما تمتد منطقة التقاء الرياح بين المدارين داخل القارة فوق زائير لتصل الى ساحة غانة متجهة نحو الشمال الغربى ، وتظل هذه المنطقة من الضغط المنخفض مقصورة على شمال خط الاستواء ولا تمتد جنوبيه لأن مياه المحيط الأطلنطى الجنوبي تظل باردة اذا قورنت بمياه ساحل غانة حتى هذا الفصل ، ويرابط مركزا الضغط المرتفع

دون المدارى اللذان يتدرجان فى الانخفاض نحو الشمال عند خط عرض ٣٥° جنوبا فى المحيط الهندى ، و ٣٠° فى جنوب المحيط الأطلنطى . ويهب فى الجزء الشمالى من القارة التيارات الهوائية الآتية وذلك من مركز الضغط المرتفع دون المدارى الشمالى .

١ - التيار المدارى الرطب ويهب فى غرب القارة من الشمال الشرقى وهو بارد جاف مطرد الهبوب حتى يصل الى ليبيريا .

٢ - رياح الهرمتان الشمالية الشرقية وهى مدارية جافة أشد قارية من التيار السابق فهى شديدة الجفاف كثيرة الغبار حتى خط الاستواء ، ولكن بعد أن تتجاوز خط الاستواء تكون قد اكتسبت بعض الرطوبة من غابات الجهات الاستوائية وسطوحها المائية مما يسبب سقوط المطر حين تلتقى بجهة الرياح التالية التى تعد أكثر رطوبة منها .

٣ - التيار الموسمى الذى يهب من الشمال الشرقى من داخل اسيا حيث مركز الضغط المرتفع وتظل هذه الرياح جافة تقريبا لضيق مساحة المياه . وهذه هى الرياح التى تهب على الصومال أما فى الجنوب فان الرياح التى تهب على المحيط الهندى أكثر رطوبة ، ولذلك تجلب المطر الى جنوب شرق أفريقيا . أما الى الجنوب من جهة التقاء التيارات بين المدارين فيهب تياران مداريان بحريان : فعلى الساحل الغربى تسود الرياح التجسارية الجنوبية الشرقية بين أقصى جنوب القارة وخط الاستواء ، ولكن تنحرف الرياح نحو الجنوب الغربى على طول السواحل الغربية الى شمال مصب نهر الأورانج ، وحين تمر هذه الرياح فوق تيار بنجويلا البارد يغلب على الجو الرطوبة العالية وكثرة الضباب ولو أنها تظل جافة . أما فى شرق القارة فان الرياح الجنوبية الشرقية تسقط الأمطار الغزيرة فى ناتال وجنوب شرق ولاية الكاب فى فصل الصيف الجنوبى .

أما فى الصيف فيسيطر على نظام الرياح فى شمال أفريقيا مركزان للضغط ، أحدهما مركز الضغط المرتفع دون المدارى فى المحيط الأطلنطى الشمالى ، وهو يربط فوق جزر أزورس ويمتد ليشمل وسط أوروبا والبحر المتوسط وشمال غرب أفريقيا ، أما المركز الآخر فيسوده الضغط المنخفض


وهو يتمركز فوق وسط آسيا وبلوخستان ، ويهب تيار هوائى مدارى قارى جاف قوى بين النيل والبحر الأحمر فى شمال شرقى القارة ، وتهب الرياح من الشمال الشرقى بانتظام الى الغرب من ذلك حيث يسود الضغط الاستقرار ، وهى رياح مدارية قارية جافة ، أما الرياح التى تهب فى أقصى الشمال الغربى فهى الرياح البحرية المدارية الرطبة التى تصل الى كيب فرد ، أما الى جنوب جبهة التقاء الرياح بين المدارين فيوجد مركزان للضغط المرتفع دون المدارى يقع أحدهما فى جنوب المحيط الهندى والآخر فى جنوب المحيط الأطلنطى عند خط ٣٠ جنوبا الى جانب مركز صغير للضغط المرتفع يقع فى جنوب شرق القارة ، وتخرج رياح مدارية رطبة جنوبية شرقية فى شرق القارة وغربها ، وتهب الرياح الجنوبية الغربية الى الشمال من مصب الأورنج حتى كيب فرد ، وهى رياح جافة قليلة الرطوبة ولكنها اذا بلغت خط الاستواء فانها تصبح رطبة غزيرة المطر بعد مرورها على البحار الدفيئة الرطبة وتهب بين النيجر وحوض الكونغو ، كما أن هبوب الرياح الجنوبية الغربية يؤدى الى سقوط المطر فى جنوب السودان والحبشة ، على حين تظل جنوب شرق الحبشة والصومال وأرتريا جافة مما يدل على أن هذه الرياح القادمة من المحيط الأطلنطى هى التى تؤثر فى ساحل آسيا بل والمحيط الهندى ، أما الشعبة الثانية من الرياح الجنوبية الغربية فهى تهب على الكمرى والى الغرب منه ، وهى رياح شديدة الرطوبة غزيرة المطر يتناقص مطرها كلما اتجهنا شمالا بعيدا عن ساحل غانة ، أما فى الشرق فإن الرياح تنحرف متتبعه الساحل الشرقى فتصبح جنوبية غربية ، وهى الرياح الموسمية الجنوبية الغربية التى تسقط المطر فى جنوب آسيا وشمال المحيط الهندى ، أما داخل القارة فيتعرض لرياح قارية مدارية جافة حتى خط الاستواء ، حيث يندمج هذا التيار الجاف بالتيار الأطلنطى المدارى الرطب فى السودان متجها نحو الشرق ، أما أقصى جنوب القارة فيتعرض للرياح الغربية فى شبه جزيرة الكاب .

**الحرارة :** قد سلف أن ذكرنا أن قارة أفريقية هى أكثر القارات « مدارية » فى مناخها ، ومن ثم كانت أكثرها حرارة إذ لا تهبط درجة الحرارة الى ١٠ م فى يناير فى أية بقعة من القارة ، فيقدر أن متوسط الحرارة فى أكثر أنحاء القارة يبلغ نحو ٢١ م لمدة تسعة أشهر ، وتختلف الجهات

إساحلية عن الداخلية وبخاصة فى الجنوب والشرق ، فالارتفاع يؤدى الى أن يصبح الداخل أكثر صحية لسكنى البيض من السواحل الرطبة لجفافه وانخفاض حرارته وبخاصة أثناء الليل ، مما يخفف من وطأة الحرارة لظهور الفرق الحرارى اليومى فى هذه الجهات الداخلية .

**الأمطار :** يلاحظ أن الأمطار عنصر مهم فى تمييز الأقاليم المناخية بترسيم القارة الى أقاليمها النباتية ، فالحرارة متوفرة فى جميع أنحاء القارة تقريبا ، كما أن الأمطار الساقطة تتدرج تدريجا غير ملموس لعدم وجود ظاهرات ضخمة واضحة للسطح تجعل الانتقال فجائيا أو عنيقا ، فضلا عن ظاهرة التناظر بين أقاليم المطر وبخاصة فى غرب القارة ، ولو أن اتساع نصف القارة الواقع شمال خط الاستواء وقربه من أوراسيا قد أدى الى اتساع منطقة الجفاف التى تتمثل فى الصحراء الكبرى إذا قورنت بالجنوب حيث توجد صحراء كلهارى المحدودة الاتساع .

فالصحراء الكبرى تمتد من شواطئ المحيط الأطلنطى بين جنوب مراكش ورأس فرد ، حتى سواحل البحر الأحمر ، أما فى الجنوب الغربى فإن تيار بنجويلا البارد يجعل من المنطقة الممتدة من جنوب أنجولا حتى منطقة الكاب التى يصيبها مطر الشتاء منطقة صحراوية ، أما فى الشرق فيسود الجفاف منطقة الصومال وجنوب غرب مدغشقر والواقع أن أكثر جهات القارة يصيبها قدر من المطر يتراوح بين ٢٥ و ٥٠ سم ، سواء فى شمال غرب التارة أو منطقة السودان الى الداخل من ساحل غانة ، وعبر وسط أفريقية حتى شرق أفريقية وفى جنوب القارة . ويرداد المطر غزارة من الغرب الى الشرق فى جنوب القارة الا جنوب عرض ٣٢° م حيث تجد أن أمطار الشتاء تسقط فى ولاية الكاب فى الجنوب الغربى ولكن أكثر الجهات مطرا يقع فى غرب القارة الأوسط سواء فى بعض جهات غانة أو حوض الكونغو ، ولكن الأمطار حتى فى هذه الجهات الغزيرة الأمطار لا يتجاوز متوسط أمطارها نحو متر ، أى يقل كثيرا عن جهات آسيا وأمريكا الجنوبية المماثلة ( انظر شكل و ٥ ) .




توزيع المطر السنوي في أفريقيا

( خريطة رقم ٤ )

### الإقلايم المناخية

المناخ الاستوائى أو المدارى الرطب الذى تنمو فيه الغابات الاستوائية: يعد اطراد عناصر المناخ ومضيها على وتيرة واحدة تقريبا طول العام هو أهم ما يميز هذا الاقليم ، فهو حار رطب مطير طول العام ، فاذا كان متوسط الحرارة فى الجهات المنخفضة نحو ٢٦°م فهو لا يهبط فى أشد الليالى برودة عن ٢١°م ولا يرتفع فى أكثر الأيام حرارة بالنهار عن ٣٢°م ، فاذا كان الجو باردا فى الصباح المبكر فسرعان ما ترتفع الحرارة عند الظهيرة ليتشبع الجو بالرطوبة ، ويصديه الاضطراب ايدانا بانهمار الأمطار الغزيرة قبل أن تصفو السماء فى الليل الذى يصبح لطيفا ، واذا كانت الرطوبة والحرارة مرهقتين للجسم ، فان بقاءهما على وتيرة واحدة طوال العام تقريبا هو الذى يورث الضيق والسأم والضعف . هذا الفرق الحرارى الضئيل وبخاصة بين فصل وأخر يصحبه فرق حرارى أكثر وضوحا بين الليل والنهار . ويضم




مواسم سقوط المطر في أفريقيا

- |                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| ١ - أساطير تادريه | ٤ - أساطير سيديبونا، فصلين            |
| ٢ - ٤ سنتوريه     | ٥ - ٥٠٠ مم طول العام                  |
| ٣ - ٥ صيفيه       | ٦ - المناطق من أساطير التتير والسبيري |
|                   | ٧ - الحد الذي تقام فيه حراره ٥        |

هذا الاقلايم نوعين من المناخ فالمناخ الحار الرطب الذي تسقط امطاره طول العام وتنمو به الكثافات الكثيفة يسود شمال حوض الكنغو ، أما النوع الآخر فهو الذي تتوافر فيه الحرارة طول العام ويسقط أكثر المطر في الصيف يل في بعض الأحيان يقتصر المطر على هذا الفصل ، وهكذا قد يظهر فصل جفاف أو قليل المطر ، ويوجد هذا النوع من المناخ في منطقة ساحل غانة والمنطقة الواقعة خلفها مباشرة ، وغاباته أقل كثافة من النوع الأول ، وهكذا تبدو الفصليه في المناخ وبخاصة في سقوط المطر في النوع الثاني . وهناك نوع آخر يوجد في الجهات المرتفعة في شرق افريقية حيث ينخفض متوسط الحرارة السنوي واليومي ، وأن ظل الفرق الحراري الفصلي قليلا الا أن الفرق اليومي يظل أكثر وضوحا ، وإذا كان المطر هنا أقل غزارة فهو حسن التوزيع على مدار السنة ، كما تنمو سافانا البساتين أو السافانا الغنية في هذه الجهات ( انظر شكل ٦ ) .





الآقاليم المناخية في أفريقيا

ويضاف الى ذلك نوع تتعرض فيه المناطق الساحلية الرياح الرطبة كما هو الحال في السواحل الشرقية في مدغشقر بين خط عرض ١٢ ، ٢٥ جنوبا ، ويسقط المطر هنا طول العام بسبب وقوع هذه السواحل في مهب الرياح الجنوبية الشرقية ، فضلا عن مرور العواصف التي تهب على جزائر المحيط الهندي القريبة كموريشيوس وريونيون . وبخاصة بين يناير وأبريل ، الى جانب انتقال جبهة التقاء التيارات الهوائية بين المدارين التي تراطب في شمال مدغشقر في يناير مما يؤدي الى سقوط الأمطار الغزيرة ، وتؤدي غزارة الأمطار الى تلطيف الحرارة فالفرق الحرارى اليومي والفصلى محدود . ويسود هذا المناخ المناطق الغزيرة الأمطار التي تواجه الرياح التي تهب من المحيط مباشرة في ساحل غانا وبخاصة ليبيريا وسيراليون ، فضلا عن سواحل شرق مدغشقر السالفة الذكر .

٢ - مناخ السافانا المدارى : يعتبر نظام المناخ المميز لأفريقية المدارية بحق ، فالهضاب الواقعة بين المدارين فى هذه القارة يسودها هذه المناخ بأنواعه المختلفة، كما تغطيها حشائش السافانا بأصنافها المتباينة أيضا ، وهو النوع الانتقالي بين المناخ المدارى المطر الذى تنمو فيه الغابات الاستوائية

والمناخ الصحراوي بجفافه وتطرفه ، وتتراوح كمية الأمطار بين مترين على أطراف الجهات التي يسودها المناخ الاستوائي ، ونحو ٤٠ سم حيث ينتقل هذا المناخ الى مناخ « الأستبس فى العروض الدنيا » أو السفانا القصيرة ، ويمكن أن نميز نوعين من هذا المناخ : « النوع القارى » فى الأجزاء الشمالية والوسطى الغربية فى شمال القارة ، والنوع البحرى الذى يقع فى جنوب القارة الأوسط حيث يتأثر بالارتفاع والبحر مما يعدل من خصائصه الى حد ما . أما النوع الأول وهو السودانى فيمتاز بحرارته المرتفعة طول العام ، حيث تصل درجة الحرارة الى أقصاها فى مايو قبل سقوط المطر فتتجاوز ٣٢ ، ولكن سقوط المطر الذى تسببه الرياح الموسمية الجنوبية الغربية يخفف من حرارته فتهدأ قليلا ، وان كان اقتران الرطوبة بالحرارة يجعل المناخ غير محتمل كثيرا ، ويقل المطر من نحو متر الى نحو ٢٥ سم بل أقل عند حدود الصحراء ، فى مسافة تقدر بنحو ٦٠٠ كم من الجنوب للشمال . ولكن اذا كان المطر قليلا فان هبوط الحرارة يصبح غير محسوس ، ويمتد نطاق هذا المناخ من الغرب الى الشرق بانتظام بين ساحل المحيط الاطلنطى وهضبة الحبشة مع ميل قليل نحو الجنوب فى الجزء الشرقى من السودان ، وقد يؤدي انتقال منخفض من الضغط الاستوائى مع حركة الشمس الظاهرية نحو الشمال ثم نحو الجنوب عقب ذلك الى ظهور قمتين للمطر فى نطاق محدود ، ويقصر فصل المطر كما تزداد الحرارة تطرفا كلما بعدنا عن خط الاستواء نحو الشمال ، فالفرق الحرارى الفصلى واليومي كبير وبخاصة فى الجهات الشمالية والداخلية ، ان قلما يهبط متوسط الحرارة الفصلى عن ٢١ م كما يتراوح بين ٧ و ١٠ م ولما الجهات التى يصيبها قدر من المطر يبدو كافيا تحتاج للرى لنجاح قيام الزراعة بها . وقد ذهب البعض الى أن السودان - ومطوره شديد الاختلاف بين عام وآخر وبين شهر وآخر كلما هبط متوسط المطر فى العام - يميل نحو الجفاف ، ولكن قد يكون لسوء استغلال الانسان للنباتات القليلة عند أطراف الصحراء ولتراكم الرمال التى تحملها رياح الهومتان أثر واضح فى ظهور معالم الجفاف التى تزحف نحو الجنوب .

أما النوع الثانى من المناخ فيسود هضاب جنوب القارة ، وهو يضم جنوب حوض الكنفو وجنوب هضبة البحيرات حتى مدار الجدى . ولكن باستثناء المناطق الصحراوية فى بنشوا نالند وجنوب غرب أفريقية ، فهذا الجزء من أفريقية يمتاز بارتفاعه وضيقه اذا قورن بالشمال ، كما أن جنوب

القارة الأفريقية ينتهى من الجنوب بالمحيط على حين يضرب الجزء الشمالى لمسافة طويلة فى أعماق اليابس قبل أن يصل الى البحر أو يصبح على كتب من تأثيره ، فقد ترتفع الحرارة قبل سقوط المطر ولكنها لا تتجاوز ٢٧°م وقد تهبط الحرارة قليلا فى الشتاء ولكنها فلما تقل عن ١٥°م ، ويبدو على نظام سقوط المطر الطابع الموسمى ، ففى الشتاء الذى يمتاز بانخفاض حرارته قليلا رغم أنه يظل دافئا مشمسا جافا يقتصر سقوط المطر على السواحل الشرقية ، أما فى الصيف فتتوغل الرياح فى الداخل ويقل المطر فى الغرب وبخاصة على سواحل أنجولا ، حيث لا يتجاوز المطر ١ متر كما يبلغ الفرق الحرارى الفصلى ١٠°م .

٣ - الصحارى والأستبس فى العروض الدنيا : يتدرج المناخ السودانى بما ينمو به من حشائش السفانا الى إقليم السفانا القصيرة ثم الى الصحراء حيث يسود المناخ المتطرف بحرارته العالية التى تبلغ أحيانا ٥٨°م فى الظل ، وإذا كان من الصعب وضع الحدود الفاصلة بين السفانا والأستبس ، فإن فصل الصحراء عن الأستبس ليس دون ذلك صعوبة ، وقد اقترح البعض أن يتخذ خط ٤٠ سم للمطر المتساوى حدا بين الأول والثانى وخط ٢٠ سم للفصل بين الأقليم الثانى والصحراء ، وترتفع درجة حرارة الصخور فى الصحراء الى ٦٥°م كما يبلغ الفرق الحرارى الفصلى ١٥° - ٢٠° واليومية - ٥٣٠ ، وتقدر نسبة السحب بنحو ١٠٪ كما قد تنخفض نسبة الرطوبة الى ٥٪ أو أقل ، مما يحول دون نمو الكثير من النبات الا اذا رويت بغزارة ، ويقتصر نطاق الصحراء الجاف على منطقة ساحلية شبه جافة تنمو فيها نباتات تشبه الأستبس الفقيرة هى صحراء كلهارى ، ولذلك فان الحرارة اللافحة والفرق الحرارى الكبير وما يتبعه من فقر شديد للحياة النباتية أقل وضوحا فى صحراء كلهارى اذا قرونت بالصحراء الكبرى .

٤ - الأستبس فى العروض الوسطى : وهو يقتصر على الجهات الرطبة فى اقليم الفلد المرتفع فى جنوب افريقية ، فتتخفف الحرارة وبخاصة فى الشتاء ، وقد يسقط الثلج كما يسقط الصقيع نحو ٣ - ٦ أشهر فى العام ، ولكن المناخ ليس متطرفا لقربه من المحيط وتأثيره اللطيف ، ويبلغ المطر أقصاه فى الربيع وأوائل الصيف كما يغزر مرة ثانية فى بعض الجهات فى الخريف .

٥ - البحر المتوسط : يوجد فى أقصى شمال القارة وبخاصة فى شمالها

الغربي وجنوب القارة الغربي في ولاية الكاب ، وهو نوع من المناخ ينفرد بسقوط المطر في فصل البرودة أي في الشتاء على حين يصبح الصيف شديد الحرارة والجفاف ، ولذلك فإن تكوين التربة ونمو النبات يتمان في بطء شديد ، كما أن النباتات إما أن تكون من الحبوب والنباتات العشبية التي تنتهي دورة نموها لتحصد قبل حلول فصل الحرارة الجاف في الصيف : أو من الأنواع التي تتحمل الجفاف ، أما بنفض أي أوراقها أو الاقلال من النتج من أجزائها المختلفة ، أو اختزان المياه في بعض أجزاء النبات نفسه ، ولكن المطر الذي يسقط في الشتاء قد يكون له قمتان أحدهما للامطار المبكرة في الخريف والأخرى للامطار المتأخرة في الربيع ، ولو أن المطر الذي يتراوح عادة بين  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{3}{4}$  متر يزداد بالارتفاع حتى يتجاوز المتر أحيانا ، إلا أن سقوطه في فصل البرودة يجعل تأثيره قويا واضحا ، وقد تحتاج الزراعة الى الري لتوفير المياه اللازمة لزراعة بعض النباتات وبخاصة في الصيف الجاف ، وبسقوط الصقيع والثلج وبخاصة في الجهات المرتفعة ، وتتباين ظروف المناخ والحياة النباتية في جهات إقليم البحر المتوسط المعقدة البنية والتضاريس ، وبخاصة في إقليم الكاب حيث تتجاوز السهول الساحلية التي توجه الأعاصير والمرتفعات والأودية الداخلية وتتوالى على مسافات قليلة ، ولكن الحرارة التي تنخفض في الشتاء وإن كان يظل الشتاء دفيئا في الجهات المنخفضة ، ترتفع في الصيف حتى تعود لا تختلف كثيرا عن حرارة الصحراء المجاورة إلا حيث يرتفع منسوب الأرض أو يقترب تأثير البحر الملطف .

٦ - المناخ دون المدارى الوطى : ويتمثل في ناتال والجهات المجاورة الواقعة قريبا من الدائرة العرضية ٣٠ جنوبا على السواحل الجنوبية الشرقية من القارة ، ويقال الفرق الحرارى بالمقرب من السواحل وإن كان يزداد وضوحا كلما توغلنا في الداخل ، وتهب الرياح التجارية الجنوبية الشرقية التي تسبب سقوط المطر على الساحل لفترة تطول بنحو شهرين أو ثلاثة عن الجهات الداخلية ، حيث يحول الضغط المرتفع شتاء دون توغل الرياح الممطرة ، وعلى العموم فنحو ثلاثة أرباع كمية المطر تسقط في نصف السنة الصيفى ، ويقال المطر في الجهات المرتفعة القريبة من الساحل الى نحو نصف متر في الجهات الداخلية ، كما يتعرض المطر في الداخل للتذبذب ، ودرجة الحرارة هنا مرتفعة في الجهات الساحلية ، فمتوسطها في الشتاء في دربان تقدر بنحو ١٨°م ، والواقع أن مرور تيسار موزمبيق الدفء إذا قورن بنديار

بنجويلا البارد يؤدي الى وجود فرق واضح فى الحرارة اذا قورن ساحل ناتال بساحل نياسا لاند مثلا . وقد سبق أن ذكرنا أن سقوط المطر يحدث بانتظام فى الفترة بين أغسطس وأبريل .

٧ - أقاليم المرتفعات : يؤدي الارتفاع فى كثير من أرجاء هضبة افريقية الى تعديل الظروف المناخية ، وبخاصة فى شرق افريقية فى هضبة البحيرات ، وهضبة الحبشة ، فتتنوع الظروف المناخية والنباتية تبعاً للارتفاع ولامتداد الجبال بالنسبة لاتجاه الرياح السائدة ولقربها أو بعدها من مصدر الرطوبة .

### الأقاليم النباتية :

الى جانب أهمية دراسة النبات الطبيعى كمظهر أو دليل يشير الى نتيجة تفاعل عناصر البيئة الطبيعية ومقوماتها ، فان لدراسة النبات فى افريقية أهمية خاصة ، لأن السواد الأعظم من السكان يعتمد على هذا النبات أما بجمع ثماره واستغلال أخشابه ، أو بتربية الحيوان الذى يرعاه ، أو صيد الحيوان الذى يعتمد على هذا النبات فى غذائه ، فضلاً عن الزراع الذين يدركون العلاقة القائمة بين ظروف نمو النبات الطبيعى وتلك التى تؤثر على الغلات المزروعة مما يميظ اللثام عن امكانيات الاستغلال الزراعى لكثير من البيئات . وكما تعرض الغطاء النباتى لتذبذبات المناخ - فقد عاصر العصر الجليدى فى أوربا ظهور العصر المطير فى افريقية بما يتضمنه من أدوار مطيرة تتخللها فترات جافة - فقد تأثر بنشاط الانسان وتدميره له حتى يتعذر على كثير من العلماء معرفة الغطاء الطبيعى الأول وما أعقبه من أنواع النباتات بعد اختفائه ، ويقدر أن الغابات تغطى من مساحة القارة والحشائش خمسيها والصحراء الشطر الباقى ، وكثيراً ما توصف الغابات بأنها ادغمال Timberland كما توصف أقاليم الحشائش بأنها سافانا ، وهى فى الواقع بمساحتها التى تقدر بنحو ٣٧٪ هى أهم الأقاليم النباتية فى افريقية لارتباطها الوثيق بالمناخ السودانى ، أو المدارى ذو المطر الصيفى الذى ينتشر فى أرجاء القارة ، ولكن تقسيم الأقاليم النباتية الى أقاليم الغابات والحشائش والصحراء قد ينطوى على اغفال للتدرج والتداخل والترابط بين هذه الأقاليم .

تقسيم أفريقية الى أقاليم نباتية محدودة يغفل التعقيد الذى يرجع الى اختلاف طبيعة التربة والنباتات على الارتفاعات المختلفة ، كما يغفل الاختلاف بين بعض النباتات السائدة والبعض الآخر على تباينها ، فالمجموعات النباتية الواحدة قد تنتشر فى مساحات واسعة ولكنها تختلف فى أهميتها النسبية فحسب ، وعلى العموم فيمكن أن نميز الأقاليم النباتية الآتية ( انظر شكل ٧ ) .

١ - الغابات المدارية المطيرة : تمتاز هذه الغابات الكثيفة بغناها وتنوع نباتاتها التى يمكن أن نميز ثلاث أطوال منها فى الجهات التى يسقط فيها نحو ١٥ متر من الأمطار كما تسود فى أرجائها الرطوبة العالية والحرارة المرتفعة وتمتاز بالفرق الحرارى الفصلى الضئيل ، وتنتشر نحو الجنوب على طول الساحل الغربى جنوب الكمرون عبر أفريقية الاستوائية الفرنسية سابقا ويومنى حتى خط الاستواء ، ولكن عند مصب الكنغو تبدو حشائش سفانا البساتين لقلة أمطاره وانخفاض رطوبته ، وتنتشر الغابات فى نحو ٥٠ ر ٦٠٪ من حوض الكنغو وبخاصة فى الأجزاء الشرقية والوسطى ، كما تنمو حول مجرى النهر وروافده ، وتمتد هذه الغابات بين التقاء الكنغو برافده سنجا شرقا حتى خط طولى يقع على بعد ٥٠ كم من بحيرة البرت ، كما تنحصر هذه الغابات بين دائرتى عرض ٤° ، ٤° شمالا وجنوبا ، أو بين الأوبنجى وملتقى نهري كاساي وستكورو .

وإذا كانت هذه الغابات بين مرتفعات الكمرون والساحل تضيق لتمثل همزة وصل بين الغابات الاستوائية فى أفريقية الوسطى من جهة ، وغابات ساحل غانة من جهة أخرى ، فهى تعود لتتسع من جديد ، ولو أنه يحفظها عند دلتا النيجر مساحة واسعة من غابات المانجروف ، ويقدر اتساع هذه الغابات بنحو ١٦٠ كم<sup>٢</sup> ، ولكن لا تلبث حشائش السفانا أن تحل محل الغابات الى غرب منطقة لاجوس فى داهومى وتوجو ، وشرق سساحل جمهورية غانة ، ويعزى ذلك الى قلة الأمطار فى هذه المنطقة الى الشرق من رأس النقط الثلاث Cape of Three Points ، أما الى الغرب فتعود الغابات للاتساع فى ساحل العاج وليبيريا ، وان كانت تقتصر فى سيراليون على جنوبيها فقط ، وتنمو هذه الغابات فى مرتفعات الكمرون حتى منسوب ٣٠٠ - ٦٠٠ متر ، كما تنمو غابات أقل كثافة حتى منسوب ١٥٠٠ - ١٨٠٠ متر .

٢ - الغابات المعتدلة : تنمو فى الجهات المرتفعة فى وسط أفريقية

وشرقها ، كما توجد على ارتفاعات تقل تدريجيا كلما اتجهنا نحو الجنوب وهي تنتشر فى هضبة الحبشة ، وتنمو حيث يغزر فيها المطر ، فيتراوح بين ١٦ و ٢٦ متر ولا توجد فترة جفاف طويلة ، وتنخفض الحرارة تبعا للارتفاع وان كان المدى الحرارى الفصلى واليومي يظل منخفضا ، والاشجار هنا اقل تنوعا منها فى الغابات الاستوائية ، وهي طويلة ذات جذوع متعددة .  
اما غابات البلوط الدائم الخضرة والاشجار المخروطية فهي تنمو فى اقليم البحر المتوسط ، وهي توجد حيث تغرز الأمطار على المرتفعات غالبا ، وهي قليلة الكثافة ، تنمو فى ارضها الشجيرات والحشائش وبعض الأعشاب .

٣ - الغابات الجافة : وتتكون من اشجار نحيلة ذات تيجان مستديرة منتظمة ، ولكنها متباعدة اذ تنمو بينها الحشائش والشجيرات ، ولا يتجاوز قطر جذع الشجرة نحو ٢٠ - ٢٥ سم لا تحمل الفروع والأوراق الا فى قممها ، كما تقع على ابعاد تبلغ نحو ٩٠ مترا ، ويرى البعض أنه من التجاوز ان توصف بالغايبه لأن اشجارها ليست متشابكة الفروع . فهي اقرب الى الاحراج ، ويعد هذا النوع من الغابات الذى ينفذ ورقه أثناء فترة الجفاف الطويلة من اهم الاقاليم النباتية فى افريقية ، اذ تنمو فى الجهات التى يتراوح بين ٣ و ١٦ متر ، ويضم السكان النار فى الغابة أو تندلع النيران من تلقاء ذاتها فتحترق الحشائش ، بل وبعض الشجيرات والاشجار التى لا تستطيع أن تقاوم لهب النيران وتختلف أنواع النباتات من اقليم لآخر ، وقد تنمو نباتات الخيزران التى تعد أشبه بالاشجار منها بحشائش السافانا .

٤ - الغابات الشوكية : ويسمى هذا الاقليم باقليم الشجيرات والاحراج « Bushland and thicket » وتنمو به خليط من الشجيرات والاشجار الدائمة الخضرة والنفضية التى تمثل نحو ٥٠٪ من الغطاء النباتى ، وبعض الحشائش القصيرة والأعشاب ، وتعتبر اشجار الجاوياب الضخمة التى توجد فى السودان الشرقى والغربى وفى حوض الزمبيزى على السواء من الاشجار التى تمتاز بقدرتها على مقاومة النار وذات اللحاء السميك الذى يقيه شر الجفاف ، ولكنها بطولها الذى يصل الى عشرات الأمتار تختلف عن الأشجار السائدة التى يبلغ ارتفاعها بضعة أمتار ، وتعد الاشجار الشوكية أو اليوفوربيا من الأنواع المنتشرة حيث تقل الأمطار ، ويصبح من الصعب اختراق هذه الغابات ، وبخاصة فى فصل المطر حين تكسوها الأوراق والأزهار .

أما الإدغال المعتدلة فى إقليم البحر المتوسط تسمى Maquis أو Chaparral فتتكون من خليط من الشجيرات المزهرة والأشجار القصيرة وأهمها أشجار الزيتون البرى وأنواع من النخيل والغار ، وإذا كان فصل الصيف الحار الجاف لا يسمح بنمو الحشائش فإن الأعشاب ذات الجذور البصيلية تعد من أهم عناصر الحياة النباتية هنا .

٥ - سفانا الحشائش الطويلة و الأشجار القصيرة : توجد على أطراف الغابات الاستوائية حيث يتراوح المطر بين  $\frac{3}{4}$  و ٢ متر ، تنمو الحشائش بسرعة ولكنها تجف فى فصل الجفاف الطويل ، وهذه الحشائش الخشنة التى يبلغ طولها أكثر من ثلاثة أمتار ليست علفا جيدا للماشية ، وإذا سقطت الأمطار تنمو بسرعة حتى تبلغ فى طولها الشجيرات المتناثرة مما يجعل الانتقال بين أرجاء هذه المراعى شاقا ، ورغم كثافتها فهذه الحشائش لا تمثل بساطا متصلا من العشب .

٦ - سفانا السنط والحشائش الطويلة : يغطى هذا النوع من النباتات نحو ١٦٪ من مساحة أفريقية وهى متشابهة الى حد كبير رغم انتشارها فى جهات متباعدة ، والأشجار من الفصيلة السنطية تمثل نسبة كبيرة منها ، يتراوح ارتفاعها بين ٣ - ١٥ متر ذات رءوس مسطحة ، أما الحشائش فيبلغ ارتفاعها نحو متر  $\frac{1}{4}$  - ١ متر بحيث إذا نمت الشجيرات والحشائش فهى تشبه البساتين ، ولكن هذه الحشائش لا تكون مراعى جيدة إذ تعرف فى جنوب أفريقية باسم «Sourveld» ولذلك تلجأ الحيوانات للرعى على جوانب المجرى المائية حيث توجد الحشائش ، ولكن قد تنمو الحشائش التى لا يتجاوز طولها مترا فى الجهات المرتفعة التى يسقط فيها المطر فى الصيف ، ويسمى هذا الإقليم الذى يخلو من الأشجار فى جنوب أفريقية باسم الفلد المرتفع ، وهو يمرض لسقوط الصقيع فى الشتاء كما يتراوح ما يسقط به من الأمطار بين  $\frac{3}{4}$  متر ومتر .

٧ - سفانا الحشائش القصيرة وأشجار السنط : تتكون النباتات هنا اما من حشائش قصيرة أو حشائش قصيرة متفرقة تنمو فى مجموعات ينتشر خلالها بعض الأشجار الشوكية الصغيرة أو الشجيرات ، وأن كانت تصلح للرعى إلا أنها كثيرا ما تختفى فى الجهات الفقيرة مخلفة الشجيرات فحسب، وهى تنمو فى الجهات شبه الجافة حيث توجد التربة الفقيرة الرقيقة التى يقع



أسفلها على عمق نحو ٢٠ سم طبقة صماء ، وتكثر هنا الأشجار الصمغية ، وقد تنمو الحشائش المعتدلة التى تشبه المراعى الألبية فى الجهات المرتفعة فى هضبة الحبشة وجبال شرق أفريقية المرتفعة مثل كينيا ، ولكن هـذـه الحشائش أكثر خشونة وأقل صلاحية كمرعى أو علف للحيوان من مراعى الأقاليم المعتدلة .

٨ - إقليم شجيرات الصحراء وحشائشها : توجد فى جنوب أفريقية حيث يتراوح المطر بين ١٥ و ٣٧ سم ، وهو نوع من المراعى القلـد الفقيرة التى تصلح رغم ذلك مرعى للماشية ، ولكنها لا توفر المرعى لعدد كبير منها ، وان كانت قيمتها الغذائية لا تقل فصل الجفاف عنها فى فصل المطر ان تظل طعاما سائغا للماشية طول العام ، أما شجيرات الصحراء التى تمتاز بقوامها الخشبي أو الغض فتمثلها نباتات الكارو فى جنوب أفريقية .

٩ - الصحراء وشجيراتها الملحة : قد تغطى سطح بعض جهات من الصحراء الملح سواء من كلور الصوديوم أو سلفات الصوديوم ، ولا تصلح حينئذ لنمو نباتات سوى بعض الشجيرات ذات الأوراق الغضة ، ويبدو سطح الأرض أبيضاً لما يغطيه من الملح ، ولكن هناك جهات تتكون من صخور صلبة عارية من الرمال أو تغطيتها الرمال أو الحصى أو الطين وتكاد تخلو من النباتات ، ولا يتجاوز مساحة هذه الأراضى التى يعرفها السكان بالصحراء بحق ٨٪ من مساحة قارة أفريقية .

## الفصل الثالث

### السكان والجماعات والاستعمار فى أفريقيا

أول ما يسترعى الانتباه فى دراسة توزيع سكان القارة قلة هؤلاء السكان ، فإذا كانت مساحة القارة تقدر بنحو ٣٠٢٥٢٠٠٠ كيلومتر مربع أو نحو ٢٢٪ من مساحة اليابس ، فإن عدد سكانها لا يتجاوز ٨٪ من سكان العالم ، وقد كان التناقض واضحا كبيرا بين التقديرات المختلفة لعدد السكان فى العصور المتباينة ، إذ كان أكثرها يمثل مجرد تقديرات قد قدرت على أساس أقوال الرحالة وكتابات المكتشفين .

وتعزى قلة السكان الى وجود ظروف طبيعية غير ملائمة للسكنى والاستقرار تضم مساحات كبيرة من القارة ، فالجهات الجافة التى تخلو أو تكاد تخلو من السكان والتى لا تصلح للسكنى والعمران تشمل أكثر من ١/٣ مساحة نصف القارة الجنوبي وبخاصة فى صحراء كاهارى ، فضلا عن الصحراء الكبرى التى تقدر مساحتها بنحو خمس مساحة القارة كلها . وكثيرا ما تقل كثافة السكان عن ٢ نسمة فى الميثل المربع فى الأقاليم الاستوائية الحارة الرطبة لتفشى الأمراض المتوطنة وكثافة النمو النباتى وسوء طرق النقل وعدم صلاحية المناخ للنشاط والانتاج . أما فى أقاليم السفانا فترتفع كثافة السكان ، إذ يصبح المناخ أقل ارهاقا ، وممارسة الزراعة أكثر يسرا ، والانتقال أكثر سهولة ، وهنا يتركز عدد كبير من سكان أفريقيا فى غرب القارة وشرقها وجنوبها ، كما يزدحم السكان فى الجهات المعتدلة المحدودة فى شمال غرب القارة وجنوبها الغربى . وإذا كانت مناطق المرعى أو الصيد أو الزراعة المتنقلة - وهى تنتشر فى مساحة واسعة من القارة لا تسمح بازدياد كثافة السكان - فإن مناطق الزراعة الكثيفة وبخاصة التى تقوم على الرى كما هو الحال فى وادى النيل الأدنى - هى المراكز الرئيسية لاكتظاظ السكان ، ولكن يجب الا يتبادر الى الذهن أن هناك ارتباطا بين أحواض الانهار الكبرى وبين ازدهام السكان - فإذا استثنينا بعض جهات حوض النيجر والنيل - قلما نجد انهارا ذات أهمية كمراكز جذب للسكان . والواقع أن ظروف البيئة الطبيعية تفسر توزيع

السكان بوجه عام ، ولكن الظروف الاجتماعية والسياسية والتاريخية تؤثر أيضا فى توزيعهم وتفاوت كثافتهم .

فالكونغو والنيجر الأدنى لا يصلحان كثيرا للعمران لما يكتنفهما من مستنقعات وغابات وادغال ، كما أن بعض الأنهار الأخرى التى تجرى فى جهات قليلة المطر ليس من السهل الاستفادة منها فى الرى أو الملاحه كالمميزى الأعلى والأورانج ليست بذات أهمية فى هذا المجال أيضا . والواقع أن مدى توافر موارد المياه وفى مقدمتها المطر له أهمية خاصة سواء فى حياة الرعاة أو الزراع ، فلا غرو أن ظهرت علاقة وثيقة واضحة للعيان بين متوسط المطر السنوى وتوزيع السكان وكثافتهم ، لأن استغلال مياه الأنهار فى أغراض الرى والزراعة لا يزال مقصورا على جهات محدودة من القارة ، ويمكن أن نعد ٦٤٠ مليمترا كمتوسط سنوى للمطر القدر الذى يفى بوجه عام بحاجة الزراعة فى الأقاليم المدارية ، وهكذا سنجد أن كثيرا من جهات العمران توجد فى الجهات التى يسقط فيها هذا القدر من المطر على الأقل ، ولكن تعرض القارة لغارات تجار الرقيق وغزوات الاوروبيين بل والحروب بين القبائل والجماعات المتجاورة من الأفريقيين أنفسهم ، قد أضاف عاملا جديدا هو اعتصام كثير من السكان بالجهات الوعرة النائية أو الجبلية المتطرفة التى يسهل الذود عنها ، فأصبحت الأودية والجهات التى يسهل الوصول إليها قرب السواحل أو المسالك الطبيعية أو الطرق غير مرغوب فيها . وربما لغزرة الأمطار فى كثير من الجهات الجبلية عنها فى المناطق السهلية المحيطة بها أهمية فى استيطان السكان فى كثير من هذه البقاع المرتفعة . رغم أن ازدحام السكان قد أدى فى كثير من الجهات الجبلية الى انهك التربة فاستنفدت خصوبة الأرض حينما واكتسحتها السيول حينما آخر .

وكما لعب استغلال الثروة المعدنية دورا مهما فى تطور القارة الاقتصادية فقد كان له أثره فى توزيع السكان كمنطقة كاتنجا فى زائير ، فيكتفى أن نذكر أن ٥٢٪ من صادرات هذه البلاد يتألف من الثروة المعدنية المستخرجة ، أما زامبيا بثروتها الضخمة من النحاس والزنك والفانديم فتمثل الثروة المعدنية ٩٧٪ صادراتها ، كذلك الحال فى سبهراليون حيث يوجد الحديد والكروم وغيرها من المعادن ، فتبلغ قيمة الثروة المعدنية أكثر من نصف قيمة الصادرات ، كذلك يزدحم السكان فى مناطق استخراج الذهب

والفضة والبلاتينوم والانتيمون والكروم والماس وغيرها من المعادن الصغيرة .

وصفوة القول أن العامل الرئيسى الذى يؤثر فى توزيع السكان وكثافتهم فى أفريقية هو توزيع المطر كما يبدو فى المناطق الكثيفة السكان نسبيا وأهمها منطقة ساحل غانة بين غمبيا ومصب النيجر ، وكما تساير هذه المنطقة بساحل غرب أفريقية جنوبا حتى مصب الكونغو تتوغل بعدا عن الساحل فى بعض المناطق الواقعة خلف الساحل فى غانة وبخاصة فى حوض النيجر الأوسط ، ثم هضبة البحيرات وبخاصة المناطق المحيطة ببحيرة فيكتوريا فى شرق أفريقية ، أما على الساحل الشرقى فيمتد نطاق غير متصل تماما بين ممباسا فى كينيا ومدينة الكاب ، أما فى شمال غرب أفريقية فيتكثف السكان فى المنطقة الساحلية وبخاصة فى تونس والجزائر ، وكما يزدحم سكان مراكش فى المنطقة المطلة على المحيط الاطلنطى ، ترتفع كثافة السكان نسبيا فى بعض جهات هضبة الحبشة . أما فى وادى النيل فى مصر وبعض جهات السودان فيمثل مجرى النهر محورا مهما للمعمران وقطبها قويا لاجتذاب السكان .

### عناصر السكان :

يسكن أفريقية عدد كبير من العناصر والسلالات البشرية ، ولكن الزنوج والقوقازيين هى أهم السلالات الرئيسية بها ، ورغم أن الحدود الفاصلة بين هاتين المجموعتين ليست الا منطقة انتقال تسكنها عناصر مختلطة ينسب متفاوتة فإنه يمكن تتبع الحدود الشمالية لسكنى العناصر الزنجية ، وتمتد هذه الحدود من مصب السنغال عند خط عرض ١٦ درجة شمالا حتى تمبكتو عند منحنى النيجر ، ثم تتابع سيرها شرقا حتى تعبر النيل الأبيض عند خط ١٢ درجة تقريبا شمالى بلدة الرنك ، ثم تدور حول هضبة الحبشة من الغرب متجهة شرقا حتى نهر جوبا فالمحيط الهندى ، ورغم ما يشوب وضع هذه الحدود من اعتساف فهى تمثل الحدود الجنوبية للتأثير القوقازى القوي . فالجماعات الزنجية الواقعة الى جنوب الخط تختلف اختلافا كبيرا فى نسبة ما اختلط بدماؤها من الدماء القوقازية ، ويسكن الزنوج السودانيون ساحل غانة وجانبها من الكمرون ، وهم أقل العناصر الزنجية تأثرا بالدماء القوقازية فيمكن أن نصفهم بأنهم يمثلون الزنوج الحقيقيين أو الخالص الى حد كبير ، أما الزنوج الاخرون فهم زنوج البانتو وهم أكثر تأثرا بالقوقازيين ، كما

تسودهم وحدة لغوية وأقرب الى النيلييين Nilotes وأنصاف الحاميين Half Hamites والحاميين النيلييين ، Nilo—Hamites وكلها من الجماعات الزنجية التي تحمل في عروقتها نسبة مختلفة من الدماء الحامية . ويسكن أفريقية جماعتان أخريتان تسييران في طريق الانقراض الى حد كبير تعصمان من ضغط العناصر القوية في جهات متطرفة تسودها ظروف شاقة هما البوشمن والأقزام ( انظر شكل ٨ ) .

فالبوشمن الذين يمثلون جماعة قديمة وفدت على القارة من بابها الشرقى منذ عصور متقدمة قد انتهى بهم المطاف تحت ضغط العناصر التي لحقت بهم والتي تعد أشد قوة ومراسا الى شمال ووسط صحراء كلهارى . ويمارس هؤلاء الصيد والجمع كما يجهلون الزراعة والرعى في الجهات التي لم يتأثروا فيها بالببيض وبخاصة البوير الذين ضيقوا عليهم الخناق ، شأن البانتو والهوتنتوت الذين طاردوهم الى أشد البيئات قسوة وجسديا في الصحراء ، ولا زال هؤلاء القناصون يستخدمون الأقواس والسهم المسمومة



السلالات البشرية من سكان أفريقيا

كانما لم يشبوا بعد عن حضارة العصر الحجري القديم ، ورغم أن دماء بعضهم قد اختلطت بدماء غيرهم من البانتو والهوتنتوت بوجه خاص فلم

يقتبسوا من ثقافة غيرهم ، بل يبدو أنهم قد فقدوا بمضى الزمن بعض ما كانوا قد امتازوا به من مقدرة فنية فى الحفر على الصخور ، ويتجول البوشمن فى جماعات لا يتجاوز عدد كل منها خمسين شخصا فى منطقة الصيد الخاصة بهم والتي يظلون يحتفظون بها تبعا للتقاليد ، ويمتاز هذا العنصر بالقامة القصيرة ، والاطراف القصيرة الصغيرة والبهرة السمراء المشربة بالصفرة ، والأديم الذى يتجدد فى سهولة والجهة البارزة والفك الناتئ والأنف الأفتس والوجه المسطح . أما الهوتنتوت فهم جماعة من الرعاة الذين يخلطون عن البوشمن قليلا بصفاتهم الجسمانية ، فهم أقوى منهم بنية وأطول قامة ، وهم يمثلون جماعة قديمة قد لجأت الى هذه المنطقة فى أعقاب البوشمن وكانت ديارهم تمتد حتى ولاية الكاب فى جهاتها الغربية ، ولكن بعد أن اتصلوا بالهولنديين من الزراع فقد الكثير منهم نظامهم القبلى ، ولم يبق منهم إلا عدد لا يتجاوز ١٥٠٠٠٠ يحيون شمالى الأورانج فى جنوب غرب القارة ويحيون حياتهم التقليدية فى بيئة شاقة ، وبخاصة بعد أن طردهم البانتو من مراعى الفلد الغنية الى أطراف الصحراء حيث يقيمون فى أكواخ بسيطة من القش وفروع الشجر ويربون البقر والأغنام ، ويمارس بعضهم الزراعة البدائية ، ولكن سكان ولاية الكاب من الملونين الذى يبلغ عددهم نحو ١٠ مليون يحملون فى أعراقهم دماء من الهوتنتوت الذين امتزجت دماؤهم بدماء الأوروبيين وبخاصة الهولنديين ، أما الأقزام فهم عنصر قديم قد اعتصم بالغابات الاستوائية الكثيفة حيث تمارس جماعاتهم الصغيرة حياتهم البدائية التى تعيش فى رباط وثيق مع الزوج فى غابات الكنغو ويمارسون الصيد وجمع حاصلات الغابات الطبيعية ، وهم يحصلون على منتجات الزوج الزراعية مقابل ما يقدمونه اليهم من منتجات الصيد ، كما يعيشون فى شبه تبعية واضحة لهؤلاء الزوج ، إذ قلما يقطن الأقزام وحدهم فى منطقة متسعة لأنهم يلتمسون الحماية والعون الاقتصادى عن طريق التبادل التجارى مع الزوج .

وهم يجمعون الى صفاتهم الزنجية الواضحة كالأنف الأفتس والفك البارز وقصر القامة الواضح ( ١٢٥ سنتيمترا ) .

أما الزوج الغربيون فيمثلون العنصر الرئيسى السائد فى افريقية المدارية : فالزوج الغربيون فى منطقة ساحل غانة يمثلون أكثر زوج افريقية

نقاء أو أقلهم اختلاطا بدماء الحاميين ، وتزداد نسبة الدماء الحامية عند أطراف الصحراء الكبرى كما يبدو التأثير بالحاميين سواء فى انتشار حرفة رعى الماشية أو فى النظم الاجتماعية فضلا عن شيوع اعتناق الديانة الاسلامية ، والواقع أى منطقة غابات غانة قد أصبحت قلعة طبيعية لاذت بحمايتها هذه العناصر لتطرف موقعها بالنسبة لمدخل أفريقية من الشرق ، أو عبر الصحراء من الشمال ، ولما يكتنف غاباتها من صعوبات ولعدم ملاءمة سواحلها لاجتذاب المهاجرين من وراء البحار يبدو الزوج الغربيون فى صورتهم النقية طوال القامة ذوى رأس مستطيل « النسبة الرأسية ٧٥ » سمراء داكنة أو سوداء حالكة ، كما أن أنوفهم فطساء وفكهم الأسفل بارز وشفاهم غليظة مقلوبة ، أما من الناحية الثقافية فالزنجى النقى مزارع وليس راعيا ، يميل لزراعة الموز والذرة ، وأهم هذه العناصر الزنجية جماعات الـ *Wolof* وبخاصة فى السنغال ، وقد كان لهم مملكة صغيرة التوكولور تدعى كايور *Tukolor* ثم جماعات السرور *Serer* وجماعات *Cayor* الماندينجان *Mandingans* وقد انتشر الاسلام بينهم وبخاصة فى جماعة الماندينجان الذين ينتشرون فى مساحات واسعة تمتد من الساحل بين نهر السنغال وشمال سيراليون شرقا الى شمال مرتفعات فوتاجالون وحوض النيجر الأعلى ، ويسود الاسلام بين جماعات الماندينجان كما تبدو فيهم الصفات الحامية فى الجهات الشمالية القريبة من الصحراء ، وقد أسس الماندينجان امبراطورية امتدت حتى غينيا ، وأهم عناصر الماندينجان جماعة من الزراع المهرة يعرفون بالمبارا *Bambara* اعتمد الفرنسيون عليهم كثيرا فى تنفيذ مشروعات الري فى النيجر الأعلى وتتتابع جماعات من الزوج مثل الفلبى فى غانة البرتغالية ، وجماعات تمنى *Timné* فى سيراليون والكرو - فى ليبيريا - ويتجه الكرو الى البحر فيعملون فى النقل البحرى وتبدو خصائصهم الجسمانية كزوج أنقياء خلص الى حد كبير ، ثم تقطن جماعات الأشانتى والفانتى *Ashanti, Fanti* فى غانة واليوروبا *Yoruba* فى جنوب غرب نيجيريا .

وقد قامت فى المنطقة الشرقية من ساحل غانة دويلات أو سلطانات وطنية مثل بنين *Benin* وأشانتى ويوروبا وداهومى ، وقد كانت مملكة الأشانتى فى الجزء الأوسط الجنوب من غانة من أهم الدول الزنجية التى لم تصلها مؤثرات حامية تذكر ، أما اليوروبا فقد كانت أكثر ثقافة وتحضرا من

الاشانتي الذين كانوا يمثلون حكومة ذات طابع عسكري ، ومن الطريف وجود مدن زنجية فى مملكة اليوروبا مثل ابادان و أبيكوتا Abekuta ، أما الصونغاي Songhai الذين يقطنون عند ثنية النيجر ، فقد أسسوا دولة امتدت نحو الجنوب متخذة تمبكتو عاصمة لهم ، وبعد أن استطاعوا بفضل نظامهم العسكرى وعددهم البالغ ٢ مليون نسمة أن يحطموا امبراطورية الماندينجان سنة ١٥٠٠ م ظلوا يسيطرون على هذه المنطقة من السودان حتى وصول الفرنسيين ، وقد اختلطوا بالحاميين الذين قدموا من وراء الصحراء ، أما فى أعلى الفولتا فتوجد جماعة المرسى Mossi الذين يمارسون الزراعة والرعى ، ولم يدينوا بالاسلام وقد اتخذوا وجدوجى Wagedugi عاصمة لهم : أما فى المنطقة الوسطى من السودان - أى الى الشرق من هذه المنطقة - فقد نشأت امارات وسلطنات لا زال الكثير منها قائما وأهم الجماعات هنا الهاوسا وهم من الزراع والتجار المهرة ، كما أنهم يتقنون بعض الحرف كالنسيج وصناعة الجلود ، وقد خضعوا لطبقة ارسنقراطية من الفولاتى ، ولما كانت لغة الهاوسا من اللغات الشائعة فى هذه المنطقة من أفريقية فقد تدعى جماعات مختلفة أنها تنتمى للهاوسا ، ولكن أهم مناطق الهاوسا هى التى تنحصر بين خط يمتد بين كاتسينا وسقوطو فى الشمال و زاريا فى الجنوب فى شمال نيجيريا . ويوجد قبائل زنجية تسيطر عليها طبقة من الحاميين أو العرب فى منطقة بحيرة تشاد ، والواقع أنه رغم أن السواد الأكبر من السكان من أصل زنجى مختلط فالعنصر الحامى قوى التأثير .

**زنجى البانتو :** رغم أن هذا الاسم لم يكن له فى أول الأمر الادلالة لغوية فكلمة بانتو تعنى « البشر أو بنى الانسان » ، فان عددهم الذى يجاوز ٥٠ مليونا يسكنون فى مساحة أفريقية قد أصبحوا يمثلون عنصرا متشابه الصفات ، وهى فى أصلها صفات زنجية قد امتزجت وبخاصة فى الشرق والجنوب الشرقى بالدماء الحامية ، كما أنه يسودها نظم اجتماعية ومظاهر ثقافية متشابهة بوجه عام ، ويمتد خط الحدود الفاصلة بين العناصر الزنجية السودانية وبين عناصر البانتو من الزنوج من جنوب الكمرسون شرقا جنوب الويلى Welle أحد روافد الكونغو الى بحيرة البرت ، ثم يخرق بحيرة كيوجا نحو الشرق مائلا نحو الجنوب حتى يتجه شمالا بعد أن يكون على كئب من الساحل عند ممبسة ، ثم يعود متجها نحو الشمال الغربى عند جبل كينيا ، وذلك قبل أن يواصل السير شمالا عابرا نهر نانا الى



تهر جوبا الأدنى . وقد كان من الممكن قبل تدخل الاوربيين فى هذه المنطقة أن نعيّز مجموعتين من الناحية الاجتماعية الأولى مجموعة القبائل الرعوية التى تميل للتنظيم العسكرى ويمثلهم الزولو خير تمثيل ، وقد اغتصبوا ماشيتهم الجهات الشرقية المطيرة الغنية بمراعيها الجيدة ، وقد كانوا يحتفرون الزراعة ويتركون ممارستها للقبائل المغلوبة على أمرها كما كانت قرية زعيمهم قلعة حصينة تحشد فيها الحيوانات التى تمثل ثروة القبيلة ، ثم المجموعة الثانية من أصحاب الحرف اليدوية ومن الزراع ولهم نظام شبه برلمانى ولذلك فنقوم الزعيم يحده مجلس يضم وجوه القبائل يدعى الـ Bisto .

فالبانتو الشرقيون يحملون فى عروقهم نسبة عالية من الدماء الحامية . فجماعة الباجنده شمال بحيرة فكتوريا يمتازون بأنهم زراع مهرة ، ولم يقتصر امتيازهم على أنهم اقبلوا على المدنية الغربية وهضموا نظمها ، بل ان عددهم البالغ نحو مليون كان يمثل مملكة وطنية ذات نظام ديمقراطى قد بلغت شأواً بعيدا اذا قورنت بالقبائل الأخرى ، ولكن الاختلاط بين الزوج من الزراع وبين الحاميين من الرعاة لم يتم فى بعض الأحيان كما هو الحال بالقرب من ساحل بحيرة البرت فى اقليم البونيورو حيث يعيش الباهيرا من الزوج والباهيما الذين يؤلفون الطبقة الاستقرائية من الحاميين الرعاة ، وفى كينيا بالقرب من الجبل المسمى ، جبل كينيا ، يقطن الزراع من جماعات الاكامبا والكيكويو الذين اذاحهم البيض عن كثير من أراضيهم الخصبة ، وهم يذكرون أن الاراضى التى اغتصبها المزارعون من البيض قد تولوا تطهيرها من النباتات البرية ، ويبلغ عدد هؤلاء ٢ مليون نسمة وهم يزرعون الموز والمانيق ، ولكن الأثرياء من بينهم يربون الماشية التى تعد فى نظرهم أيضا من مظاهر الثروة والجاه . وتنتشر لغة السواحلى التى نشأت كخليط من لغة البانتو وكثير من الألفاظ العربية ، كما اقتبست كثيرا من العبارات والالفاظ من لغة التجار فى شرق أفريقية الهندستانية والفارسية والبرتغالية والانجليزية ، وتعد اللغة التجارية السائدة فى كثير من أنحاء شرق افريقية ، فقد نشأت فى زنجبار الرئيسى وبخاصة تجار الرقيق فى شرق افريقية ، حتى القرن الماضى ، ثم انتشرت مع طرق القوافل فى الداخل فى مراكز متناثرة حتى الكونغو كما أصبحت منتشرة فى مدن الساحل الشرقى بل وبعض جزائر المحيط الهندى كشمال غرب مدغشقر .

جغرافيا العالم

أما البانتو الجنوبيون الذين يسكنون فى أكثر جهات القارة صالحة لسكنى المستوطنين من البيض ، فقد أصاب نظامهم الاجتماعى الكثير من التفكك الانحلال ، وأهم هذه القبائل فى جنوب أفريقيا مجموعتان الأونى وتسمى السوتوتشوانا Suto-Chuana وأهم قبائلها الباسوتو والبنتشوانا الذين يسكنون شمال نهر ولو - أو كسبا الأورانج ، ثم المجموعة الثانية وتسمى Zulu-kosa الذين ينتشرون فى شرق ولاية الكاب وسوازيلاندوناتال وأن كانت بعض قبائلهم تعيش الى الشمال فى ملاوى وزامبيا لاختلاطهم وروديسيا الجنوبية ، وقد يصبح لون البشرة أسمر داكنا نتيجة لاختلاطهم بالحاميين ، كما اختلطت دمائهم فى الغرب فى بنتشوانالند بالهنتنتوت والبوتنمن ، فاكتسبت بشرتهم لونا مصفرا ، ويكثر الأفراد الذين يبدو على تقاطيعهم التأثير الحامى بين الزولو عنهم فى الجماعات الأخرى ، والواقع أن الزولو كانوا من أكثر قبائل الجنوب تأثرا فى نظامهم الاجتماعى وثقافتهم بالمحضارة الأوروبية ، وهم عناصر المجموعة الأولى هم الباسوتو الذين استطاعوا بفضل طبيعة بيئتهم الجبلية الوعرة أى يصونوا وحدتهم ، بدین شعب الباسوتو الذى يبلغ نحو نصف مليون بظهوره منذ نحو قرن الى زعيم قوى هو موشيش (Moshesh) ، ولكن البانتشوانا لا يؤلفون شعبا كالباستو رغم وجود جماعات متعددة متشابهة من حيث الجنس والثقافة ، أما شعب الزولو الذى يسكن الى شرق وجنوب جبال دراكينزبرج فقد تفتت وحدته تحت تأثير الضغط الإقتصادى ، فخرج كثير منهم بحثا عن العمل فى المصانع والمناجم ، وقد تألف منهم شعب قوى فى أول القرن الماضى تحت زعامة قائدهم تشاكا Chaka ، ولكن رغم أن الزولو من الاقوام الحربية الشديدة المراس فقد استطاعت بعض القبائل أن تتغلل فى ديارهم مثل الماتابلى Matabele فى زيمبابوى وجماعات الأنجوى Angoni شمال نهر الزمبيري وأن كانت الباسوتو والتشوانا يعيشون فى قرى كبيرة ، فان الزولو يؤثرون أن يعيشوا فى مجموعة من الاكواخ « كرال » Kraal تعيش فيها الأسرة أو العشيرة تتكون من المساكن وحظائر المشية فى يحيط بها سور من الاشوك لحمايتها .

أما بانتو الجزء لاوسط الذى يعتبر حوض الكنغو مركز وطنهم ، فلم يستطيعوا لكثافة الغابات أن يكونوا دولا مترابطة متماسكة مركزية.

قوية ، تبسط سلطانها على مساحة كبيرة لفترة طويلة ، ويمتد وطنهم من جنوب الكمرن حتى أنجولا الوسطى ، ومن ساحل المحيط الاطلنطى حتى روديسيا الشمالية ، وهكذا كانت تقوم أنواع من الاتحادات تضم جماعة متفرقة تعيش فى الجبهات المنعزلة التى استطاع السكان فيها تدمير الغطاء النباتى لممارسة الزراعة ، وقد أطلق على هذه الاتحادات الفيدرالية المفككة امبراطوريات . فمنذ القرن السادس عشر عرف الاوروبيون من المبشرين والرحالة امبراطورية فى حوض الكنگو الأدنى تدعى الكنگو "Kongo" كما كانت هناك امبراطورية زنجية أخرى تمتد فى جنوب الكنگو ، وظل أحد الطغاة الاقوياء الذى يدعى Great Jumbo يحكم هذه المنطقة حتى انتزعها البلجيكيون منه .

• وأهم القبائل هنا هى البوشنجو Bushongo الذين ينزلون فى حوض نهر كساي والفانج فى جابون والباتيكى Bateke الذين يسكنون شمال مصب الكنگو وجماعة البالوندا Balunda فى أعلى نهر كساي

وتوجد جماعات من النيليين والنيليين الحاميين وأنصاف الحاميين ، ينتشرون فى النيل وفى السودان وأوغنده وفى هضبة شرق أفريقيا حيث كانت تختلط القبائل الرعوية من الحاميين الذين جلبوا معهم أنواعا من الحيوانات والنباتات الى هذه المنطقة وحملوا السكان من الزراع من الزنوج على ممارسة صناعة الحديد وبوجه عام نقلوا اليهم ثقافة أكثر تقدما ، وقد أقبل هؤلاء الرعاة على الزواج من الزنجيات ، فاذا اختلطت دماؤهم أصبحت الموجات الحامية الجديدة تنظر اليهم بعين الازدراء وطردتهم الى الداخل أو فى المناطق غير المرغوب فيها ، هكذا ظهرت جماعات فى درجات متفاوتة من الاختلاط ، فالى جانب الحاميين من المتمسكين بنقاء دمائهم يوجد أنصاف الحاميين كالمساي Masai والناندى والتوركانا Nandi, Turkana وهم أحدث من العناصر النيلية الحامية التى اختلطت فيها دماء الحاميين بجماعة النيليين من الزنوج الذين تنخفض فى عروقهم نسبة الدماء الحامية .

الحاميون : تدفقت جموع الحاميين على أفريقية منذ عهد مبكر

حين كان يسود الصحراء الكبرى مناخ مطير يسمح بنمو حشائش السفانا الغنية فى كثير من الجهات ، كما يبدو فى الوديان الكثيرة الضخمة الواضحة المعالم فى كثير من انحاء الصحراء ، ويمتاز الحاميون الاتقياء بالقامة المتوسطة الطول والبشرة البنية أو السمراء والشعر المسجوج قليلا أو المجعد والشسفاة الغليظة غير المقلوبة والراس المستطيل والانف البارز الضيق والوجه المسطح وعدم بروز الفك ، وقد كان الحاميون حتى قبيل الاسلام يمثلون العنصر الرئيسى من سكان الصحراء الكبرى وسواحل البحر المتوسط فى شمال القارة الافريقية ، فالصيريون القدماء وسكان النوبة والبهاج فى الصحراء الشرقية كانوا يحملون نسبة عالية من الدماء الحامية ، ولا زال السكان الحاميون فى هذه الجهات يمتازون بالصفات الحامية ، لأن تأثير الساميين وبخاصة العرب كان تأثيرا ثقافيا ودينيا وان كان من الصعب التمييز بين الصفات الحامية والسامية من الناحية الجسدية الى حد كبير فسكان الحبشة التى تنتشر بينهم اللغات السامية والحضارة السامية ويعتز بها الحاكم بانتمائيه لأصل سامى عريق لا يزوالن يمتازون بالخصائص أو الصفات الحامية ، أما الجماعات القريية من الصوماليين والجال وغيرهم فهم من الرعاة الحاميين الذين يسكنون الجزء الأوسط من الصحراء وهم من رعاة الأبل ، وهم ينقسمون الى فريقين : الطوارق السود وهم الاتباع ممن اختلطوا بالزنوج ، والطوارق البيض وهم من الحاميين الخالص الذين كانوا يسيطرون قبل الغزو الفرنسى لهذه الجهات على منطقة واسعة تمتد من واحة توات فى الشمال الغربى وفزان فى الشمال الشرقى الى تمبكتو فى الجنوب الغربى وزندر فى الجنوب وبحيرة تشاد فى الغرب ، وهم يؤلفون مجموعات مستقلة من الاتحادات ولكنهم رغم ثقافتهم المتجانسة وصفاتهم السلالية المتشابهة لم يخضعوا لحكومة موحدة ، أما التبو من سكان تبستى فهم لا يختلفون عن الطوارق فى صفاتهم الجسمانية أو حياتهم الاجتماعية كثيرا ، وقد كانوا يسيطرون قبل أن يطردهم السنوسيون على كثير من واحات ليبيا ، أما الفولانى فقد تغلغوا تدريجيا فى أول القرن الماضى فى شمال نيجيريا حيث سيطروا على امارات الهوسا وأسسوا امارات وسلطنات ، ولا زالوا يحتفظون ببعض السلطة وبعض المراكز المهمة فى شمال نيجيريا مثل زاربا وسوقطو وكانو ، وقد أخذوا فى الاستقرار ، وان

تكان بعضهم قد تغلغل في المنطقة الواقعة الى الغرب عند ثنية النيجر حيث أصبحوا شبه مستقرين ، وقد أدى اختلاط دمائهم بدماء الهاوسا من الزنوج الى اكتسابهم تدريجيا الصفات الزنجية ، وإيثارهم الزراعة على رعى الحيوان وهو مهنتهم التقليدية .

أما البربر أو الحاميون الشماليون فهم لا يؤلفون عنصرا متجانسا . فالى جانب النوع المتوسط القامة ، ذى الرأس العريض ، والبشرة السمراء ، والوجه المستدير ، وقليل من الجماعات الشقراء ذوى القامة الطسويلة ، والبشرة البيضاء والشعر الأصفر المموج ، ويوجد العنصر المتوسط الطول ذو البشرة السمراء والرأس المستطيل ، والشعر المجعد ، ويميل البربر الى تكوين اتحادات من القوى المتجاورة ذات مجالس يطبعها الطابع الديمقراطي ، وهم من الزراع ولو أن بعض قبائلهم تحيا حياة بدوية وتمارس الرعى ، وقد نقلوا لغتهم ولغتهم وعاداتهم ، فضلا عن اعتناق الدين الاسلامي ، وإذا كانت خصائص البربر الجسدية لا تختلف كثيرا عن صفات العرب ، فمن الصعب أن نتبين إذا كانت القبائل تنتمي الى أصل بربري واكتسبت بعض الصفات السامية ، أو أنها ذات أصل عربي ، بل أن كثيرا من قبائل العرب في تونس قد تأثرت بالثقافة البربرية ، إذ يقدر عدد هؤلاء العرب الذين تأثروا بالبربر بنحو ٣ مليون نسمة ، وإذا كانت نسبة العرب ومن يتحدثون اللغة العربية يقل في بلاد المغرب من تونس شرقا حتى المغرب غربا ، فإنها تزداد شرقا في ليبيا التي يسودها العنصر العربي .

الساميون : استطاع العرب بعد غزوه لشمال أفريقية في القرن الثامن أن يجلبوا بعض القبائل من بلاد العرب لتعمير وبسط النفوذ العربي في أرجاء بلاد المغرب ، وفي مقدمتهم بنى هلال وبنى سليم ، وذلك أثناء القرن الحادي عشر . وقد انتشر العرب عن طريق مصر غربا في بلاد المغرب فلا زالوا يمثلون السواد الأعظم من سكان ليبيا ثم تغلغلوا عن طريق وادي النيل في السودان ، وعلى حين ظل بعض من بقى بادية منهم من رعاة الابل على نقاء دمائهم وعلى تقاليدهم الاجتماعية ونظامهم القبلي ، فقد اختلط رعاة الماشية منهم الذين يطلق عليهم البقارة في السودان بدماء الزنوج كما نتضع نهاية السرت حدا لتوغلهم في بعض جهات الجنوب ، أما الجماعات التي

استقرت فى وادى النيل فى مصر والسودان أو فى منطقة الجبل الأخضر ببرقة أو غيرها فسرعان ما ففسدوا نقساوة دمائها التى امتزجت بدماء العناصر الأخرى .

وهناك عناصر سلالية أخرى عربية قديمة وفدت من جنوب غرب شبة الجزيرة العربية فى الفترة بين ١٠٠ و ٤٠٠ ق م مثل جماعة الحبشات ، فقد أدخلوا بعض طرز المعمار وطرق الزراعة والرى فضلا عن مجموعة من اللغات مثل اللغة التجرينية واللغة الأمهرية الى الحبشة . وقد كان من الآثار الحضارية هنا قيام دولة أكسوم .

### كشف أفريقية واستعمارها :

كانت كلمة « أفريقية » تطلق فى الخرائط القديمة على شواطئ قارة أفريقية الشمالية من مصر وسواحل البحر الأحمر فى الشرق حتى بلاد البربر غربا ، وكان يمتد نطاقها الحيانا ليطلق على المنطقة الواقعة خلفها الى الداخل مباشرة ، وقد كان ينظر اليها من عالم البحر المتوسط أو الشواطئ الجنوبية لهذا البحر أى لا تعنى قارة مستقلة . ويبدو التناقض بين تقدم هذه المناطق الشمالية من أفريقية التى نشأت فيها حضارات متقدمة كانت معروفة للعالم ، يفسح لها التاريخ صفحات حافلة سواء اكانت حضارة مصر العريقة أو حضارة قرطاجنة التى أسسها الفينيقيون وبلغت أوجها فى القرن التاسع قبل الميلاد ، وبين بقية القارة الافريقية التى ظلت مجهولة تحيا فى عزلة بعيدا عن الحضارة وتياراتها ، وقد ارتبط مصير هذه البلاد الشمالية ببلاد العرب فى جنوب غرب آسيا بعد أن غزاها العرب ونشروا فى أرجائها الحضارة والثقافة العربية والديانة الاسلامية فأصبحت جزءا من العالمين العربى والاسلامى ، وأصبح البحر المتوسط يمثل منطقة نزاع وصادم تلتقى الأروام الساكنة على شواطئه على الخصومة والعداء . وكان للفينيقيين الفضل الأول فى كشف سواحل أفريقية فسيطروا - بعد انشائهم بلدة ( بالماطر ) ثم قمطاجنة مكان تونس الحالية - على منطقة واسعة تمتد من طرابلس الى طنجة ، بل نكسر هيرودوت أنهم داروا حول أفريقية .

ولكن لم تلبث كشوفهم أن نسيت ، فلم يتبناها غيرهم ، ولكن كانوا أول من استطلع أن يجلب الى أسواق البحر المتوسط والعالم المتحضر منتجات أفريقية المدارية من رقيق وريش وعاج وأبنوس وغيرها ، ما النفوذ الثقافى الاغريقى فقد أخذ يتغلغل فى شمال أفريقية منذ القرن الحسادى عشر قبل الميلاد حتى انتهى فى القرن السابع قبل الميلاد باستيطان المهاجرين الاغريق لمدينة شحات الأفريقية فى برقة Cyrene ، وأخذ نفوذهم التجارى والثقافى يطرق باب هذه القارة من جهة أخرى فى الشرق سى وادى النيل الأدنى انتهى بغزو الاسكندر لمصر . ولكن الرومان الذين سيطروا على أرجاء سواحل أفريقية المطلة على البحر المتوسط والمعروفة حينئذ لم يمتد نفوذهم الى أفريقية الزنجية وراء الصحراء ، ولكن حدث حادث كان له أهمية كبرى فى تذليل الانتقال فى الصحراء الكبرى - تلك العقبة التى فصلت الشمال عن بقية القارة - وهو دخول الجمل من جنوب غرب اسيا عن طريق مصر الى موريتانيا والصحراء الكبرى ، وقد أخفقت بعثة الكشف الرومانية التى ذهبت صاعدة نهر النيل فى الوصول لمنابعه ، نحالت السدود دون تقدمها الى الجنوب من فاشودة ، كان للاغريق نشاط تجارى كبير على سواحل شرق أفريقية . كما يظهر فى كتاب جمع فيه صاحبه من الاغريق بعض تعليمات وارشادات خاصة بالملاحة فى البحر الأحمر ، ويسمى Periplus of the Erythrean Sea.

ولكن النفوذ الرومانى لم يكن قويا على قبائل البربر حتى غزا الوندال هذه الجهات فى القرن الخامس الميلاد ، قبل أن تحاول بيزنطة اخضاعها ثم غزا العرب هذه البقاع فتركوا اثرا اكثر قوة وأبقى على الزمن من الغزاة السابقين من الاغريق والفينيقيين والرومان ، وهكذا اتصلت أجزاء شمال أفريقية اتصالا وثيقا بجنوب غرب اسيا ، كما أن آثار هذا الفتح الثقافية والدينية قد قضت على كل ما سبقها من آثار الغزاة السالفين ، ولا زالت هذه المنطقة تعد جزءا مهما من العالمين العربى والاسلامى .

أما على الساحل الشرقى فقد نشأت مستعمرات للعرب والفرس ، تمتد من زنجبار جنوبا حتى مصب الزمبيزى وخليج صوقالا بالقرب من ميناء بيرا الحديثة ، ولم يكتف العرب بتنظيم حملات للاتجار بالرقيق ومحاصيل تلك الجهات ، بل أدخلوا زراعة الأرز وقصب السكر فى هذه

البقاع أيضا ، ان كان لسكان جنوب بلاد العرب من السبئيين والمعنيين من الحضارمة والعمانيين اليد الطولى وذلك بفضل امتداد الياوس شمال المحيط الهندي فى شكل قوس وروى تيارات مائية تدفعها الرياح الموسمية فى ربط سواحل شرق أفريقية فى المحيط المغلق من الشمال بسواحل جنوب آسيا ، وذلك بفضل امتداد الياوس العربى على شكل قوس وهبوب الرياح الموسمية فى رفع أشعة السفن من الياوس العربى الى الساحل الافريقي صيفا ، ودفعها من الساحل الافريقي الى الساحل العربى شتاء ، وكما ارتبط تاريخ شمال أفريقية بتاريخ حضارات البحر المتوسط الذى كان مهدا لمذنياته العريقة ، فان سواحلها الشرقية كانت احدى الجبهات التى اخترقها العرب وشعوب المحيط الهندي البحرية كالفرس والهنود والملايو منذ زمن بعيد ، اما المحيط الأطلنطى فقد حال باتساعه الضخم وتباعد ما بين شواطئه فى العالمين القديم والجديد دون كشف سواحل غرب أفريقية ، حتى تجاوزت شعوب البحر المتوسط البحرية كاسبانيا مرحلة الملاحة الداخلية كما ظهرت الشعوب البحرية المحيطية ، فالهولنديون والبريطانيون والفرنسيون والبرتغاليون قد تتبعوا السواحل الغربية متوجسين خيفة من المحيط المجهول فى أول الامر ، فوصلوا الى سواحل القارة الجنوبية قبل ان يصلوا الى سواحلها الشرقية ، لأن برزخ السويس بعرضه الذى يتجاوز ٢٤٠ كم دفعهم لأن يتبعوا سواحل أفريقية من الغرب ليمخروا عباب المحيط الهندي فى طريقهم للشرق ، ولما كان الأوروبيون قد ركبوا البحر فى طريقهم الى أفريقية ، فقد اقتصروا على انشاء مراكز ومحطات تجارية وحصون على الجزائر والمرافىء المحمية يتهيبون اقتحام المناطق الداخلية التى بقيت مجهولة حتى القرن التاسع عشر ، على حين قدم العرب من الصحراء عن طريق الياوس ، فلم يروا فى الصحراء الكبرى عقبة كأداء بل جاست أرجاءها طرق قوافلهم التى أصبحت تربط أملاكهم ومناطق الحكم والسياسة وأساليبهم فى الحياة وعقائدهم وثقافتهم الى امسارات نفوذهم التى امتدت على مشارف الصحراء وأطرافها ، فحملوا نظمهم فى المناطق الصحراوية المتاخمة للسفانا ، ولم يقفوا الا أمام الغابات الكثيفة بأمراضها ورطوبتها التى يتعذر فيها على حيوانهم الأثير وهو الجمل أن يعيش ، ولكن لا يعنى ذلك أن ننكر ما للصحراء من تأثير كحاجز طبيعى وثقافى ضخم حالت بجفافها الذى لا يقارن حتى يشبه جزيرة العرب التى توحدت قبائلها وجماعاتها وقامت بها دول وأخرجت حضارات - دون أن تتطور ثقافات البحر المتوسط تدريجيا ، حتى تستطيع الجماعات الزنجية



فى الجهات المدارية ان تقتبسها بعد تعديلها لتلائم ظروف بيئتها ، كما حدث  
فى حضارات جنوب شرق آسيا الموسمية .

وقد توافرت البواعث المتعددة التى حفزت البرتغاليين لارتياح سواحل  
غرب افريقية ، فبعد أن تخلصوا من الحكم العربى فى القرن الخامس عشر  
دفعهم ما سمعوه من العرب عن ثروة الشرق من توابل وذهب وجمواهر  
وغيرها الى محاولة الوصول اليها بالدوران حول افريقية ، فى فترة  
لا تتجاوز الخمسين عاما قطعوا ما ينوف عن ٥٠٠٠ ميل حول سواحل  
افريقية ، ورغم اقتصرهم على المنزول عند الموانئ والجزائر التى كانت  
تمثل محطات تنتشر على طول خطوط ملاحظتهم الساحلية ، فقد أدركوا  
قيمة ثروة البلاد من الذهب وبخاصة بعد أن تمكن أحد التجار البرتغاليين  
الذى يدعى جوميز من الظفر بحق احتكار تجارة ساحل غانة على أن يتابع  
الكشف عن هذا الساحل ، وبعد ان انتهى عقد هذا التاجر أخذت حكومة  
البرتغال على عاتقها مهمة الكشف فشجعت الريان برتلميو دياز على مواصلة  
الدوران حول جنوب افريقية فوصل الى أقصى جنوب القارة سنة ١٤٨٧ ،  
وهكذا استوقفت ثروة بعض جهات ساحل غانة التجارية المغامرين والبحارة  
من البرتغاليين ، فكانت ارجوين عند مصب نهر غمبيا ميناء مهما لهم ،  
ثم « المينسا » التى نشأت على أهم جهات ساحل غانة كانت مركزا للتجار  
فى الذهب التى تحمله رواسب الأنهار ، أما الفلفل الأفريقى فلم يظل سلعة  
مهمة فترة داريلة ان كان يناقسه الفلفل الهندى ، ولذلك تحركت مراكز التجارة  
وبخاصة فى منطقة ساحل نيجيريا وجزائر فرناندو وسار ترمى فى خليج  
بيافرا الى مصادر للحصول على الرقيق . والواقع أن الجهات المدارية فى  
افريقية لم تظفر بعناية المستعمرين التى ظفرت بها جهات آسيا الموسمية ،  
فلم يتغلغل البرتغاليون كثيرا فى الداخل ولم يعنوا بكشف المناطق الداخلية ،  
وقد استطلع فاسكودى جاما أن يتابع السير شمالا متتبعا سواحل شرق  
افريقية بمساعدة التجار من العرب ، فوصل الى موانئ ماليندى وصوفا  
وممبسه وغيرها ، وعرف طريقة استخدام الرياح الموسمية فى السفر الى  
الهند ، ولما كانت هذه السلطنات ومحطات التجارة العربية على السواحل  
الشرقية لا تربطها ببعضها رابطة فسرعان ما وقعت فى قبضة البرتغاليين  
الذين سيطروا على عدن وجزيرة سقطرى ، كذلك للتحكم فى مضائق خليج  
عدن وباب الهند ، ولكن عرب عمان استطاعوا أن يطردوا البرتغاليين

ويجلوهم عن منطقة نفوذهم سنة ١٥٥٠ ، وهكذا ظهرت الأواصر القوية بين عمان التي تزعمت الجهاد العربى فى المحيط الهندى وشرق أفريقية وبين جزيرة زنجبار ، انسحب البرتغاليون فى أوائل القرن الثامن عشر الى خليج دلجادوا ( خط عرض ٢٣ - ١٠ جج نوبيا ) ، ولم يتركوا من آثار استعمارهم الا بعض عناصر نقلوها من مستعمراتهم فى جوا على ساحل الهند ، لازالت تقسوم فى موانئ الساحل الشرقى ومدنه حتى الآن . وقد تعرضت العلاقات بين عمان وسلطان مسقط وبين موانئ وسواحل شرق افريقية للمد والجزر ، حتى انتهى الأمر بأن نقل سلطان مسقط مركز حكمه من مسقط الى زنجبار سنة ١٨٣٢ ، وامتد نفوذ هذه السلطنة على بعض المناطق الساحلية التى تقع الآن شرق تنزانيا وكينيا .

ولكن البرتغال التى اخذت تعاني من قلة ثروتها ومواردها الاقتصادية والبشرية قد فقدت استقلالها حين ضمها الاسبان لحكمهم ، فانتزعت الدول الأوروبية مراكز التجارة البرتغالية ومحطاتها الواقعة شمال خط الاستواء سنة ١٦٥٠ ولم يبق للبرتغاليين سوى غينيا « البرتغالية » كما عنى الفرنسيون الذين اتخذوا السنغال قاعدة لتوسعهم يربط مناطق نفوذهم فى الداخل بالساحل ، أما الانجليز الذين اهتموا بسواحل الذهب لما يدره من الذهب والرقيق رغم عدم صلاحيته لقيام الموانئ الطبيعية ، فقد اتخذوا من نهر غمبيا منفذا للتوسع ومحطة للتجارة .

ولكن تجارة الرقيق كانت من أهم صنوف التجارة التى اجتذبت النفوذ الأوروبى ، وبخاصة بعد أن انشأ الاسبان مستعمراتهم فى جزائر البحر الكاريبى ، اذ كانت بعض الجزائر تكاد تخلو من السكان كجزيرة باربادوس التى لا زال أكثر سكانها من أصل افريقى ، والبعض الآخر كان سكانه من الهنود الحمر الذين لا يستطيعون أن يعملوا فى ظل ظروف المناخ المدارى عملا مرهقا فى مزارع الاسبان الكبيرة كمزارع قصب السكر والموز ثم مزارع القطن فى جنوب الولايات المتحدة .

ولما كان الاسبان من أصحاب المزارع فى العالم الجديد بعيدين عن مصادر الرقيق فى مستعمرات البرتغال الافريقية فقد احتكر البرتغاليون امداد المستعمرات الاسبانية بالأيدى العاملة من الرقيق ، قبل أن يحسول البريطانيون والفرنسيون أن ينقلوا الرقيق بين ساحل غانة والعالم الجديد

مباشرة ، فلم يأت سنة ١٦٦٠ حتى أصبح البريطانيون من تجار موانئ بريطانيا الغربية مثل لقربول وبريستول ينقلون بعض الحلى المعدنية البراقة الى موانئ ساحل غانة حيث يستبدلونها بالرقيق الذى ينقلونه الى موانئ شرق الولايات المتحدة وجنوبها وجزء البحر الكاريبى ، فيحصلون على القطن والسكر والروم والطباق التى ينقلونها الى موانئ انجلترا ، وظلت هذه التجارة التى بلغت أوجها فى القرن الثامن عشر تسلب هذه المناطق من أفريقية نحو ١٠٠٠٠٠٠ من الرقيق سنويا ، كانت تتولى سفن لقربول نقل نحو نصفها ، ولما شعر البريطانيون بفداحة الجرم الذى ارتكبه انشأوا أول مستعمرة أوروبية على ساحل غانة لاىوا الرقيق المحررين سنة ١٨٠٧ .  
ثم انشأت بعض الجمعيات الأمريكية ليبيريا .  
ولكن يجب أن نذكر أن عنابة الأوربيين كانت مقصورة على التجارة وانشاء مركز تجارية ، إذ كانوا يحصلون على الرقيق من النخاسين من الزوج أنفسهم من الداخل ، ولكن الفرنسيين والهولنديين قد عنوا بكشف بعض جهات الجزائر الواقعة فى المحيط الهندى كجزيرة مدغشقر التى وجسه الفرنسيون اليها اهتمامهم منذ القرن السابع عشر .

وكانت أول محاولة لاستيطان الأوربيين بعض جهات افريقية فى منطقة خليج تابل سنة ١٦٥٢ ، فاتخذوها قاعدة لتموين سفنهم فى طريقها بين جزائر الهند الشرقية وهولنده فأثروها على جزيرة سنت هيلانة ، ثم اقامت شركة الهند الشرقية الهولندية حصنا ومستعمرة يسكنها رجالها الذين لحق بهم بعض الزراع فأخذوا يتحولون من موظفين يخضعون للشركة الى مستعمرين اتخذوا من تلك الجهات الجديدة وطنا ، ففسروا نحو الشرق ثم انتفوا حول حوض الكارو الجاف ليصلوا الى إقليم الفلد المرتفع بمراعيه الجديدة .  
ثم انشأ البريطانيون أول مستعمرة استيطانية لهم فى جنوب افريقية سنة ١٨٢٠ بالقرب من بورت اليزابيث الحالية ، فالتقى البيض من البوير والبريطانيين البانتو الذين كانوا مندفعين حينئذ فى زحفهم نحو الجنوب والجنوب الغربى ، وأصبح نهر فيش حاجزا يفصل بين هذين العنصرين اللذين لا زالا فى صراع عنيف .

وقد بدأ عصر الكشف الجغرافى الحديث فى آخر القرن الثامن عشر ، فقام جيمس بروس "James Bruce" بكشف منابع النيل الأزرق واتصاله

بالميل الأبيض ، كما أرسلت جمعية لندن الافريقية African Association of London رد اله يدعى مانجوبارك Mango Park استطلاع عن طريق نهر غينيا أن يصل الى اعالي النيجر حتى بلغ بلدة سيجو ، وقد اتجهت عناية الرحالة الى السودان الغربى وساحل غانة ، وقد اتبع هؤلاء الرحالة مسالك متعددة لكشف الجهات الداخلية فتقدم بعضهم من الشمال من ساحل البحر المتوسط عبر الصحراء الكبرى ، ولكن أكثرهم تغلغل من قواعد انتشرت على نهري غمبيا والسدغال ، ففي سنة ١٨٢٣ استطلاع ثلاثة من الرحالة ان يتجهوا من طرابلس مخترفين الصحراء الكبرى حتى منطقة تشاد ، واسترعدوا انتباه العالم الى وجود دويلات بورنو وبرنو وكانم وسوقطر وغيرها ، ثم كشف الأخوان لاندر Lander مجلسرى النيجر الأوتى ، أما الرحالة بارت Barth فقد كشف المنطقة الممتدة بين تمبكتو ومنطقة تشاد فى منتصف القرن الماضى .

والواقع أن سياسة الدول الكبرى ازاء افريقية والاقبال على استعمارها كان يتأثر بظروف كل دولة على حده ، فبريدانيا التى كانت اقوى الدول واكثرها تقدما فى ميدان الصناعة والتجارة كانت شديدة الرغبة فى البحث عن مصادر للمواد الخام ولتصريف سلمها المصنوعة ، ولكن سيطرة انصار التجارة الدولية الحرة على البرلمان الانجليسى كان يصرف الحكومة البريطانية فى أول الأمر عن مناصرة المشروعات الاستعمارية حتى تتولاها شركات . فقد كان المغامرون من رجال الشركات يقومون بالسيطرة على شقة ضيقة على الساحل أو مصب نهر أو جزائر قريبة من الساحل ، ليتخذوا كل ذلك قاعدة للتغلغل تدريجيا فى الداخل ، وقد كان من المألوف أن تعتبر الشركة المنطقة الداخلية أو ظهير قاعدتها فى الجهات الساحلية منطقة نفوذ تقليدى لها بل امتدادا طبيعيا لمستعمراتها التى كانت تخطط حدودها بالاتفاق بينها وبين الدول الأوروبية المجاورة ، وقد لعبت الانهار دورا هاما كمسالك لاقتحام القارة الافريقية ، ومن أهم الشركات الاستعمارية شركة جنوب افريقية البريطانية British South Africa التى أسسها سيسل رودس سنة ١٨٨٩ ، وهى شركة بريطانية كان يمتد نفوذها بين نهر اللمبوبو وحدود افريقيا الشرقية الألمانية ، ثم شركة دولية لاستغلال خيرات الكونغو تدعى International Association of the Congo أما فرنسا فقد عذبت لأسباب متعددة ببلاد المغرب ، ثم وجبت اهتمامها الى بعض جهات السودان الغربى لتصديق مناطق نفوذها متصلة ، وكان

يغنيها احتكار تجارة كثيرة من مستعمراتها ، كما أن المانيا التي شعرت رغم تأخر وحدتها بحاجات الدول الصناعية المتقدمة لفتح أبواب لاستغلال اموالها والحصون على حاجاتها من المواد الخام وفتح باب لتصريف مصنوعاتها - قد استطاعت ان تمد نفوذها فى ساحل غرب افريقية على الكمرون وتوجولاند وتجانيقا فى شرق افريقية وجنوب غرب افريقية . وقد اتفقت الدول الأوروبية ذات المصالح الاستعمارية سنة ١٨٨٥ على تقسيم مناطق النفوذ فى افريقية ، فاستعمرت البرتغال غينيا البرتغالية وأنجولا وموزمبيق وجزائر خليج بيافرا ، واستعمرت اسبانيا ريومونى وبعض جزائر خليج بيافرا وريودورو وسيدى حقنى ، وذلك لاختلاف الدول الكبرى على توزيع هذه المستعمرات ، أما المانيا فقد ظفرت بمناطق واسعة فى الغرب والشرق والجنوب الشرقى ، ولكن بريطانيا وفرنسا قد استأثرتا بالنصيب الأوفر من هذه الاسلاب ، وسارعت الدول الى كشف وارتياح المناطق الداخلية وتحديد تخوم وتخطيط حدود مستعمراتها مع الزعماء الوطنيين ، وأعقب ذلك تكوين بلجيكا لمستعمراتها الجديدة فى الكونغو التي سميت « Congo Free State » سنة ١٨٨٥ واستولت ايطاليا على عصب ومصوع .

وبعد أو وضع البريطانيين أيديهم على مستعمرات الهولنديين من البوير فى جنوب افريقية ، انشئت أربع جمهوريات هى ناتال والأورنج الحرة والترنسفال والكاب ، تختلف كل منها فى ظروفها الطبيعية عن الأخرى ، ثم اندمجت لتكون اتحاد جنوب افريقية الذى أصبح من دول الكومنولث البريطانى قبل ان يستقل ليصبح جمهورية وقد اتخذ قاعدة للتوغل فى وسط افريقيا حين استطاع سيسل رودس أن يعقد معاهدة مع ملك الماتابيلى ، ثم تأسست شركة جنوب افريقية فاعلنت نياسالاند ( ملاوى ) محمية بريطانية بينما تركت روديسيا الشمالية والجنوبية ( زامبيا وزمبابوى ) فى يد الشركة البريطانية حتى تحولت الثانية الى مستعمرة سنة ١٩١٣ ومنحت حق الحكم الذاتى ، أما روديسيا الشمالية زامبيا فقد اتحدت أجزاؤها سنة ١٩٢٤ ثم اتحدت هذه الأقاليم الثلاثة سنة ١٩٥٣ باسم Central African Federation قبل تفككه بعد عشر سنوات من انشائه سنة ١٩٥٤ .

حسبت املاك المانيا بعد خروجها مهزومة فى الحرب العالمية الأولى ، فدمرت بلجيكا إقليم رواندى أورندى ، وتحولت شرق افريقية الالمانية الى تنجانيقا البريكانية ، ووضع جنوب غرب افريقية تحت انتداب اتحاد جنوب

أفريقية ، واقتسمت بريطانيا وفرنسا كلا من الكمرون وتوجولاند ، ودخلت إيطاليا معركة الاستعمار فاستوتت على ليبيا والصومال الايطالى وارتريا ثم الحبشة ، ولكنها تخلت عن كل تلك الجهات فى الحرب العالمية الثانية ، وأصبحت تتولى ادارة الصومال الذى وضع تحت الوصاية باسم الأمم المتحدة قبل الاستفتاء ليتقرر مصيره ويظفر باستقلاله ، ولكن الوعى القومى قد حرر كلا من تونس ومراكش من النفوذ الفرنسى فى الشمال ، وغينيا الفرنسية فى غرب افريقية ، فضلا عن ساحل الذهب التى تحسرت من النفوذ البريطانى وأصبحت تدعى جمهورية غانا ، كما نال السودان استقلاله ، وان كانت قد منحت أرتريا لأثيوبيا . ولكن لا زالت الروح القومية تضطرم فى قلب القارة ، واستقلت الكمرون والصومال وتوجولاند ونيجيريا سنة ١٩٦٠ . كما استقلت زامبيا روديسيا الشمالية وملابى نياسالاند داخل نطاق الكومنولث البريطانى .

كما ظهرت داخل الاتحاد الفرنسى جمهوريات فى غرب افريقية هى جمهورية موريتانيا ومالى وجمهورية النيجر وجمهورية ساحل العاج ، كما انقسمت أفريقية الاستوائية الفرنسية الى أربع جمهوريات هى تشاد وأفريقية الوسطى والكونغو برازفيل وجابون الى جانب جمهورية ملجاش، بجزيرة مدغشقر . ولكن هل هذا الاستقلال فى داخل نطاق النفوذ الأجنبى يتيح للدولة التحرر من تحكم واستغلال واستبعاد الدول الاستعمارية حقيقة ؟ الواقع أنه يمثل خطوة فى سبيل التخلص من ربة وسيطرة النفوذ الأجنبى فحسب .

### اقتصاديات أفريقية

تتباين ظروف الانتاج الزراعى - الذى يعد أهم نواحى الاقتصاد فى قارة أفريقية - تباينا واضحا لاختلاف ظروف المناخ والتربة ومدى توافر الأسواق والمواصلات والأموال ومستوى حضارة الشعوب وسياسة المستعمرين الاقتصادية وعادات الشعوب وتقاليدها . والى جانب هذا التباين يتفاوت مستوى الانتاج وكفايته ، فالى جاذب الشركات الزراعية والاستعمارية التى تنتج المحاصيل التجارية وتستخدم أكثر طرق الانتاج تقدما وكفاية ، وتقوم الزراعة البدائية المتنقلة التى تستنفد خصوبة التربة وتعرضها للاكتساح والتى يجهل من يمارسها من الزراع استخدام السماد

أو المحرث أو الدورة الزراعية ، وأن كانت قد قامت طبقاً من الزراع الوطنيين بإنتاج المحاصيل التجارية كالكافور فى غرب أفريقية والقطن والطباق فى شرق أفريقية فى زراعتهم الصغيرة الى جانب إنتاج محاصيلهم الغذائية ، وربما كان شيوخ الزراعة البدائية التى تستهدف الاكتفاء الذاتى من أهم الصعوبات التى تحول دون نمو تجارة أفريقية فى المحاصيل التجارية وهبوط غلة الفدان ، فضلاً عن صعوبة تقديم أهمية الإنتاج الزراعى كأهم فروع الاقتصاد الأفريقى ، ورغم تعذر وضع حدود فاصلة بين الأقاليم أو المناطق الاقتصادية التى يمكن أن تنقسم إليها أفريقية فإنه من الممكن أن نمين عدة أقاليم اقتصادية بوجه عام هى ساحل المتوسط شمال الصحراء الكبرى، وأفريقية المدارية جنوب أفريقية ، فالأقليم الأول يمتاز بتوفره على إنتاج بعض المحاصيل الزراعية المعتدلة كالحبوب والزيتون والكروم والفواكه والموالح ولا يخلو من بعض المنتجات المعدنية كالفوسفات والحديد والبتول، ولكنه مرتبط ببقية إقليم البحر المتوسط فى أوروبا ولا زال اقتصاده متكاملًا مع الاقتصاد الفرنسى والأسباني الى حد كبير . أما أفريقية المدارية فثروتها المعدنية من النحاس والقصدير وغيرها تساهم بنصيب الى جانب الاقتصاد الزراعى الذى يعتبر بمحاصيله التجارية ومنتجاته الغذائية أهم عناصر البناء الاقتصادى ، أما جنوب أفريقية فقد أستوطنه الأوربيون وتوافرت لديه الخبرة ورعوس الأموال والثروة المعدنية وتنوع ظرف الإنتاج الزراعى مما أدى الى نمو التجارة الخارجية وارتفاع مستوى دخل الأفراد من الأوربيين .

• وقيام الصناعة وتعدد مصادر الإنتاج وتقديمها •

تغطى الغابات خمس أو سدس مساحة أفريقية ، وتعمل النار والناس والحيوانات على تدمير شطر كبير منها دون استنبات مساحات جديدة ، وقد يعزو الانكماش الى تغير فى نظام المناخ والاستغلال التجارى للأخشاب وعوامل أخرى أقل أهمية ، ورغم حجب بعض المساحات وصيانتها من التدمير، وزراعة أنواع غريبة عن أفريقية تمتاز بقيمتها التجارية وسرعة نموها كالكافور والمانجو ، فأهمية الغابات الاقتصادية محدودة ، والغابات الاستوائية فى ساحل غانة ودلتا النيجر وحوض الكونغو وساحل أفريقية الشرقية المدارية الرطبة مصدر مهم لأخشاب الأثاث التى تحول سوء الأحوال الصحية وظروف النقل والتنوع الشديد وقلة الأخشاب اللينة دون استثمارها ، ويصدر ١٥ نوعاً من بين ٤٠ نوعاً تجارياً منها •

وأهمها أنواع الكابلي وخشب ماكوريه *makoré* الأحمر ، وخشب أفوديرييه *avodiré* الأبيض ، وخشب إيروكو *iroko* الأسمر ، وهي من أخشاب الأثاث الثمينة فضلا عن أنواع خشب التطعيم أو القشرة مثل أوكوميه *okoumé* وليمبوه *limbo* وإلى جانب الغابات الاستوائية توجد أنواع من الاحراج والادغال تتدرج من الغابات المدارية المطيرة الى الغابات المختلطة بالسفانا ثم ادغال السفانا الى السفانا من الحشائش الطويلة والقصيرة فالصحراء ، وتلعب ظروف النمو المختلفة والانسان دورها فى مدى كثافة النباتات ونوعها ، وتنحصر أهميتها فى تثبيت التربة واستغلالها كوقود . أما النباتات المعتدلة فقد انكسبت كثيرا تحت تأثير الرعى المدمر ، وبخاصة فى الصيف فضلا عن صناعة الفحم النباتى ، وقد بدأت العناية بتشجير بعض المناطق وبخاصة الرملية من الكثبان والقمم العالية .

وتدل دراسة تجارة قارة افريقية الخارجية على مدى الشوط الذى قطعته فى ربط انتاجها بالأسواق العالمية . ولذلك فنصيبها من هذه التجارة يفوق ما تسهم به فى الدخل العالمى ، ولكن يجب ألا نبالغ فى ذلك فنصيبها فى تجارة الصادرات لا يتجاوز ٦٪ وفى تجارة الوارد حوالى ٩٪ ونصيب الفرد من هذه التجارة ينسب إليه يقل عن نصيب الفرد فى أمريكا اللاتينية . ولكن الذى يسترعى الانتباه هو احتكاره لانتاج بضعة معادن للتصدير فهى ٩٠٪ من الماس ، ٨٠٪ من الكوبلت ، و ٥٩٪ من الذهب ، و ٣٥٪ من الفوسفات ، ٣٠٪ من خام الكروم والمنجنيز و ١٨٪ من النحاس من الانتاج العالمى . ولكن المعادن الأخرى التى يمكن أن تقوم على أساسها نهضة صناعية كالفحم والحديد والبتروكيمياويات فنصيب القارة منها ضئيل للغاية ، فلا يتجاوز نصيبها من الفحم ٢٢٪ ومن الحديد ٢٨٪ ومن البترول .

أما من ناحية المحاصيل الزراعية فان هذه الظاهرة ليست أقل وضوحا فهى تنتج ٦٩٪ من الكاكاو و ٧٠٪ من منتجات نخيل الزيت ، و ٧٥٪ من السيزال و ٤٠٪ من الالياف النباتية ١٥٪ من البن ولكن نصيبها من الحبوب الغذائية كالقمح والذرة والشعير والأرز ضئيل لاعتماد ساكنيها على أنواع من الذرة الرفيعة تستهلك محليا ، أما ثروتها الحيوانية فهى ضئيلة فهى تربي ١٣٦٪ من الماشية المنتجة فى العالم و ١٦٪ من ضرائه .



تعتمد الماشية بفصائلها الثلاث في أفريقية من الحيوانات التي ارتبط انتشارها بغزوات الحاميين ، وفي فصيلة *Bos taurus* من النوع الذي ظهر في مصر القديمة في العصر الحجري الحديث وقد انتشر نحو الجنوب والغرب . أما الزيرو فقد عرف في شرق أفريقية ووسطها وجنوبها باسم *Bos indicus* ، ونوع ماشية يعرف بـ *Bos brachyconis* في غرب أفريقية ، وليس للماشية أهمية اقتصادية كمصدر للحوم والألبان فيما عدا الزيت المحلي بل ان استخدامها في حراث الأرض الزراعية محدود . ولكن مشاكل التغذية ومكافحة الأمراض الكثيرة وتوفير أساليب تحسين النوع تعد شائكة .

يرجع تخلف أفريقية الاقتصادية في كثير من جهاتها الى قسوة الظروف الطبيعية ، سواء اكانت في جهات الغابات الاستوائية بتربتها الفقيرة وأمراضها النباتية المتفشية ، وتلك التي تصيب البشر وصعوبة الانتقال فيها ، وعدم ملاءمتها لسكنى الأوربيين ، أو مناطقها الصحراوية الجرداء أو جهات السفانا التي تقاسى الجفاف في كثير من جهاتها ، وبخاصة في سنوات القحط والجفاف الكثيرة الحدوث ، ويضاف الى ذلك انتشار نظام الاحتكارات حتى الآن ، لأن الشركات لا يعينها سوى الريح السريع ، كما أن أفريقية قد دخلت ميدان التجارة العالمية منذ وقت قريب ، فأستترعت انتباه المستعمرين بما فيها من ثروات طبيعية كالثروة المعدنية والأخشاب . ويجب ألا نغفل صعوبة الانتقال في أرجائها أو اقتحامها ، فسواحلها التي تبدو جافة أو مستقيمة تحفها المستنقعات والغابات وكثبان الرمال ، وشطوطها وأنهارها القليلة بمجاريها التي تعترضها المساقط والجنادل ، وعدم قيام وحدات سياسية قوية فيها فترة طويلة منذ ارتيادها في أول عصور الكشف ، كل ذلك مضافا اليه قلة سكانها وقيام حاجز اللون وسياسة الدول المستعمرة التي تبغى النفع السريع قد أفضى الى تخلفها في الميدان الاقتصادي .

وإذا كانت ثروتها المعدنية قد أغرت الدول بأن تقتصر على هذا النوع من الاستغلال السريع الجزى الذي يسلب الطبيعة ثروتها فقد لعبت هذه الثروة المعدنية دورا كبيرا في مد السكك الحديدية التي تكاد ترتبط جميعها باستغلال المعادن ، والواقع أن من أهم مميزات الاقتصاد الأفريقي ثنائيته إذ يتنازع الاقتصاد التقليدي الذي يقوم على الاكتفاء الذاتي الذي قد يسرير الزيادة في عدد السكان بتوفير حاجتهم الغذائية ، وقد يخفف

ويختلف مما يستدعى تدخلا من السلطات الحاكمة ، والاقتصاد القائم على التبادل التجارى والنذى يستدل من نمو تجارة الصادرات فى محاصيله الرئيسية من المطباق والسهمس والفول السودانى والشاى والقطن على مضى المناطق المختلفة فى سياسة الانتاج الزراعى للاتجار بالمحاصيل ، ولكن أقبال الوطنيين على زراعة محاصيل المزارع الواسعة مثل القطن والبن والكافور والفول السودانى فى مزارعهم التقليدية الصغيرة ، ثم انشأؤهم للمزارع الكبيرة جعل الفصل بين النوعين غير واضح .

ويعد انشاء المعازل التى يقيم فيها الوطنيون من أهم الأسباب التى أدت لظهور مشاكل متعددة ، اذ تضيق بسكانها أو لا تفى مواردنا بحاجاتهم ولا تيسر لهم أسباب الرزق فتدفعهم للهجرة للعمل فى ظروف قاسية فى مزارع البيض أو فى المدن ، مما يؤدى الى تفكك وانحلال المجتمع الوطنى وازدياد الصراع بين العمسال من الوطنيين وغيرهم من الملونين البيض حدة ويقود الى اصدار تشريعات تنطوى على التعسف لوقف هذه المنافسة ، فضلا عما يترتب على الهجرة من حرمان الزراعة الوطنية من الأيدى العاملة القوية التى تقبل على هذه الهجرة .

**المواهب سالت :** قد سلفت الإشارة الى ما يكتنف لانتغال فى أرجاء افريقية من صعوبات ، فعلى ساحلها المستقيم الذى تحف بالمصالحات وتكتنفه المستنقعات والشطوط الرملية لا توفر الأسباب لقيام موانى طبيعية ، كما أن انتشار ذباب تسمى تسمى قد جعل استخدام المشاية فى النقل البرى محدودا ، ومن ثم كثر استخدام الانسان لحمل السلع حتى عهد قريب ، لأن انهار افريقية غير صالحة للملاحة فى كثير من اجزائها ، كما ان سقوط المطر على التربة الصلصالية كثيرا ما يجعل الطرق غير صالحة للانتقال فترة فة تطول من العام . وقد كانت الظروف التى تكتنف استغلال المارد الاقتصادية شاقة ، لما كان يواجه الدول التى ترغب فى مد السكك الحديدية من صعوبة توفير السلع التى تغطى تكاليف النقل ، فلم يكن هناك باعث اقتصادى لمسك الحديدية الا استغلال ثروة معدنية ، لا تلبث حتى تستنفد ، فتطالع المسئولين نفس المشكلة من جديد ، والواقع أن كثيرا من السكك الحديدية قد مدت لأسباب سياسية واستراتيجية .

وقد سبق مصر وبلاد المغرب وجنوب افريقية بقية انحاء القارة فى مد السكك الحديدية فى أرجاءها ، ففي سنة ١٨٥٩ مدت سكة حديدية الى

ولنجتوتون لتصل الى مناجم الماس فى كمبرلى سنة ١٨٨٥ ومناجم الذهب فى جوهانسبرج فى اقليم الراند سنة ١٨٩٢ وبولوايو سنة ١٨٩٧ ، وقد بدأ عهد مد السكك الحديدية فى افريقية المدارية بعد مؤتمر برلين حين عرفت كل دولة منطقة نفوذها ، وتمتاز الخطوط بانها لا تمثل شبكة وانما خطأ واحداً أو اكثر يمتد من الميناء الى منطقة داخلية لاغراض تعدينية أو استراتيجية ، وقد كانت الحدود السياسية تحول دون ربط هذه الخطوط بعضها ببعض الآخر ، كما كان عرض الخطوط يتفاوت كثيراً ، والواقع أن الاعترافات الاقتصادية أصبحت لها أهمية بعد الحرب العالمية الأولى ، أى بعد أن حددت أنصبة الدول وطوائف الدول كل دولة استعمارية على مستعمراتها ، فخط السكة الحديدية الذى مدته شركة السكك الحديدية الهولندية Netherlands Railways من لورنسو ماركيز الى بريتوريا سنة ١٨٩٥ والخط من بريتوريا الى دريان ، والخط الذى مدته شركة شرق افريقية الألمانية German East Africa Co. من تنجا Tanga فى شرق افريقية الألمانية الى الداخل كلها مدت لأغراض غير اقتصادية . كذلك شأن الخط الذى مد فى كينيا سنة ١٨٩٢ بين ممبسة وبحيرة فكتوريا ، وقد حاولت فرنسا أن تخلق من مستعمراتها الصغيرة فى الصومال ومن ميناء جيبوتى منفذاً طبيعياً تحتكر به تجارة الحبشة ، وربما امتزجت تلك الاغراض الاقتصادية بتطلع للسيطرة السياسية على الحبشة فمدت سكة حديد جيبوتى - اديس ابابا سنة ١٨٩٤ ، وقد مدت فرنسا قبل ذلك سنة ١٨٨٥ خطاً حديدياً من سنت لويس وديكار وآخر من كايس Kays على السنغال الى كوليكور على النيجر سنة ١٩٠٦ ، أما فى زائير فقد مدت عام ١٨٩٨ سكك حديدية لتفادى شلالات لفينجستون لتربط بين متادى وليوبولد فيسل ولتفادى شلالات ستانلى مد خط آخر سنة ١٩٠٩ بين ستانلى وبوندييرفيل ، وقد خالغ بعض رواد الامبراطورية البريطانية وبناتها مثل سيدسل رودس ربط هذه الجهات المختلفة من أقصى جنوب القارة عند كيبوتون بالقاهرة شمالاً بواسطة سكة حديد واحدة ، ولكن أهمية مثل هذا المشروع لم تعد كما كانت تبدو بعد ما أحرزه الطيران والنقل بالطرق البرية من تقدم ونجاح .

ولكن ما لبث المستعمرون أن تبينوا أهمية مد الطرق البرية ، فلم يعد ينظر اليها كفروع تغذى أو تمد الطرق الملاحية أو الخطوط الحديدية الرئيسية فحسب ، بل عنى بها المستعمرون وبخاصة فى جنوب افريقية حتى أصبحت

تنتشر فى أرجاء جنوب أفريقية شبكة من الطرق البرية الرئيسية والفرعية ، ولا زال يعد النيل والكنغو والنيجر أنهارا ذات أهمية فى النقل فى كثير من الجهات التى تجرى فيها .. لكننا يجب ألا نغفل أن أفريقية يعوزها الكثير من شبكات المواصلات المتكاملة عبر حدودها السياسية التى مزقتها المستعمرون ، وأنه اذا كان التقصير فى مد هذه الطرق قد أضر باقتصاديات وتقدم كثير من الجهات ، فان دون توفريها عقبات كثيرة وليس التخلف الاقتصادى نفسه أقل هذه العقبات أهمية .

كانت ملكية الأرض التى كان يغلب عليها الشبيوع فى كنف مجتمع يمارس الزراعة المتنقلة والرعى تمثل مشكلة شائكة أمام المستعمرين الذين كانوا يتألفون من نفر من المغامرين وشركات الاحتكار التى وجدت فى نظام استغلال الأرض بتركها بورا فترة من العام مسوغا لمصادرتها للقيام على حسن استغلالها وقد كان النظام القديم يبيح للأجنبى أن يحصل على أرض من القبيلة ليستغلها لا ليدعى حقوقا مطلقة للملكية فيها ، فإساء الأوربيون فهم هذا النظام ، كما أن تحول نظم الاستغلال الواسعة للاكتفاء الذاتى فى وقت كان عدد السكان والحيوان لا يمثل دافعا قويا يدفع للتشبيث بالأرض والمغلاة فى قيمتها - نظام يستهدف الانتاج للربح فى وقت زاد فيه ضغط السكان وحيواناتهم على الموارد الطبيعية من مراعى وموارد ومياه وأرض تصلح للزراعة - كل ذلك جعل نظام الملكية التقليدية غير ملائم للمجتمع الأفريقى المتطور ، فضلا عن أن وفود مزارعين وشركات أوربية تريد أن تنتزع أخصب الأراضى فى أكثر المناطق ملاءمة لسكانهم آثار حنق وثورة الوطنيين ، وباحتجاز هذه البقاع المختارة تهافت الوطنيون من الزراع والرعاة على الاسراف فى استغلال الأرض مما عرض التربة للانجراف واستنفاد الخصوبة وقضى على أجود حشائش المرعى ، وتقدر نسبة الاراضى المحجوزة أو التى يستغلها الأوربيون بـ ٨٩% من جمهورية جنوب أفريقية ، ٤٩% فى زيمبابوى ، ٤٩% فى سوازلاند ، وكانت ١٣% فى الجزائر خارج نطاق الصحراء ، ٩% فى زائير ، ٧% فى كينيا ، ٦% فى تونس ، ٦% فى بتشوانالند ، ٥% فى ملاوى ، ٣% فى زامبيا ، ٢% فى المغرب ، ٢% فى رواندى وبوروندى ، ١/ فى تانزانيا .

## الباب الثانى

### الفصل الأول

#### بلاد المغرب

رغم ما يبدو على بلاد المغرب أو « جزيرة المغرب » كما عرفها العرب من تباين فى الظواهر الطبيعية ، فقد استمدت وحدتها من امتداد هذه الظواهر الطبيعية فى صورة شبيهة مطردة بين أقصى شرقها وأقصى غربها ، فهذا العالم المتميز الواضح السمات تحيط به معالم طبيعية واضحة أيضا ، فيقع البحر المتوسط فى شماله وشماله الشرقى والمحيط الأطلنطى فى غربه وشماله الغربى كما تمتد الصحراء فى جنوبه ، وهكذا وجدت التقاليد المتباينة والحضارات المختلفة فى أحواضها المنعزلة وجبالها الوعرة ووديانها الضيقة ملاذا ومعصما ، ولكن لم تكن طوال تاريخها تفتح ذراعيها لهذه المؤثرات الأجنبية التى كانت لا تجد مجالا فسيحا لانتشارها ، ورغم هذا التنوع فى البيئات وما يكتنف التحول من بيئة لأخرى من صعوبات ، فقد كانت بلاد المغرب تقوم بدور حلقة اتصال من النواحي البشرية ومنطقة انتقال فى الظروف الطبيعية بين قارة أفريقيا التى تعد جزءا منها من الناحية التقليدية وبين قارة أوروبا التى تصل بها بأكثر من سبب وتمت إليها بأكثر من وشيجة ، فإذا كان صحيفا ما قيل من أن قارة أفريقية تنتهى عند جبال البرانس لأن شبه جزيرة أيبيريا تعد جزءا من العالم الأفريقى سواء ببنياتها وتضاريسها ومناخها أو نباتها وتاريخها وتوجيهها الجغرافى الى حد ما فإن ما يقال من أن قارة أوروبا تبدأ عند حافة الصحراء الكبرى الشمالية أى تضم بلاد المغرب التى تتسم بطابع أوروبى ليس دون ذلك صوابا ، ولكن قد يكون أجدر بالتصديق أن نصف بلاد المغرب بأنها منطقة انتقال يلتقى فيها العالمان الأفريقى والأوروبى ، وتختلط وتتجاوز مميزات كل من القارتين ، فأفريقية تمتاز بسطحها ذى الطبيعة الهضبية المستوية الذى تمتد أفاقها الى مدى بعيد ، كما أن بنياتها تتميز بانتشار أشكال السطح المستوية التى تعكس بساطة فى التركيب الجيولوجى ، كما أن كتلتها القديمة تبدو على جانب كبير من الاستقرار فضلا عن أن نطاقات المناخ والنبات تمتد فى وضوح

واطراد من شرق القارة الى غربها ، هذه السمات المميزة للقارة الافريقية لا تكاد تخلو منها بلاد المغرب ، فتلك الجهات من مراكش التى تطل على المحيط الاطلنطى يغلب عليها طابع الهضبة ذات البنية القديمة ، كما أن نظام الصرف الداخلى الذى ينتشر فى القارة الافريقية يوجد فى بقاع متفرقة فى شرق تونس وفى السهول العليا فى الجزائر وفى مراكش وتتغلغل المظاهر المناخية والنباتية التى تميز الصحراء فى بعض المناطق الشمالية التى كان ينتظر أن تخضع لمؤثرات البحر المتوسط كمنخفض الحوض الصحراوي الذى يقع فى قلب الجزائر ، وتقترب الصحراء كثيرا من الساحل فى شرق مراكش أيضا ، كما تتجاوز فى شرق الأطلس الكبرى بعض المناطق التى يصيبها المطر الغزير وتقوم بها حياة نباتية غنية و جهات صحراوية جافة ، كما يحدث فى شرق الجزائر ان تطل مرتفعات أوراس التى تكتنفها الغابات الكثيفة على منطقة صحراوية جرداء .

ولكن هذا لا يعنى أن الانتقال بين الظروف الطبيعية وما يتصل بها من مظاهر الحياة البشرية المتباينة لا يحدث الا فجأة ، فامتداد البحر بتأثيره اللطيف لمسافة كبيرة وما تمتاز به بعض المناطق المجاورة له من أنبساط وسهولة يسمح لهذا التأثير بالتغلغل فى اليابس دون عائق ، مما أدى الى انتشار المؤثرات البحرية فى مساحة كبيرة تضمحل فيها تدريجيا لتسود الظروف القارية ، كما يحدث فى شرق تونس ومراكش الغربية المطلة على المحيط الاطلنطى ، ورغم ما يشوب وضع حدود فاصلة بين هذا الاقليم الكبير والصحراء الملاصقة من صعوبات ، فانه يمكن أن نعتبر أن هذه الحدود تبدأ على ساحل المحيط الاطلنطى الى الشمال قليلا من وادى درعه فى وادى صغير يدعى وادى نون لتتحف بالمنحدرات الجنوبية لجبال أطلس الصغرى ، وتسير متتبعة السفوح السفلى لجبال أطلس الكبرى فى نواحيها الشرقية وأطلس الصحراء فى الجزائر . أما فى تونس فان الحدود تلازم سلاسل جبال قفصه ولكنها لا تبلغ البحر ، ان يعترض طريقها اقليم الساحل شبه الصحراوي الذى يغزر فيه المطر نسبيا كما تتضح فيه المؤثرات البحرية بفضل خليج قابس وانتشار مناطق مرتفعة فى جنوب تونس .

وهكذا اتضحت وحدة بلاد المغرب لا بسبب ما يسودها من تجانس ونشأبه ولكن لما يحدها من المظاهر الطبيعية التى ضربت حولها نطاقا من

العزلة حتى لتبدو عالما مستقلا ولا امتداد للظواهرات الجغرافية على طولها ، فكانما حين أولت بلاد المغرب قارة أفريقية ظهرها قد اتصلت بأوروبا التي لا يفصلها عنها الا مضيق جبل طارق الذى لا يربو اتساعه على ١٣ كيلومترًا والذى يقع فى طريقها الغربى ، على حين يقترب طرفها الشرقى من جزيرة صقلية كثيرا فلا يتجاوز اتساع مضيق صقلية ١٤٠ كيلومترًا ، وهكذا ربط البحر المتوسط بين سواحله الشمالية الواقعة فى جنوب أوروبا وسواحله الجنوبية الممتدة فى شمال غرب قارة أفريقية ، والواقع أن حوضه الغربى يسوده تشابه لا من النواحي الطبيعية من حيث البنية والتضاريس والمناخ والنبات فحسب ، بل فيما يتصل بالظروف البشرية من تاريخية وسياسية وثقافية أيضا . ولكن الى جانب أسباب الاتصال والتشابه التي تربط بلاد المغرب بالصحراء الكبرى فى جنوبيها والعالم الاوروبى فى شمالها ، فقد كانت هذه البلاد على صلة وثيقة ربطت مصيرها زمنا بمصير الأمور ومجريات الاحداث فى حوض البحر المتوسط الشرقى سواء فى جنوب غربى اسيا او فى شمال افريقية ، اذ انتشر الاستعمار الفينيقى الذى اتخذ قرطاجنة مركزا له فترة طويلة ، كما حمل اليها الفتح العربى الحضارة الاسلامية والثقافة العربية والدين الاسلامى التى سادت هذه الاصقاع وطبعتها بطابع واضح ، فأصبحت من عوامل الارتباط والوحدة بين هذه الجهات رغم تباين بيئاتها وتمزيق الاستعمار لوحدها زمنا .

وتمتد هذه المنطقة بين خطى طول ١٠° و ١١° شرقا ، وعرضى ٤٠° و ٣٧° و ٢٩° شمالا ، وهكذا تبدو فى شكل متوازى مستطيلات يبلغ طوله ٢٠٠٠ كم من غرب الجذب العربى الى شرق الشمال الشرقى ، أما اتساعها بين الشمال والجنوب فيتراوح بين ١٥٠٠ و ٢٠٠٠ كم ، ورغم ما يبدو من أن الصحراء تمثل عقبة طبيعية ضخمة تفصل العرق الزنجى والحضارات السودانية عن العرق القوقازى وحضارات البحر المتوسط ، فقد استطاع العرب بفضل حياتهم البدوية واستخدامهم للابل فى بيئتهم الاصلية أن يوجهوا بلاد المغرب نحو الجنوب ، فأصبح الكثير من سكان الواحات من القوقازيين كما تسرب الدم الزنجى للشمال ، بيد أن هذا الاتصال بين بلاد المغرب والصحراء الكبرى وما يليها جنوبا لم يظهر عند الفتح الاسلامى ، وأن كان هذا الفتح قد شاهد توثق أو اصره ، لأن القوافل منذ أقدم العصور كانت تتردد بين الشمال والجنوب تحمل الرقيق والذهب وجلود الحيوان

وريش النعام من الجنوب ، لتعود محملة بسلع حضارات الشمال من المنسوجات والأدوات المعدنية والآنية والأسلحة .

أما البحار التى تحيط بهذا الاقليم فقد تباينت فى طبيعة وأهمية الدور الذى لعبته فى حياة سكان هذا الاقليم وتاريخه ، فكان المحيط الاطلنطى يمثل حتى عصر الكشوف الجغرافية بحرا مجهولا غير مطروق ، ولذلك كانت الرحلات البحرية اثناء عصر الكشوف تلازم الساحل ولا تحيد عنه ، ولكن بعد أن تم كشف العالم الجديد أصبح هذا المحيط مثابة للنشاط التجارى ومركزا لحضارة متقدمة ، وبرزت أهمية السواحل الغربية لمراكش المطل على المحيط الاطلنطى كمراكز استراتيجية ، وقواعد ومحطات بحرية ومطارات بين العالم القديم والبحر المتوسط وبين العالم الجديد ، ولم يعد البحر المتوسط يمثل وحده ساحل بلاد المغرب وجبهتها البحرية التى يمكن التغلغل عن طريقها الى قلب البلاد ، بل أصبحت المنطقة الغربية من مراكش تفتح ذراعيها لاستقبال التأثيرات الحضارية والسلع من وراء المحيط . أما ساحل بلاد المغرب الذى يطل على البحر المتوسط فلم يدفع سكانه نحو النشاط البحرى الا فى منطقة محدودة ، تقع غربى ساحل الجزائر ، فقد اضطر السكان فى هذه المنطقة الجدياء القليلة الموارد أن يمارسوا النقل البحرى والتجارة ، بل والقرصنة ، أما ساحل تونس وبخاصة الجزء الشرقى منه فقد كان يمثل بيئة بحرية ملائمة لقيام حضارة بحرية ، فحضارة قرطاجنة وجدت فى مرافئ هذا الساحل العميقة التى تتوافر فيها أسباب الحماية ، وفى مواجهتها لشرقى البحر المتوسط ظروفها جد ملائمة لنمو وتبلور حضارة ذات طابع بحرئ خالص ، ولا زال كثير من سكان خليج قابس - سواحلها وجزره - يجدون فى ثروته من الاسماك والاسفنج مرثقا .

البنية : تتكون هذه المنطقة من سلاسل جبلية ، وهضاب تتخللها ودبان تمتد من الجنوب الغربى نحو الشمال الشرقى موازية للساحل بوجه عام ، وقد تبدو هذه السلاسل الجبلية متوازية ، ولكن كثيرا ما تنكشف هذه الظاهرة عن عدم اتصال هذه السلاسل التى قد تظهر متصلة لاول وهلة ، فأطلس التسل ، أو تل الريف ليست موازية لأطلس الكبرى ، وأطلس الصحراء ، وتعتبر السلاسل الشمالية أحدث وأكثر تعقيدا من الجبال التى تقع فى الجنوب لتأثرها بمميزات البنية فى النظام الابلى ، وما يتصل به من حركات .



أما فى الغرب فنتسع ، كما تتعقد ، النظم الجبلية ، إذ تقترب الكتلة الإفريقية من السلاسل فى الجهة الشرقية ، وهكذا تبلغ هذه الانظمة أقصى اتساعها بين تال الريف وأطلس الصغرى فى غربى مراكش ، ولكن أثر كتلة أفريقية القديمة يبدو فى اتجاه الجبال وضخامتها وارتفاعها ، ونظام الالتواءات ، وطبيعة الصخور فى بلاد المغرب ، فعلى حين تبلغ الرواسب البحرية سمكا كبيرا فى الجهات الشمالية لطغيان البحر المتوسط الذى كان يغير من الشمال ، نجد أن صخور الكتلة القديمة فى الجنوب تظهر على سطح الأرض ، كما تتكون من هذه الصخور هضاب أو سهول مرتفعة تتغلغل فى داخل جزيرة المغرب نفسها ، وتبدو صخور الكتلة الإفريقية على سطح الأرض فى مساحات واسعة فى مراكش فى الأطلس الصغرى ، والمحيط الاطلنطى فى تافيلالت ، وفى الأطلس الكبرى ومنطقة الجبال وفى هضبة مراكش الوسطى ، وعند الحافة الشمالية من الهضبة أو السهول العليا فى مراكش ووهران ( أنظر شكل ٩ ) .


تتكون هذه الكتلة الإفريقية من صخور متحولة من الشست والميكاشست ، والجرانيت ، والمجمعات ، وصخور الحجر الرملى القارية ، والريوليت التى تنتمى لما قبل الكمبرى ، ومن صخور الزمن الأول السميكة جدا ، فقد بلغ سمك رواسبها من ٨٠٠٠ الى ١٠٠٠٠ مترا من الحجر الرملى والجيرى ، وقد تعرضت فى العصر الفحمى لطغيان البحر ، فتكونت طبقات سميكة من الحجر الرملى ، وفى أثناء ما عرف بالحركة الكاليدونية أصابت هذه الجهات هذه الحركة التكتونية ولا تزال آثارها الالتوائية واضحة فى السهل الساحلى فى الشمال ، وفى الجنوب على السواء ، وقد صحبتها حركة تحول صخور المنطقة الساحلية ، ولكن كانت آثار الحركة الهرسينية اشد وضوحا كما كانت أكثر تعقيدا فتعددت اتجاهاتها ، التى كان يمتد محورها الرئيسى من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى ، أو من الشرق الى المغرب ، ولكن توجد محاور أخرى ثانوية للالتواءات ، تسير من الشمال الى الجنوب ، تقع بين غرب الأطلس الصغرى والهضبة الغربية ، الى جانب بعض الاتجاهات بين الشمال الغربى والجنوب الشرقى فى شرق أطلس الصغرى وجنوبها ، وقد تعرضت سلاسل الحركة الهرسينية لعوامل التعرية فترة طويلة ، وتحولت كثير من الصخور التى أرسبت بعد هذه الحركة تحت ضغط الرواسب السميكة التى تنتمى لعصور البرمي

واللياسى والترياسى والجوراسى والكريتاسى ، وتمتاز هذه الرواسب بأنها أقل دكنة من صخور الكتلة القديمة . وترتكز رواسب الزمنين الثانى والثالث ارتكازا غير متناسق على الكتلة القديمة ، كما تنتشر فيها - وبخاصة فى جنوب مراكش - الطفرح البازلتية ، فقد تكونت شقوق خرجت منها هذه المصهرات فى عصور اللياس والجوراسى والكريتاسى . ويطلغى البحر من الشمال أو الزمن الثانى حتى لم يبق بمنجاة منه سوى جبال غرب مراكش ، ولكن كان مستواه وعمق مياهه معرض للتغير . ولذلك يبدو الاختلاف فى سمك الرواسب وطبيعتها ، فأرسبت الصخور الطفلية الجيرية فى القيعان المنخفضة ، أما المرتفعة نسبيا فتنشر بها الصخور الجيرية الصلبة ، ويتراوح سمكها بين طبقات رقيقة جدا ، وأخرى يتجاوز سمكها ٦٠٠٠ متر .

أما فى الزمن الثالث فقد امتد « بحر الفوسفات » بين الجزء الغربى من مراكش ، بحيث يضم شمال الجزائر ومنطقة الشطوط : وتتألف أكثر صخور الايوسين الاسفل من الحجر الجيرى الطفلى . ويمكن أن نميز حركتين : الأولى فى الايوسين الاوسط « نظام البرانس » أما الأخرى فقد حدثت فى الاوليغوسين الأعلى ، وقد أعقبتها ثلاث حركات البية امتدت من الميوسين الاوسط حتى الميوسين الأعلى ، أما الاخيرة فقد حدثت فى البلايوسين والزمن الرابع . وقد بقيت بعض جهات هذه المنطقة محتفظة بشكل الهضاب المستوية حتى آخر الميوسين لتلتوى بعد ذلك كما حدثت فى شرق تونس وجنوبها ، ومن ثم ظهرت حركات التوائية فى البلايوسين . وهكذا يبدو عدم استقرار الظروف غريبا كما يظهر فى النشاط البركانى فى الريف الشرقى وأطلس الوسطى .

ويظهر مما سلف أنه رغم أن سلاسل الأطلس قد أخذت تتكون منذ العصر الجوراسى فقد تجددت فى الكريتاسى الاوسط والأعلى ، ولكن حركات الزمن الثالث هى التى طبعت هذه السلاسل بطابعها الرئيسى وأضفت عليها نظامها الحالى .

ولقد نحار فى أيهما أعظم قوة وأبعد أثرا فى تكوين هذه الجبال ، هى الحركات البرانسية أم الالبية ؟ والواقع : أنه بينما نجد أن الاولى أهم فى



الستورین الجیولوجی لشرق غرب آفریقیتیا

- ۷- بکر تیان کجکس کرسلسون بولفس وازان کول بولج
- ۸- استوری اواناقلایک اولونک
- ۹- الکتات الیمرز ایزکیتیک سلسون جیالیان بزلایس
- ۱۰- سوسول لوزرا ایزکیتیک فیه الیولیس الیمرس
- ۱۱- ارضی اکلجیک فیه الیولیس الیولیس الیولیس
- ۱۲- ارضی سوسول کوزیک ایزکیتیک ارضی کوزیک

- ۱- ککن انا ترا ساقه و الیولیس
- ۲- سلسون الیولیس الیولیس
- ۳- جیالی سلسون الیولیس الیولیس
- ۴- جیالی سلسون الیولیس الیولیس
- ۵- سلسون الیولیس الیولیس
- ۶- ککن الیولیس الیولیس

تكوين أطلس الصغرى والكبرى والوسطى وتلال منخفض الهدنة ، وفى جبال الريف الى حد معين ، فان الالتواءات الكبرى والانكسارات قد حدثت فى الفترتين الاولييتين من الحركات الالبية ، أى الحركات التكتونية التى انتهت بتكوين سلاسل الأطلس ، ولذلك فمظاهر البنية الحالية تعزى الى حركات الزمن الثالث بل والرابع . وقد تأثرت بعض الجهات بحركات هبوط كما فى شرق بلاد المغرب وشمال جبال أطلس ، وعند اتصالها بالكتلة الافريقية فى الجنوب ، وفى بعض الجهات الغربية كما فى إقليم بون ووادى متيجا وسهول وهران والمغرب وسوس كما تنشط مظاهر عدم الاستقرار كالبراكين التى توجد فى الريف الشرقى فى مراكش وعلى طول محاور الجبال بعيدا عن تأثير الكتلة القديمة . ولكن كان آخر عهد بلاد المغرب بالاضطرابات البركانية فى آخر الزمن الرابع عند ظهور الانسان الاول .

وتكثر آثار هذه البراكين فى المناطق الساحلية فى تونس والجزائر سواء على الساحل نفسه كما فى غربرى وهران وجنوب الجزائر وشرقها أو فى منطقة قسنطنة أو فى الجزر التى تقع على كئيب من الساحل مثل جزائر راشجون وحبيبة وجليته وبنتلاريا Galile و Pantellaria, و Habibas و Rachgoun أما فى مراكش فتنتشر البراكين فى بعض جهات الأطلس الوسطى وبخاصة فى المنطقة الهضبية الواقعة الى الشمال الغربى منها ، كما تكثر على طول انكسار ( من آثار الحركة الهرسينية ) يمتد من شمال الشمال الغربى الى جنوب الجنوب الشرقى من مليلة الى فجيج ، الى جانب تعرض بعض الجهات الساحلية لحركات زلزالية كساحل الجزائر ومتيجا والحضنة . ويخف بساحل بلاد المغرب الذى يطل على المحيط الاطلنطى رصيف بحرى يرجع للزمن الرابع يدل على تعرض هذه الجهات للارتفاع أو انحصار ماء البحر عنها ، كما تكثر الارصفة المرتفعة على ساحل البحر المتوسط ويقع أهمها على منسوب ١٨ - ٢٠ متر فوق مستوى سطح البحر الحالى (١) ، والى جانب هذه الحركات العامة توجد حركات محلية تؤدى الى ارتفاع الأرض نسبيا اذا قورنت بسطح البحر فى الجهات الالتوائية أو للهبوط فى الجهات ذات الطبيعة الهضبية التى قد تظل دون أن تتغير كثيرا،

(١) انظر غلاب والجوهري : الجغرافيا التاريخية ط ١٩٨٢ الفصل الرابع .

وهكذا هبطت الأرض فى المنطقة الساحلية شرق بون ، بينما ارتفعت بلاد المغرب الوسطى مما جدد من شباب الانهاز التى تصب فى هذه المنطقة .

### المناخ :

إذا كانت البنية تلقى ضوءا على مظاهر السطح المتباينة فى بلاد المغرب ، فإن دراسة الظروف المناخية وبخاصة نظام المطر يجلو العوامل التى توجه نوع العمران التى تصلح له هذه الجهات ، وما يتصل بنظم الاستغلال من ظروف اجتماعية ، فعلى حين تسمح الظروف المناخية السائدة فى بقعة ما بقيام حياة زراعية مستقرة ، يحول الجفاف وتغير نظام سقوط المطر فى بقاع أخرى دون قيام الزراعة على أسس وطيدة فتصبح أكثر صلاحية لممارسة حرفة الرعى ، وليس هناك دليل يشير الى أهمية الظروف المناخية من شيوخ استخدام كلمات ويقصد بها الزراعة على المطر فى المنطقة الساحلية « تل » و « استبس » ، « صحراء » فى صدد تقسيم البلاد الى أقاليم طبيعية وهذه الأفاظ - كما يبدو - ذات مغزى مناخى .

وإذا كنا قد أشرنا الى أن بلاد المغرب تمثل من نواحي البنية والتضاريس منطقة انتقال بين بنية النظام الالىى والكتلة الافريقية ، فإن هذه الصفة « الانتقالية » ليست أقل وضوحا فى الناحية المناخية ، فأقليم البحر المتوسط بخصائصه الانتقالية التى تضم عناصر من المناخ المدارى وأخرى من المناخ المعتدل تسود كثيرا فى تلك المنطقة وأهم العوامل المؤثرة فى المناخ .

١ - تقع بلاد المغرب فى الشطر الجنوبى لأقليم البحر المتوسط بين عرضى ٢٠° و ٣٦° شمالا ، فلا غرو أن ظهرت مميزات المناخ المدارى سائدة وبخاصة فى فصل الصيف .

٢ - تمثل هذه البلاد فى جملتها منطقة مرتفعة يسودها فى الشتاء ضغط مرتفع يدفع بأعاصير الشتاء نحو الأطراف ، ومن ثم يقتصر أثرها على ساحل البحر المتوسط الى حد كبير . أما فى الصيف فينخفض الضغط فى هذه المنطقة فلا يسمح بامتداد مركز الضغط المرتفع الأوروى فى الداخل ، وهكذا نجد التباين واضحا فى الضغط والحرارة بين الساحل والداخل

واليابس والماء ، مما يجعل لنسيم البحر تأثيرا على الساحل شأن نسيم  
الوادى فى الجهات الجبلية فى الداخل .

٣ - يحول امتداد خطوط التضاريس الرئيسية دون توغل رياح  
البحر المتوسط للداخل فيقتصر تأثير هذا المناخ على الساحل ، على  
حين نجد ان رياح الجنوب الحارة اللافحة الجافة تزداد حرارة وجفافا اذا  
هبطت على منحدرات الجبال فى طريقها للمنطقة الساحلية التى قلما يصل  
اثرها اليها .

٤ - يتباين تأثير البحار المحيطة باختلاف درجة حرارة مياهها ونظام  
الرياح التى تهب منها الى اليابس أو بالعكس ، فمياه البحر المتوسط ادفأ  
بنحو ٣° - ٤°م اذا قورنت بمياه المحيط الاطلنطى ، فترتفع حرارة المياه  
القليلة العمق فى خليج قابس ، وتكثر أعاصير الخريف بوجه خاص فى خليج  
قابس التى تتعرض لها شرق بلاد المغرب ، اما تيار كنارى البارد الذى يمر  
بساحل المحيط الاطلنطى فى مراكش بين مايو وديسمبر وبخاصة فى أغسطس  
فيظهر تأثيره الى الجنوب من ميناء صافى .

**عناصر المناخ : الضغط :** تتعرض هذه البلاد لهبون الكتلة الهوائية  
القطبية فى الشتاء ، وهى رطبة عادة لمصدرها البحرى فى أكثر الاحيان ،  
وقد تكون دفيئة أو باردة تبعا لمصدرها ، فقد تقبل من جهات شمالية أو  
مناطق تقع الى الجنوب من ذلك قليلا ، ولكن قد يصل اثر الضغط المرتفع  
الاوراسى الى غربى بلاد المغرب فتصبح هذه الكتلة الهوائية قارية ويصحبها  
الجو الصافى البارد فى مراكش كما يسقط الصقيع على الساحل ، أما  
الكتلة الهوائية الأخرى فهى كتلة مدارية تتعرض لها البلاد غالبا فى الصيف ،  
وان كانت خصائصها البارزة هى الحرارة والجفاف ، فقد تهب من الشرق  
شتاء فتصبح حينئذ باردة جافة . والى جانب ذلك توجد كتلة هوائية ثالثة  
هى كتلة مدارية رطبة تهب على ساحل المحيط الاطلنطى فى الغرب ، ويصحب  
هبوبها ارتفاع رطوبة الهواء وكثرة الضباب وغزارة الندى .

وفى الشتاء تتقدم الكتلة الهوائية القطبية نحو الجنوب حتى تصل الى  
عرض ٣٠° شمالا تقريبا ويتكون عند التقائها بالكتلة المدارية ما يعرف  
بالجبهة القطبية التى تمتاز بكثرة الاضطرابات الاعصارية ، وتهب رياح

تتفاوت حرارتها باختلاف مصدرها فبعضها قارى والاخر بحرى ، تتأثر الجبهة القطبية بطبيعة سطح بلاد المغرب فتتمد من الشرق الى الغرب ، ولذلك يسود بلاد المغرب نوع واحد من المناخ من أقصاها الى أقصاها ، ولكن قد تمتد فى اتجاه مائل فيصبح حينئذ تأثيرها مقصورا على غربى البلاد أو شرقها فحسب ، أما الجبهة الأخرى فتتأثر من التقاء كتلتى الهواء المدارى القارى والبحرى ، ويختلف تأثيرها المناخى تبعاً لخط العرض وارتفاعها عن سطح الأرض .

**المسألة :** تتباين الحرارة على قيد مسافات قصيرة لأنها تخضع لعوامل متعددة كالمسطح واختلاف مصادر الرياح وتأثير البحر والصحراء والنبات الطبيعى وغير ذلك ، وهكذا تتدخل عوامل عديدة تعدل ما نتوقعه من انخفاض الحرارة من الجنوب الشمال تبعاً لخط العرض ، ولارتفاع تأثير فى انخفاض الحرارة شتاء بوجه خاص .

كما أن للبحر اثر ملطف ، فيقل الفرق الحرارى اليومى والفصلى ، وبخاصة شرقى بلاد المغرب حيث تتشابه درجات الحرارة على طول الساحل الشرقى لتونس ، فترتفع درجة الحرارة فى الشتاء قليلا تحت تأثير دفء مياه البحر المتوسط . ويبدو اثر المحيط الاطلنطى فى تشابه حرارة ساحل مراكش الغربى فمياه الاطلنطى تتعرض لمور تيار كنارى البارد مما يجعلها أقل حرارة من ي الهواء على اليابس فضل عن مياه خليج قابس فى شرق تونس ، ويتأخر حدوث فصل الحرارة الكبرى والصغرى على ساحل المحيط بنحو أسبوعين أو ثلاثة عن الداخل ، تمتد خطوط الحرارة المتساوية متوازية وموازية للسواحل فى المنطقة القريبة منها ، ولا تتعرض الحرارة للهبوط عن درجة الصفر المئوى فى شهر يناير ، وتنخفض الحرارة على طول الساحل من الغرب الى الشرق فى الشتاء فتصل الى ١٣ر٥° م فى موجدور وتتراوح بين ١٠ر٥° و ١١° م على طول سواحل الجزائر وتونس ، ولا يسقط الثلج على الأرض على ساحل مراكش الا فى شمال بلسدة مزقان Mazagan حيث يمتد أحيانا اثر الضغط المرتفع الاوراسى أو الازورى ، أما فى الصديف فترتفع الحرارة على طول الساحل من الغرب الى الشرق ، وهكذا تبدو السواحل الشرقية أكثر تطرفا فى مناخها عن الغربية ، أما الحرارة العظمى التى تتأخر الى سبتمبر على ساحل المحيط الاطلنطى فى موجدور حيث تبلغ ١٩ر٩° م فتحدث فى أغسطس فى أكثر الجهات الساحلية الأخرى ،

ويصل متوسط الحرارة العظمى الى  $23^{\circ}$  م فى طنجه و  $25^{\circ}$  م فى الجزائر و  $17^{\circ}$  م فى صفاقص ، ولكن قد ترتفع درجة حرارة المناطق الشرقية فى تونس اذا تعرضت لهبوب رياح الجنوب الحارة الى  $38$  م بل  $40$  م وصفوة القول أن سواحل بلاد المغرب يسودها نوعان من المناخ البحرى : أحدها بحرئ يتضح فيه تأثير البحر فى المغرب المنطقة المطلة على المحيط الاطلنطى ، والأخرى بحرئ يقع فيه الساحل تحت تأثير بحر داخلى تظهر فيه القسارية وبخاصة فى خليج قابس ، وربما كان انخفاض الفرق الحرارى الفصلى على ساحل المحيط الاطلنطى مرجعه الى انخفاض حرارة الصيف الأكثر من ارتفاع حرارة الشتاء ، وتظهر خصائص المناخ القارية فى الجهات الداخلية، فترتفع حرارة الصيف كما تشتد برودة الشتاء على بعد بضعة كيلومترات من الساحل ، ولا يعود متوسط درجة حرارة الشتاء الى  $10$  م كما هو الحال على الساحل الا على حافة الصحراء أو قريبا منها  $10$  أما فى الهضاب الداخلية فى قسنطينة فلا يتجاوز متوسط حرارة شهر يناير  $4$  م -  $5$  م كما يسقط الثلج لمدة شهرين فى العام ، وكما تهبط الحرارة أحيانا دون درجة التجمد فإنها تتعرض لتغيرات تختلف حسب الظروف المحلية . أما فى الصيف فترتفع الحرارة كلما بعدنا عن الساحل دون استثناء ، فمتوسط درجة الحرارة  $27^{\circ}$  م فى يوليو ، ولكنه يرتفع عن ذلك بكثير فى الجهات الداخلية شبه المغلقة والبعيدة عن تأثير البحر ، فيصل متوسط النهاية الكبرى الى  $42^{\circ}$  م فى سهل تدله فى مراكش ، على حين تبلغ النهاية الكبرى المطلقة  $48^{\circ}$  م بل  $50^{\circ}$  م فى سهل مجردة الأوسط ، وبينما يتراوح الفرق الحرارى اليومى بين  $6^{\circ}$  م فى الشتاء  $8^{\circ}$  م فى الصيف فى المنطقة الساحلية فى الجزائر يبلغ الفرق  $10^{\circ}$  م و  $16^{\circ}$  م على التوالي فى الجهات الداخلية .

والواقع أن الفرق الحرارى يزداد وضوحا كلما اتجهنا نحو الداخل نتيجة لارتفاع حرارة الصيف بصفة خاصة ، ولكن للسطح وتباينه اثره فى درجة الحرارة بالارتفاع بمقدار  $4^{\circ}$  و  $5^{\circ}$  م كلما صعدنا نحو  $100$  متر ، فكثيرا ما يحدث فى الجهات الجبلية شتاء ظاهرة الانقلاب أى يصبح الهواء القريب من قاع الودية أكثر برودة من الهواء الذى يعلوه كما يرتفع معدل هبوط الحرارة فى الجهات المنخفضة ذات الهواء الدافئ لتصل الى  $7^{\circ}$  م كل  $100$  متر . ويظهر الفرق واضحا بين الجهات المعرضة لاشعة الشمس العمودية المباشرة وبين الجهات الواقعة فى الظل ، والواقع أن أشد الجهات



حرارة فى فصل الصيف هى الجهات المنخفضة الواقعة فى الجبال كما أنها أشدها برودة شتاءً أيضا ويسقط الثلج نحو تسعة أشهر فى الجهات المرتفعة من جبال أطلس ، ولا تجدى رياح الجنوب الدفيئة التى تشبه الفهن فى تأثيرها فى رفع درجة الحرارة كثيرا فى هذه الجهات الجبلية ، ويمكن أن نقدر أن خط الحرارة المتساوى « صفر » يعلى قليلا فى القمم المرتفعة التى يتراوح ارتفاعها بين ٤٢٠٠ و ٤٣٠٠ متر .

### الرياح :

تتأثر الحرارة بنوع الرياح بصورة واضحة ، لأن طبيعة المناخ الانتقالية وطبيعة البلاد الجبلية لا تؤدى الى كثرة تغير اتجاه الرياح فحسب بل الى تعدد أنواعها ومصادرها أيضا ، فالرياح البحرية الرطبة تشتد اذا كان هبوبها مصحوبا بقيام عاصفة ، أما الرياح التى تهب من الداخل فهى عنيفة فى أكثر الاحيان .

### وأهم أنواع الرياح هى :

١ - « الغربية » وتهب فى جميع الاتجاهات بين الغرب والشمال حين تسود الجهة القطبية فى المنطقة الساحلية ، وهى أكثر انتظاما فى الشتاء من الرياح التى تقبل من الداخل .

٢ - « القبلى » و « الشرق » وهى تهب بين هذين الاتجاهين . وتسمى مثل هذه الرياح القارية أحيانا باسم سيروكو . "Sirocco" وتهب هذه الرياح حين يتوغل انخفاض صحراوي فى الشمال فى الصيف ، أو حين تجذب هذه الرياح انخفاضات الجهة القطبية الواقعة على البحر المتوسط . كما يحدث فى شرق بلاد المغرب بصفة خاصة ، ويقترن هبوب هذه الرياح بوجود أنواع من الطقس متعددة ، وتمتاز بكثرة تغيرها ، فرغم أنها جافة تضاعف من تأثير الجفاف صيفا فقد تمطر كما يحدث فى شرق تونس ، وتتفاوت قوة هذه الرياح وعنفها التى تشتد فى بعض المضائق والوديان كمضيق جبل طارق وممر تازة ووادى شلف وممر بطنه .

وينحصر تأثير نسيم البحر فى منطقة ضيقة لا تبعد عن الساحل

جغرافيا العالم


عادة بأكثر من ٢٠ كيلو مترا وإن كانت تصل أحيانا إلى ٤٠ كيلو مترا ،  
وقد تخفف من الحرارة التي تنخفض بمقدار ٣ - ٤ م كما تزيد من الرطوبة  
النسبية التي تصل إلى ٣٠ - ٤٠ .

### الأمطار :

تنقسم السنة إلى فصلين أحدهما حار وجاف والآخر ممطر دافئ شبان  
أقليم البحر المتوسط ، وتبدو الفصلية واضحة لأن فصل الصيف طويل جاف  
تماما أم يمتد بين يونيو وسبتمبر وبذلك يصبح يوليو وأغسطس أشد شهور  
الصيف جفافا في المغرب الشرقي وأغسطس وسبتمبر في المغرب الغربي ،  
ورغم أن هذا الفصل يبدأ مبكرا في الداخل عن الساحل فلا يعتبر جافا  
تماما في هذه الجهات الداخلية لتعرضها لزوايا ممطرة وبخاصة في الجهات  
الجبلية ، أما فصل الشتاء فيظهر فجأة في الشرق مبكرا في سبتمبر ، على  
حين يتأخر إلى آخر أكتوبر في الغرب ، وتحدث فترة جفاف نسبي حين  
يمتد أثر الضغط المرتفع على بلاد المغرب ، وتقع هذه الفترة غالبا في يناير  
وإن كانت تتأخر على ساحل المحيط الأطلنطي في مراكش الشمالية إلى  
فبراير ، ولكنها تحدث مبكرة في شرق مراكش إذ تحدث في ديسمبر ،  
وكثيرا ما يقل المطر في كل أرجاء المغرب تحت تأثير حدوث ضغط مرتفع  
في شهر فبراير ، ويفزر المطر في فترتين في المغرب الغربي وبخاصة في  
الشمال الغربي ، فينهمر المطر في الخريف وبخاصة في نوفمبر بسبب مرور  
أعاصير الشتاء بصفة خاصة .

أما الفترة الثانية فتحدث في الربيع وأواخر الشتاء في فبراير في  
موجاردور وفي مارس بل وأبريل في الأطلس الكبرى وفي مايو في مراكش  
الشرقية ، وقد تسقط هذه الأمطار لمرور أعاصير جبهة الرياح الأتيزيه الشمالية  
لاصطدام الجبهة الجاردة بالمرتفعات .

أما في المغرب الشرقي فيحدث ، موسم النهاية الكبرى للأمطار في  
ديسمبر في المنطقة الساحلية ، وإن كانت جبهة الرياح الأتيزيه قد تؤدي  
إلى غزارة أمطار شهر مايو . أما في الجهات الداخلية فيتأخر حدوث قمة  
المطر قليلا أو كثيرا تبعا لغلبة أحد العاملين على الآخر فتارة تؤثر أعاصير  
جبهة الرياح الأتيزيه ، فتحدث هذه القيمة في يناير في إقليم التل الداخلي  
وفي مارس في جنوب تونس ( انظر شكل ١٠ ) .



المناطق في شمال غربها الرئيسية ونظامها من سطح المياه.

- ١- خط طول جغرافي ١٠٠ ميليمتر
- ٢- خط عرض جغرافي ٢٠ ميليمتر
- ٣- حدود مناطق الري الرئيسية في شمال غربها الرئيسية
- ٤- خطوط الطرق الرئيسية
- ٥- حدود المناطق التي يتفرع منها فرع البحر
- ٦- الخطوط الرئيسية
- ٧- مناطق تفرعها من أماكن أخرى

ويتفاوت مقدار الأمطار تبعا لطبيعة السطح والقرب من البحر واتجاه مظاهر التضاريس الرئيسية بالنسبة للرياح ، فأكثر جهات بلاد المغرب مطرا هي منطقة الساحل الشمالى من المغرب الشرقى حيث تمتد السلاسل الجبلية المتصلة الشاهقة ، وحديث تجد أعاصير الجبهة القطبية فى الجزء الشرقى من حوض البحر المتوسط الغربى مصدرا مهما يغذيها بالرطوبة ، وبخاصة أن هذا الحوض أكثر اتساعا فى الشرق عنه فى الغرب ، وتأتى الرياح الممطرة من الغرب أو الشمال الغربى والجنوب الغربى ، أما الرياح الشرقية فهى ممطرة فى تونس بوجه خاص ، ويسقط المطر الغزير فى غرب مراكش حيث تواجه الجبال المرتفعة الرياح الرطبة ، ويقع الساحل الشرقى والجهات الداخلية فى مراكش فى ظل المطر ، وهكذا يلجف الجفاف على الجزء الشرقى من ساحل مراكش الذى يقل فيه المطر نتيجة لنظام التضاريس . والواقع أن أكثر الأمطار الساقطة هى أمطار تضاريس كجما يبدو من مقارنة توزيع الأمطار بنظام التضاريس ، ولكن يرجع أن تأثير الارتفاع فى غزارة الأمطار أكثر وضوحا عند ارتفاع معين قد يكون منجسبرا بين ٢٠٠٠ و ٣٠٠٠ متر شرقى الأطلس الكبرى ، فلا يزيد معسبدل الزيادة فى المطر فى المنحدرت السفلى فى المرتفعات الساحلية عن ١٠٠ ملليمتر فى كل ١٠٠ متر ، وفى جهات التل ذات الارتفاع المتوسط عن ١٠٠ ملليمتر فى كل ٤٠٠ متر .

ويعد خط ٤٠٠ ملليمتر من المطر المتساوى الحد الفاصل بين إقليم التل أو الزراعة والاستقرار وبين إقليم الاستبس أو الرعى ، كسما أن خط ٣٠٠ ملليمتر للمطر المتساوى يحدد الجهات التى لا تلائم الزراعة إلا بالرعى . ويعد توزيع المطر الفصلى ومدى تعرضه للتغير بين عام وآخر ، ومقدار انتشار طرق الزراعة الجافة بانتاج حاصلات معينة كالزيتون الذى يوجد فى جهات الاستبس التى تكاد لا تصلح بحكم ظروفها الطبيعية إلا للرعى ، كل هذه العوامل الى جانب عوامل أخرى كثيرة تؤثر فى قيمة المطر الساقط ، فظروف سقوط المطر على ساحل مراكش المغربى تجعل ما يسقط منه أكثر أهمية مما يسقط فى جهات مراكش الداخلية أو تونس الداخلية ، وكثيرا ما تقوم الراحات معتمدة على ما ينجم عن ذوبان الثلج فى أول الصيف وبخاصة حين تهب رياح السيروكو ، وكهكذا ظهرت واجات سوس ودرعة وتقللالت ، ويكثر سقوط الثلج فى الجهات الجبلية ذات المناخ القارى حيث

يصيبها الثلج نحو خمس مرات فى العام فى يناير وفبراير ومارس بوجه خاص ، ولا يغطى سفوح الجبال أكثر من خمسة أشهر كما يحدث فى أطلس الكسبرى .

وإذا كانت الامطار تمتاز بفصليتها وتفاوت مقاديرها على أبعاد قليلة، فإنها تتعرض للتذبذب الكبير بين عام واخر أيضا ، فمتوسط التذبذب الذى يقدر بـ ٢٥٪ فى اقليم التل فى الجزائر يصل الى ٤٥٪ عند حافة الصحراء ، وهكذا أصاب مدينة الجزائر التى يسقط بها ٧٦٢ ملليمترا سنويا فى المتوسط ٤٩٠ ملليمترا سنة ١٩١٣ و ١٣٠٥ ملليمترا سنة ١٩٤٧ ، كما تتراوح الامطار فى قسنطينة بين ٢٧٠ ملليمترا ١٠٢٠ ملليمترا على حين يقدر المتوسط بـ ٣٠٨ ملليمتر ، وقد تتعاقب سنوات الجفاف كما حدث ١٩٤٤ و ١٩٤٥ ويصادف عام واحد فى المتوسط غزير المطر فى الجهات الداخلية ، الى جانب عامين يسقط فيهما مطر متوسط الغزارة ، فضلا عن ثلاث سنوات يجف فيها المناخ حتى يتهدد البلاد قحط ، يمتاز نظام سقوط المطر بكثرة السيول الغزيرة التى قد تلحق بالبلاد الدمار كما يصعب الافادة منها ، والحقيقة أن حدوث شاييب المطر الغزير أكثر وضوحا هنا من اقليم البحر المتوسط فى أوروبا ، وانتشار سقوط السيول ليس مقصورا على الجهات الغزيرة المطر فى الجهات الجبلية والسواحل بل يظهر فى الداخل أيضا .

## الفصل الثانى

### الأقاليم الطبيعية

قد استرعى انتباه العرب الاختلاف البين الملموس بين إقليم الزراعة الخصبية بما يصيبها من مطر غزير ، وما يعمر أرجاءها من مظاهر التقدم والثروة فى إقليم التل بالجزائر ، وبين الصحراء التى جعل منها الإنسان فتكبا سلوكها كلما وجد الى ذلك سبيلا ، يجتازها وجلا على عجل خشية أن يقضى وهو فى طريقه للعمران ، ورغم صعوبة تحديد التخوم التى تفصل بين الصحراء ومناطق العمران ، فإن الحدس الصادق لا يخطئ حين يلمس التباين الواضح فى البنية والمناخ وظروف الحياتين النباتية والحيوانية والظواهرات الجيومورفية بين إقليم جبال أطلس والكتلة الأفريقية ، ويمكن اعتبار خط ١٠٠ ملليمتر المتساوى وخط الحرارة المتساوى ١٠° م فى يناير ، وما يرتبط بذلك من فقر فى الحياة النباتية كما يبدو من اختفاء حشائش الاستبس التى تعرف بالحلفا والجهات التى لا ينضج الى شمالها ثمار نخيل البلح ، هى الحدود التى تساعد فى تمييز المنطقتين الطبيعيين الكبريتين وهما الصحراء وإقليم الهضاب من جانب والسلاسل الجبلية والبحر المتوسط من جانب آخر ولكن هناك أقاليم أخرى صغرى لها خصائصها المميزة وشخصيتها ذات القسامات الواضحة هى :

١ - أطلس الكبرى : وتمثل سلسلة متصلة من أطول السلاسل الجبلية فى شمال أفريقية ، وهى فى الواقع تشبه هضبة ترجع للحركة الهرسينية وتتكون صخورها من الزمن الاول والعصور السابقة ، وهى تبدو كحائط شاهق الارتفاع يصل الى ٤٠٠٠ متر ، بل قد يبلغ ارتفاع بعض قممها كقمة طبقال Toubkal الى أكثر من ذلك ، وأن كان خط الثلج شتاء الى أكثر من ٢٠٠ متر الا أنه لا يوجد ثلج دائم ، ولا يخترق هذا الحاجز للضخم الامرات مرتفعة ، وقلما نجد منطقة مثلها تتجاوز فيها ظروف البحر المتوسط والصحراء ، إذ بينما تتعرض الجهات الشمالية والشمالية الغربية للأعاصير وتغذر بها الأمطار فيزرع البربر الحبوب والفواكه وتستقر جماعات المشلوح حيث تقتصر الزراعة على الأودية المرتفعة ، نجد أن السفوح الجنوبية

الشرقية من الأطلس محرومة من هذه الأمطار الى حد كبير ، فلا تنمو إلا الشجيرات الخشنة ، على حين تغطي السفوح الشمالية والغربية غابات الزيتون حتى ارتفاع ١٦٠٠ متر ، بينما تسود أشجار البلوط الدائم الخضرة فى الجهات التى تعلو عن ذلك .

٢ - **أطلس الوسطى** : تقع هذه السلاسل الجبلية - التى لم تتعرض للتواء عنيف والتى تشبه هضبة تلتقى بها السلاسل الجبلية الالتوائية فجأة - بين أطلس الكبرى وأطلس الريف من جهة وبين ميزيتا ( هضبة مستوية ) مراكش من جهة وميزيتا وهران فى الجزائر الغربية من جهة أخرى ، والالتواءات التى تنتمى للعصر الجوارسى تتعاقب فيها الثنيات المحسبة والمنخفضات المقعرة ، وعلى حين تتشرد الصخور النارية والمتحولة فى القمم المرتفعة وتظهر على السطح بعض صخور الزمن الأول بل والزمن السابق للكمبرى ، يغلب على الجهات الشرقية التى تسودها الصخور الجيرية مظاهر النحت فى جهات الكارست المعروفة . هذه الالتواءات المحسبة التى تكون من تلال تمثل مجموعات غير متصلة لما يتخللها من انكسارات تنتهى بحافات جيرية قد يناهز ارتفاعها ٣٠٠٠ متر كقمة بن ناصر ( ٣٣٤٥ مترا ) .

وتعتبر هذه المنطقة خط تقسيم المياه بين الانهار المهمة التى تصب فى المحيط الاطلنطى كنهر سبو وأم الربيع والانهار التى تفرغ مياهها فى البحر المتوسط كنهر المولوية وتتحكم لطبيعة موقعها فى الاتصال بين مدن الجزائر ومراكش الهامة وكما يصيبها الثلج يسقط بها نحو  $\frac{3}{4}$  متر من الأمطار ، ولذلك تنمو بها غابات البلوط والأرز كما تنتشر المراعى ، مما يساعد على ممارسة الزراعة والرعى اللتين تعتبران متكاملتين ، مما يقتضى من السكان الهجرة فى المواسم المختلفة .

٣ - **الأطلس الصغرى وسهل سوس** : تشرف الأطلس الصغرى وأطلس الصحراء على الصحراء الكبرى ، وقد تأثرت حافة الكتلة الصحراوية بالتواءات أثرت فى باطن الأرض ، وترتفع جهات هذه السلاسل الجبلية كما يحدث فى طرفيها الشرقى عند خليج سرت والغربى عند المحيط الاطلنطى وفى الاجزاء الوسطى فى المناطق التى تسمى « ظهر الصحراء الكبرى Dorsale Saharienne » وإذا كانت صخورها قديمة أركية من الكورانزيت والنيس فى كثير من جهاتها ، فتأثرها بالحركة الالبية واضح

للعيان ، ولكنها رغم ذلك اقرب للكتلة الجبلية منها لسلسلة جبلية كما يبدو  
فى تضاريسها التى تشبه الهضبة ، والتى يبلغ متوسط ارتفاعها ١٦٠٠ متر ،  
وتعد أهم الكتل الجبلية فى مراكش ، وتتصل بالاطلس الكبرى بواسطة كتلة  
بركانية يبلغ ارتفاعها نحو ٨٢٠٠ متر تسمى جبل سسيروا  
ومنخفض ذو شكل مثلث هو وادى سوس الذى يتكون نتيجة لهبوط هذه  
المنطقة والتوائها التواء مقعرا حين التوت جبال اطلس الصغرى فى الزمن  
الثالث . ويسود المناخ شبه الجاف هنا ، فلا يسمح الا بنبمو بعض الشجيرات  
الشوكية تعيش على ثمارها الماعز فى هذا الاقليم الفقير .

٤ - مينيكا مراكش : وهى هضبة اركية قديمة قد غطتها بعض رواسب  
حديثة ، ولكن هذه الصخور القديمة قد كشفت عنها عوامل النحت كما  
حدث فى وادى أم الربيع ، وقد قاومت حركات الزمن الثالث ولذلك لم تتأثر  
بالحركات التى تمخضت عن تكوين الجبال الى شماليها وجنوبيها الا تأثرا  
محدودا كما يبدو فى هبوط المنطقة التى تقع فيها مدينة مراكش . وتنحصر  
هذه الهضبة بين الريف والاطلس الوسطى والكبرى من جانب وساحل المحيط  
بين موجدور والرباط من جانب آخر ، ويفصلها عن جبال الريف مناطق  
منخفضة تقع فيها المدن الكبرى كمكناس وفاس ومراكش . وصفوة القول  
ان هذه الكتلة من الهضبة الافريقية القديمة والتى تبدو نواتها المكونة من  
الصخور القديمة فى جهاتها الداخلية - تظهر منخفضة فى جهات ومرتفعة  
فى جهات اخرى ، كما تغطيها رواسب حديثة فى بعض الجهات بينما تظلى  
منها فى بعض الجهات الأخرى ، ويغلب عليها السهولة فى الجهات الغربية  
المطلية على المحيط الاطلسى حيث يسود المناخ البحرى ، ويسقط المطر الغزير  
الذى يكفى زراعة الحبوب وبخاصة القمح والشعير وتوجد زراعتها فى  
هذه التربة السوداء الغنية بالمواد الحديدية .

هذه التربة الصلصالية السوداء التى تدعى « الترس » كثيفة الانتاج ،  
فلا غرو ان كانت هذه المنطقة مهد الاستعمار الفرنسى فى أول عهده ، كما  
أصبحت من أهم مناطقه الغذائية فيما بعد . وقد نشأت الموانئ على السواحل  
الغربية مثل موجدور والرباط والدار البيضاء ، ويرجع بعضها الى أول  
عصر الكشوف الجغرافية التى كان البرتغاليون من روادها فى القرن  
السادس عشر . ولكن رغم ذلك فان الظروف الطبيعية لا تعد مواتية لنشوء



مراقىء جيدة أو تطور الموانى لأن الساحل يغلت عليه الاستقامة معرض للتيارات البحرية ، كما أن مصبات الانهار هنا تعترضها الحواجز الرملية .

#### ٥ - وادى سيبيو :

نشأ في الثنية المقعرة من التواء يفصل بين أطلس الريف وهضبة مراكش ويجرى في هذا الوادى الذى كان يمثل خليجا بحريا تراكتت فيه الرواسب - نهر سيبيو ، وتحصر أطلس الريف التى تقترب من الشرق من أطلس الوسطى ممرا ضيقا يدعى ممر تازا ، وهو يمثل حلقة الاتصبال الفريدة بين داخل مراكش واقليم التل في الجزائر ، هذا المجاز الذى يبلغ ارتفاعه نحو ١٠٠ متر فوق سطح البحر ولا يزيد اتساعه على ١٠ كيلو متر له أهمية تجارية وتاريخية واقتصادية واستراتيجية لا تقدر ، فرغم ما يكتنف اجتيازه من صعوبات فقد خففت من وطأة التناوب الذى فرضته الطبيعة بين غربى الجزائر وقلب مراكش وغربها حتى تبدو البلدان كأنما قد أولى كل ظهره للآخر . ويتغلغل تأثير المحيط فى قلب مراكش عن طريق هذا الوادى فيسقط فيه نحو نصف متر من الامطار ، كما تخف حدة الشرق الحرارى وتنمو غابات معمورة الشهيرة فى الجنوب الغربى ، وأكثر شجارها من البلوط الفلينى ، وان كانت قد اجتث أكثرها لافساح المجال لنمو المراعى ، وتجد زراعة الحبوب ما يكفيها من الامطار ، ويتلقى نهر سيبيو بغض المياه من الثلج الذائبة من جبال أطلس الوسطى المجاورة .

#### ٦ - أطلس الريف :

ليست هذه الجبال سلسلة متصلة ولكنها مجموعة من السلسلات الجبلية أو الكتل الجبلية تنحدر بشدة شمالا نحو البحر المتوسط ، وكما تظهر صخور الزمن الأول فوق سطح الأرض وتنتشر تكوينات الحجر الجيري الجوارسى فى كثير من انحاء هذه الجبال ، وهى منطقة جافة تنتهى بمنطقة سهلية خصيبة تسمى الغرب ، تشبه بل نجد فى الواقع امتدادا لوادى سيبيو الواقع الى الجنوب منها .

وتنحدر الاودية التى تشقها الانهار للبحر المتوسط شمالا أى نهدر سيبيو جنوبا على جانبى أطلس الريف . وتنتهى هذه الجبال شرقا بالقرب

من حدود مراكش التي لا تطل على البحر المتوسط الا بشقة ضيقة لا يزيد اتساعها على عشرة أميال تكاد تخلو من الموانئ . ورغم أن الساحل في الريف الاسباني سابقا لا يصلح كثيرا لقيام الموانئ الا أن هناك موانئ ذات موقع مهم ، وبخاصة أن هذه المنطقة جدياء شبه جافة قليلة الموارد ، مما دفع سكانها للاشتغال بالتجارة بل والقرصنة ، وأهم هذه الموانئ سبته .  
مليلية .

وهذه الاقاليم السالفة الذكر هي التي تضمها مراكش أو المغرب ، ولذلك سوف نتناول هذه الوحدة السياسية الكبرى لتتعرف على مدى ما يسود أرجاءها المتباعدة من وحدة طبيعية وما يميز شخصيتها .

### المغرب :

تعد أكثر بلاد المغرب العربي وضوحا في شخصيتها ، فهي أقرب من كل من تونس والجزائر الى أوروبا كما أنها أكثرها اتصالا بالصحراء التي يخفف من قسوتها قرب شطر كبير من هذه البلاد من المحيط الاطلنطي من جانب وارتفاع جبالها من جانب آخر ، وإذا كانت بلاد المغرب تمتاز بطابع انتقالى يجمع بين خصائص الحياة الافريقية ومظاهر المدنية العربية . فبالمغرب التي يقع في طرفها القريب من أوروبا مدينة أسبانية الطابع مثل مليلية وتضم بلدة سودانية أو افريقية مثل مراكش في الجانب الاخر أصدق بلاد المغرب تمثيلا لهذه الخصائص المختلفة .

وللمغرب التي تساوى مساحتها مساحة الجزائر وتونس مجتمعين خاصية فريدة . إذ تنفرد بأن لها جبهتين بحريتين تطل احدهما على المحيط الاطلنطي حيث تمتد سهول تناظر سهول تونس في الشرق وان كانت اعظم اتساعا وأغزر مطرا وأكثر منها غنى ، أما الجهات الجبلية الداخلية فقد كفلت بفضل ارتفاعها العظيم وما يسقط على قممها من ثلج غزير موردا يرفد المجارى المائية في فصل الجفاف بالمياه ، وقد أدى امتداد مراكش غربا حتى المحيط الاطلنطي الى تعديل مناخ البحر المتوسط الذي يعد النوع السائد من المناخ ، كما أضافت هذه الجهة البحرية المغربية تباينا من الغرب الى الشرق الى جانب الاختلاف الذي يعزى الى خط العرض من الشمال الى الجنوب ، ولكن إذا كانت مراكش الشرقية والجنوبية ذات صفة قارية فقد

أنتسح الخيال في الشمال والغرب لظهور مميزات المناخ البحري ، وأن كان ارتفاع بعض هذه الجهات الداخلية قد خفف من وطأة المناخ الصحراوي . ولذلك نجد أن أفراد قبائل الشلوح في غرب الأطلس الكبرى والصغرى يعملون في الزراعة ويهاجرون حين تضيق بهم أبواب الرزق إلى دار البيضاء ، على حين تسود القبائل التي تنتجع السفوح الجبلية صيفا في شرق الأطلس الكبرى وأطلس الوسطى وهضبة مراكش حيث تجتذب ظروف المناخ والانتاج المستقر قبائل الجنوب والشرق بصفة خاصة على كل عصور التاريخ .

وإذا كانت كثير من الاقاليم التي تضمها مراكش يبسود فيها التبايز الذي يمزق وحدتها ، فإن هذه البلاد بفضل ما فرضته عليها الطبيعة من عزلة عن جيرانها قد شملها نوع من الوحدة ينطوي على التعدد ولا يفتقد التنوع ، فهناك جبال أطلس الكبرى في الجنوب وأطلس الريف في الشمال وأطلس الوسطى التي تقف حاجزا ضخما يحف بالضفة اليسرى لنهر المولوية ولا يدع شجرة للتجارة والجيوش والانتقال والهجرة إلا ممر تازا الذي يسمح باستمرار الطريق الذي يخترق شمال أفريقية من أقصاه إلى شرقا إلى أقصاه غربا ، ومن ثم كان الاتصال بين الجزائر ومراكش صعب شاق .

وقد سبقت الإشارة إلى ضالة أهمية ساحل مراكش الشمالي إذا استثنينا طنجة التي كانت مفتاح البحر المتوسط حين كان مغلقا ، ثم أصبحت قاعدة كبرى للسيطرة على الطرق التي تربط المغرب بالشرق عن طريق البحر المتوسط وبخاصة بعد أن شقت قناة السويس . أما تلك الشقة الجبلية الوعرة التي كان لجذبها وقلة أمطارها وضيق آفاق الرزق أمام سكانها من « الجبال » أو سكان الريف لا تغريهم إلا بالقرصنة فلم تلعب دورا يذكر في حياة مراكش الاقتصادية أو السياسية ولكن الريف الشرقي أكثر جسديا بسكانه من الرعاة ، على حين نجد الريف الغربي بمطره الغزير نسبيا قد مكن المستقرين من الزراع الذين يمارسون زراعة الحبوب والفواكه وتربية الحيوان من التكاثر حتى أخذوا يهاجرون بأعداد كبيرة بحثا عن العمل على حين نجد أن ساحل الاطلنطي الذي تحفه سهول متسعة خصيبة التربة غزيرة المطر تمثل قلب مراكش ومركز العمران الرئيسي فيها ، وسوق تنضاعف أهمية مواثيقها التي لم تتوافر لها المرافق الطبيعية الآمنة بعد انتقال مركز النشاط الاقتصادي والتجاري والسياسي تدريجيا إلى المحيط

الاطنلطي الجنوبي ، وحينئذ تكتسب سواحل مراكش الغربية أهمية اقتصادية . ورغم ما يتأخم مراكش من فيافي الاجزاء الغربية من الصحراء الكبرى التي تقف عقبة طبيعية كبرى تعترض الاتصال السهل الميسور المطرد بين « جزيرة » المغرب والاقاليم السودانية في الجنوب ، فان هذه البقاع من الصحراء الكبرى ليسر في اختراقها من الجهات الوسطى من هسهة المصحراء ، ومن ثم كانت طسريق المرابطين الذين انحدروا من السنغال ليضموا الى مراكش بل وأسبانيا الغربية وينشئوا امبراطورية ككبيرة تبسط نفوذها في هذه الارحاء .

يبدو التباين واضحا بين زراعة الوطنيين التي يمارسونها في ظروف طبيعية وبشرية قاسية : في جهات تسودها التربة الفقيرة والارض الوغرة والمطر القليل المتغير ، فيعنون بزراعة الحبوب وتربية الحيوان ، وبين الزراعة المتقدمة التي تسود في مزارع الاوربيين التي تكثر في سهل المغرب وفي الوديان التي تقوم بها مشروعات الري بصفة خاصة حيث تمثل اراضى زراعة الري ٤٪ من مساحة اراضى مراكش الزراعية وتتركز الزراعة في وديان سيبو والمولوية وأم الربيع ، وكذلك فالتوسع في مشروعات الري لزراعة المحاصيل التجارية مثل المالح والكروم والطباق وتوطين البسود وتجميع المزارع الصغيرة يعد من أهم المشكلات الزراعية .

ولكن موقع مراكش في النازف المغربى الأقصى لبلاد المغرب قد جعل هذه البلاد أقل تعرضا للتيارات الحضارية والثقافية القادمة من الشرق ، فلم تتأثر بالفنيين أو الرومان أو العرب الا تأثرا محدودا اذا قورنت بكل من تونس والجزائر ، ويبدو ذلك واضحا فيما يكتنف انشاء دولة مراكشية من صعوبات في العصور السابقة لصعوبة الاتصال بين اقاليمها الصغرى العديدة والعصبيات المحلية والمنازعات والتأزات القبلية ، كما أن عدم تواجر مركز سياسى لقومية تتجه نحوه كل الجماعات وترتبط بها كل الاقاليم قد افضى الى اخفاق محاولات فرض الوحدة السياسية الشاملة على هذه البقاع التي مزقتها الطبيعة . ولذلك فان نظام الحكم المحلى الذى يقوم على أساس العصبيات الاقليمية ، وافتقار البلاد لعاصمة ذات مركز متوسط يتخذها المغربى ايا كان اقليمه وقبيلته مبعث فخره قد أدى الى تعدد العواصم بتعدد الدويلات الكبيرة التي تعددت في ارجاء هذه البلاد من مراكش الى فاس

الى الرباط ، وغيرها كثير ، تشبث الكثير من البزير هنا بلغتهم وعاداتهم وتبثروا الآثار الخميقة التي تركتها ظروف البلاد الطبيعية من موقع وظروف السطح في حياة السكان وتاريخ البلاد ، فلم يتجه اليها الاستعمار الفرنسي الا في وقت متأخر في اول القرن الحالي ، ولم يطمس معالم ثقافتها الوطنية التي وجدت في معانقها الجبلية ما ينضوونها من الاندثار ، فلا غرو ان كانت اولى دول المغرب في استرداد حريتها :

### أقاليم الجزائر الطبيعية :

تعد الظروف المناخية وبخاصة مقدار المطر الساقط أهم العناصر في تمييز الاختلافات الإقليمية في الجزائر شأن مراكش ، ولكن هناك اختلافات في ظروف السطح والبنية بين الجهات المختلفة ، فهضبة وهران امتداد لهضبة مراكش وجبال أطلس الصحراء تنمة لأطلس الصغرى ، وكلاهما قد تأثر بالكتلة الإفريقية القديمة ، على حين نجد ان الهضاب العليا المعروفة بهضبة الشطوط تمثل بقايا الكتلة الإفريقية ، حيث تنشر فيها الاصواض ذات الصرف الداخلي على نقيض جبال أطلس التل ، بتلالها الجديدة التكوين التي تنحدر فيها الانهار السريعة الجريان الذبسيطة التي تفرغ مياهها في البحر المجاور ، وقد قسمت الجزائر من الناحية الادارية الى مقاطعات ثلاثة ، هي : وهران ، والجزائر ، وقسنطينة وتتابع من الغرب الى الشرق لتمد الحدود الفاصلة بينها من الشمال الى الجنوب عبر المظاهر الطبيعية المتباينة ، وقد فطن البعض الى ما في هذا التقسيم الإداري من تكلف واغفال صبارخ لما يسود البلاد من ظروف طبيعية فاقترح هؤلاء ان تقسم الى اقاليم ادارية صغيرة عديدة قد يصل عددها الى عشرة أو اثني عشر قسما تضم منطقة شليف والقبائل وغيرها من الوحدات الطبيعية الصغرى ، وإذا كان من الممكن ان نميز من النواحي البشرية بصفة خاصة بين جزائر التل وجزائر الاستبس فان تقسيم الجزائر الى قسم غربي ، وآخر شرقي له ما يعضده من أدلة عديدة ، أهمها : أنه منذ عصر الاوليغوسين أو الميوسين امتد خليج بحري عند مدينة الجزائر تقريبا ، فأخذت منطقة التل الشرقية تتعرض للانفصاع والارتفاع منذ عصر ( الاوليغوسين ) فلا غرو أن نشأت أكثر السلاسل الجبلية في حركة البرانس على عكس التل الغربي الذي ظل وحده في جميع أنحاء الجزائر وقد طغت عليه المياه فغمرته في آخر الزمن الثالث ، وقد نشأت هنا سلاسل من النظام

الآلبي • بل تعرض لحركات التوافقية أحدث من ذلك ، ومن الطريف أن الكتلة القديمة التي تظهر في أطلس الريف تختفي في هذا الجزء الغربي من الجزائر لتظهر من جديد في شرقي الجزائر ، ويتسع نطاق إقليم التل حتى يشرف في مقاطعة قسنطينة على منخفض بسكرة في الشرق ، على حين يضيق في الجزائر الغربية في مقاطعة وهران ، ولا يقتصر هذا التباين بين الجزائر الغربية والشرقية على الظروف الطبيعية ، بل يشمل النواحي البشرية ، فعلى حين يستقر السكان من البربر المعروفين بالقبائل في الجزائر الشرقية إلى شرقي مدينة الجزائر حيث يضعف تأثير العرب يتضح تأثير العرب في انتشار اللغة العربية بين كثير من القبائل ذات الأصل الغربي والتي تمارس حياة بدوية في الجزائر الغربية ، ويبلغ نسبة من يتحدثون لغة البربر نحو ١٠ - ٢٥٪ من سكان الجبال « القبائل وميليانة وأوراس والنمامشة » .

#### الجزائر الغربية :

تمتاز البنية والتضاريس ببساطتها ونظامها ، إذ تتابع أطلس البحرية والسهول التي تتكون من رواسب الزمن الثالث وسلسلة جبلية أخرى يليها نحو الجنوب السهول مرة ثانية ، ويلى تلك الجهات إلى الجنوب ميوزيتا وهران التي تشبه أطلس الوسطى من ناحية وهضبة أو ميوزيتا مراكز الشرقية من ناحية أخرى ، ولما كانت عوامل التعرية نشيطة بفضل خزانة الأمطار في المنطقة الساحلية فقد فقدت هذه الجهات غطاءها من التكوينات الزمن الثالث لتبدو التكوينات الجيرية الجوراسية بما يصحبها من مظاهرها تعرية الكارست وكثرة الينابيع ، أما في الجنوب فان تكوينات الزمنين الثالث والرابع تغطي هضبة وهران تماما ، فلا تبدو التكوينات السفلى التي تنتمي للحركة الهرسينية ويسود هذه الهضبة ظروف متشابهة حتى أطلس الصحراء • وتمتاز المنطقة الساحلية التي تقع في ظل المطر سواء بسبب اعتراض إقليم الريف للرياح الغربية المطيرة بفقرها وقلة سكانها من القبائل الوطنية ، حتى تركت المجال فسيحا للوربيين الذين ترتفع نسبتهم هنا عن بقية جهات بلاد المغرب ، وبخاصة من الإسبانيين الذين يميلون لسكنى السهول حيث يمارسون الزراعة ، أما منطقة سعيدة ، وتلمسان فهي أكثر مطرا واكثف نباتا • وأهم الانهار هي : تفنه ، والمقطع التي تجرى بعض أجزائها في مناطق لم يكتمل فيها الارساب مما يدل على حداثة البنية هنا وقلة الامطار كما في منطقة سبخة وهران •

وتختلف الجزائر بوجه عام عن مراكش إذ تخلو من السهول والهضاب المتسعة والجبال الشاهقة ، فأطلس التل ليست الا تلالا أو هضبات أو نجادا صغيرة غير متصلة ، تتخللها الوديان الضيقة ، وتنحدر سفوحها الشمالية التي تمتاز بخصوصيتها نحو البحر ، وأهم هذه الوديان المنخفضة ، وادي شلف ، وادي متيجة الذي يبلغ طوله ٩٠ كم ، وعرضه ١٥ كم تعطيه الترواسب العميقة من الغرين وتعد هذه الجهات كما سنذكر بالتفصيل مركز الاستعمار الفرنسي ، فانتشرت مزارع الفرنسيين ، وبخاصة مزارع الكروم وقد عوض من قلة مطر هذه الجهات المنخفضة الداخلية تنفيذ مشروعات الري ، وبخاصة في وادي شلف الذي يمثل حوضه ثلث مساحة مقاطعة وهران \* ( الاستقلال ) .

أما هضبة الشطوط أو الهضاب العليا التي يبلغ ارتفاعها ١٠٠٠ - ١٢٠٠ متر ، فتعد من المنحدرات الشمالية للأطلس الصحراوية حتى وادي مولوية ومنخفض الحضنة ، ويغطي الكتلة القديمة التي أصابتها حركة التواء بسيطة تكوينات قارية تنتمي للزمن الثالث ، وبذلك طمرت المنخفضات فأصبحت هذه المنطقة واضحة الاستواء ، فلا يظهر فوق سطحها سوى قمم جبلية محدودة تطلرها التكوينات الرسوبية الى حد كبير ، وقد يحيط بهذه البحيرات الداخلية الصخور حينما كما في « الشط الغربي » أو الشواطئ المنخفضة كما في « الشط الشرقي » الذين يقعان في وسط هضبة الشطوط في مقاطعة وهران ، وقد يبلغ قطر الشط كما هو الحال في الشط الشرقي ٢٥٠ كيلو مترا ، ويضم منخفضين صغيرين ، ويمتد في هضبة الشطوط بعض السلاسل الجبلية من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي في الجزء الشرقي من منطقة الجزائر الغربية ، وتنحصر أهمية هذه السلاسل الجبلية التي قد يبلغ ارتفاعها ٨٠٠ - ١١٠٠ متر في أنها أغزر مطرا ولذلك تكسبها غابات من صنوبر حلب التي لم تعد إليها يد الرعاة بالاحراق أو نجت من القطعان ، ولكن لا تزال النباتات الطبيعية السائدة هي الحلفا والشويح وبعض شجيرات « البطوم » التي يطلق عليه « فستق الأطلس » ، فلا غرو أن يبلغ فقر الحياة النباتية حدا نجد فيه « صحراء صغيرة » قد ظهرت متوغلة الى الشمال في الجزائر في بقعة كبو غزول في أعالي وادي نهر شلف وهكذا أصبحت هذه المنطقة في نظر سكانها من الرعياء جزءا من الصحراء ، فهي منطقة لتربية الضأن والماعز وجنة للراعي \* وتتغير طبيعة

النباتات تبعنا لنوع التربة التي قد تكون رملية أو جيرية أو طفلية أو صلصالية أو محلية :

أما أطلس الصحراء فمن السهل تمييزها عن الأطلس الكبير التي لا تعد امتدادا لها لا بجداثة تكوينها فحسب فهي تنتمي بوجه خاص لحركة البرانس في أول الزمن الثالث ، ولكنها كذلك بانها أقل ارتفاعا ، وتتكون من سلاسل جبلية شبه متوازية تتخللها وديان طويلة تعبرها وديان مستعرضة قليلة ، وقد أثر في تشكيل سطحها تفاوت الارتفاعات في عنفها وشبهتها ، وقلة الأمطار بها وضعف عامل التعرية المائية ، لكن عوامل التعرية الجافة كثيرا ما تحول هذه السلاسل الى كتل جبلية منعزلة ممزقة حتى يصبح الانتقال من أطلس الصحراء الى هضبة الشطوط المستوية غير فجائي .  
وكما يوجد سهول متسعة تفصلها منحدرات وعرة كما في إقليم « القصور » ومنطقة « أولاد نايل » ، توجد هضاب من الحجر الرملي يفصلها حافات شديدة الانحدار تسمى قادا كما في جبل عمور الذي يبلغ ارتفاعه ١٤٠٠ م - ١٧٠٠ متر .

### الجزائر الشرقية :

تختلف عن الجزائر الغربية فيما يسود التضاريس من نظام تتتابع فيه مظاهر السطح المختلفة ، كما تضيق الهضاب العليا كلما اتجهنا نحو الشرق ويبدو عليها التعقيد وتكثر السلاسل الجبلية الشاهقة ، والواقع أن الإحساس القوي بالانتقال من التل الى الاستبس الذي يبدو جليا في الجزائر الغربية يتم ببطء كبير في هذه المنطقة الشرقية من الجزائر ، وقد سلف ذكر توافر المعقل الطبيعية من القمم الجبلية الشاهقة والوديان العميقة التي تشبثت بها قبائل البربر واعتصمت بها فأمنت تغلغل المستعمرين الأوربيين فيها فلم يجدوا في هذه البيئة الصعبة ما يغريهم أو يشجعهم على الاستقرار فيها .  
على حين وجد كثير من المستعمرين ممن يحملون الجنسية الفرنسية رغم انتمائهم الى أصول اسانية أو ايطالية أو مالطية - في أراض التل المتسعة المنخفضة نسبيا في الجزائر الغربية مجالا لإنشاء مزارعهم ، فأقبل الإسبان على إحلال الكروم محل زراعة الحبوب المتقلبة التي كانت تسود في هذه المنطقة شأن المناطق التي ظلت في جنوبها تمارس هذا النوع من الزراعة مما أكد الاختلافات الإقليمية بين الجزائر الشرقية والغربية . كما أن



السلاسل الجبلية الساحلية الشرقية قد استطاعت بفضل ارتفاعها الذى يفوق كثيرا منطقة التل فى الغرب أن تكون أغزر مطرا وأكثر نباتا حتى ضمنت أكثر غابات الجزائر من البلوط الفلبنى ، وقد كان لبعدها عن شبه جزيرة أيبيريا وأطلس الريف أثره الحسن فى تجنّبها الوقوع فى ظل المطر ، والصخور من النوع القديم يتكون أكثرها من الحجر الرملى وإن كانت تسود الصخور الجيرية الصلبة فى القمم المرتفعة . هذه المنطقة التى تعرف « قبيلة الجرجرة » و « قبيلة بابور » و « قبيلة دى كولو » فضل عن سهول عنابة حول مدينة عنابة والهضبة الصغيرة الواقعة غربى هذا السهل وتسمى كتلة أدوغ • Massif de l'Eldough

والواقع أن هذه الكتلة الجبلية فى الشرق ما هى الا متلقى أطلس التل بأطلس الصحراء كما فى جبال أوراس ، ومن ثم لا تعود الهضاب العليا مما يميز وسط الجزائر فى الشرق شأن الغرب ، وكان يعد سهل عنابة مركز الاستعمار الفرنسى فى شرق الجزائر وهو فى ذلك يشبه سهل منيجه فى غربها ، ورغم ارتفاع هضبة أوراس ، فإن قربها من الصحراء فرض على السكان أن يجمعوا بين زراعة الفواكه والرعى ومن أهم الفواكه التين والشمس ، ويبدو أن الجهات المنخفضة نسبيا والوديان كانت أعظم أهمية وأكثر غنى منها الآن ، حين أصبحت الجهات المرتفعة الوعرة ملاذا للقبائل من البربر أمام الغزاة . ويمتاز إقليم البحر المتوسط فى الجزائر بضيقة وطبيعته الجبلية ، وتميل منطقتا الاستبس والصحراء الى الشمال قليلا فى الجزائر ، مما أدى الى سيطرة الحياة الدوية وعدم الاستقرار على الجزائر زمننا •

وإذا كانت مساحة مراكش « ٤١٥٠٠٠ كيلو متر مربع » تقدر بنحو نصف مساحة بلاد المغرب جميعها وهى ٨٥٣٠٠٠ كيلو متر مربع ، فإن مساحة الجزائر لا تتجاوز ربع هذه المساحة أى ٢٠٧٥٠٠ كيلو متر مربع ، ولكن كان هناك ما يعرف بالمناطق الجنوبية "Southern Territories" التى تمثل صحراء الجزائر والتى كانت تحمكها الادارة الفرنسية المحتلة حكما مستقلا ، ليست الا صحراء الجزائر ، وجزءا لا يمكن فصله عن بقية الجزائر ، وتقدر مساحة هذه المناطق الجنوبية بنحو ٢ مليون كيلو متر مربع •

لا يمكن أن نعد الجزائر وحدة قائمة بذاتها فمظاهرها الطبيعية سواء من ناحية بنيتها أو نظام السطح فيها أو الحياة النباتية أو ظروفها المناخية تمثل امتدادا لما يسود غربها في مراكش وإلى الشرق منها في تونس ، فالسلاسل الالبيية والهرسيثية والهضبات المستوية القديمة والتباين الواضح بين بنية القارة الافريقية القديمة وبنية أوربا سلاسلها الالية يميز بنية الجزائر شأن جارتها ، كما أن الانتقال بين غابات البحر المتوسط حيث يغزر المطر على الساحل والمناطق المرتفعة الى مناطق الاستبس الداخلية الواقعة الى الجنوب يشاهد في الجزائر ، فلا عجب ان لم يكن للجزائر تاريخ مستقل فقد خضعت شأن تونس للاستعمار القرطاجنى والرومانى ، ثم تعرضت للغزو العربى والاستعمار التركى ثم الفرنسى ، ولكن هل حرمت الجزائر من وجود مميزات طبيعية تضىف عليها طابعا خاصا ؟

والواقع أن الجزائر تختلف عن مراكش في بنيتها وتضاريسها من بعض النواحي ، فهي تخلو من السهول المتسعة كسهل مراكش الغربى بل من السلاسل الجبلية الشاهقة كالاطلس الكبرى والوسطى ، فهي تتألف في تضاريسها وبنيتها بل وفي ظروفها المناخية من اقاليم مستطيلة ضيقة متتابعة بانتظام من الشمال الى الجنوب ، ويضمحل مناخ البحر المتوسط الذى يعد النوع السائد من المناخ في كثير من جهات الجزائر كلما توغلنا جنوبا ، فيقل المطر بانتظام لا يفسده إلا ارتفاع بعض الكتل الجبلية ، فيصيبها قدر أكبر من المطر أو هبوط بعض الاودية فيتضائل نصيبها منه . ويجب أن نذكر في هذا الصدد أن تقسيم بلاد المغرب الشائع الى التل والاستبس والصحراء لا يصدق ولا يتضح الا في الجزائر ، فلا عجب أن كلمة التل التى يقصد بها منطقة التلال الساحلية الغزيرة المطر الخصيبة لا تستخدم الا في الجزائر ، على حين أن حضيض الهضبة الساحلية المرتفعة التى تسمى في مراكش حيث يوجد هذا النوع من الهضاب « دير » Dir ليست معروفة في الجزائر \*

كما يحسن أن نشير الى الفرق بين تقسيم الجزائر الى منطقة غربية وأخرى شرقية ، واختلاف ذلك عن تقسيم مراكش الى مراكش الغربية والشرقية ، فالجبال الشاهقة في مراكش الشرقية تفسد النظام المألوف لتوزيع الامطار الذى يقل فيه بين الساحل والداخل ، على حين يتركز مطر

الجزائر سواء الشرقية منها أو الغربية في المنطقة الساحلية في الشرق والداخلية قليلا في الغرب وان كانت يتدرج نحو الداخل تبعا للنظام العام السائد في بلاد المغرب بوجه عام . وقد كان لطبيعة السطح الذي يعترض بتلاله الوعرة وجباله الشاهقة كإطلس بليده تقدم الغزاة من البحر أثره في مقاومة الغزو من هذه الناحية ، فلم يستطع الفرنسيون أن يثبتوا أقدامهم الا بعد مرور أكثر من نصف قرن في هذه الجهات ، ولكن امتداد الوديان من الشرق والغرب التي تفضى الى تونس من جانب ومراكش من جانب آخر كان عوننا للمستعمرين فيما بعد على التسلسل والتغلغل في هذه البلاد المجاورة .

والجزائر الشرقية كانت أكثر تأثرا بالمستعمرين الذين ينتمون لأصل إيطالي ولكن طبيعتها الجبلية التي عاشت في كنفها قبائل البربر التي تمارس زراعة الزيتون والتين قصر مزارع المستعمرين على السهول الساحلية المنعزلة والوديان الكبرى نسبيا ، وينتشر قبائل البربر من الشاوية وراء جبل أوراس ، وهم خليط من الزراع وأشباه الرعاة ممن ينتجعون مراعى المرتفعات صيفا .

وسوف نتناول فيما بعد أثر موقع الجزائر في أنها أضحت أكثر تأثرا بالرومان وبخاصة في شرقيها ، ثم بالاستعمار الفرنسي الذي وجد ظروفًا ملائمة لاستقراره وتوطيد دعائمه والتمكين له .

وإذا حاولنا دراسة طبيعة حدود الجزائر السياسية سوف نجد أن بعض المناطق الغربية كوهان أشبه في ظروفها الطبيعية بل تعد جزءا متما لمراكش الشرقية ، والواقع أن حدود الجزائر الطبيعية تتفق مع وادي نهر الملوية ، أما في الشرق فقد اقتطعت الجزائر أعالي وادي مجردة ورافده ملاق وهما أشبه ببقية الأراضى التونسية ، أما من الناحية الجنوبية فالداخل بين الظروف الصحراوية والظروف السائدة في بلاد المغرب أقل وضوحا في الجزائر حيث يتم الانتقال تدريجيا ، والواقع أن امتداد مقاطعات الجنوب التي يغلب على أكثرها الطبيعة الصحراوية متوغلة في الصحراء الكبرى التي تعجز مواردها عن توفير أسس قيام وحدة مستقلة جعل فصلها عن المقاطعات عن الجزائر على الأقل في جزئها الشمالى فصلا مصطنعا .

## البتروال فى « الجزائر » :

— الانتاج : ٤٣ مليون طن ( سنة ١٩٨٣ ) .

— مناطق الاستخراج : حاسى مسعود - عجيلة - زارزتين .  
( حقول البترول )

— ميناء التصدير : بجاية .

تعتبر الجزائر من الدول العربية الغنية بثروتها المعدنية . والبتروال والغاز الطبيعى يأتيان فى المرتبة الأولى فى الأهمية . فقد بلغ انتاجها من البترول ٤٣ مليون طن ( سنة ١٩٨٣ ) ، ومن الغاز الطبيعى مليون طن متري .  
وجد البترول بكميات ضخمة فى صحراء الجزائر . وأهم الحقول جميعا « حاسى مسعود » الذى يقع فى وسط الجزائر ويبعد عن ساحل البحر المتوسط بـ ٤٠٠ ميل . وينقل البترول من هذه المنطقة عن طريق الأنابيب الى « بجاية » ميناء التصدير . ومن أهم حقول شرقى الجزائر وهى قريبة من الحدود الليبية الجزائرية حقول « عجيلة » وزارزتين ، وينقل بترولها أيضا عبر الانابيب الى ميناء التصدير بجاية .

## تونس الشمالية :

تمتد بين خليج تونس وساحل البحر المتوسط فى الشمال وادى مجرده فى الجنوب وحدود الجزائر فى الغرب ، وتغزر الامطار كما تكثف الغابات فى جزئها الغربى ، كما تتقدم الزراعة ويستقر السكان فى الجهات الزراعية كوادى مجرده ، وتمتاز تونس الشمالية بأنها أكثر جهات تونس غنى وتنوعا ، تمتد جبالها فى شكل كتل متقطعة وسلاسل قصيرة قد التوت فى شكل مجموعات من الثنيات المحدبة والمقعرة اتخذت اتجاهها عاما من الجنوب الغربى نحو الشمال الشرقى ، هذه الالتواءات المتزامنة الضيقة التى يقطعها هبوط بعض جهاتها نتيجة لظهور محاور أخرى للالتواءات تمتد بين الشمال والجنوب حينما وبين الشمال الغربى والجنوب الشرقى حينما آخر ، ليست نتيجة لحركات قديمة بل هى حديثة التكوين فقد استمر تكوين بعضها حتى آخر عصر البلايوسين ، وتتعاقد المنحدرات الوعرة والالتواءات

الضيقفة فجأة مع الانحدارات البسيطة البطيئة ، فكثيرا ما تشرف الجبال الشاهقة على منخفض أو منبسط متسع .

وقد كانت مجارى المياه فى تونس الشمالية تمثل أحواضا داخلية ، اذا استثنينا حوض بنزرت نجد أن أكثر هذه الانهار قد تطور لفترة طويلة قبل أن يشق طريقه للبحر ، ولذلك فإن اتصالها بالبحر وانصرافها اليه الذى تم حديثا يعد حدثا هاما فى تفسير النظام الهيدرولوجى فى هذه المنطقة ، تنقسم مجاريها كما يبدو بوضوح فى نهر مجردة الى ثلاثة أجزاء اثنان منهما قد نضجا فأصبح الانحدار فيهما محدودا يفصلهما جزء يشدد فيه الانحدار .

وتمتد هذه المجموعة من السلاسل الجبلية من الجنوب الغربى نحو الشمال الشرقى ، وهى تتألف فى أكثر الاحيان من الحجر الرملى ، وأهمها سلاسل مجردة ومقعد وخمير ، وقد تعرضت للتعرية البحرية وكثرت الكثبان فى بعض الجهات الساحلية على حين لا زالت تمتد رءوس صخرية بين رأس نجر وراس سيرات ، وتعد منطقة خمير شأن منطقة قبائل بابور فى الجزائر من أغزر جهات المغرب مطرا ، فأمطارها التى تربو على المتر قد ساعدت على نمو الغابات الكثيفة التى تمتد دون انقطاع تقريبا من منطقة القبائل ، وتعد جبال خمير معتمسا لقبائل شديدة المراس ، عظيمة الحفـاظ على ماضيها ، والتشبث بتقاليدها الماثورة . وهكذا تنتشر من الساحل الرءوس والخلجان ، ولا غرو أن اتجهت تونس نحو البحر المتوسط أو الشرق ، فكأنما تدير ظهرها لجارتها الجزائر ولا تتصل بها فى بعض الجهات الا بصعوبة ، وتعبر جبال الظهر التونسى التى يبرز منها نتوء تتكون منه شبه جزيرة بون فى الشرق أقصى امتداد لجبال أطلس نحو الغرب ، كما تعتبر فاصلا مناخيا ونباتيا مهما يفصل اقليم التل فى الشمال والمغرب عن اقليم شبه الصحراء الساحل فى الجنوب والشرق . وتسمى التل الشرقية القريبة من مدينة تونس التل البحرى ، التى يقع الى غربها ما يعرف بالتل القارئ الذى ينقسم بدوره الى ثلاثة اقاليم صغيرة : هى الاقليم الساساطلى حيث يسقط المطر الغزير الذى يبلغ نحو متر وحيث تصبح التربة متنوعة والقوى قليلة اذ تنتشر المساكن المستديرة من فروع الاشجار والنقش ، ويزرع الاسرة من الزراع نحو ٨ - ١٠ أفدنة فى المرتفعات ، ١٢ - ١٣ فدان فى السهول ،

وقد وجد السكان فى الغابات الكثيفة ملاذا منذ حكم القرطاجيين ، واكثر السكان من البربر ، اما الاقليم الثانى فهو وادى مجرده الذى يفصل كتل شمال تونس الساحلية عن تونس الوسطى ، وهو فى ذلك يشبه وادى شليف بالجزائر ، ويتبع نهر مجرده من الهضاب العليا فى مقاطعة قسطنطينة ، ولا تبعد منابعه كثيرا عن خميسة وينحدر بعنف فى خانق ضيق بين سوق امران وغاردموى "Ghardimaou" وتمتد على طول هذا الخانق السكة الحديدية التى تربط تونس بالجزائر ، أما بعد غردموى فيتسع الوادى بحيث ترتفع ضفافه نحو ١٠ - ١٢ مترا وينتشر النبات فى مجراه ، وتمتد هذه السهول لمسافة كيلو مترا على جانبى النهر وكانت تمثل بحيرات قديمة غمرها الطمى ، ويسمى كل منها باسم خاص مثل سهول رقبة والمرج ( بطاح بها مستنقعات ) وسهل دخله ( حوض ) . وأما سهل مجرده الاوسط فقد كان طريق الغزو ومركزا مهما للانتاج الزراعى عرفه القدماء باسم Megala Pedla وقد اجتذبت خصوبة التربة العميقة المزارعين من هنا حيث يستخدمون الطرق الالية فى فلحها فى اقليم سوق الكريمى Souk el Kremis ولا يتجاوز انحدار مجرده الاذن فى مسافة ٣٠٠ كيلو متر نحو ٢٠٠ متر ، وتتخلله بين وادى زرقا وتستور جنادل حيث يمر فى خانق يتجه فيه النهر من الشمال الى الجنوب ، وينفرد نهر مجرده بين أنهار بلاد المغرب بأن له دلتا تبدأ من الجديدة ، وتقدر مساحتها بنحو ٣٣٥٠٠٠ متر مربع ، لأن النهر يلقى برواسبه الكثيرة فى خليج باشاطر او تيكا او العتيقة "Utique" كما أن رأس سيدى على المكى تبعد عن الرواسب نتيجة تأثير التيارات البحرية ، كما توجد جزر هى شوات Chaouht ومبطوحة Mabtouha وقلعة الاندلس كانت عوامل تجمع الرواسب فلعبت دورا مهما فى تكوين دلتا هذا النهر . ورغم خصوبة التربة فان فيضان النهر وبخاصة اثناء فصل المطر يؤدى الى انتشار المستنقعات وتفشى الحميات وبخاصة الملاريا التى قضت على ثلث سكان قرية الهوجة سنة ١٩٠٠ . والواقع أن المزارع الحديثة والقرى ومراكز العمران القديمة كانت تتوخى البعد عن مواطن تفشى الحميات ، فتلتزم ضفاف النهر المرتفعة لما يرسبه النهر على جانبيه وأحيانا تنتشر على اطراف الدلتا عند التقاء رواسبها بالتكوينات الجارية ، ومن الأولى لبوريا Lebourba وجديدة وقلعة الاندلس ومن امثلة الثانية بورتو فارينا Porto Farina

والهوجة وسيدي ثابت وسبالا Sebbala ، وتعتبر تلال باجه وسهول  
ماطر من مواطن زراعة الحبوب .

وأما التل الاسفل فهو يضم اقليم مجار الباب واطليم مدينة تونس  
ورأس بون ( ٩ ناز ) أو الجزيرة كما عرفها العرب ، وتمتاز بأن التلال  
منخفضة لا تمثل وحدة متصلة من ناحية البنية أو التضاريس ، وقد أدى  
اتصالها باقليم الاستبس فى الجنوب ووقوعها فى ظل جبال التل البحرية فى  
الشمال الى قلة مطرها وملاءمتها لزراعة الاشجار وبخاصة الكروم ،  
والجهات المرتفعة قليلة ، ولا تمثل عقبة أمام توغل رياح الجنوب والسيروكو  
التي تقلل من مفعول ما يصيبها من مطر قليل ، ولا تتأثر هذه المنطقة بالبحر  
الا فى شريط ضيق يحف بشبه جزيرة بون . واذ كان اقليم الساحل على  
سوسه وصفاقس الذى يسوده مناخ الاستبس يصلح بصفة خاصة لزراعة  
الزيتون ، فان جانبا كبيرا من هذا الاقليم ايضا كما فى تبورا وزعوان  
ومورناج يزرع فيه الزيتون ، وان كان لغزارة مطره نسبيا يصلح لزراعة  
الحبوب والكروم التي تعد أساس الزراعة الاوربية بصفة خاصة . والواقع  
أن هذا الاقليم بارتفاعه القليل وبكثرة السكان من الزراع المستقرين فيه  
وبقلة مطره ، وبانتشار زراعة الزيتون فى أرجائه وقيام العاصمة تونس  
فيه يعد اقليما فريدا وان كان يشبه الى حد ما اقليم الساحل الذى يليه نحو  
الشرق بين الحمامات وطرابلس ، ولذلك يمكن أن يطلق عليه اسم ساحل  
التل .

### تونس الجنوبية :

يمتد اقليم الساحل شبه الجاف بين سوسه وصفاقس ، وقد وجد  
العرب فيه بية شبه جافة ، فأقبلوا على زراعة الزيتون دون حاجة للررى  
كما كانت رطوبة الجو تساعد على زراعة الكروم فى الشمال ، ويوجد نخيل  
البلح جنوب نطوط فى الجنوب . ويبدو عدم النظام والتعقيد سائدا فى  
السطح والبنية فى هذه الجهات ، فكثيرا ما تتقابل الالتواءات متعامدة ،  
فنشآت القباب حينما كما ظهرت الاحواض حينما آخر ، ولا يغلب عليها اتجاهات  
واحدة فمنها ما يتابع الاتجاه العام من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى،  
ومنها ما يتجه من الشمال الى الجنوب ، أو ما يسير مستعرضا بين الشرق  
والغرب .

ولكن ما هي مميزات تونس كوحدة سياسية أو كدولة من وجهة النظر الجغرافية ؟ تشبه تونس كل من الجزائر ومراكش في الظروف العامة التي تتلخص في الصراع والتباين الواضح بين ظروف البحر المتوسط والصحراء فهي في الواقع بمساحتها الصغيرة التي لا تعدو ثلث مساحة الجزائر ليست الا امتدادا لمقاطعة قسنطينة الجزائرية نحو الشرق ، ومن ثم كانت الحدود المصطنعة بينهما مثارا للصعاب ، فقد اشتدت المنافسة بين بون وبنزرت في أيهما أكثر ملاءمة لتصدير معادن منطقة جبل الوزنة الواقعة قرب حدود الجزائر ، وتعد تونس أسوأ حظا من الجزائر فيما يصيبها من مطر ، فتأثير امتداد خليج سرت الذي يناظر تأثير المحيط الاطلسي في مناخ مراكش الغربية محدود ، ولكنه ساعد على نجاح زراعة الزيتون حتى أقصى جنوب تونس الشرقية ، ويمكن أن نعتبر خطأ يصل بين القيروان وقرطاج الحد الشمالي لاقليم الاستبس في تونس ، وإذا كانت الجهات الشمالية أو اقليم التل في تونس يعتبر بوجه عام أقل مطرا من نظيره في الجزائر فان اقليم الساحل في تونس أحسن حظا من اقليم الاستبس في الجزائر ، أي أن الانتقال بين الاقليمين غير محسوس وتدرجي في تونس ، وتطل تونس الذي يفوق طول سواحلها الجزائر رغم صغر مساحتها على جبهتين بحريتين ، كما أن وادي مجرده الذي يمتد متغلغلا في تونس من الجنوب الغربي للشمال الشرقي موازيا للجبال التي تقل وعورة وارتفاعا من أطلس الوسطى أو الكبرى في مراكش بل وكثيرا من جهات أطلس التل في الجزائر قد ساعد على سهولة اختراقها ، ويجب الا نغفل أن تونس أكثر غنى من الجزائر في اتساع مساحة سهولها التي تغطي ٣٠٪ من مساحتها ، بل أن ثلثي البلاد لا يزيد متوسط ارتفاعه على ٤٠٠ متر فوق سطح البحر ، بل أن متوسط ارتفاع اقليم الساحل بين بنزرت والحدود الليبية لا يتجاوز ٢٠٠ متر ، ولا يقتصر سهولة اختراق تونس ، على نقيض الجزائر على طول السواحل واتساع السهول بل أن المرتفعات في تونس أيضا أقل صعوبة في اختراقها ، فتكثر فيها التلال المنخفضة المتقطعة التي يعوزها الامتداد بصورة مضطربة لمسافة كبيرة ، كما يغلب عليها كثرة القباب أو المرتفعات ذات السطوح القبابية أو المخروطية اما لتعارض وتقاطع محاور الارتفاع كما ذكرنا أو لانتشار حركة الرفع الرئيسية ، فكثيرا ما تتوسط هذه الجبال أحواض منخفضة تفصل بين الوديان والسهول التي تحيط بها تسمى دخلات أو نفائض ( جمع نفيسة وهي البحيرة ) ، وتختلف سواحل تونس المنخفضة التي تمتد منها الرصيف



القارى لمسافة طويلة وبخاصة فى خليج قابس حيث تتوافر ثروة سمكية كبيرة ، عن سواحل الجزائر الجبلية التى تجاورها الاعماق السحيقة قريبا من الشواطىء \*

ولموقع تونس بين حوض البحر المتوسط الشرقى وحوضه الغربى أثره فى أهميتها كحلقة اتصال بين العالم الشرقى الذى استمدت منه حضارة قرطاجنة التى لا زالت عميقة الأثر ، وحضارة العرب وثقافتهم والدين الاسلامى التى خلعت على تونس طابعها المميز ، وبين العالم الغربى الذى وقعت فى قبضته مرتين حين غزتها روما ، ثم حين فرضت فرنسا حمايتها عليها ، ولكن مدينة تونس بما تضمه من سكان وما يشيع فى أجوائها من روح شرقى يستقبل تراث الشرق ويستلهمه ، تلعب دورا مهما فى حياة تونس ، ان تمثل بحق نواة مركزية ومراكز جغرافيا يجعل منه مهدا للحضارة التونسية وواسطة العقد فى حياة التونسيين ، وبذلك تنفرد تونس دون بلاد المغرب الاوروبى بتوفر هذا المركز العمرانى القوى \*

ولكل اقليم طابعه الاقتصادى الخاص ، فالجنوب بعيد عن العاصمة ومراكز العمران الكبرى فى الشمال ، يسوده الجفاف الذى أدى الى حفر الآبار التى أوضحت أن المياه الباطنية تسمح بالآثار من النخيل فحسب ، وقد اقتصرت العناية على وحات الجنوب حيث لا ينفسح المجال كثيرا للتوسع الزراعى لما يسود من ظروف طبيعية واجتماعية فى هذه الواحات ، وحيث تخف وطأة الجفاف فى الجنوب الشرقى تنتشر اقامة السدود فى عرض الوديان حيث حيث تنتشر زراعة الزيتون والتين والنخيل ، وتتطلب العناية بالانتاج هنا اصلاح نظام ملكية الأرض ، كما أن منطقة نفزاوه فى الجنوب الغربى تعاني من نقص المياه وطغيان الرمال \* وقد اقتصر التطوير الاقتصادى على توطين البدو فى هذه المنطقة ، فتحول جانب منهم الى اشباه رحل ، ولكن دون الاهتمام بتحسين الثروة الحيوانية التى ستظل موردا مهما لهذا الإقليم الذى لم تحبه الطبيعة الا بما يقيم أود الحيوان أو حيث تقوم الواحات أو زراعة الوديان المتنقلة ، وربما بعد مد خط أنابيب البترول من حقل عجيلة الجزائرى للبترول الى الصخيرة ، واقامة مصنع لتكريره فى الصخيرة سوف تنتعش هذه المنطقة الفقيرة \*

أما فى اقليمى الساحل والاستبس ، فيتكثف السكان وبخاصة فى

الساحل ، وتقدر كثافتهم بـ ٣٥ نسمة فى الكيلو متر المربع فى الاقليمين فى المتوسط ، ويعد تذبذب المطر من أهم المشكلات التى تواجه الزراعة هنا . وان كان نشر مزارع الزيتون واللوز ، سواء باستخدام الطريقة المألوفة للرعى فى سوسه بجمع مياه القنوات على المنحدرات فى جور الاشجار ، أو بزراعة أشجار الزيتون على ابعاد كبيرة كما فى صفاقس ، قد أدى الى امتداد زراعته فى مناطق حدية ( ١٥٠ - ٢٠٠ مليمتر من الامطار ) الا ان الاعتماد على محصول واحد غير مضمون الغلة عاما بعد اخر ، يتطلب التوسع فى الزراعة على الرى وبخاصة فى اقليم الاستبس ، حتى يصبح الانتاج متنوعا بل ان التفاوت فى محصول الحبوب يجعل من الرى وسيلة كما فى فموده والقيروان من وسائل ضمان محصول وافر منها ، وتنتهى الوديان التى تنبع من الظهر الى سبخات الكلبيية وسيدي الهانى وغيرهما وأهمها وديان زرد ومركليل ونيانا ، وقد أقيم سد على وادى نيانا حيث يخبزن ٢٥ مليون متر مكعب ، وقد الف سكان القيروان استخدام طريقة رى الفيضان بإنشاء سدود صغيرة ، ولكن تحسين طرق ضبط مياه هذه الوديان يكفل مارسة زراعات متنوعة كثيفة ، ولا بد من اقتلاع أشجار الزيتون فى صفاقس بعد أن يتقدم بها العمر ويتضام محصولها تدريجيا بدرجة ملموسة ، كما أن تفتش « حمى الزيتون » فى الاستبس السفلى بل والمنطقة شبه الصحراوية الجنوبية على يد الرحل الذين تحولوا الى زراع مستقرين أو شبه رحل قد ينطوى على أخطار كبيرة سواء لعدم أكثرات البدو بعد الغراس بالاشجار ، أو لتذبذب المطر أو لما يثيره النظام القبلى من مشكلات ، ويعد تشجير سفوح ومنحدرات الظهر من أهم وسائل الحفاظ على التربة وموارد المياه السطحية والباطنية ( مثل جبال الصمامة وسيدي عياش والسلوم ) ، ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار أيضا أن انتشار زراعة الاشجار والمحاصيل الحولية قد ضيق الخناق على تربية الحيوان الذى يجب توفير العلف وموارد مياه الشرب له بعد حماية المزارع من أضراره ، ويقترح إقامة مصنع للعلف فى القصرين ، واخسر لصناعة السوبر فوسفات فى سوسه وثالث لصناعة غزل ونسيج القطن مثل مصنع قصر هلال .

ومنطقة التل الشمالية رغم غزارة مطرها وصلاحياتها لانتاج محاصيل شجرية كالزيتون والكروم والموالج حيث تنتشر مزارعها ، ولنمو الاشجار الخشبية على سفوح الجبال لوقاية التربة من الجرف ، ولتربية الحيوان على

المراعى النضرة الكثيرة ، وانتشار المزارع الحديثة التى كان يملكها كثير من المستوطنين الايطاليين والفرنسيين بصفة خاصة ، فان الاعتماد على زراعة الحبوب فحسب أو جنباً الى جانب مع الرعى فضلا عن جرف التربة يعتبر من مظاهر سوء استغلال موارد هذه المنطقة ذات الامكانيات الزراعية الكبرى ، وتعد مشروعات اصلاح وادى مجرده ، وتوزيع المصانع توزيعاً اقليمياً متناسقاً دون أن تتركز فى عاصمة تونس مشروعات مهمة للنهوض بالمنطقة .

المسدن : يغلب على سكان بلاد المغرب طابع الريف ، فتقدر نسبة من يمارسون الزراعة أو الرعى أو الحرفتين معا - كما يحدث فى أكثر الاحيان - نحو ٨٠٪ من السكان ، أما المدن وهى قليلة فى بلاد المغرب فتسكنها عناصر تكاد تنفصل عن المجتمع الريفى ، تتألف من النازحين من الوطنيين الذين قضوا بضعة أجيال فى المدن حتى عدوا من سكان الحضر ، ويدعون «برابى» ، ولكن الاندلسيين الذين هاجروا من أسبانيا بين القرنين الثالث عشر والسابع عشر يمثلون عنصراً حضرياً مهما ( هاجر حين سقطت اشبيلية سنة ١٢٤٨ نحو ٢٠٠٠٠٠٠ وحين سقطت غرناطة سنة ١٤٩٢ ، وفراراً من اضطهاد فيلب الثانى سنة ١٥٦٨ وفيلب الثالث سنة ١٦١٠ ولجأ الى بلاد المغرب نحو مليون ونصف ) كما خلف الاتراك وراءهم فى مدن الجزائر وتونس بعض عناصرهم نقية حيناً ومختلطة أحياناً ويدعون بالكروغلية

أما الزنوج ممن يقومون بالخدمة أو يمارسون الحرف الصغيرة فهم ارقاء اعتقوا فى أكثر الاحيان ، ويهاجر الخوارج من سكان جزيرة جربه فى تونس أو واحة مزاب فى الجزائر سعياً وراء الرزق . وهم يعودون لبلادهم حيث يخلفون وراءهم أسرهم وزوجاتهم بعد أن يقتصدوا جانباً من المال ، كما كان اليهود من المغاربة وبخاصة من قبيلة الشلعة أو من النازحين من أسبانيا أو من المهاجرين من ليفورن بايطاليا يمثلون عنصراً مهماً قبل أن يهاجر أكثرهم الى اسرائيل ، والمدن هنا ليست مراكز صناعية ، فالصناعة أكثرها من النوع اليدوى ، ولذلك فأكثر سكان هذه المدن من الموظفين والتجار أو أصحاب الحرف الصغيرة ، ويلاحظ أن المدن هنا لم تنشأ لأنها ملتقى طرق المواصلات المختلفة ، ولكنها ظهرت فى المنطقة الساحلية تحت تأثير أجنبى ونتيجة لعلاقات تجارية تربطها بمناطق أخرى خارج بلاد المغرب نفسها ، وهكذا شاهدت سواحل بلاد المغرب ظهور عواصم ومراكز للادارة والحكم أنشأها الفينيقيون

والقرطاجنيون والرومان والعرب والأتراك ، وربما كان لتعاقب الحكم الأجنبي ولتمزيق البلاد الطبيعي تأثير واضح لا فى تعدد المدن التى أسستها كل دولة - حكمت البلاد بل كل أسرة تولت مقاليد الأمور - فحسب بل أيضا فى بقاء هذه المدن عهدا طويلا دون أن ينالها الدمار والاندثار . ويبدو على المدن هنا طابع تقليدى إذ تتألف من ثلاثة أجزاء ، السوق ويتألف من حوانيت صغيرة قد تراصت على جوانب الأزقة اختص كل منها بحرفة أو سلعة معينة شأن أسواق الشرق القديمة ثم القصبة التى تضم قصر الحاكم والقلعة ودواوين الموظفين والادارات المختلفة ، وتقع غالبا بعيدا عن بقية الاحياء والحى الأوربي فى خارج المدينة أو أطرافها ، وقد كان لليهود حى خاص يسمى « الله » أو Ghetto ، وكان المسجد الجامع بمنارته والميدان الرئيسى بنافورته والحائط المحصن بأبوابه من مظاهر المدينة ومعالمها الرئيسية .  
وأهم المدن هى :

١ - طنجة : تتحكم فى مدخل البحر المتوسط ان تطل على جبل طارق الذى لا يزيد اتساعه على ١٤ كيلو مترا ، حتى بلغت خطسورة موقعها الاستراتيجى والتجارى والسياسى حدا حال دون أن تستأثر بها قوة أو دولة دون أخرى من الدول الكبرى ، فمدينة طنجة تقع على الطرف الغربى لخليج تهميه من رياح الغرب الشرق ، وقد امتدت متجهة الى هضبة مرشان شمالا بغرب ، كما اتسعت رقعتها حين أخذت تزحف شرقا نحو طرف الخليج الذى تقع عليه مدينة برماله ، والواقع أن اقحام طنجة فى حلقة الصراع الدولى لم يعرقل تقدمها فحسب بل قلصت من جرائه الدول المتنازعة أهمية هذه الميناء التى كانت أولى موانى بلاد المغرب الاقصى وأعظمها أهمية حتى أول القرن الحالى ، وبذلك حرمت منطقة « الغرب » من مينائها الطبيعى ، وقد كان لانتزاع هذه الميناء من منطقتها الخلفية أكبر دافع لفرنسا على تحويل الدار البيضاء التى تتصل بسهولة بمراكش التى كانت حينئذ تخضع لفرنسا الى ميناء مهم ، وقد ظلت ميناء طنجة بمنطقتها التى تمتد لمسافة ١٦ كم فى ١٩١٤ موضع اتفاقيات دولية خاصة بين فرنسا وبريطانيا واسبانيا وألمانيا ولكن لم يصدر اتفاق دولى يكفل لها حيادها كمدينة وميناء الاسنة ١٩٢٣ ، وقد عادت للحكم الدولى سنة ١٩٤٥ بعد أن احتلتها القوات الاسبانية أثناء الحرب العالمية الثانية ١٩٤٠ - ١٩٤٥ ، وقد انضمت الى المغرب المستقل سنة ١٩٥٧ ، ثم أعلنت مصيفا لحكومة المغرب ومنطقة حرة


للتجارة ، وتوجه النية الى تخطيط ميناء حرة ومنطقة صناعية بها ، لأعداد المحاصيل المصدر من شمال المغرب التي تعد طنجة منفذ الطبيعي .

٢ - الدار البيضاء : تحولت من قاعدة عسكرية فرنسية الى ميناء مهم ، وقد زادت أهميتها كمنذ رئيسى لتجارة مراكش ان يمر بها أكثر من ٨٠٪ من تجارتها الخارجية ، يعد أن كانت الدار البيضاء قرية صغيرة سنة ١٩٠٨ نمت نموا سريعا وذلك باقامة حواجز الامواج التي وفرت الوقاية والأمن لمرافئها العميق الذى يمتاز دون سائر موانئ مراكش لعدم تعرضها للاطماء ، وقد بدأت أعمال تزويد المرفأ بالارصفة وحواجز الامواج وغيرها سنة ١٩١٣ فبلغ عدد سكانها نحو ٣ مليون حتى بزت مراكش العاصمة القديمة فى عدد سكانها ، وتعد الدار البيضاء ميناءا حديثا ففى سنة ١٩٠٧ كان سكانها ٢٥٠٠٠٠ فأصبح سنة ١٩٣٦ ( ٢٥٠٠٠٠٠ وأصبحو ٥٥٠٠٠٠ سنة ١٩٤٩ ثم نحو ١٥٠٠٠٠٠ الآن ) وقد صدرت سنة ١٩٥٠ نحو ست ملايين طن أكثرها من الفوسفات الذى حملت السكك الحديدية احجاره ، وتختلط فى الدار البيضاء التى يتجاوز السكان من الاوربيين واليهود ثلث مجموع سكانها التقاليد ونظم الحياة وفن المعمار الأمريكى والفرنسى والاسبانى والمراكشى ، وتتابع نطاقات المساكن الوطنية والاوربية المتباينة مما يجعل إعادة تخطيط المدينة التى تحيطها اكواخ المهاجرين الفقراء وتمتد حوالىها مناطق زراعة الخضروات والفواكه لمسافة كبيرة أمرا صعبا .

٣ - الرباط : تعد العاصمة الادارية لمراكش وهى تقع على خليج وادى بورقراق ، وتعد برج أحد الحكام الذى يدعى حسن من أهم الآثار ، وقد بنيت على الطراز المراكشى ، ويقطنها الآن نحو ١٦٠ ألف نسمة ربعهم من الاوربيين وقد اقيمت فيها مقبرة مرشال ليوتى الذى حكم مراكش حكما غاشما عنيفا من سنة ١٩١٢ الى سنة ١٩٢٥ ، وكان يطلق على الرباط وفاس وتطوان « الحواضر ويقدر سكانها بـ ٨٩٣٠٠٠ نسمة .

٤ - فاس : احدى عواصم مراكش الاقليمية الوطنية ، فكثيرا ما اتخذت قصبة لحكم مراكش - شأن مدينة مراكش - ان عصفت بالبلاد ربح التفكك السياسى ، وتعد فاس التى تأسست فى القرن التاسع الميلادى عاصمة دينية وثقافية لمراكش ، ان تضم الى جانب جامعة القرويين العريقة ضريح مولا ادريس حتى سميت « مكة المغرب » ويكفى ان نذكر أن سكانها قد بلغوا ٤٠٠

ألف نسمة فى القرن الثالث عشر أو ما يقرب من ضعف عدد سكانها الحالى ( أنظر شكل ١١ ) ، وتقع فاس فى وادى سييو الخصيب بالقرب من ممر تازا الذى يتحكم فى الانتقال بين وجده فى تل الجزائر وبين قلب مراكش ، وقد نفذت مشروعات رى بالقرب من موقع المدينة عند متلقى روافد سييو فى منطقة خصيبة ، وقد أدى توفر موارد المياه لهذه المدينة ذات الموقع التجارى الذى



مدينة فاس

( شكل ١١ )

لا يبارى الى ازدهارها وقد أصابت شهرة واسعة فى العالم القديم كموطن لصناعة الحرير والجلود ، وإذا كانت فاس قد أنشئت على يد أدريس الثانى سنة ٨٠٦ م ، فقد شارك فى انمائها وازدهارها نشاط الاندلسيين والقيروانيين ، وهى فى الواقع إحدى مجموعة من المدن تمتد من الغرب الى الشرق من ميناء اقليم العرب ( يعرف الآن باسم ميناء الحسن الثانى ) وكان

يعرف من قبل باسم القنيطرة شرقا الى فاس ومكناس حيث تكثف زراعة الكروم والموالح والحبوب . وقد بلغت أوج تقدمها فى عهد الموحدين بين القرنين الثانى عشر والثالث عشر حين أوفى عدد سكانها على ٤٠٠ ألف نسمة ولكن حين تنازعتها أيدي الاسرات الحاكمة والمدعين للحكم أخذت فى الاضمحلال ، فالصناعات اليدوية التى درت عليها الريح الجزيل وانتزعت لها الصيت البعيد كصناعة الاحذية الجلدية والقاشانى والحريير ، قد فقدت أهميتها ، بل ان تجارها الذين كانت لهم علاقة تجارية وثيقة بالبيوت التجارية فى مرسيليا ومانشستر قبل أن يتغلغل النفوذ الفرنسى فى البلاد وتظهر المدن والموانئ الأوروبية الطابع والنظام ، قد فقدوا أسباب تفوقهم ، فكسدت تجارتها وجمدت صناعاتها ، وتنقسم المدينة الوطنية الى قسمين المدينة القديمة أو « فاس البالية » والمدينة الحديثة وتسمى « فاس الجديدة » التى انشئت سنة ١٢٧٦ م وهى أقل أهمية من المدينة القديمة بأسواقها التى تضم ضريح مولاي إدريس وجامعة القرويين ، أما فاس الجديدة فتقع فى حى اليهود أو المله على كثب من قصر السلطان ، أما المدينة الاوربية فقد أقيمت على الهضبة لتجنب ما يكتنف موقع مدينة فاس من تموج عنيف فى السطح وعدم توفر الظروف الصحية ، وربما كان ذلك من أهم أسباب جمود مدينة فاس ، وقد أمكن توليد الكهرباء من وادى فاس لتدبير المطاحن ومعاصر الزيوت ومصانع المواد الغذائية ويقدر عدد سكان فاس بـ ٢١٦ر٠٠٠ نسمة .

**مراكش :** اذا كانت فاس عاصمة الشمال الوطنية فمراكش عاصمة الجنوب فهى لا تبعد عن الاطلس الكبرى أكثر من ٣٠ كيلو مترا ، انشئت فى وادى تنسفت عام ١٠٦٢ م لتلقى إليها ممرات ووديان الاطلس الكبرى ، ولذلك أصبحت قصبية بدو الصحراء القريبة وسوق سكان الاطلس الكبرى من المصامدة أو الشلوح من البربر ، فالوادي الذى تصليه الشمس المحرقة بشواظ من نارها ، والسحب التى تنتشر قريبا منها عند قمم جبال الاطلس الكبرى من أهم ما يميز مراكش ، وهى فى الواقع مدينة صحراوية أو واحة كبيرة تجتذب إليها سكان الجبال والصحراء المتاخمة ، ان يحمل إليها الرعاة البلح والجلود ليقيضوها بالمنسوجات والوانى والمصنوعات الجلدية ، وقد أقيمت مراكش الاوربية على حافة هضبة جليز ، والواقع انه لا يتوافر المجال للتوسع فى سكنى الاوربيين فى هذه المنطقة الا بعد مضاعفة موارد المياه ، ورغم أن سكانها يربون على نصف مليون وبذلك تبرز فاس فى

هذا الصدد ، الا أنها أقل تحضرا والاتصال بالعالم الخارجى من فاس التى شاركت بنصيب أوفر من مدينة مراكش ( انظر شكل ١٢ ) ، يقدر عدد السكان بـ ٢٤٣.٠٠٠ نسمة تسيطر على جنوب المغرب .

يطلق على مدن الساحل الشمال من المغرب التى لا زالت فى حوزة اسبانيا Plaza de Soberania فمدينة سبته التى يبلغ سكانها ٦٠.٠٠٠ التى تواجه جبل طارق على الجبل الآخر من ميناء جبل طارق تحولت من مركز للادارة ذى أهمية عسكرية الى ميناء لتموين السفن ولصيد الاسماك وهى أقل سكانا كما أن طابعها المغربى أقل وضوحا من مليلة بسكانها البالغين




مدينة مراكش  
( خريطة رقم ١٢ )



٨٠٠٠٠ نسمة فى شمال شرق المغرب ، حيث يصدر أكثر من مليون طن من خام الحديد أما تطوان فهى مركز لمنطقة زراعية مهمة تعد أكثر مناطق الزراعة اتساعا ، ويبلغ سكانها ١٠١٠٠٠٠ نسمة .

**مدن الجزائر :** قد أدت وعورة المناطق الساحلية فى الجزائر ، واقتصار المناطق الخلفية للموانى على بقاع ضيقة غير متصلة وطول شواطئ الجزائر الى تعدد الموانى على تلك السواحل ، فظهرت الجزائر التى لم تستأثر شأن الدار البيضاء فى مراكش بالنصيب الاكبر من التجارة الخارجية للبلاد ، اذ لا يتجاوز نصيبها منها نصف هذه التجارة ، ولم تضمن الطبيعة على هذه الميناء باتصالها بمنطقة خلفية متسعة فحسب ، بل ان المكان الذى قامت فيه المدينة تضيق عليه التلال الخناق ، وتقصره على مساحة محدودة تمتد ١٢ كم على طول خليج الجزائر . وتعزى أهمية الجزائر الى انها عاصمة وميناء هام يتوسط ساحل الجزائر والى اتصالها السهل السريع بالداخل ، ولذلك فحركة مرور المسافرين نشيطة . أما أهميتها فى تجارة المرور فقد نافستها فيها وهران ، ولكن جبل طارق وطنجة قد أخذتا ينتزعان جانبا من أهمية هذين المينائين الجزائريين . وتصدر للموانى الفرنسية وبخاصة مرسيليا التى تبعد عنها أكثر من رحلة تستغرق ٢٤ ساعة فقط التين والنبذ والزيتون والجلود والحديد والزيوت والحبوب وبخاصة القمح ، وتستورد المصنوعات المعدنية والمنسوجات والبن والسكر والشاي وغيرها من واردات الجزائر . ( انظر شكل ١٤ ) ، ويقدر عدد سكانها من مليون نسمة ، ولا تقتصر أهميتها على كونها عاصمة ومراكزا للنشاط التجارى بل تتمتع أيضا بأهمية ثقافية وصناعية ، وتمتد جنوبها منطقة عامرة بزراعة الخضر والكروم فى متيجة .

**قسنطينة :** تمثل بموقعها على قلعة أو ربوة شامخة حصنا طبيعيا منيعا ، اذ تشرف على منطقة واسعة يمثل بعضها أحواضا بحرية قديمة واخرى سلسلة جبلية مثل سلسلة نوميد *Chaine Numidique* . ورغم ما تمتاز به من حصانة طبيعية حتى انه لا يمكن اقتحامها الا من جانب واحد يمكن الدفاع عنه بسهولة ، فانها بحكم موقعها تستطيع أن تسيطر على جهات التل الشرقى فى الجزائر بل وتسيطر على هذا المعقل المنيع المعروف بجبال القبائل ، فقد يسهل الوديان والثغرات التى تخترق ما يحق بها من مرتفعات أسباب اتصالها بعنابة وسككده وسوق أهراس وعين بيضاوباتنه وسطيف ، هذا الموقع المتوسط بالنسبة لمنطقة المحيطة بها قد اجتذب اليها الانظار ،



( خريطة رقم ١٠ )

فقد كانت تسمى Cita وأطلق عليها الوطنيون « بلد الهواء » إذ كانت حقا  
أمنع من عقاب الجو ، هكذا اتخذها الحكام والغزاة مركزا حصينا لهم  
كالقرطاجنيين والرومان وملوك نوميديا ، وقد كان سقوطها في يد الغزاة من  
الفرنسيين سنة ١٨٣٧ إيذانا بتحطيم حركة المقاومة الوطنية في المنطقة القريبة

منها • ويقدر سكانها بنحو ١٥٠.٠٠٠ نسمة كان نصفهم من الاوربيين •  
وهى أهم من مدن الجزائر الداخلية ، وتبعد عن مينائها اسكيكيدة بنحو ٨٠كم ،  
ولكن أهميتها الكبرى فى موقعها وصفتها كقلعة طبيعية •

وهران « تعد ميناء الجزائر الغربية الاول ، وان كانت تشاركها موانى  
أخرى مثل مستغانم التى تتخصص فى تصدير الغلات الزراعية ، على حين  
تصدر نيمور الفحم ، وبنى صاف الحديد ، وقد زاد عدد سكان مدينة وهران  
من ٣.٠٠٠ نسمة سنة ١٨٣١ الى ٣٩٣.٠٠٠ سنة ١٩٦٢ والى ٦٦٣.٥٠٤  
عام ١٩٨٣ وتصدر النبيذ والحبوب ، الأغنام وتستورد المصنوعات والآلات •

تونس : تعزى أهمية تونس التى تعد وريثة قرطاجنة الى وقوعها عند  
النهاية الطبيعية لاقليم التل ، كما أن صلتها بالساحل الجنوبي ميسورة (انظر  
شكل ١٥ ) وهكذا كانت ملتقى الهجرات والتيارات الحضارية وألوان السلع  
المختلفة القادمة من الساحل والاستبس والتل على السواء ، بحكم قيامها فى  
موقع متوسط بين وادى مجرده ووادى ملىان ، وبين البحر من ناحية ومدينة  
الكاف من ناحية أخرى ، والتقاء الممرات الطبيعية التى تخترق جبل أحمر  
وجبل نهيل وهضبة سيدى أبو الحسن وجبل الجلود وجبل بو قرنين عند  
هذه المدينة ، ولا كن قرطاجنة البونية التى كان يبلغ سكانها - كما يقولون -  
٧٠٠ ألف نسمة والتى كانت المدينة والميناء الاولى فى حوض البحر  
المتوسط طالما كان القرطاجنيون سادة البحر المتوسط دون منازع ، والتى  
كانت المدينة الثالثة تحت الحكم الرومانى كانت ميناء بحريا تتجمع فيها  
تجارات و سلع البحر المتوسط الغربى على عكس تونس التى أسسها العرب  
الذين كانوا يخشون بأس الاساطيل الاوربية فى أول الأمر ، فقد نشأت كمدينة  
داخلية لا يربطها بالبحر سوى مستنقع ضحل يصلها بمرفأها الخارجى  
المعروف باسم الجوليه la Goulet • وقد اتخذ العرب القيروان فى ربوع  
الاستبس قصبه حكمهم ، ثم نقلوها الى المهديه ولكنهم عادوا لموقع تونس  
ليتخذوه عاصمة من جديد ، وقد كانت تونس حتى القرن الثانى عشر مدينة  
صغيرة ، ولكنها نمت واتسع نطاقها تحت حكم الحفصيين ، وبالغ ابن خلدون  
فى اطراء محاسنها والاكبار من شأنها والمغلاة فى تقدير عدد قاطنيها حتى  
قدر سكانها بما يزيد على سكان القاهرة فتجاوزوا ١٠٠.٠٠٠ نسمة ،  
وتبدو المدينة القديمة ممتدة بين أرباضا فى الشمال حيث تقع ضاحية باب  
السويقة فى الشمال وضاحية باب الجزيرة فى الجنوب ، كما تنتشر الأسواق

الصغيرة فى « المدينة » الى الشرق من القصبة او مقر الحكم والادارة التى تشرف على بقية « المدينة » ، والواقع أن تونس نمت وازدهرت بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر فأصبحت مركزا تجاريا اقتصاديا وسياسيا كبيرا ، ومن الطريف أن عشر سكان الدولة التونسية يقيمون فى تونس التى قدر عدد سكانها بنحو ٦٥٦ ألف ، على حين يبلغ عدد سكان ضواحيها نحو ٧٠٠ ألف نسمة ، ويعد المسجد الجامع وجامعة الزيتونة مركز تونس العربية أو « المدينة » ، أما الجزء الشرقى الملاصق لبحيرة تونس فقد اتخذ موطنها للاربيين الذين كانوا يضمون عددا كبيرا من الايطاليين ( ٥٠ر٠٠٠ ) والفرنسيين ( ٧٠ر٠٠٠ ) كما كان بها عدد كبير من اليهود ( ١٤ر٠٠٠ ) ، وتنفرد كل جالية بحى معين ، ويقدر سكان المدينة الاوروبية بنحو ١٣٥ر٠٠٠ نسمة ، وكما تتركز الصناعة فى اقليم الجنوب تعتبر الجهات الشمالية موطن سكنى الموظفين ، وتعد تونس ميناء تجاريا ، فقد انقضت أكثر الحرف اليدوية التى تمثل الصناعة الوطنية ، فالوان النشاط فى الميناء وطرق النقل بالسكة الحديدية والطرق البرية تخلع عليها الطابع التجارى ، ونستأثر تونس بنصيب كبير من تجارة الواردات ، ولكن صفاقس التى تصدر الفوسفات تفوقها فى الصادرات من حيث الوزن ، وتشحن السلع فى الميناء الخارجى « لا جوليه » بعد أن شقت قناة عميقة تسمح بمرور السفن بين هذا المرفأ وتونس نفسها ، كانت المدينة الاوروبية قد نشأت على شاطئ بحيرة تونس أو « البحيرة » كما تسمى ، بعد أن طمرت أطرافها الغربية فهى حارة رطبة منخفضة ذات جو خانق فضلا على أن وضع الاساس كثير النفقات ، فلا غرو أن أخذ الاوروبيون يتنقلون الى لا جوليه حينما ، والى موقع قرطاجنة القديم الذى لا يبعد بأكثر من خمسة كيلو مترات حينما آخر ، بل قسد راود المسئولين فكرة نقل المدينة الاوروبية الى موقع قرطاجنة .

لم تتوافر الظروف فى الداخل لقيام مدن تحمل سمات الحضارة فى مراكش وفاس ومكناس لمواقعها فى ملتقى الطرق وعلى كثب من الوديان والممرات وعند اتصال الاقاليم الجبلية بالهضبة أو مناطق الزراعة بالرعى ، أما فى بقية بلاد المغرب فقد حالت العزلة وانطواء البلاد على نفسها وتوجيهها برىا نحو الشرق والجنوب دون ظهور موانئ على طول السواحل ، ولكن حين ارتبطت البلاد بالخارج وراء البحار واصبحت اقتصادياتها لا تقوم فقط على التبادل الحر بينها وبين العالم الخارجى بل على التكامل بينها وبين



## ماينة توفس

( خريطة رقم ١٤ )

اقتصاديات الدولة المسيطرة فرنسا ، زادت أهمية المنافذ البحرية ، وهكذا نجد أن انكفاء التوجيه الاقتصادي والسياسي للبلاد رأسا على عقب قد أدى الى تركيز المدن على الساحل ولم يؤد استغلال الثروة المعدنية الى قيام مدن تذكر في الداخل ، والواقع أن صعوبة المواصلات وطبيعته السطح الوعرة وتشبه السكان بالانتاج للاكتفاء الذاتي أو قيام التبادل بين الرعاة والزراع في أضيق نطاق ، قد يفسر عدم اقبال الوطنيين على انشاء المدن التي احتفظت بالاسماء التي أطلقها المستعمرون الذين تعاقبوا على حكم البلاد .

الجزائر : حاولت فرنسا سنة ١٨٩٠ بوجه خاص أن تفتتخ أخصب

بقاع تل الجزائر لتوطين الفرنسيين الذين نزحوا من جنوب فرنسا بصفة خاصة فاتبعت وسائل متعددة : من مصادرة الملكيات الى طرد السكان ونقلهم الى السهول العليا وصحراء الجزائر الى محاولة ابادتهم لاقساح المجال امام المستعمرين الفرنسيين ، وقد نظمت حركة الهجرة فاقبعت القرى ومدت الطرق وتوفرت المرافق العامة وبخاصة بعد ان خرجت فرنسا مهزومة من حرب السبعين فرائت فى ضمها الجزائر ما يعوضها عن فقد الالزاس واللورين ويضيف الى مواردها الاقتصادية موارد جديدة ، واصبحت الجزائر فى نظر الحكومة الفرنسية جزءا من الاراضى الفرنسية تتبع وزارة الداخلية الفرنسية ، وترسل ممثلها من المستوطنين الفرنسيين او صنائع فرنسا الى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسى أسوة بجهات فرنسا نفسها ، وربما كانت اصابة مزارع الكروم فى جنوب فرنسا سنة ١٨٧٨ بالافات مما دعا الى هذا الاتجاه ، فأخذت تنتشر مزارع الكروم فى اقليم التل الذى أصبح ينتج نحو ١٢٪ من محصول النبيذ الفرنسى ، وقد بلغت مساحة أصبح الكروم أكثر من ٣ مليون فدان، وقد قدر أن نصيب المستعمرين من اراضى الجزائر الزراعية كان لا يقل عن ٣٧٩٪ بعد أن وزعت مساحة نحو خمسة ملايين من الافدنة على هؤلاء المستعمرين كما شيدت او نظمت نحو ٦٧٥ قرية، ولكن ٧٪ من مساحة هذه الأراضى قد خضعت لما يمكن أن يسمى بالاستعمار الرسمى Official Colonization ، ففى الجزائر الشمالية حيث توجد نحو ١٣ مليون هكتار صالحة للاستغلال كان يملك الاوربيون منها نحو ٣ مليون هكتار يخضع ٢ مليون منها لنظام الاستعمار الرسمى .

اتجه الفرنسيون الى زراعة المحاصيل التجارية فى مزارع كبيرة فى ظل ظروف كافية من الامطار ، وكانت السهول وبخاصة فى اقليم البحر المتوسط مجالا ملائما لزراعة الكروم التى يصدر ما قيمته ٤٠ - ٦٠ مليون فرنك سنويا منها الى فرنسا ، وهى تسمح بارتفاع كثافة السكان من المستوطنين فضلا عن انصراف المستوطنين ممن ينتمون الى اصول اسبانية أو ايطالية لزراعة الخضروات حول المدن ، ولكن الحبوب التى تزرع كغلة تجارية باستخدام الآلات وطرق الزراعة الجافة اذا سقط مطر يقل عن نصف متر فى العام تعد غلة مهمة ، وكان يقدر عدد المزارعين الاوربيين سنة ١٩٥٠ - ٢٠٠٠ يملكون ١/٣ الأراضى الزراعية متوسط مساحة المزرعة ٢٦٠ فدان .


ولكن الفرنسيون الذين وضعوا استعمارهم فى الجزائر على أسس راسخة حين استوطنوا الريف أخذوا يبيعون أو يؤجرون مزارعهم للوطنيين ليقيموا فى المدن ، كما ان اعتمادهم على ما كان يغذيهم من مهاجرين جدد قد اختفى أو كاد بل على النقيض ، أخذ كثير منهم يعود الى فرنسا ، وقد انصرف المزارعون الفرنسيون الى زراعة الكروم منذ سنة ١٨٨٠ حتى بلغت مساحتها نحو مليون فدان الآن ، يزرع أكثرها فى مقاطعة وهران التى يوجد بها نصف هذه المساحة ، وتنتشر هذه الكروم فى السفوح المنخفضة من التل بعيدا عن تأثير رياح السيروكو والصفيع على السواء ، وهكذا ترك للمزارعين من الوطنيين الذين عجزوا عن مجاورة الفرنسيين فى استخدام الآلات الحديثة أو تطوير طرق الزراعة التقليدية - تربية الحيوان وزراعة الحبوب من القمح والشعير ، فبعد انتشار المواصلات الحديثة قلت أهمية تربية الإبل فانصرف الرعاة الى تربية الضأن ، ولم تبذل جهود تذكر لتحسين الانتاج الحيوانى بل ان محاولة تحسين مراعى السهول العليا قد منيت بالافاق . وتستخدم طرق الزراعة الجافة لانتاج الحبوب فى السهول العليا جنوبا حتى حافة الصحراء ، ولكن الكروم كما اسلفنا الحديث كانت ولا تزال عماد الاقتصاد الجزائرى ، ان يمثل النبيذ نحو ثلثى قيمة الصادرات ، وقد حاول الفرنسيون بعد أن وجدوا أن اصابة الكروم بالامراض مثل مرض *polyloxén* أو انخفاض سعره لزيادة الانتاج كثيرا كما حدث ( ١٨٩٢ - ١٨٩٥ ، ١٩٠٠ - ١٩٠٤ ، ١٩٣٤ - ١٩٣٥ ) يعرض البلاد لازمة اقتصادية خانقة - أن يتوسعوا فى زراعة القطن والطباق ونباتات العلف وبخاصة فى اراضى الرى التى تضاعفت مساحتها منذ سنة ١٩٢٩ ، ولكن لا زال النبيذ يسيطر على اقتصاديات الجزائر ( انظر شكل ١٥ ) ، وتعانى الجزائر من سوء توجيه الاقتصاد الجزائرى حيث يمثل النبيذ نصف الصادرات من حيث القيمة ، رغم أنه لا يستهلك محليا ويصدر لفرنسا التى تدمره بدورها للخارج فى صورة كحول لأن نبيذها يفيض عن حاجتها ، كما أنه فى مناطق الساحل الغنية فى اقليم التل حيث تركز العمران والمشروعات فظهرت مشكلة صغر الملكيات ، على حين حرمت مناطق الاستبس من موارد المياه ، وأن كانت مشروعات الرى وتوليد الكهرباء قد تساعد على التوسع فى الزراعة والرى وتوفير القوى المحركة للصناعة التى تقتصر على صناعات الاسمنت وطحن الغلال وصناعة الكيماويات والسكر والملابس .

## تونس :

اجتذبت تونس انظار الفرنسيين اذ ظنوا ان وادى مجرده بأرضه الخصيبية ونظام الملكية فيه وقلة سكانه وايتارهم المسألة وسوف يمكن للاستعمار الزراعى الفرنسى ، فى هذه الجهات التى نظروا اليها كامتداد لاستعمارهم لاقليم التل فى الجزائر ، والواقع ان الاستعمار الفرنسى الذى أبقى على ادارة الهأى مع انفراد المقيم العام الفرنسى بتسيير دفعة الشئون الخارجية - وذلك قبل استقلال تونس - قد اتبع نظام الحكم غير المباشر على عكس ما هو مألوف عن سياسة الاستعمار الفرنسى \* وقصد عنى الفرنسيون بنزع الملكيات الكبيرة فى منطقة مجرده فوزعوها بين الشركات أو الملاك الكبار ، وهكذا كانت مزرعة شركة « انفيدا » التى تبلغ مساحتها أكثر من ٢٠٠ ألف فدان تمتد بين تونس وسوسة مثلا لهذه المزارع التى قدرت مساحتها بنحو ٢ مليون فدان ، وقد اتبع فى زراعتها طريق ، الشرك « أى أن يدفع المزارع وهو من الوطنيين غالبا جانبا من المحصول ايجارا للأرض ، ولكن هذه المزارع الكبيرة لم تصب نجاحا يذكر فقسمت أراضيها بين الزراع من الاوربيين الفرنسيين والايطاليين ، اذ اقبل الايطاليون وبخاصة بعد الحرب العالمية الاولى على شراء أراضى الفرنسيين من الملاك - وخصوصا فى وادى مجرده - الذين عادوا الى فرنسا خشية ثورة وطنية قام بها السكان فى وجه الفرنسيين فى ذلك الحين \*

ولم تنجح زراعة الكروم هنا نجاحها فى الجزائر ، ولم يرغب الفرنسيون فى زراعة الحبوب لأنها غير مجزية ولأنها كانت تحتاج الى ايدى عاملة كثيرة من جنوب ايطاليا أو من الوطنيين ، فآثروا التوسع فى زراعة الزيتون فى منطقة الساحل بين صفاقس وسوسة ، وكان الأجانب يملكون نحو ١٥ - ٢٠٪ من أشجار الزيتون فى تونس وينتجون نحو ١/٢ زيت الزيتون \* ولكن مساحة الكروم انكمشت كما ذكرنا بعد الفترة ١٩٠٥ - ١٩٣٢ ومن ثم أصبح الزيتون الى جانب الحبوب هما عماد الزراعة التونسية ( انظر شكل ١٦ ) \* وتشمل صادرات تونس المتنوعة من خامات معدنية ( الفوسفات والحديد والرصاص والزنك ) فضلا عن الحلفاء والزيوت والخمور والتمور والموالح والجلود والفراء والحبوب هى من الخامات الزراعية الحيوانية \*





أفريقيا في عام ١٩٥٠ (1950)

- ١١ - صكتون
- ١٢ - نياي
- ١٣ - نياي
- ١٤ - نياي
- ١٥ - نياي
- ١٦ - نياي
- ١٧ - نياي
- ١٨ - نياي
- ١٩ - نياي
- ٢٠ - نياي

- ١ - نياي
- ٢ - نياي
- ٣ - نياي
- ٤ - نياي
- ٥ - نياي
- ٦ - نياي
- ٧ - نياي
- ٨ - نياي
- ٩ - نياي
- ١٠ - نياي


## المغرب :

تطلعت فرنسا منذ احتلالها للمثل الى السيطرة على مراكش لاتساع سهوله الساحلية وغناها بالمواد الغذائية وبخاصة الحبوب وثروته من الاخشاب والمواد الخام الاخرى ، واخذت تترىص بها حتى وانتهت الفرصة ، فتوغلت فى الشرق حتى فجيج عند حافة الصحراء ، ثم اتفقت مع بريطانيا فى ان تطلق يدها فى مراكش نظير عدم معارضتها فى مصر فى الاتفاق الودى الشهير سنة ١٩٠٤ . واستولت على المنطقة الغربية وبخاصة سهول الغرب وتوغلت حتى وصلت الى ممر تازة ، ثم اتبعت طريقة المهادنة والحكم غير المباشر مع زعماء قبائل البربر وجبال أطلس ، وقد صادرت الحكومة الفرنسية نحو ١٢ مليون فدان فى السهول الساحلية الغربية لصلحة المستعمرين من الفرنسيين الذين كان يسكن اكثرهم المدن وبخاصة الدار البيضاء حيث يقيم نحو ٤٠٪ منهم ، واهم صادرات المغرب الحبوب وبخاصة القمح اللين ، وان كان يزرع الأرز ، كما توسعت البلاد فى زراعة الكروم الذى انتشرت زراعته بعد الحرب العالمية الاولى وبخاصة بعد سنة ١٩٣٠ فى منطقة مكناس ، وتفوق مساحته الان مساحة الكروم فى تونس ، يبلغ عدد سكانها ٢٠٢٥٥٦٨٣ نسمة عام ١٩٨٢ ظلوا موزعين بين الريف الاسبانى ومراكش الفرنسية فى الفترة بين سنة ١٩١٢ وسنة ١٩٥٦ ، وقد غادر كثير من الفرنسيين الذين بلغ عددهم ٣٦٢٠٠٠ نسمة سنة ١٩٥١ المنطقة الفرنسية ، ومن الاسبانيين الذين قدر عددهم سنة ١٩٥٥ بـ ٩١٠٠ المنطقة الفرنسية .

## الصناعات :

تعد الثروة الغابية ذات أهمية خاصة فى منطقة خمير فى تونس وفى الهضبة الوسطى وبخاصة سفوحها الغربية فى مراكش ، وفى منطقة القبائل فى الجزائر ، أما الحلفاء فقد قام باستغلالها بعض التجار أو الشركات الذين حصلوا على امتياز استغلالها ، ولم يقيم أى مصنع لاستخدامها فى صناعة الورق غير واحد بالجزائر ، أما الثروة السمكية فلها أهمية خاصة فى مراكش وبخاصة فى الدار البيضاء وأسفى وموجادور . وتلى الاسماك الفوسفات من حيث قيمتها فى تجارة المصادر ، ويقوم بعض الصيادين من الايطاليين والاسبانيين بالصيد فى منطقة ساحل قسنطينة ، ولكن منطقة

## لقلمهاديات توفس



- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ١ - قارات (صنوبر، وبلوط، ليني) | ٤ - المناطق الرئيسية لإنتاج الزيتون |
| ٢ - منسكك حديدية عادية         | ٥ - " " " " " " " "                 |
| ٣ - " " " " " " " "            | ٦ - " " " " " " " "                 |
|                                | ٧ - " " " " " " " "                 |

( خريطة رقم ١٦ )

خليج قابس ذات أهمية كبيرة فى الصيد ، وقد قامت صناعة تجفيف الأسماك وحفظها فى رأس بون وقابس \*

أما الثروة المعدنية فرغم انها ليست كبيرة الا أن الفوسفات والحديد قد أضفيا على هذه المنطقة أهمية اقتصادية ، فتعد بلاد المغرب بأكملها أكبر مناطق العالم استخراجا للفوسفات ، الذى يستخرج فى تونس من شمال شط الجريد عند قفصه اذ تستخرجه شركة الفوسفات وسكة حديد قفصه من ثلاث مناطق ( المشلوى والرديف ) أم العرايس - مهارى زبوز وفصيله ، وشركة أخرى من منطقة رابعة مجاورة ، وقد مدت لذلك سكة حديد من قفصه لنقله فى سوسه وصفاقس كما أقيمت مصانع لتحويل الفوسفات الى سوپر فوسفات فى تونس وصفاقس ، أما فى الجزائر فهو يستخرج من تبسه فى المنطقة الجبلية بالقرب من الحدود التونسية ، ومن *Toequeville* توكفيل جنوب اطلس التل والى الشمال من شط الحضنة ، أما فى مراكش فيستخرج الى شرق الدار البيضاء من خريبكة ، أما الحديد وأكثره من الهيماتيت فله أهمية اقتصادية كبرى وبخاصة فى الجزائر ، ويستخرج من أقصى غرب ساحل وهران ومن وادى شليف عند بلدة مليانه ، وعلى مقربة من تبسه وحدود تونس يوجد فى أبو خضرة وجبل العنزه وتعد أهم مناجم الحديد فى الجزائر ، أما فى مراكش فيستخرج فى شرق الدار البيضاء عند وادى زم وفى مليلة فى الريف التى تعد أغنى بكثير من السابكة ، أما فى تونس فيوجد الحديد فى الشمال الغربى عند جريصه \*

وقد مدت سكة حديدية متعددة كان الدافع اليها خدمة الاقتصاد المحلى من ناحية ثم الربط بين بلاد المغرب بعضها ببعض الاخر لتيسير الانتقال بين بقاعها المتاعدة من ناحية أخرى ، فكان خط السكة الحديدية فى اقليم التل الجزائر وهو أقدم جهات الجزائر عهدا بالاستعمار يربط بين مدينة الجزائر ومدينة بليده على بعد ٣٠ ميلا للجنوب فى اقليم وادى متيجة الخصب ، ثم خط آخر وهو يعتبر فى الواقع عصب شبكة السكة الحديدية فى الجزائر يمتد من الشرق الى الغرب تقريبا ، من الساحل بين عنابة وسكيكده وبجايه والجزائر فى الشرق من ناحية وبين وهران فى الغرب من ناحية أخرى ، وتخرج منه فروع أهمها الذى يخرج من قسنطينة الى بسكرة الى توغرت فى الشرق ، والاخر يمتد فى الغرب من وهران الى كلومب بشار أما فى تونس فقد أصبحت مدينة تونس نفسها مركزا لالتقاء خطوط متعددة

يسير بعضها موازيا للساحل من قابس الى قفصه الى سوسة ورأس بون  
أذار والآخرى تربط بين مناطق التعدين فى تيبسه والعنزه ( الونزه ) الواقعة  
داخل حدود الجزائر فضلا عن قفصه بالموانى .

أما مراکش فلم يعن فيها كثيرا بمد السكك الحديدية ، وأهم خطوطها  
من وجده الى فاس ومكناس والرباط ويرتبط بسكك حديد الجزائر عن طريق  
ممر تاز ، أما الآخر فيمر بمدينة مراکش والدار البيضاء ، يوجد خط ثالث  
يصل طنجة بمكناس .

#### ملخص احصائى

وعدد سكانها ٢٠٢٥٥٦٨٧ نسمة*(١٩٨٢)	٢ كم ٤٥٨٧٣٠	مساحتها	المغرب
وعدد سكانها ٢١٥٢٥٠٠٠ نسمة (١٩٨٥)	٢ كم ٢٣٨١٧٤١	مساحتها	الجزائر
وعدد سكانها ٦٩٦٦١٧٣ نسمة*(١٩٨٤)	٢ كم ١٤٤١٥٠	مساحتها	تونس

(\*) تعداد



## الباب الثالث

### شمال شرق أفريقية


#### الفصل الأول

##### ليبيا

كانت ليبيا قبل اكتشاف البترول تمثل منطقة فقيرة قليلة المواد الزراعية قد توسطت منحاقتين أكثر غنى منها فى شمال أفريقيا هما مصر فى الشرق وتونس وبقيّة بلاد المغرب فى الغرب ، فهنا تمتد الصحراء الكبرى حتى تصل الى سواحل البحر المتوسط نفسه فى عدة مناطق ، فى الشرق فى مارماريكا وفى الوسط فى سرت وبذلك تمزق اتصال العمران فى البلاد الذى يبدو وكأنه واحات متناثرة قد أهدقت بها الصحراء ، بل أن جهاتها العامرة فى برقة الشرق وطرابلس فى الغرب ليست الا مناطق شبه جافة انتزعت انتزاعا من الصحراء الطاغية ، فاذا كانت برقة وبخاصة الجبل قد تمكنت بامتدادها البارز فى شبه جزيرة مرتفعة أن تتلقى قدرا من المطر يسمح بقيام الزراعة المستقرة على المدرجات وبخاصة المدرج الثالث ( شحات - القبة ) والثانى وبخاصة المريج - الاپيار فان الزراعة قد انتشرت فى المدرج الاول على الرى فى سهل بنغازى ومناطق طلميثه - طوكره - اللاطرون - درنه - مرسى رأس الهلال . أما طرابلس فهى لا تعدو نوعا من الاستبس الفقيرة التى لا يمكن أن تقوم الحياة المستقرة فيها الا فى بعض بقاع متفرقة يحسن الافادة فيها من موارد المياه السطحية والباطنية . والواقع أن الطبيعة قد ضنت على هذه الدولة الفتية بجهة ساحلية فضلا عن منطقة خلفية تتيح لسكان الساحل حياة مطمئنة رخيّة ، بل ان تفرق مراكز العمران على الساحل قد أوحى لمن اضطلع بوضع نظام البلاد السياسى فى أول الامر أن يجعله على أساس فدرالى إذ كانت تتألف المملكة الليبية المتحدة من طرابلس وبرقة وفزان . ولكن لمكافحة الروح الاقليمية التى ظهرت فى رغبة اقليم فى الاستئثار بنصيب أكبر من عوائد البترول التى كانت تدفع للحكومة المحلية ، وكما بدت فى النص على الانتقال الدورى من طرابلس وبنغازى للحكومة المركزية أو

الاتحادية ، اختيرت البيضاء عاصمة سياسية للبلاد حسما لهذه المنافسة الاقليمية ، ويقدر عدد السكان ١٤ مليون نسمة ثلاثهم ( ٨٠٠ر٠٠٠ ) فى طرابلس ، وأقل من الثلث ( ٣٥٠ر٠٠٠ ) فى برقة ونحو ٥٥ر٠٠٠ فى فزان يتركزون فى ثلاث واحات هى سبها ومرزق دراك كما يسكن ١٠ر٠٠٠ فى واحات برقة الكبرى الاربعة وهى جالو وجغبوب ومراده والكفرة . وقد اشتقت أسماء كثيرة من الاقاليم من المدن الرئيسية مما يدل على أن مراكز العمران نفسها متفرقة متناثرة وسط محيط من اراضى فقيرة من الصحراء وشبه الصحراء ، ولسنا بحاجة الى أن نؤكد أن الحياة فى مراكز العمران متشابهة فى جوهرها ولكن يشوب هذا التشابه اختلاف اقليمى من الناحية الطبيعية ، كما أن التطور السياسى كان محليا ، إذ كانت كل مدينة كبيرة والمنطقة القريبة منها تتطور تطورا مستقلا يشبه مدن الاغريق القديمة ، كما هو الحال فى الخمس مدن القديمة فى برقة وهى مدن المرج وشحات وبنغازى وطمبيثة وسوسة القديمة ، والثلث مدن التى كانت تتألف منها طرابلس ( اويا ) ، صبراتة وليده القديمة .

وتتكون ليبيا من الناحية الطبيعية من جزء من الهضبة الافريقية بصخورها الاركية التى يغطيها تكوينات رسوبية تبدو افقية تقريبا ، وقد ارسبت هذه التكوينات التى تنحصر بين العصر الكريتاسى ومنتصف الزمن الثالث من الجنوب الى الشمال ، فتبدو صخور العصر الكريتاسى الرملية فى الجنوب لتنتهى بصخور الحجر الجيري الايوسينى فى الشمال ، وقد تعرضت بعض الجهات وبخاصة فى الشمال لاضطرابات تكتونية وظهرت الانكسارات وخرجت اللابة من باطن الأرض كما ظهرت الينابيع الحارة فى طرابلس .




( خريطة رقم ١٧ )

قطاع فى طرابلس من الشمال الى الجنوب



ففى طرابلس يمتد على طول الساحل مجموعة من الواحات قامت فيها القرى وتناثرت فيها الابار بين كثبان الرمال البيضاء ومستنقعات الساحل ويلى هذا الشريط الساحلى سهل الجفارة الذى تقدر مساحته بنحو ١٨٠٠٠ كم ٢ ، ويحف هذا السهل الذى يرتفع تدريجيا نحو الجنوب المستنقعات فى الغرب والجنوب كما يحده فى الجنوب « الجبل » وهو عبارة عن منحدرات انكسارية وقد اندفعت مرتفعة نتيجة لانكسارات ثم غطتها بعض طفوح من اللابة حتى بلغ ارتفاع بعض جهاتها نحو ٩٠٠ متر ، وتمتد نحو غرب الجنوب الغربى بالقرب من الخمس على الساحل حتى نالوث فى الداخل ، وقد شقت هذه المرتفعات وديان عميقة لا تجرى فيها السول الآن الا نادرا ، ولذلك أصبح لكل جزء من هذه المرتفعات اسما خاصا هى جبال ( ترهونة ويفرن ونفوسة ) وهى تمثل منطقة استبس فقيرة تنتشر فى أرجائها بعض الكثبان الرملية أو التلال الحصوية أو الصخرية التى تنحدر منها السيول بفضل الامطار القليلة لتحمل الطمي أو الملح الى منخفضات تمثلها بحيرات أو سبخات .

ورغم أن سهل الجفارة يمتاز بنباته الفقير ان تتناثر اخراج النخيل فى بعض الواحات حول الابار تاركة منحدرات الجبال وهى قفرة عارية ، تبدو المنطقة المرتفعة الى الجنوب لتصل الى ما يسمى بالظهر حيث يظهر




طريقة استعمال الأراضي فى مصر

مناخ البحر المتوسط من جديد فيغزر المطر وتنتشر الزراعة الجافة لمواجهة هذه الجهات المرتفعة للرياح العكسية وأعاصيرها ، ثم نجد فى الداخل منطقة مرتفعة أو هضبة من الصخور الرملية والجيرية بوجه خاص يبلغ ارتفاعها ٦٠٠ متر فى الغرب وان كانت تنحدر تدريجيا نحو خليج سرت ، وتنحدر هذه الهضبة الى حمادة حمراء ومنخفض فزان نحو الجنوب ، أما فى الجنوب الشرقى فيوجد جبل السوداء وهو يتكون من صخور اللابة مثل هضبة الهاروج الاسود القريبة منها ، ويفصل بين هضاب اللابة فى الجنوب الشرقى ويحور الرمال فى الغرب والجنوب الغربى منخفض فزان بواحاته ، ويلى ذلك نحو الجنوب هضبة تبستى التى توجد فى الصحراء الوسطى .

أما برقة فتتكون من هضبة ترتفع على دفعتين أو تتألف من مدرجين لتصل الى مستوى ٧٠٠ متر فوق البحر ، ولا يتسع السهل الساحلى الا فى الغرب ، وتنتشر فى أرجاء برقة الكثبان الرملية تمتد عبر حدود مصر شرقا وتغطى مساحة كبيرة ، على حين نجد أن مناطق اللابة محدودة على عكس طرابلس ، فلا يوجد ببرقة الا منطقة هاروج الأسود فى منطقة الحدود بينها وبين طرابلس . وتوجد مجموعتان من الواحات فى برقة يفصلهما بحور من الرمال تجعل الاتصال صعبا بينهما ، وتفرض عليها العزلة وأهم هذه المناطق من الكثبان المتحركة تقع بالقرب من واحات بالطل و جغبوب و جالو ، تقع على امتدادها واحة سيوه ومنخفض القطارة ، أما المجموعة الجنوبية فى تازربو وزيجين والكفرة والجوف ، وأهم مناطق الرمال هنا هى بحر الرمال الكبير ، وبحر حصى الكلتشيو ، وبحر رمال رييانه .

### المناخ :

تلتقى هنا مؤثرات البحر المتوسط بنسيمه وأعاصيره المطيرة بالصحراء بجفافها وتطرفها ، وفى طرابلس تحجب مرتفعات تونس تأثير الرياح العكسية ، ولذلك فلا يصيبها من أعاصير خليج ليون مطر يذكر ، وأكثر الانخفاضات التى تمر بطرابلس تأتى من خليج صقلية ، ويسقط المطر فى الشتاء وهو يتعرض للتذبذب الكبير ، ويقال أن له دورة يتغير فيها كل عشر سنوات ، وكثيرا ما يسقط فى فترة قصيرة مرات محدودة مما لا يسمح للنبات أن ينضج ويحصد ، وقد يتتابع عامان يسودهما الجفاف .



ويغزر المطر بالمقرب من طرابلس ولكنه يقل في الجهات الشرقية الوسطى من الجبل ، وتتأثر الرطوبة النسبية والحرارة والمطر بالموقع من البحر بالارتفاع كما يبدو من الجدول الآتي :

الرطوبة %		الحرارة		الارتفاع	المنطقة
في الصيف	في الشتاء	أدناها	أقصاها		
٦٦	٦٩	١٢٫٢°م	٢٦٫٤°م	١٤ متر	الساحل
٤٢	٤٠	١١٫١°	٣٠٫٠°	١٠٠ متر	الجفارة
٧١	٣٢	٧٫٨°	٢٢٫٢°	٧٨٠ متر	الجبل
٥١	٣٢	١٠٫٣°	٢٨٫٩°	٥٧٠ متر	الصحراء

ويتعرض سهل الجفارة لهبوب رياح حارة من الصحراء تسقى الرمال تسمى « القبلى » قد ترفع الحرارة الى أكثر من ٤٣° ، أما برقة فقد استطاعت بحكم موقعها الذى يبرز فى البحر وارتفاعها أن تفيد من أعاصير البحر المتوسط الشرقى التى تجلب اليها نحو ٣٠٠ ملليمتر من المطر فوق الهضبة ، ولكن على حين تصل هذه الكمية الى ٥٠٠ - ٦٠٠ ملليمتر على الساحل الشمالى الاقصى تبلغ ٤٠٠ ملليمتر فى المنطقة الوسطى ، ولكن النطاق الساحلى الضيق قد يصيبه قدر لا يتجاوز ٢٠٠ ملليمتر ، والمطر يتعرض للتذبذب شأنه فى طرابلس ، ولكنه يتوزع على فترة أطول وهو أقل غزارة ولذلك يتسنى الافادة منه بطريقة أكثر جدوى ، وتنخفض الحرارة قليلا عن طرابلس فوق الهضبة بنحو ٢٥°م .

وتخلو ليبيا من الانهار ال دائمة الجريان وقد بذلت عد محاولات لاقامة سدود عبر وديان طرابلس ولكن لم يقيض لها النجاح ، وتتوافر لها المياه الباطنية فى طرابلس على عمق ٥ - ١٥ متر فى الواحات الساحلية ولكن يهبط هذا المنسوب بارتفاع الأرض نحو الجنوب ، ويوجد منسوب آخر للمياه على عمق ١٥ - ٢٥ متر أسفل المنسوب الاول ، وهما يستمدان المياه الباطنية من السيول التى تترشح مياهها من وديان الجبال . ولكن توافر المياه الارتوازية العميقة مقصور على منطقة ذات شكل مثلث يحدها صبراته والعزيرية ومصراته فى الشرق ، أما فى الجبل فتوجد الينابيع على مستويات متباينة كما توجد مياه باطنية على أعماق تتفاوت بين ٥٠ - ٨٠ مترا .

أما فى برقه فرغم أمطارها الغزيرة نسبيا فان الافادة منها دونه صعوبات ، فالمسيول النادرة تجرى فى وديان عميقة ، كما أن الينابيع التى توجد فى الجهات المنخفضة لا تتيح زراعة الأرض الخصبة الواقعة فوق سطح الهضبة من جهة ، كما أنها تنبعث فى أكثر الاحيان من حفر عميقة يصعب على الانسان تصريف مياهها فى قنوات ، أما المياه الباطنية فهى غير منتظمة إذ تقع رغم ما يبدو من وفرتها على أعماق متفاوتة ، وقد أجاد الاغريق والرومان طرق تخزين وصيانة موارد المياه كما يبدو من كثرة خزاناتهم وسرديبيهم ، كما أن شبكة مجارى الكارست السفلى التى تمتد أسفل سهل بنغازى قد يمكن استغلالها ، وان كانت ملوحة المياه مما يعترض حسن استغلالها ( انظر خريطتى ١٨ ، ١٩ ) .

### التربة :

يتكون الجبل فى طرابلس من صخور جيرية تغطيها صخور رملية ورملية صلصالية فى أجزائها الوسطى والشرقية ، أما الجزء الغربى الجاف فتبدو الصخور الجيرية على السطح ، وعلى حين تعد التربة الجيرية غير صالحة للزراعة اذا أصبحت صماء فان التربة الرملية الحمراء خصبة ، ان تتكون من رمال ناعمة يتراوح نسبة الكوارتز فيها بين ٩٠ر٥٠ ٪ ، وهى خفيفة مفككة عميقة حسنة التهوية ، كما أن التربة السفلى وهى تتكون غالبا من الصلصال ليحول دون تسرب المياه الى أسفل ، ولكن التربة المفككة كثيرا ما تتعرض لتعرية الرياح كما أن نسبة الدبال والازوت منخفضة ، أما سهل الجفارة فيتكون من خليط من الكثبان الرملية والاكوام الحصوية تحف بسواحل رمال بيضاء حملتها الامواج ، كما تنتشر فى بعض جهاته فى أقصى طرفيه فى الشرق والغرب مناطق الاملاح . أما فى برقة فتوجد أرض الكارست الجيرية التى تتفتت حين الجفاف ، وسرعان ما تصبح غير مسامية فى الهضبة والسهل الساحلى بين طوكره وبنغازى ، ويغضى الحجر الجيرى هنا بعض الصلصال من فتات الصخور ، وحين ينتشر الحصى فى شرق السهل الساحلى تصبح التربة حول شحات تربة صلصالية سوداء أو رملية سميكة . التى تغذيها النباتات أو تعدها بالمواد العضوية .

## الاقاليم الجغرافية :

١ - النطاق الساحلى الغنى فى طرابلس بين مصراته وزوارة وهو يتأثر بالبحر فى مناخه ويمتد للداخل لمسافة تقدر بنحو عشرة كيلو مترات ( أنظر شكل ١٩ ) وهو ليس نطاقا متصلا فتنتشر فى غربه المسستنقعات والمناطق الملحية والكثبان الرملية من رمال البحر البيضاء على الساحل والرمال الحمراء فى الداخل فى جهاته الوسطى والشرقية ، ولذلك فازراعة التى تقوم فى بقاع متفرقة هنا يهددها بين أونة وأخرى طغيان الرمال . وتقوم زراعة الحبوب الزيتون والجوز والموالح والخضروات بفضل خصوبة التربة وتوافر رطوبة الجو الامطار المياه الباطنية ، تنتشر فى الجهات الداخلية والشرقية شبيه الجافة طرق الزراعة الجافة .

٢ - سهل الجفارة الاوسط ويندرج فيه الساحلى ، فهو يمثل فى الواقع منطقة شبيه مستوية تغطيها حشائش الاستبس . ولا يزرع منه سوى جزء صغير تتخلله مناطق الكثبان الرملية ، ويزرع بطرق الزراعة الجافة الزيتون وأشجار الجوز والشعير .

وكلما اتجهنا نحو الغرب فى سهل الجفارة الذى يتسع فى هذا الاتجاه بعيدا عن البحر وتأثيره ، تقل الابار وتصبح الزراعة مقصورة على بقاع متفرقة حيث يزرع الشعير وبخاصة بالمقرب من جبل غريان ، أما وراء ذلك فالأرض تستخدم للرعى فحسب .

٣ - الجبل وينقسم الى قسمين ، الشرقى من الساحل حتى جبل غريان حيث يسقط نحو ٢٥ - ٣٠ سم وحيث تصبح التربة خصبة ، ولكن اذا كانت السفوح المواجهة للرياح والبحر تصلح لزراعة الزيتون وغيرها ، فانه على قيد كيلو مترات نحو الداخل يبدو الجفاف واضحا ، أما فى الجزء الغربى حيث يوجد جبل نفوسة فتقل اشجار الزيتون ويظهر الشعير حتى تسود ظروف الصحراء عند نالوت ، عند الحدود التونسية .

٤ - أما فى برقة فتوجد الهضبة المستديرة أو البيضاء المرتفعة فى الشمال حيث تنمو بعض غابات من الاشجار المعتدلة كالصنوبر والشربين والارز وبخاصة حول الوديان ، ويمتد فى جنوبها الغربى هضبة أقل مطرا

تغطيها الادغال الخفيفة ، واذا كان رأسها عند شحات فان قاعدتها تنحصر بين توكره والابيار ، وتقل فيها الامطار فى جنوبيها حتى يتعذر زراعة الشعير الا فى سهل الموج الذى يمثل حوضا يغطيه الصلصال الأحمر العميق حيث تزرع الحبوب .

٥ - هضبة منخفضة تمتد شرق درنة قليلة الامطار تقدم بها زراعة الشعير زراعة متنقلة وتعرض للرياح العنيفة ، ولذلك فهى تصلح للرى فى أكثر أجزائها واذا كانت درنة تبدو كواحة تمدها عينان بالمياه الباطنية فانه فى المنطقة الواقعة الى شرقيها توجد هذه الهضبة الجافة التى تنخفض تدريجيا حتى تصل الى صحراء مصر الغربية .

٦ - السهل الساحلى غربى درنة وهو يتسع تدريجيا من سهل سوسه الضيق حتى يصل الى توكره التى تفضى الى سهل بنغازى الذى تتوافر فيه مياه الابار الضحلة قرب الساحل ، ولو أنه قليل المطر تبدو عليه مظاهر الجفاف ، ومن الصعب حفر الابار فى طبقات الحجر الجيرى السميكة التى تبدو على السطح فى بعض الاحيان وان كان يغطيها طبقة من التربة الحمراء ويتعرض هذا السهل لعواصف من البحر ورياح الصحراء الجافة العنيفة وينتهى سهل بنغازى الى السهول الجافة التى تحيط بخليج سرت الذى يمتد على طوله نطاق يبلغ عرضه ٥٠ كيلو مترا من المراعى الخشنة .

٧ - اقليم الصحراء الذى قد ينمو فيها بعض النباتات فى الوديان عقب السيول أو يزرع القليل من الشعير وسط منطقة جافة تتعاقب فيها هضاب اللابة والبحر من الكثبان الرملية والاراضى الصخرية أو الحصوية التى تتخللها منخفضات الواحات القليلة .

٨ - فزان تتكون من ثلاث منخفضات طويلة منفصلة تحيطها الهضاب وهى وادى الشاطى فى الشمال وادى الاجال ومرزق وسبخة أو بارى فى الجنوب ، وتربتها الرملية الحبيبات خصيبة اذا توفرت المياه الباطنية التى توجد على عمق ١٥ - ٢٢ متر ، وهى أقل غزارة وقد حفرت آبارا أكثر عمقا بعد أن عثر على اثار انكسار عميق يقع على منسوب ينحصر بين ١٨٠ - ٩٥٠ متر ويزرع هنا النخيل والحبوب .

## السكان والانتاج :

قدر عدد سكان ليبيا بنحو ١١٢٢٦١ ر١ يقطن ٣ مليون فى طرابلس وأقل قليلا من ثلث مليون فى برقة ولا يتجاوز عدد سكان فزان ٣١٠٠٠ نسمة ، وقد نزح الايطاليون عن برقة وبقى منهم فى طرابلس ٤٧١٠٠ نسمة وعلى حين يبلغ عدد سكان المدن ٢٢٤٠٠٠ نسمة ، يقدر عدد سكان القرى المستقرين بنحو ٤١٦٠٠٠ نسمة وأشباه البدو بنحو ٢٤٦٠٠٠ والبدو بنحو ١٥٠٠٠ نسمة ، ويجب ان نميز فى ليبيا بين الزراعة المثقلة والمستقرة وأراضى الرعى ، ولو أنه من الصعب تحديد مناطقها .

## البتروى فى « ليبيا » :

الانتاج : ٥١٦ مليون طن ( سنة ١٩٨٣ ) .

مناطق الاستخراج ( حقول البترول ) : زلطن - البيضاء - سرير -  
آمال .

ميناء التصدير : مرسى البريقة .

عرف البترول فى ليبيا قبل الحرب العالمية الثانية ، ولكن استخراجه لم يظهر الى الوجود الا فى الستينيات .

يعد البترول ولا شك أكثر المعادن أهمية اقتصادية فى ليبيا ، ووجد البترول بكميات تجارية فى حقل زلطن سنة ١٩٥٩ على بعد ٢٠٠ ميل جنوب « بنى غازى » ويعتبر من أهم حقول ليبيا إذ ينتج بمفرده ٣٦٪ من مجموع انتاج ليبيا ، ويصل بميناء « مرسى البريقة » على خليج سريره خط أنابيب ، ويوجد فى إقليم برقه ثلاثون حقلا من أهمها حقل « السرير » وحقل « آمال » ومجموعة حقول عجيلة وتقع الى الشرق من حقل زلطن وحقل البيضاء الذى يقع جنوبى غرب حقل زلطن . والجميع تصلها خطوط الانابيب الى موانئ التصدير على الساحل ، ساحل البحر المتوسط .



## الفصل الثانى

### حوض النيل

اذا كنا قد اطلقنا على الاقاليم الطبيعية التى تضمها حوض النيل شمال شرق افريقية • ولكن هذه المنطقة من افريقية لا تشملها وحدة فهى فى الحقيقة ليست الا الاطراف الشرقية من النطاقات المناخية والنباتية التى تمتد عبر القارة من اقليم البحر المتوسط او بالاحرى اطرافه الجنوبية ، الى اقليم الصحراء الذى يمثل جزءا لا يتجزء من نطاق صحارى العالم القديم ، الى الاقليم السودانى الذى يجاوره فى الشرق لارتفاع هذه الكتلة الجبلية الضخمة المعقدة المعروفة بهضبة الحبشة - الاقليم الموسمى الذى يبدو كنوع من الشذوذ فى هذا النظام من النطاقات العرضية ، ثم الى الاقليم الاستوائى الذى يصل بنا الى أعماق القارة الافريقية ، ومن ثم - كان نهر النيل الذى يسير من الجنوب الى الشمال رابطا بين هذا الشتات من الاقليم بطوله الكبير الذى يربى على ٦٤٠٠ كيلو متر هو همزة الوصل بين هذه الاقاليم التى كفل لها نوعا من الوحدة الاقليمية تجعل هذه المنطقة جديرة بأن تسمى « افريقية النيل فالنيل الذى يمشى شاقا طريقه من وسط افريقية باطراد فريد عبر خطوط العرض المتابعة من عرض ٣٥° جنوب خط الاستواء الى ٣١° شماله يمثل فى الواقع ظاهرة جغرافية كبيرة فريدة أسبغت على هذه المنطقة صفتها الاقليمية السائدة •

وإذا كانت مساحة حوض النيل التى تبلغ نحو ٢٩٠٠٠٠٠ كم ٢ يسودها عدد كبير من الاقاليم المدارية التى يتوافر فيها الحرارة ، فان نظام المطر المتباينة تكفل التنوع بين الاقاليم المناخية التى لا تخلو من مظاهر مناخ المنطقة المعتدلة فى دلتا النيل فى أقصى الشمال وفى الجهات الجبلية التى تصل قممها الى خط الثلج لا فى قلب افريقية عند خط الاستواء وفى اعلام الحبشة البركانية فحسب ، بل وفى اطراف السودان كجبل مرة وايما تونج أيضا •

وقد كان لموقع حوض النيل مواجها لجنوب غرب آسيا الذى يتصل به لا عن طريق القرن الافريقى الذى يقابل الجزء الاوسط الجنوبي من هذا الحوض وعند اطرافه الشمالية عن طريق برزخ السويس فحسب ، بل كذلك عبر البحر الاحمر الذى كان طريقا لا ينفذ الى قلب القارة ويخترق هذا اليابس بين البحر المتوسط والمحيط الهندى . فلا غرو أن تعددت العناصر والسلالات البشرية التى وجدت متسعا لها فى أرجاء هذا الحوض ، من زنوج تباينت فى دمائهم وقوقازيين نسبة الدماء القوقازية اختلطت بدمائهم بعض الدماء الزنجية ، وقد توافرت أسباب العزلة حيننا وظروف الاختلاط حيننا آخر بين هذه العناصر ، فتطورت حضارة بعضها حتى أصبحت كحضارة المصريين القدماء من أقدم الحضارات وأعرقها وأبقاها على الزمن وجمدت حضارة البعض الاخر فظلوا يحيون حياة العصر الحجري القديم . وصفوة القول ان التباين والترابط مع تفاوت درجاته يسود الظروف الطبيعية فى حوض النيل كالمناخ والنبات والموقع الجغرافى والنسواحى البشرية كالتطور الحضارى والتاريخى والثقافى والسلالات البشرية والتطور الاقتصادى ، ويجب ألا نغفل أهمية النيل بنظامه الهيدرولوجى الذى يعد وحدة طبيعية ونشاطه كعامل من عوامل النحت بمدرجاته ووضفاه وجزائره وسواحله وجروفه ، وما يقوم به من وظيفته الطبيعية كطريق ملاحى طبيعى أو كطريق برى على طول واديه فى دراسة هذه المنطقة من أفريقية .

تمتد حدود حوض النيل جنوب بحيرة فكتوريا فى جبال أونيا مويزى عند اعلى روافد البحيرة الجنوبية ، ثم تسيير غربا حتى جبال مغمبرى البركانية التى فصلت بين حوض بحيرة كيفو وتنجانيقا من جانب وبين بحيرة أدوارد وجورج اللتين تصلانه بالنيل من جانب آخر ، وهكذا تعترض هذه الكتلة البركانية الفرع الغربى من الاخدود ، وتعتبر حدود الحوض الاخدود الى الجانب الغربى فتسير متتبعة الحافة الغربية لهذا الفرع من الاخدود ، ثم يبتعد تدريجيا عن بحر الجبل بعد بحيرة البرت متجها نحو الشمال الغربى ، ثم يتفق مع المرتفعات التى تفصل بين بحر الغزال وفروعه وبين نهر الايبانجى والويلى . ثم تتجه الحدود متتبعة مرتفعات دارفور ، ثم تبتعد هذه الحدود من نهر النيل تارة أو تقترب منه تارة أخرى تبعا لطبيعة الأرض التى قلما تنتشر بها الاودية فى شمال غرب السودان وفى الصحراء الليبية

ولكنها تقترب كثيرا من النيل فى غرب وادى النيل فى مصر ، ثم تدور حول منخفض الفيوم ليصل الى غربى الاسكندرية . أما من الناحية الشرقية فيسير متتبعا الحافة الغربية للاخدود الشرقى حتى غرب بحيرة رولف ، ثم يشق طريقه عبر هضبة الحبشة متفقا فى اتجاهه مع الحافة الغربية للاخدود ويسير على طول قمم مرتفعات البحر الاحمر ثم يعبر برزخ السويس الى سهل الطينة شرقى بورسعيد حيث كان يصب الفرع البيلوزى القديم للنيل .

وتضيق واجهة هضبة البحيرات التى تطل بها على منخفض حوض بحر الغزال ، وتمتاز التكوينات الجيولوجية فى السودان ببساطتها ، وتتألف صخور القاعدة القديمة من الصخور الجوفية النارية كالجرانيت والمتحولة عن الرسوبية كالشمسيت ثم صخور النيس والرخام وقد اختلطت بها الصخور البركانية ، وتكون جبال الجنوب فى ايماتونج واللاتوكا والدينجتانا وجبال الوسط كجبال مويبا ، وصقدي وجبل جولى أو تلال البورون والانجسنا أو جبال دارفور والنوبا فى الغرب أو جبال البحر الأحمر والاسنة الشمالية لهضبة الحبشة فى تلال القصارف - من الصخور القديمة البلورية . ولكن قد تغطى سطح هذه التكوينات مواد مفتتة ، وهى تنتشر فى أرجاء السودان فيما عدا الركن الشمالى الغربى والحوض الاوسط أو منخفض النيل الابيض والسدود حيث توجد تكوينات رسوبية أحدث تتألف من الخراسان النوبى فى الشمال والغرب ومن تكوينات أم روابه الطفلية والصلصالية فى الوسط . ويبدو أن السودان الذى كان يمثل جزءا من الكتلة الافريقية اثناء الزمن الأول قد ظل جزءا من اليابس فتعرضت جباله ومرتفعاته لعوامل التعرية حتى أصبح يمثل سهلا تحاتيا ، فلا عجب أن كانت تكوينات الزمن الأول غير ممثلة فى السودان .

ومن أهم التكوينات الرسوبية انتشارا فى شمال غرب السودان الحجر الرملى المعروف بالخراسان النوبى الذى أرسب خلال فترة طويلة ، وهو لا يقتصر على السودان وانما يغطى مساحة كبيرة من افريقية المجاورة فى الصحراء الكبرى ومصر والسودان الغربى ، وهى تكوينات رسوبية القتها مياه الانهار أو رسبت فى قيعان البحيرات ، هذه التكوينات القليلة

الحفريات التى تعرضت للتدمير قد يوجد بها جذوع بعض الاشجار المنحجرة واهمها انواع من الاشجار المخروطية مما يدل على رطوبة الجو السائد حينئذ ، هذه التكوينات الافقية الطبقات تتكون من صخور الحجر الرملى الذى قد يختلط بصخور الحجر الحديدى iron stone ويوجد أسفلها تكوينات من الرواسب الطينية والمجمعات والاحجار الطفلية التى تماسكت واكتسبت لونا لامعا لاختلاطها بالسليكا ، وتنتمى هذه التكوينات الى منتصف الزمن الثانى بوجه خاص .

ثم تليها تكوينات محدودة المساحة من صخور السليكا السوداء تسمى Hudi Chert وهى ترجع الى منتصف الزمن الثالث وتوجد فى صحراء بيوضه بوجه خاص ، وترجع أهميتها الى أنها غنية بالحفريات كما انها شديدة المقاومة ولذلك فهى تمثل القمم المستوية لكثير من الاعلام المتناثرة وسط صخور الحجر الرملى .

ثم تعرض السودان شأن كثير من جهات الحبشة وهضبة البحيرات . للنشاط البركانى المصحوب بخروج اللابة والصخور الطفحية وبخاصة البازلت أثناء الزمن الثالث ، ولكن كان نصيب السودان منها محدودا ، وعلى حين يبدو على بعض هذه البراكين القدم يظهر على البعض الآخر الجدة والحداثة ، وقد ظهرت هذه اللابة فى الشرق أيضا فى منطقة القضارف وفى الجنوب فى يوما ، وهى توجد فى جهات متناثرة تقل كلما اتجهنا شمالا ، وهى تعاصر تكوين أخدود البحر الاحمر بين عصرى الاوليغوسين والميوسين . وقد تعرض وسط السودان للهبوط فتراكمت رواسب بحرية ونهرية ، وربما كان هبوط هذه المنطقة يعزى الى ضغط هذه الرواسب السميكة التى لا تبدو على السطح الذى تغطيه طبقة من الطفل الاحمر ، وترتكز هذه الرواسب على صخور القاعدة القديمة ولكن ربما امتدت طبقات من الخرسان النوبى .

أما على شواطئ البحر الأحمر فتمتد مدرجات تتألف من الصلصال والمجمعات والحجر الجيري والجبس التى ارسبت قبل أن يرتفع اليابس بالنسبة لمستوى مياه البحر فتبدو هذه المدرجات .

وتوجد رواسب سطحية متنوعة تغطى الكثير من التكوينات الجيولوجية

واللاتريت يمثل الطقة السطحية التى تغطى مرتفعات خط تقسيم المياه بين الكونغو والنيل ، فهذه الهضبة التى تقع فى غرب المديرية الاستوائية عند أعالى روافد بحر الغزال قد تأثرت صخورها بعوامل الحرارة والرطوبة فتفككت حيناً وظلت كذلك ، أو تماسكت بعد ذلك بحيث أصبحت تمثل صخوراً حديدية حيناً آخر وقد توجد هذه التكوينات السطحية من اللاتريت شرق الخرطوم وحول أم درمان مما يدل على أن ظروف المناخ التى كانت سائدة هناك حين تكوينها كانت أكثر رطوبة من المناخ الحالى ، والواقع أن الحجر البديى اللاتريتي ينتمى الى عصرين الاول : منتصف الزمن الثالث وهو منتشر فى انحاء السودان أما الثانى فهو ينتمى للزمن الرابع حول عرض ١٠° ، أما الصلصال الذى يتراوح سمكه بين بضعة أمتار وثلاثين متراً والذى يعلو الصخور والرمال والحصى فهو يمتد فى أرجاء السودان الاوسط من الحدود الشرقية الى أعالى بحر العرب كما يصل الى قرب الحدود الجنوبية وهذا الصلصال الذى تختلط به فتات صخور الجبس والحجر الجيري يضرب الى اللون الرمادى فى الجنوب الغربى على حين يميل للون الأحمر فى الشمال والشمال الشرقى ، أما صلصال الجزيرة الذى يمتاز بقلويته وملوحته العالية فهو أكثر هذه التكوينات إنتاجاً من الناحية الاقتصادية ، وهو يرجع الى الزمن الرابع .

أما نطاق الكثبان الرملية الثانية أو القيزان فهو يمتد بين سهل الصلصال فى الشمال وجبال النوبا فى الجنوب ، والصحراء برمالها وصخورها العارية المتماسكة أو المفتتة وتمتد غرب النيل الأبيض بين الخرطوم جنوباً بقرب إقليم كوستى ، ثم يتجه هذا النطاق المكون من كثبان رملية حملتها الرياح الشمالية من فتات صخور الخراسان النوبى ، وأرسبتها من الشمال الى الجنوب نحو الغرب حتى جنوب جبل مرة وغربه ، بل ويمتد داخل تشاد ، هذه الرمال العميقة المتجانسة التى يتخللها الصلصال أحياناً قد ثبتتها النباتات كالشائش والشجيرات ، كما حمل النيل بروافده المختلفة والاقوار العديدة التى لا تتصل به وفى مقدمتها بركة والقاش رواسب الطمي الحديث التى تمثل فى السهل للنيل أو سهل الجزيرة فى النيل الأزرق دالات هذه الخيران أهم جهات السودان غنى وإنتاجاً .

## المناخ :

يقع السودان فى خطوط العرض المدارية ، ولذلك فالحرارة مرتفعة طول العام فى طول البلاد وعرضها ، ولكن المدى الحرارى الفصلى واليومية أكبر فى الشمال عنه فى الوسط والجنوب حيث تتوافر الرطوبة وتصبح الحياة النباتية أكثر غنى . وفى منلا وحلفا مثلا تصل حرارة الصيف الى  $٣٤^{\circ}\text{م}$  فى المتوسط ، أما فى الشتاء فان الصخور العارية من النباتات والسماء الصافية والهواء الجاف يسمح بنشاط الاشعاع الارضى فى الشمال فتهدب متوسط حرارة الشتاء الى  $١٥^{\circ}\text{م}$  فى حلفا و  $٢٠^{\circ}\text{م}$  فى منجلا . ولذلك فالفرق الحرارى الفصلى يبلغ  $١٨^{\circ}\text{م}$  فى الشمال على حين يصل الى  $١٤^{\circ}\text{م}$  فى الجنوب ، ولكن الظروف فى الشمال تسمح بارتفاع درجة الحرارة الكبرى أحيانا الى  $٥٢^{\circ}\text{م}$  أما النهاية الصغرى فتهدب الى  $٣^{\circ}\text{م}$  ، أما فى منجلا فى الجنوب فتتراوح النهاية العظمى والصغرى بين  $٤٣^{\circ}\text{م}$  و  $١١^{\circ}\text{م}$  .

ويسود السودان الرياح الشمالية الشرقية الجافة فى الشتاء ولكن فى الصيف تهب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الممطرة التى يصل تأثيرها الى عرض  $١٨^{\circ}$  شمالا ، ولما كان المطر الذى يبدأ فى مارس وأبريل فى الجنوب يرفع من الرطوبة فان الرطوبة النسبية تصل أذناها الى يناير فى منجلا وفى يناير فى ملكال وفى أبريل فى الخرطوم بل تتأخر الى يونيو فى وادى حلفا . ويقصر فصل المطر من الجنوب الى الشمال كما تقل غزارة الأمطار نحو الشمال ، ويتأثر المطر كذلك بطبيعة السطح ، فالجهات المرتفعة فى مناطق الاطراف أغزر مطرا من وادى النيل المنخفض ، فيبلغ طول فصل المطر تسعة أشهر فى الجنوب الغربى فى جيلو وكثيرى ، يسقط فى أثناءها  $٢٢٦٣$  ،  $١٥٣٠$  ملليمتر على التوالي ويقعان على منسوب  $١٨٠٠$  متر أكثر - على خط عرض  $٤$  شمالا ، أما فى وأو التى تقع فى جهات منخفضة الى الشمال ( الارتفاع  $٤٣٥$  مترا من سطح البحر وخط العرض  $٧^{\circ}$  ) فان فصل المطر يصبح سبعة أشهر ، يسقط فى أثناءها  $١٢٧$  ملليمترا ، أما الروصيرص التى تقع على خط عرض  $١١$  شمالا على ارتفاع  $٤٦٥$  مترا ، فانه يصيبها  $٨٠٢$  ملليمترا فى السنة أثناء فترة خمسة أشهر ، على حين لا يتجاوز شهور المطر التى لا يقل فيها ما يسقط منها فى الشهر عن خمسين ملليمترا فى

الخرطوم عن شهرين ، يسقط فيهما ١٨١ ملليمترا وهى تقع على عرض ٣٧ ١٥ وعلى ارتفاع ٣٨٠ مترا . ولا يتجاوز تأثير الرياح الموسمية خط عرض ١٨ حيث لا يسقط أكثر من ٢٥ ملليمترا فى أبو حمد . وعلى ضوء هذه العناصر المناخية يمكن أن تميز ثلاث أنواع من المناخ .

١ - شبه استوائى رطب فيه يمتد فصل المطر الى نحو تسعة أشهر بل أكثر ، كما يكثر المطر الذى يسقط غزيرا فى فترتين ، ففى نمولى يغزر المطر فى مايو ، وفى أغسطس وأكتوبر ، أما فى منجلا عند خط عرض ١١ ٥٠ فيندمج الفصلان تماما والواقع أن ظاهرة وجود قمتين للمطر غير واضحة تماما .

٢ - المنطقة ذات المناخ السودانى وهو القارى الرطب الذى يسقط فيه المطر فى الصيف ويتركز حول شهر أغسطس ، ويجنح المناخ نحو الجفاف تدريجيا حتى يصل الى عرض ١٨° الى المناخ الصحراوى بجفافه وتطرقه المناخى ومداه الحرارى الكبير .

٣ - اقليم شرق السودان على سواحل البحر الأحمر حيث يسقط القليل من مطر الشتاء كما يحدث فى بورسودان وسواكن .

**الاقاليم النباتية :** تتابع الاقاليم النباتية فى شكل نطاقات عرضية تنحى قليلا نحو الشمال فى الجزء الشرقى تحت تأثير هضبة الحبشة ، وأهمها ١ - الاقليم الصحراوى بمناطقه الشاسعة تخلو من النبات الا بعض الشجيرات المتفرقة فى الوديان على أثر سقوط السيول يمتد فى صورة نطاق جنوبا حتى خط عرض ١٩ شمالا ، وقد أدى ارتفاع الجهات الشرقية قليلا الى نمو بعض الحشائش والنباتات الشوكية ، يليه جنوبا حتى العطيرة نطاق من الشجيرات الشوكية شبه الصحراوية ويتراوح المطر هنا بين ٧٥ و ٣٠٠ ملليمتر فى العام ، والنباتات هنا لا تغطى الا مساحة ضئيلة وهى خليط من الاعشاب والحشائش الدائمة او الفصلية ، وبعض الشجيرات التى قد يبلغ ارتفاعها مترين تنتشر فى جهات تخلو فيها الأرض من النبات ، والحرائق لا تؤذّر كثيرا هنا لانها نادرة الحدوث الا فى سنوات المطر الغزير ، وتختلف هنا أنواع النباتات باختلاف نوع التربة او التكوينات السطحية .

٢ - اقليم سافانا الاحراج وهو خليط من الشجيرات أو الاشجار التى تقاوم الجفاف والنيران التى تجف فى فصل الجفاف الطويل عقب انقضاء فصل المطر الذى يتراوح بين ٣٠٠ و ١٥٠٠ ملليمتر ٠ ولا تحول الاشجار المتباعدة دون نمو بساط كثيف من الحشائش حيث يتوافر المطر ، ويمكن أن نميز اقليمين ثانويين هما : ( أ ) الاقليم القليل المطر حيث تنتشر النباتات الشوكية ، ويصبح السنط من الانواع السائدة ، وترتفع نسبة الحشائش الحولية اذا قورنت بالحشائش الدائمة ٠ ويتراوح المطر هنا بين ٣٠٠ - ٨٠٠ أو ١٠٠٠ ملليمتر ، وتختلف التربة ، وفى الجزء الشرقى الاوسط من السودان تنمو النباتات فوق تربة صلصالية منقولة قابلة للتشقق فى شكل بقع متناثرة يسود فى كل منها نوع واحد من النباتات دون الاخرى أما فى منطقة تربة القيزان الرملية فتتمو أشجار الهشاب والسنط ٠

( ب ) الاقليم الثانى فى جنوب الاقليم السابق حيث تنمو به السافانا التى تختلط بها الاشجار فى الجهات المطيرة ، وتمتد منطقة الانتقال بين خطى مطر ٨٠٠ - ١٠٠٠ ملليمتر المتساويين ، وتسود هنا الانواع ذات الاوراق العريضة تقل الانواع الشوكية ٠ وأهم مناطقها هضبة الصخور الحديدية فى مديريتى بحر الغزال والاستوائية ، وأكثر الحشائش من الانواع التى تحترق فى فصل الجفاف قبيل سقوط المطر لينمو مكانها الحشائش الغضة الحولية والاعشاب الفصليية ، وتعتبر الغابات هى النباتات التى تجد فى ظل ظروف المطر التى لا تقل عن ١٣٠٠ ملليمتر ما تحتاج اليه ، ولذلك سرعان ما تنمو اذا ما توقفت الحرائق ، وتنمو غابات الدهاليز لتحف بالمجارى المائية ، أما فى اقليم الفيضان ، فان أشجارا من نوع النخيل وأشجارا أخرى ذات أوراق عريضة وبعض الانواع الشوكية تنمو فى الجهات المرتفعة ، أما الاراضى المتوسطة الارتفاع التى تغمرها مياه الفيضان فى فصل المطر لتنحسر عنها فى وقت الجفاف ، فتنتشر بها انواع من السفانا الشوكية ، أما فى جهات المستنقعات فتتمو حشائش خضراء أهمها من نوع البردى والعنبج وأم الصوف ( أنظر شكل ٢٠ ) ٠

### اقليم السودان الجغرافية :



١ - اقليم مرتفعات البحر الأحمر : تمثل الحافة القافزة لأخدود البحر الأحمر التى تتألف من صخور أركية نارية ومتحولة ، امتد تكوينها من



الميوسين الأسفل - أن لم يكن قبل ذلك - حتى البلايوسين الأعلى ، ويحف بها سهل ساحلى يتراوح اتساعه بين ٨ - ١٦ كم تنتهى اليه الوديان والاقوار التى تأثرت فى بعض الاحيان بظواهرات الانكسارات كما يبدو فيها بعض حالات الاسر النهري .

وقد يتكون السهل الساحلى من ركام من الرمال والحصى والصلصال التى حملتها السيول ، وقد تظهر بعض الكثبان الرملية التى تنتشر فيها اثار النشاط البركانى وأكثر هذه التلال الرملية لا يزيد ارتفاعها على ٣٠ مترا .

والواقع أن المرتفعات تتكون من تلال صغيرة أو مجموعات من التلال المتباعدة فى الشمال ، وهى على العموم أقل ارتفاعا فى الشمال عنها فى الجنوب ، حيث توجد كتلة متسعة شبيهة متصلة يبلغ ارتفاعها أحيانا ٣٠٠٠ متر ، ولو أن بعض الجهات فى الشمال تبدو مرتفعة كجبل اسوتريا ، جبل أربة جنوب محمد قول ، ويرجح أنه منذ نحو ٤٠٠٠ سنة كانت هذه الجهات المرتفعة كاركويت أكثر مطرا ، تغطيها المراعى النضرة وتنتشر فى أرجائها الغدران والجداول المائية . والمناطق الجنوبية أكثر غنى من الشمالية لكثافة الضباب الذى يقبل من البحر يحمل الندى الغزير ، بل قد يسقط بعض الامطار القليلة حين يصطدم ، وتتوغل فى الداخلى فى المنطقة الجنوبية المعروفة بتلال طوكر حيث تنعقد الغيوم فى سماء الوديان وفوق قمم التلال فترة تصل الى أكثر من يوم ، فلا غرو أن أضحت هذه الجهات أكثر غنى والنباتات أكثر نضرة ، ولم تتعرض لتعرية التربة لقلّة موارد المياه ولخوف السكان من الضباب الذى فى زعمهم قد يؤثر على صحتهم ، والواقع أن السفوح والمنحدرات القريبة من جبل البحر الاحمر أقل غنى ، ان تظهر عليها مظاهر الصحراء ، وبخاصة فى الجهات الشمالية ويشبه الكتل الجبلية العالية ، مثل أرباواكويت، التى تسمى أحيانا واحات التلال وهى مثل تلال طوكر فى غناها وكثرة رطوبتها نسبيا ، فأركويت وعلبة ينهضان من البحر مباشرة دون وجود منحدرات أو سفوح تسمح بتبديد ضباب البحر الكثيف الذى تدفعه الرياح عند أركويت من الجنوب الى الشمال فى الصيف فيتراكم كثيفا ، وتقدر مساحته كتلة أركويت بنحو ٢٤ كم<sup>٢</sup> وتسودها ظروف التربة والنبات التى تشبه ما يسود الى شمالها بنحو ٣٣٠ كم فى جبل عليه ، ولكن جبلى أربة واسوتريا أقل غنى وتنتشر هنا قبائل البجة من البشاريين والهند ندوة



( خريطة رقم ٢٠ )

والأمراء وبنى عامر الى جانب بعض القبائل العربية الأخرى كالرشايدة والصدارية .

٢ - إقليم الدالات المروحية هي خور بركة والقاش : ينبع هذا الخوارن من مرتفعات أرتريا وينصرفان الى الشمال حاملين رواسب أدت الى تكوين دالات مروحية ، فدلتا القاش يمتد لمسافة ١٠٠ متر شمال بلدة كسلا ، وشمالها الغربي ، وتنحدر الارض في هذه الدلتا بنسبة ١ - ١٠٠٠ ، وفترة الفيضان لا تجاوز ثلاثة أشهر بين يوليو وسبتمبر ، ولا يكفى الفيضان الا لزراعة بـ أو بـ مساحة الدلتا اذ يتراوح فيضان النهر بين ١٤٠ و ١٢٦٠ مليون متر مكعب في العام ، والتربة هنا طفلية خصبة عميقة ، ذات قدرة على الاحتفاظ بالمياه التي تصل الى عمق ١٢ متر ، على حين توجد تربة أخرى صلصالية ثقيلة تعرف باسم « بادوب » ليست ذات قدرة كبيرة على الاحتفاظ بالمروية ، وأهم المحاصيل التي تزرع القطن الذي قد تبلغ مساحته نحو ٥٥٤٦٦ فداناً كما حدث سنة ١٩٥٣ وقد ينخفض الى ٣٦١٨٦ فداناً كما حدث سنة ١٩٥٥ ، ولكن مساحة الارض التي تروى أو تزرع تتراوح بين ٤٠ ألف و ٦٠ ألف فدان . وتقسّم أراضى الدلتا الى مربعات تسمى الفيضان، والحوض مربع الشكل يقسم الى اقسام كل منها ٤٠٠ فدان تماماً ، ويقسم كل حوض الى ٢٥ مربعا يضم ١٦٠ فداناً ويضم كل مربع منطقة تبلغ عشرة أفدنة ، ويسمى كل مربع قطعة .

أما خور بركة فهو أقل تصريفاً وأكثر تذبذباً من خور القاش ، فيضانه قد يستمر من بضع ساعات الى أربعة أيام . وتتراوح مساحته بين ٢٥٠٠٠ و ١٢٥ ألف فدان ، ومجراه كثير التغير ، ويمكن اصلاح نحو ٧٠٠٠٠ فدان منها ، ويقع الطرف الجنوبي للدلتا أو رأسها عند شدين التي تقع على منسوب ٦٠ متراً فوق سطح البحر ، وتنحدر الارض نحو الشمال بنحو ١٢ متر في كل كيلو متر ، ويقل الانحدار وتنتشر المستنقعات الملحية في الطرف الشمالي للدلتا . وتكون التربة عند رأس الدلتا من الرمال التي تتحول على بعد ١٠ كيلو متر شمال شرق شدين الى تربة صلصالية خصبة تشبه طمي النيل ، وتحمل الرياح كل عام ما يرسبه النهر لتلقيه في شكل كثبان و « ديات » في الجهات المختلفة كما يتفرع المجرى الرئيسى لخور بركة على بعد ١٠ كيلو مترات شمال شرق شدين الى فروع يتردد النهر بينها من عام لآخر .

٣ - إقليم سهل البطانة : يقع بين العظبرة والنيل الأزرق ، ويتكون من سهل فيضى ينحدر نحو الشمال الغربى ، وإذا كانت هناك تكوينات مخرسة تحف بمجرى النهر قليلة الأهمية الاقتصادية تسمى « الكرب » فإن التربة طفلية فى أكثر الجهات ، ولا يكفى المطر سوى نمو حشائش وشجيرات ترعاها الإبل والماعز .

٤ - إقليم الجزيرة : يمثل سهلا فيضيا تغطيه رواسب الصلصال السميكة وينحدر نحو الشمال والغرب تدريجيا وأن كان لا يخلو من السنة مرتفعة نسبيا أهمها اثنان : أحدهما يتجه موازيا للنيل الأزرق وقريبا منه حتى بلدة المسير ، الآخر يمتد فى الجزء الجنوبي من الأراضى التى تعرف عادة بأرض الجزيرة ، والتى تمتد شمالى سكة حديد سنار كوستى . وقد أقيم سد سنار كما أقيمت عدة طلمبات لرى أراضى مشروع الجزيرة التى تجاوزت مساحتها المليون فدان الى جانب أرض مشروع المناقل التى لا تقل عنها مساحة ، وتمتد فى الجنوب الغربى من أراضى رى مشروع الجزيرة .

٥ - منطقة تلال الانجسنا والودوك : وهى تلال من الصخور الأركية أكثر مطرا نسبيا من المناطق المجاورة لارتفاعها ، وسكانها من الزراع الزوج الذين لجأوا إليها أمام ضغط الرعاة فى الجهات المنخفضة ، وقد أجهدت تربتها الفقيرة لاستغلالها استغلالا كثيفا ، وهى تشبه فى ظروفها الاقتصادية والطبيعية ما يسود فى الجانب الآخر من النيل الأبيض فى جبال النوبا .

٦ - منطقة مرتفعات النوبا : تتكون من مجموعة من الجبال المرتفعة التى قد يصل ارتفاع بعضها الى ١٠٧٥ متر كجبل تالودى وهيبان وغيرهما ، وتتنوع التربة من تربة صلصالية قابلة للتشقق الى أخرى ثقيلة غير قابلة للتشقق وأن كان بعضها رملى مفكك ، والواقع أن السكان من الزوج من الزراع المهرة ، وقد أخذوا حين اطمأنوا يهبطون من الجبال التى أنهكت تربتها للجهات السهلية ، وتتعدد مصادر المياه من آبار عميقة ، وآبار ضحلة ، أما المياه السطحية فى الأودية فتتنصرف من الجبال للمناطق السهلية ، ولذلك فترية الجهات السهلية قد تفيد من أمطار الجهات الجبلية القريبة منها .

٧ - منطقة كردفان : وهى أقل ارتفاعا من جبال النوبا ، تنحدر نحو الشمال ، وتغطى القيزان من الكثبان الرملية الثابتة مساحة كبيرة منها ،

وتصلح لزراعة الدخن والبذور الزيتية ، ولكنها تعاني الجفاف الشديد لشدة مسامية التربة السطحية ، واختفاء المجارى المائية السطحية ، ويسود فى الركن الشمالى الغربى صخور الخراسان النوبى ، وتقل موارد المياه حتى تصبح الحياة مقصورة على مراكز العمران فى الواحات القليلة .

٨ - منطقة دارفور : وتغطى بعض الصخور الطفحية الصخور الاركية النارية والمتحولة هنا وبخاصة جبل مرة الذى توجد باعلاه بحيرتان فى فوهتى بركان ، ويجرى نهر ازوم نحو الغرب فى هذه المنطقة الغزيرة المطر نسبيا ، وتتوافر مياه الينابيع فى جوانب الجبال ، كما قد يوجد بها كثير من المستنقعات والبحيرات ، بل والمجارى الدائمة الجريان فى جبل مرة التى تنتشر الزراعة فيه على المدرجات وجوانب الوديان .

٩ - اقليم الفيضان : ويمتد فى جنوب مديرية اعلى النيل وحوض بحر الغزال ، وتؤدى قلة الانحدار وعدم مسامية التربة وعجز الانهار بضافها المنخفضة عن منع المياه من التسرب - الى غمر المياه لهذه السهول ، وتقوم الزراعة القليلة فى الجهات المرتفعة المحدودة المساحة ، وتعانى هذه المنطقة من سوء صرف المياه ، وربما يؤدى تنفيذ مشروع جونجلى الى التحكم فى مياه هذه المنطقة الى حد ما .

١٠ - اقليم هضبة الحجر الحديدى فى منطقة تقسيم المياه بين نهر الكونغو وبحر الغزال : وهى ذات تربة حمراء ضحلة قليلة الخصوبة ولكنها فى جنوبها غزيرة المطر الذى قد يصل الى نحو متر ونصف ، ويصلح لزراعة بعض النباتات الشجرية واكثر جهاتها خصوبة هى المنطقه الواقعة بين منخفض السدود الذى يتعرض للفيضان وبين الجهات المرتفعة .

١١ - اقليم المرتفعات الشرقية والجنوبية الشرقية : وهى تتكون من صخور اركية نارية ومتحولة تظهر فى جبال ايما تونج التى تقع عند حدود اوغنده ويصل ارتفاعها الى ٣١٨٧ مترا ، وتوجد بها ثلاث مستويات رئيسية هى ٣٠٠٠ ، ٢٠٠٠ - ٢٥٠٠ متر ومستوى السهل المنخفض ، وتخرقها اودية كثيرا ما تكون بطيئة الجريان فى اعلاها حيث تتكون بها المستنقعات ، ولكن ما أن تنحدر من منسوب ١٨٠٠ متر حتى تعترضها الجنادل ، والى جانبها يوجد جبال الديدنجا واللاتو كاو الديقجتانا . Didinga, Dingitana, Latuka.

وهى كلها كتل جبلية معقدة قد تغطيها اللابة كما هو الحال فى هضبة بوما التى تقع عند حدود الحبشة .

١٢ - وادى النيل : ويتفاوت اتساعه من بقعة لأخرى تفاوتاً كبيراً ، فبينما يضيق حتى يكاد يختفى فى بعض جهات النيل النوبى يتسع فى ممنطقة النيل الأبيض ويصبح مجالاً لزراعة « السلوكة » بعد انحصار مياه الفيضان ، ويبلغ اتساعه ٢ - ٣ كيلو متر على الجانبين ، بل يندمج فى منخفض السدود ولا يفصلهما فى هذه المنطقة الا ضفاف تقع بعيبدا عن مجرى النهر ، تقع الأرض المنخفضة وراءها ، تلك الأرض التى ترتفع تدريجياً جداً بعيداً عن مجرى النهر . ورغم عدم اتساع الوادى فى بعض جهاته فأهميته الاقتصادية كبيرة ، وبخاصة فى الجهات التى تعتمد فيها على الزراعة فى الشمال بل ووسط السودان .

#### مصر ( ١ )

تمثل مصر بيئة جغرافية فريدة ، إذ تقتصر منطقة السكنى وال عمران فيها على شطر محدود لا تتجاوز نسبته ٣٪ من مساحة البلاد ويتركز العمران ومظاهر الاستغلال الاقتصادي الكثيف حول النيل الذى تدين مصر الزراعية أو مصر الحامرة له بالمشء الكثير ، ومن ثم تبدو هذه المنطقة التى تعج بمظاهر الحياة النشيطة وتمثل مركز احتشاد كبير ، وقد أحيطت بحدود واضحة تماماً من الأراضى الجرداء الجافة ، فلا تدرج ولا مناطق انتقال وذلك شأن أراضى الرى فى الواحات التى لا تمثل مصر كما يعرفها التاريخ الا واحة كبيرة مثلها . ولكن لا يعنى ذلك أننا نغفل شأن الصحراء الواسعة التى تشغل أكثر مساحة البلاد ، فان لها دوراً مهماً لا فى حياة البلاد الاقتصادية بمعادنها وثروتها الحجرية فحسب ولكن كذلك فى سياسة البلاد وطبيعتها الاستراتيجية ، فكانت درعا وقى البلاد شر الغزوات فترة طويلة ، كما تخترقها طرق المواصلات التى تربطها بجيرانها فى الشرق والغرب والجنوب .

وإذ كان النيل قد وفر للانتاج الزراعى أسباب النمو والازدهار ، وكفلت الصحراء للبلاد الطمأنينة ، مما مكن للحضارة الزراعية فى مصر أن تمتاز

(١) انظر دراسات فى جغرافية مصر - القاهرة ١٩٥٧ للمؤلف ، واثنين .

بالعراقة والنمو المتصل ، فان موقع البلاد الجغرافى هو الذى لم يجعل من مصر واحة ضخمة خصيبة فحسب شأن بعض الواحات النائية فى فيافى الصحراء « بل خلق منها مركزا تاريخيا مهما من مراكز الحضارة ، كان ولا يزال ملتقى تيارات الحضارة وطرق المواصلات العالمية بين القارات المختلفة والحضارات المتباينة والبيئات المتباعدة . فكانت مهذا صالحا لقيام حضارة متقدمة نشرت ثمارها فى منطقة واسعة ، كما تلقت مظاهرها من عالمها الكبير التى لم تنقطع علاقاتها به ، حتى اذا ركبت فيها الحضارة وأرادت البلاد الانطواء على نفسها لم تتركها هذه المناطق المحيطة بها لتعكف على نفسها . وهكذا نشأت مصر كما عرفها التاريخ ثمرة تفاعل وتضافر عوامل طبيعية وبشرية معقدة تتصل حيناً بطروف بيئتها وحيناً آخر بموقعها وعلاقاتها المكانية .

#### اقسام البلاد الفسيوغرافية :

١ - الصحراء الشرقية : تقدر مساحتها بنحو ٢٢٣ الف كيلو متر مربع ، وتمتد بين البحر الأحمر وخليج السويس ووداى النيل ، وتكاد تكون والصحراء الغربية على طرفى نقيض ، فتتكون الصحراء الشرقية من سلسلة فقيرية من جبال نارية انكسارية ، ليست سوى هضاب قد قطعتها الانكسارات الطولية والعرضية الى هضيبات تميل كل واحدة منها تقع الى الجنوب من سابقتها نحو الشرق قليلا ، ولكنها تظل متوازية وموازية لساحل البحر الأحمر ، وتقع أكثر القمم المرتفعة على الجانب الشرقى من خط تقسيم المياه وهى تؤلف جزءا من الخط ، وقد ترتفع بعضها من السهل المنخفض مباشرة ، واقتراب هذا الخط من الشرق وانتشار القمم الى شرقه يعزى الى وجود انكسار طولى هبطت الأرض الواقعة شرقه ، ولم يسمح بتكوين وديان مستعرضة . وتقترب قمم جبال البحر فى سلاسلها الرئيسية من هذا البحر ، فيفصلها عن وداى النيل فى الغرب هضاب تبدو لاول وهلة امتدادا للتكوينات الواقعة الى غرب النهر ، وهذه الهضاب الشرقية قد قطعتها الأودية الجافة وخرستها فبدت ذات سطح وعر ، على حين يبدو على الغرب الانبساط والاستواء والأفاق المكشوفة . ويتراوح ارتفاع الصحراء الشرقية بين ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ متر وهى أكثر ارتفاعا من الصحراء الغربية ، ولا يعنى ذلك خلوها من الجهات المنخفضة التى تمتاز بطولها الكبير وقلتها اتساعها ، مثل السهول الذى يمتد لمسافة ٣٠٠ كيلو متر من جبال القلابة الشمالية الى

خط تقسيم المياه بالقرب من طريق قنا القصير ، وان كان عرضه لا يتجاوز ٢٠ كيلو مترا ، ثم السهل الساحلى على طول خليج السويس والسهل الكبير الذى يقع الى شمال جبال البحر الأحمر ، وربما كان تأثر مناطق هذه الصحراء وبخاصة الوسطى بالانكسارات هو الذى أدى الى ظهور سهول وجبال متوازية وموازية لجبال البحر الأحمر .

ويمتد وادى قنا الذى يعد وحده الوادى الطولى بالصحراء ، لمسافة ٢٠٠ كيلو مترا منحدرًا من الشمال الى الجنوب عكس اتجاه النيل ولكنه مواز له الى شمال هضبة الحجر الرملى التى يوجد بها السهول الرملية المتسعة وقمم الجبال مثال جبل عليه ومويلح من صخور النيس المشققة والشست ، وتمثل هذه القمم حدود حوض النيل الشرقية التى تبتعد موعلة نحو الشرق . ولذلك فالوديان الشرقية أكثر انحدارا من الغربية ، وتحجز صخور الجرانيت التى تكون السدود المياه الجوفية ، ويحيط بالجبال النارية التكوينات الرسوبية الرملية فى الغرب والشرق ، قد يتراكم الرمال والحصى فى بعض الجهات كما تحف بالساحل هنا المرجان . والمياه هنا تتوفر فى الحفر الصخرية أو القلوت وفى باطن الوديان على عمق ٨ - ١٠ متر حينما تعترضها السدود النارية ، كما تكثر الينابيع فى منطقة الحجر الرملى كإبار أبو سعفة والابرق .

أما الهضبة الجبرية فتمتد بين وادى قنا والقاهرة ، وتكون من الصخور الجيرية فى الغرب والطباشيرية فى الجنوب الغربى ، والسهول الحصوية فى الوسط والصخور الرملية فى الجنوب ، والهضبة الجيرية أكثر جفافا من الجنوبية ووديانها أكثر عمقا ، كما يتخلل هذه الوديان القيعان الصخرية .

٢ - الصحراء الغربية : تقدر مساحتها ٨٦١٠٠٠ كيلو متر مربع ، وتعد من أجف جهات العالم ، وتتألف من مجموعة من الهضاب ليست عظيمة الارتفاع إذ يقدر متوسط بنحو ٥٠٠ متر ، وقد أدى تجانس السطح وقلة الامطار الى عجز خطوط صرف المياه عن الوصول الى النيل أو البحر المتوسط على نقيض ما حدث فى الصحراء الشرقية . وقد كشفت الرياح عوامل التعرية الجافة عن الرواسب التى تغطيها لتظهر الصخور القديمة فى منطقة العوينات ، ولكن تنتشر فى أرجائها الحصى حينما والكثبان الرملية والصخور



العارية حينما آخر ، ويفضل هذه الهضاب منخفضات قد ساعدت عوامل التعرية على تكوينها واتساعها ، وهى تتسع تحت تأثير نشاط هذه العوامل كما تنحدر فجأة الى قيعانها حافات الهضاب المحيطة بها ، وأهم هذه الهضاب من الجنوب الى الشمال هى :

( أ ) هضبة الخراسان النوبى ويبدو جبل العوينات المكون من الصخور النارية فى أقصى جنوبها الغربى حيث يصل الارتفاع ١٨٠٠ متر ، يقع الى شمالها هضبة الجلف الكبير التى تتكون من الحجر الرملى ، وتنحدر نحو الشمال حتى منخفض الواحات الخارجة والداخلة الذى حفر عند التقاء تكوينات الخراسان النوبى والحجر الجيرى من العصر الكريتاسى الأعلى .

( ب ) هضبة الحجر الجيرى الايوسينى التى تنحدر نحو الشمال ، وتوجد بها عدة منخفضات تهبط دون سطح الهضبة مثل منخفضات الفيوم والقطارة والفرافرة والبحرية وسيوه .

( ج ) هضبة الحجر الجيرى الميوسينى التى تنحدر من منخفض القطارة وسيوه شمالا حتى ساحل البحر المتوسط . وأهم المنخفضات وما بها من الواحات هى :

١ - منخفض الخارجة : تقع فى الطرف الشرقى للمنخفض الكبير الذى يضم الواحات الخارجة والداخلة ، وحدود المنخفض غير واضحة فى حافته ، فيحفظها فى الغرب سلسلة رمال أبو الحاريق ، أما من الجنوب فالانتقال تدريجى من سطح الهضبة الى المنخفض ، أما فى الشرق والشمال فتوجد حافات واضحة . ويبلغ طول المنخفض ١٨٥ كيلو مترا ويتراوح عرضه بين ١٥ و ٣٠ كيلو مترا . وتتكون صخور العصر الكريتاسى من طبقات الحجر الجيرى والطبقات الصلصالية وطبقات أخرى من الحجر الجيرى . وتوجد بعض التلال التى تتفق فى اتجاهها من الشمال الى الجنوب مع اتجاه الرياح السائدة . وتوجد الآبار العميقة على عمق يتراوح بين ١٤٠ - ١٥٧ مترا التى تحفر فى الطبقات السفلى من الخراسان النوبى والتى تنحدر اليها المياه من مرتفعات أنيدى فى إقليم وادى .

٢ - منخفض الداخلة : الى غرب الخارجة بمسافة ١٢٠ كيلو مترا .

وهى أهم الواحات بحكم عدد سكانها واتساع مساحة الاراضى الصالحة للزراعة فيها ، وما ينمو بها من احراج النخيل وما تمتاز به من توافر موارد المياه فيها ، وتكون من منخفض تتخلله تلال صغيرة لا عدد لها ، وقاعها متموج يعلو تدريجيا نحو الجنوب ، وتمثل الحافة الشمالية للمنخفض حافة شديدة الانحدار .

٣ - منخفض الغرافرة : تقع على بعد ٣٠٠ كيلو متر غربى اسيوط ، تتكون من منخفض مثلث غير منتظم رأسه تتجه نحو الشمال ، ويغلب على سطح قاع المنخفض التشابه والاستواء ، الا حيث توجد تلال منخفضة مخروطية فى الغرب ، وتغطى الرمال شطرا كبيرا من جنوب وجنوب شرق المنخفض ، وتقتصر الينابيع على الجانب الغربى ، ولذلك فهى قليلة العمران ولا تسد موارد الزراعة المحدودة حاجة السكان ، ويقال أن موارد المياه فى طريق النضوب ، ويبدو أن المساحة الصالحة للزراعة كانت أكثر اتساعا .

٤ - منخفض البحيرية : منخفض ذو حافات مرتفعة بيضاوى الشكل تقدر مساحته بـ ١٨٠ كيلو متر مربع ، ويقتصر الجزء المعمور على الشمال ، ويهبط قاع المنخفض بنحو ١٠٠ متر عن سطح الهضبة ، وتنتشر به التلال المنعزلة ، ويتعرض المنخفض هنا للرمال كما تكثرت فى بقاعه البطائح والمستنقعات الملحة .

٥ - منخفض القطارة : منخفض كبير يبلغ متوسط منسوبه ٦٠ مترا تحت منسوب سطح البحر ، ويبلغ أقصى عمقه فى الجنوب الغربى نحو ١٣٤ مترا تحت مستوى سطح البحر ، والحافتان الشمالية والغربية واضحتان مرتفعتان ، ومن الصعب تحديد مساحته على وجه التحقيق لأن الانتقال من المنخفض الى الشرق والجنوب تدريجى ، فاذا اتخذنا خطا يمثل سطح البحر حدا لهذا المنخفض لأصبحت مساحته نحو ١٩٥٠٠ كم<sup>٢</sup> ، وتشغل المستنقعات الملحة والسبخات الموحلة التى تغطيها الاملاح والرمال ٢٦٪ من جملة مساحة المنخفض ، ولكن بقية اراضى المنخفض تغطيها الرمال والحصى والصلصال بل والحجر الجيرى .

كما توجد فى جنوب غرب المنخفض هضبة جيرية صلبة تغطيها طبقة ملحية شفافة اشد مقاومة من الصلصال لعوامل التعرية ، فأكثر جهات المنخفض عمقا هى مناطق تكوينات الصلصال .

٦ - منخفض سهبوه : يقع تحت سطح البحر وينحصر داخل خط كنتور صفر ويمتد لمسافة ٨٢ كيلو مترا من الشرق للغرب ، ويبلغ أقصى انخفاضه فى الشرق ، ويحف به من الشمال هضبة جييرية ميبوسينية يبلغ متوسط ارتفاعها الى ٥٠٠ متر ، ويوجد داخل المنخفض كثبان رملية ، ثم يقع خارج نطاق المنخفض الكثبان الرملية التى تمتد امتدادا عاما من الشرق الى الغرب ، أما فى الخارج من ذلك فيوجد كثبان تمثل فى الواقع جزءا من بحر الرمال ، وتنتشر المستنقعات والبحيرات فى قاع المنخفض ، كما مزقت السيل الصافة الشمالية له .

٧ - منخفض المنطرون : يمتد هذا المنخفض الذى حفرتة الرياح فى طبقات الصلصال البلايوسينية اللينة - من الشمال الغربى نحو الجنوب الشرقى على طريق القاهرة والاسكندرية الصحراوى ويبلغ عمقه ٢٣ مترا تحت منسوب سطح البحر . وتتسرب اليه المياه عند حافات المنخفض الشرقية والشمالية من النيل ، كما تتسرب المياه فى شكل ينابيع تظهر فى قاع البحيرات التى تشغل جزءا من قاع المنخفض ، وتهدد هذه البحيرات الرمال التى تسبقها الرياح ، وتتسع مساحة البحيرات على أثر فيضان النيل فى الخريف .

٨ - منخفض الفيوم : يعتبر منخفضا فريدا فى الصحراء ، لأنه اذا كان قد حفر فى الصخور الجيرية الايوسينية بما يتخللها من شرائح الطين والصلصال اللينة بواسطة الرياح شأن منخضات الواحات ، فقد تمكن من ان يتصل بالنيل ان استطاع أحد فروع النهر القديمة الذى سمي بحر يوسف فيما بعد ، أن يصل اليه فتكونت بحيرة فى قاعة تأثر مستواها بظروف المنخفض المحلية من أمطار وبخر من جهة وبملاقته بالنيل من جهة أخرى ، ويحيط ببحيرة قارون الحالية وهى البقية الباقية من البحيرة العظيمة التى كادت تشغل المنخفض من قبل مدرجات تقع على ارتفاع هى ٤٠ - ٢٤ - ٢٨ - ٢٢ - ١٨ - ١٠ - ٢ متر ، استمر منسوبها فى الهبوط تحت سطح البحر حتى بلغ ٣٦ متر تحت هذا المنسوب ، ولكن منسوب بحيرة قارون يقع دون سطح البحر بنحو ٤٥ مترا الآن . وتبلغ مساحة المنخفض نحو ١٧٠٠ كيلو متر مربع ينحدر نحو الشمال الغربى الى شواطئ بحيرة قارون .

شبه جزيرة سيناء : يمثل جنوب سيناء كتلة مندفعة تأثرت بهبوط

الأرض من حولها ، ففي الزمنين الثالث والرابع تكون خليجا العقبة والسويس ، وقد لعبت الانكسارات كذلك دورا مهما فى تشكيل السطح فى الجنوب والوسط ، أما الى شمالها هضبة التيه فتأثيرها محدود ، ويوجد اتجاهان للانكسارات السلمية أحدهما يتجه من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى موازيا لخليج السويس وقريبا من خليج العقبة ، وتنقسم سسيناء الى ثلاثة أقسام رئيسية : الشمال وهو منخفض تحفه السبخات والمستنقعات الساحلية ، كما تنتشر به الكثبان ، يليها جنوبا مناطق الجبال القبايية التى تتجه ثنياتها من غرب الجنوب الغربى الى شرق الشمال الشرقى وتحصر بينها منخفضات موازية ، وأهم الكتل الجبلية جبل مغارة الذى يتراوح ارتفاعه بين ٥٠٠ و ٧٠٠ متر وجبل يلج وجبل هلال ، بها طبقات الحجر الجيرى الايوسينى التى نحتت لتظهر الصخور الكريتاسية أسفلها ، ويقدر متوسط ارتفاعها بنحو ٨٠٠ متر تنحدر انحدارا بطيئا جدا صوب الشمال ، وتمتاز حافاتها الجنوبية المعروفة بالتية والعجمة بالارتفاع الذى قد يتجاوز ١٠٠٠ متر ، أما القسم الجنوبى فيتكون من صخور أركية ذات قمم وعرة قد قطعتها الاودية العميقة تحفها فى الشرق والغرب مجموعات من الانكسارات السلمية، وتنحدر نحو الشرق ، ولكن يمتد الى غربها سهل القاع الذى يبلغ اتساعه اكثر من ٢٠ كيلو مترا .

**الدلتا والودى :** يعتبر وادى النيل فى مصر واديا تحاتيا فى معظمه نشأ نتيجة نحت المياه لتكوينات الميوسين والبلايوسين السابقة ، وقد خلف النهر على ضفتيه مدرجات نهريية نتيجة لحركات الأرض من جهة وتغيير مستوى البحر من ناحية أخرى ، وقد يكون وادى النهر قد تأثر بحركات التوائية كما حدث فى ثنية قنا مثلا ، ويتفاوت اتساع الودى من بضع كيلو مترات فى الجنوب الى نحو ٢٥ كيلو مترا فى الشمال عند بنى سويف ، وتتركز اراضى الودى الرسوبية شمال ثنية قنا فى غرب النهر ، ويحف بالودى تكوينات متباينة من الحجر الرملى بل والصخور النارية فى جنوبه الى الصخور الجيرية الكريتاسية والايوسينية ثم تكوينات الاوليوجوسين فى الشمال .

أما الدلتا التى تمثل ما طمره النيل من خليجه القديم فتقدر مساحتها بنحو ٢٢٠٠٠ كيلو متر مربع ، ويحيط بالدلتا التى تنحدر نحو الشمال الغربى بوجه خاص عند الاطراف الشمالية مجموعة من البحيرات تمثل فى

أكثر الأحيان أطراف الدلتا التي طمرها الرواسب ، وإن كانت بحيرة المنزلة في أول الأمر أرضا يابسة هبطت على أثر تعرض هذا الجزء في القرن السادس الميلادي للاضطرابات الأرضية ، ويحف بشواطئها الكثبان الرملية كما إن فروع الدلتا القديمة قد جعلت سطحها مموجا وبخاصة في الشمال حيث لم يؤد استخدام رى الحياض الى تحويل هذا السطح الى مدرجات تهبط على شكل عتبات نحو الشمال كما حدث جنوب الدلتا . وتنحدر الدلتا من الوسط نحو الجانبين ولكن يرجح أن جانبها الغربي أكثر انخفاضا من الشرقى كما يبدو من اتجاه بحر الفرعونية القديم في وسط الدلتا من فرع دمياط الى فرع رشيد .

### المناخ :

تقع مصر في النطاق المدارى عند أطراف اقليم البحر المتوسط ، ولكن أثر البحر المتوسط محدود لانخفاض سطح الدلتا وعدم تغلغل الماء في أرجاء مصر ، ولذلك فأن المناخ القارى الجاف أو الصحراوى الحار يبدو بوضوح في نظام الحرارة في جنوب الدلتا . فإذا كان مناخ الوادى صحراويا جافا شديد التطرف حتى مصر الوسطى ، فإن بعض الاعاصير التي قد تشق طريقها في المنطقة الواقعة جنوب القاهرة تخفف من وطأة هذا المناخ ، فالرطوبة النسبية تصبح أكثر ارتفاعا ورياح الشمال السائدة الجافة في الجنوب تكون أقل انتظاما ، والغيوم والمطر أكبر قدرا منها في الجنوب ، أما في الدلتا فنجد أن كل مظاهر مناخ الصحراء تخف حدتها وبخاصة في النطاق الساحلى حيث تصبح كمية المطر الشستوى أكبر وأكثر انتظاما ، والرطوبة النسبية تصبح على شاطئ البحر أو قريبة منه مرتفعة طول العام وبخاصة في الصيف حين تبلغ أقصاها على نقيض انحاء مصر الاخرى ، لما تحمله رياح الصيف الشمالية من رطوبة البحر .

فالحرارة تهبط في الشتاء وبخاصة في ديسمبر ويناير حين تبلغ أدناها ، كما أن القرب من البحر يؤدي الى الدفاء والى صغر المدى الحرارى ، كما هو الحال في الاسكندرية ( المدى ٧٩° م ) فان الابتعاد جنوبا قريبا من مدار السرطان يؤدي الى ارتفاع النهاية الصغرى للحرارة ووضوح الفرق اليومي للحرارة ( أسوان ١٣٤° م ) ، أما في الصيف فيصل متوسط الحرارة الى أقصاها في شهر يونيو في جميع أرجاء البلاد ، الا أنه يتأخر في

الاسكندرية شأن سائر السواحل الأخرى الى أغسطس ، ولكن على حين تبلغ الحرارة العظمى فى أسوان ٣٣٫٢م° وفى طنطا ٢٦٫٥م° تصل فى الاسكندرية الى ٢٦٫٢م° ، وهكذا نجد أن تأثير البحر الذى تهب من صوبه الرياح بانتظام أوضح أثرا على الشاطئء فى الصيف عنه فى الشتاء حين تصبح الرياح مضطربة .

أما المطر الذى يقل نحو الشرق والجنوب لتوغل أعاصير الشتاء المطرة فى البلاد من هذه الناحية فسقط أكثره فى الشتاء ، ولكن الجهات الشرقية من الدلتا ومن ساحل البحر المتوسط قد يصيبها مطر غزير فى الربيع والخريف على السواء شأن الجهات الواقعة على ساحل مريوط فى الغرب ، ويتراوح ما يسقط على الجزء الشمالى الغربى من الدلتا بين ١٧٥ و ٢٠٠ ملليمتر ، أما على الساحل الواقع غربى الاسكندرية فيسقط ١٥٠ ملليمتر فى مرسى مطروح ، أما فى الساحل الشرقى فيسقط ١٥٣ ملليمترا فى رشيد و ٩٢ ملليمترا فى بورسعيد ، ويقل المطر نحو الجنوب فيصل الى ٢٦ ملليمترا فى القاهرة ويضع ملليمترات فى المنيا ، ويندر سقوطه فى أسوان ، وليس للمطر أهمية اقتصادية الا فى اقليم مريوط حيث تقوم زراعة الحبوب المتقلبة والتين والكروم ، وفى شمال سيناء حيث تقوم زراعة الكثبان الرملية من البطيخ والخضروات أو فى وديان جنوب سيناء .

**الانتاج الاقتصادى :** ينهض الاقتصاد فى مصر على أساس الزراعة التى تعتمد على مياه الرى التى تستمد كلها من النيل تقريبا ، ولذلك فالانتاج الزراعى يمثل ذلك النوع من الزراعة الذى يسود فى السهول الفيضية فى الجهات دون المدارية شبه الجافة . وقد ظلت الزراعة فى مصر حتى القرن التاسع عشر زراعة فصلية - إذ تكاد تقتصر على موسم الزراعة الشتوى على أثر رى الأرض بمياه الفيضان ، وقد تضافرت التربة الخصبة العميقة المكونة من المواد الرسوبية وانحدار الارض فى الوادى والدلتا نحو الجانبين والشمال على تيسير اتباع نظام رى الحياض ، الذى وجد فى المناخ الدافئ الممطر فى الشتاء ما يكفل النجاح لهذا النوع من الزراعة الجافة ، إذ يقل البخر ويقنع النبات فى كثير من الاحيان بما احتفظت به التربة من الرطوبة على أثر غمرها بمياه الفيضان . وقد سائر التطور فى بناء البلاد الاقتصادى من الناحية الزراعية سواء بتوسيع رقعة الارض المزروعة أو باتباع نظام كثيف للانتاج الزراعى التطور فى ضبط مياه النهر وتنظيم طرق الرى .

فحين حاولت البلاد ان تنتج غلات الصيف لم يكن هناك بد من توفير المياه اثناء الفترة الحرجة فى الصيف واخر الربيع ، فما كان الا ان عمقت القنوات لتجرى فيها المياه باطراد طول العام ، ثم اقيمت السدود والقناطر عبر القنوات ثم اقيمت القناطر الحاجزة وفى مقدمتها القناطر الخيرية . ولكن شاعت ظروف تشييدها ان تحرم البلاد من جنى ثمار هذا العمل كاملة حتى سنة ١٨٩١ حين تم اصلاحها ، ثم كان انشاء سد أسوان سنة ١٩٠٢ وتعليته سنة ١٩١٢ وسنة ١٩٣٣ يمثل طريقة اخرى لتحسين طرق الري بتوفير مياه الفيضان للاستفادة منها فى الفترة الحرجة من العام بين أبريل ويونيو . ولكن زيادة المياه التى يتطلب توزيعها فى أرجاء البلاد نوعا من الضبط لا يتيسر بدون اقامة القناطر الحاجزة كقناطر أسيوط ( ١٩٠٢ ) واسنا ١٩٠٨ ونجع حمادى . ولم تقنع البلاد بتخزين المياه داخل اراضيها ، فاقدم مشروع جبل الأولياء سنة ١٩٣٧ لتخزين ٢ مليار متر مكعب الى جانب ٢٥ مليار أصبحت تخزن امام سد أسوان بعد تعليته .

ثم خطت البلاد خطوة اخرى فى سبيل ضمان مورد من مياه النيل عاما بعد عام لتكون بمنجاة من تذبذب فيضانات النهر ، فكان التخزين القرنى أو الدائم الذى تمخض عنه انشاء السد العالى ، وبفضل هذا المشروع أمكن استصلاح ١٧ مليون فدان ، وتصويل ٧٠٠٠٠٠ فدان من الري الحوضى الى الري الدائم ، فضلا عن ضمان زراعة  $\frac{3}{4}$  مليون أرضا كل عام ، ولا شك أن توليد طاقة محرك كهربائية وتحسين نظام الصرف والملاحة فى النيل وتربية ثروة سمكية وتشجير منطقة بحيرة ناصر اعلى السد ، سوف تساعد على تطوير البلاد الاقتصادى .

ولكن العناية بالصرف بعد التوسع فى الري الدائم أصبحت ضرورة ، فاذا كان صحيحا أن العناية به لم تساير العناية بالري مما خلق مناطق تشكو سوء الصرف ، الا أن شق المصارف واقامة طلمبات الصرف أخذ ينتشر تدريجيا . وكان تأثير ذلك الانقلاب فى نظام الري ثورة فى الزراعة حاولت التوسع الافقى للارض المزروعة وتنويع الانتاج الذى أصبح يضم ثلاثة مواسم بدلا من موسم واحد تقريبا ، فالى جانب محاصيل الشتاء أصبحت هناك محاصيل الصيف والنيل أو الخريف ، فزاد حجم الانتاج سواء عن طريق زيادة الأرض الزراعية أو مساحة المحاصيل ، كما أصبح أكثر تنوعا .

فزادت مساحة الأراضى الزراعية عن ٦٧٨ر١٣ر٤ فدان سنة ١٨٨٩ الى ٠٠٠ر٦٥٨ر٥ فدان سنة ١٩١١ الى ٠٠٠ر٥٠٣ر٥ فدان ثم الى ٠٠٠ر٦١٦ر٣٧ فدان سنة ١٩٢٨ ثم الى ٠٠٠ر٩٠٠ر٥ فدان تقريبا سنة ١٩٥٨ ولكن التطور فى مساحة المحاصيل كان أكثر وضوحا .

كما زادت أهمية محاصيل الصيف كالقطن الذى بلغت نسبة مساحته ٢٢٪ من مساحة أراضى المحاصيل .

من اليسير ان نميز بين المحاصيل العامة كالذرة والبرسيم والقمح والقطن التى لا يبدو فيها التركيز الاقليمى واضحا وبين المحاصيل التجارية كالعدس والبصل والارز وقصب السكر وال فول السودانى والسهمس والحبلة والفواكه والخضروات والالبان التى تنضج فيها فالمنطقة المحيطة بالعاصمة تقل فيها أهمية القطن ليحل محله الالبان فى المنوفية ( زراعة البرسيم ) والفواكه فى القليوبية والخضروات فى الجيزة ، وتزداد أهمية القطن شمالا وبخاصة الطويل التيلة ويصحب القطن كما يحل محله تدريجيا الأرز الذى يمثل غلة تجارية ومحصولا غذائيا فى الدرجة الثانية ، أما فى أطراف الدلتا ذات التربة الرملية فى الشرقية والدقهلية والبحيرة والقليوبية فتزرع الفواكه وتزداد أهمية محاصيل بذور الزيت كالسهمس والفول السودانى ، أما فى الودادى جنوب الجيزة ، فتزداد أهمية القطن تدريجيا لتبلغ أقصاها فى المنيا التى تنضج فيها أهمية البصل ، ثم تظهر أهمية قصب السكر فى جرجا وقنا حيث تقل أهمية القطن كثيرا ، كما تقل أهمية البرسيم لتبرز الاهمية النسبية لبعض حبوب الشتاء كالفول والعدس والبصل ، ولكنها قد تقل أهميتها بعد تصميم الري الدائم أما فى الواحات فالنخيل والشعير والفواكه وبعض الخضروات وبعض البذور الزيتية شغل مساحة ٠٠٠ر٣٠ فدان .

هذا وقد تقدمت البلاد فى ميدان الصناعة وبخاصة الصناعات التى توافرت مقومات نجاحها ، وكانت الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الاولى وبخاصة بعد الغاء القيود على التعريفة الجمركية سنة ١٩٣٠ ثم أثناء الحرب العالمية الثانية والفترة التى أعقبها وبخاصة بعد العدوان على بورسعيد وصعوبة الاستيراد ومحاولة البلاد أن تنتج ما يسد حاجتها هى فترات التقدم الصناعى ، وفى مقدمة الصناعات تلك التى تقوم على القطن



سواء يحلجه أو بغزله ونسجه ، وقد قدرت قيمتها المضافة للمواد الخام بنحو ٢٨٪ من المجموع الكلى لمجموع الصناعات سنة ١٩٥٤ ، يليها الصناعات الغذائية كعصر الزيوت والغلل وصناعة الخبز والسكر وحفظ الفواكه والخضروات ، وقد نهضت الصناعات الكيماوية كصناعة الكحول والصابون والاسمدة والورق ودبغ الجلود وصناعة المستحضرات الطبية والكيماوية ، كما أن اتفاق مبالغ طائلة فى صناعة البناء قد انعش صناعات البناء وأهمها الاسمنت والزجاج والجبس والطوب والرخام وغيرها . وهى فى معظمها صناعات استهلاكية خفيفة ، ولكن أخذت البلاد فى انشاء بعض الصناعات الثقيلة أهمها صناعة الحديد والصلب والصناعات المعدنية الأخرى ، وقد اجتذبت المدن بما توفره من مميزات كتوفير المرافق العامة وأماكن السكنى ووسائل التسلية والمواصلات الميسورة والخبراء وقربها من السوق كثيرا من الصناعات ، ولذلك تعد القاهرة والاسكندرية والمناطق القريبة منهما مركزين للتوطن الصناعى ، وأن كانت هناك صناعة أخرى متقدمة فى المحلة الكبرى وكفر الزيات فضلا عن مراكز صناعات السكر فى الوجه القبلى .

وقد سائر هذا القدم الاقتصادى بل جاوزه زيادة عدد السكان الذين تضاعفوا أكثر من ثلاث مرات فى الفترة بين ١٨٨٢ و ١٩٤٧ ، إذ بلغ عددهم سنة ١٨٨٢ نحو ٦٨٠٤٠٢١ على حين قدر هذا العدد سنة ١٩٤٧ بـ ١٩٩٢١٨٤٠ ، ووصل عام ١٩٦٠ والى ٣٦٠٨٥٣٢٦ عام ١٩٧٦ والى ٤٨٢٠٥٠٤٩ عام ١٩٨٦ .

وقد تقدمت المواصلات سواء السكك الحديدية التى يقدر طولها - بـ ٥٦٥٦ كيلو مترا تملك الحكومة منها ٤٢٦٩ كيلو مترا ذات المقياس العالى ، أو الطرق الزراعية التى يبلغ طولها ٤١٧٩ كيلو مترا منها ٢٩٠٠ فقط من طرق الدرجة الاولى ، أو الطرق الملاحية التى يصل طولها الى ٤٤٥٠ كيلو مترا ، ولكن بعض الجهات لا زالت محرومة من بعض طرق النقل اليسيرة كشمال الدلتا وبعض الجهات الواقعة شرقى النيل فى الوجه القبلى .

وقد زادت نسبة سكان المدن كثيرا وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية

ان يبلغ عددهم ( ٨ مليون ) أو ٣٥٪ من السكان سنة ١٩٦٠ ، وتعد القاهرة بموقعها المتوسط فى البلاد وشهرتها التاريخية وتطورها العمرانى الحديث وكثرة عدد سكانها مقر الحكم والادارة ومركز الثقافة وعاصمة البلاد السياسية ، كما كان نشاطها التجارى والصناعى ومينائها النهري يجعل منها كبرى مدن افريقية دون منازع . أما الإسكندرية فتعد بمرفأها الطبيعى الذى يجعل منها بفضل توفر وسائل اتصالها بالداخل منفذا تجاريا مهما للبلاد يستأثر بالشرط الاكبر من تجارتها الخارجية - ثانية موانى البحر المتوسط التجارية .

## الفصل الثالث

### أثيوبيا والصومال

رغم أنه قد درج بعض الكتاب على أن يجمعوا بين السودان ومصر من ناحية - وهما يعتمدان الى حد كبير فى حياتهما على مياه النيل كما يمثل النيل ظاهرة جغرافية مهمة قد تغلغلت فى كثير من أرجائهما العامرة فقد ربطوا بين الحبشة وارتريا والمناطق الساحلية المجاورة واسعة والمعروفة بالصومال من ناحية أخرى ، وذلك فى منطقة واسعة أطلق عليها شمال شرق أفريقيا ، ولكن الحبشة بما تمتاز به مظاهر فريدة فى الحياتين النباتية والبشرية والتطور الاقتصادى والسياسى والتاريخى ، ولما يحيط بها من نطاق الاراضى الجافة نسبيا فى الشمال والغرب والجنوب والشرق على السواء ، تمثل ( جزيرة طبيعية ) ( وقلعة بشرية ) فذة فى شخصيتها الجغرافية ، مما يبرز فصلها عن بقية حوض النيل فى مصر والسودان .

الواقع أن هضبة الحبشة منعزلة بما يحفها فى الغرب من انكسارات ومنحدرات عنيفة تعرقل اتصالها بسهول السودان المجاورة الا فى نقط محدودة وبخاصة فى الجنوب الغربى وبما تعترضها من منطقة صحراوية قليلة السكان تمتد الى شمال غرب بحيرة رودلف على السواء ، وقد لعبت هذه المنطقة دورا مهما فى فصل العناصر الحامية فى الشمال عن البانثو الذين يسودون فى شرقها وجنوبها ، حتى أصبحت باتساعها الذى يبلغ نحو ١٦٠ كم أشبه بمناطق التخوم ، والواقع أن هذه المنطقة الى تفصل هضبة الحبشة عن مرتفعات شرق أفريقيا فى كينيا كانت عائقا سياسيا وثقافيا وحاجزا عنصريا هما قصر الاتصال بين الحبشة وجيرانها فى الجنوب من القبائل الرعوية على حدود ضيقة ، ورغم ارتفاع الحافة الشرقية والجنوبية وما يحف الحبشة من هذه الناحية من سهول ساحلية جافة فقد كان اتجاه الحبشة نحو الشرق واضح الأثر فى تاريخ عمرانها وحضارتها ولغاتها وأجناسها ، إذ كانت بحكم موقعها قريبا من جنوب غرب بلاد العرب أولى المناطق التى اتصلت بهذه الجهات من آسيا ، فتلقت منها أولى موجات



الهجرة من العناصر الحامية والسامية التي انتشرت فى أرجاء الهضبة ، والواقع أن من يدرس الظروف الطبيعية من بنية وتطور جيولوجى ومظاهر سطح أو البشرية من تطور ثقافى وتاريخى وسياسى وحضارى لا يلبث أن يتبين أن هذه المنطقة من أفريقية أشبه بالجزء القريب منها فى آسيا منها ببقية أنحاء أفريقية لمجاورة التي ضربت الأراضى الشاهقة الوعرة الجافة وشبه الجافة حولها نطاقا من العزلة \* وإذا كانت هناك اختلافات واضحة فى الظروف الطبيعية والبشرية بين هضبة الحبشة والمناطق المنخفضة المجاورة لها فى الشرق والشمال ، فلا شك أن التكامل الاقتصادى بين مواطن الانتاج الاقتصادى داخل الهضبة بين المنافذ الطبيعية الواقعة على السواحل والتي كانت ترتبط بمراكز الداخل بخطوط القوافل القديمة بما يبرر دراسة هاتين المنطقتين معا \*

ولا يقتصر هذا التباين والتنوع الكبير على الاختلاف الملموس بين الجهات الساحلية المجاورة فى الصومال وبين هضبة الحبشة نفسها ، بل أن هذا التباين نفسه يعتبر الطابع المميز للظروف الطبيعية والبشرية السائدة فى أرجاء الهضبة نفسها ، فالأخاديد العميقة كالفروع الشرقى من الأخدود الذى يجرى فيه نهر هواش والذى ترتفع جوانبه الى أكثر من ١٦٠٠ متر فوق سطح البحر ، وأودية الانهار السحيقة التى يبلغ عمقها أكثر من ١٥٠٠ متر تحت منسوب الهضبة ، والهضبة التى تتخللها الربى الشامخة والذرى التى تتوج هاماتها الثلوج رغم وقوعها فى الاقليم المدارى ، قد جعلت التفكك والتمزيق والعزلة بين الجهات المختلفة - أهم الظواهرات التى تميز العلاقات البشرية السائدة فى أنحاء الهضبة ، وقد امتد أثر هذا التباين فى السطح والبنية الى الحياتين النباتية والبشرية والظروف المناخية ، فتعددت عناصر السكان بين زنوج حاميين وساميين اختلطوا حيناً ولكنهم ظلوا فى عزلتهم أحيانا ، وتنوعت طرق الحياطة والحرف والنظم الاقتصادية بين الجماعات المختلفة \* وهكذا ضعف الشعور بالوحدة ، وأزكت هذه الظروف الروح الاقليمية ، فلا غرو أن كان الامبراطور ينظر الى حكام الاقاليم أو الرؤوس نظرتهم الى ملوك ليسوا دونه مقاما بكثير ، وهكذا صار التعدد والتنوع جنبا الى جنب مع العزلة والانطواء والتفكك ، فاستطاع حكام أمهرة التى تمتاز بغناها وكثرة سكانها نسبيا وتأثرها تأثرا عميقا بالحضارة

السامية ، ان تجعل الجهات المجاورة منها تدريجيا دولة تدين بالسواء لحاكم امهرة ، فمثلت النواة التى نمت حولها وحدة البلاد السياسية .

### هضبة الحيشة :

اذا نظرنا الى هضبة الحيشة بما ترضه من مظاهر البنية والسطح والنباتات والمناخ والسكان والحضارة ، تبين لنا انها تمثل هضبة معقدة نشأت نتيجة لاندفاع الارض الى أعلى مع هبوط الاراضى حولها بحيث ظهرت فى شكل هورست ، ولكنها ليست هضبة تكتونية فحسب بل تراكمية أيضا ، اذ طغى عليها البحر فى عهود متعددة ، كما خرجت الطفوح البركانية وتكوينات اللابة لتغطى مساحة كبيرة من الهضبة فتراكم بعضها على سطح الهضبة وخرج البعض الاخر من فوهات كونت جبالا بركانية بغير نظام ، كما اخذت اودية الانهار فى هذه الهضبة التى تعرضت للحركات الارضية العنيفة والاندفاعات الحديثة فى البلايستوسين - تحفر وديانا وخنادق عميقة ، كما ان الامطار الموسمية الغزيرة تنصرف فى وديان تجرى فيها انهار بلغت مياهها الى قاعدة الهضبة الاصلية على عمق ١٥٠٠ متر وربما كان التاريخ الجيولوجى لهضبة الحيشة خير ما يلقى الضوء على ما تمايز به هذه الهضبة من صفات طبيعية مميزة ويتلخص هذا التاريخ على النحو الاتى :

١ - تتكون صخور القاعدة هنا من صخور الكتلة الافريقية القديمة التى تظهر فى عدة مواضع : فهى مثلا تظهر فى أسفل التكوينات فى الحافة الغربية للاخدود الافريقى فى شرق الهضبة وجنوبها الشرقى وفى غرب الجنوب الغربى ، يليها نحو الداخل تكوينات خرسان اديجرات ثم تكوينات كلس انتالو ، أما المنطقة الثانية التى تظهر فيها الصخور البلورية القديمة من الشيست والنيس والجرانيت فهى وديان الانهار العميقة التى بلغت من العمق حدا كشف عن صخور القاعدة وبخاصة فى النيل الازرق والعبطرية ، كما تظهر هذه الصخور كذلك الى شمال وشرق الهضبة وجنوبها وغربها ، ولذلك يبدو أن تكوينات التالبة قد تراكمت فوق سطح القارة القديمة بعد ان تحولت الى سهل تحاتى ، ولا يعرف سمك هذه الصخور القديمة التى لا يزال الجزء الاكبر منها مطمورا أسفل التكوينات الحديثة .

٢ - خرسان أوجرات ٠ وهو حجر رملى ، تراكم بفعل الرياح يشبه الخرسان النوبى الذى ينتمى لآخر العصر الكريتاسى ، ولكن خراسان أوجرات أقدم منه ، إذ تكون فى العصر الترياسى اول عصور الزمن الثانى ، وهو خال من الحفريات ، وقد وجد فى الجهات التى كشفت الحركات التكتونية أو عوامل التعرية عن الصخور القديمة يها جنباً الى جنب مع صخور القاعدة الأركية ، فيوجد فى وديان الأنهار فى حافى الهضبة الشرقية والغربية للهضبة ٠

٢ - كلس أئئالو : وهى صخور جيرية طبقية بها حفريات أرسبت فى قاع بحر طغى على الهضبة فى العصر الجوراسى من الجنوب والشرق ، لأن هذه الطبقات من الجير الرمادى أو الاسمر اللون تنتشر فى وادى النيل الأزرق ولا توجد فى وادى العظيرة ، ويقدر سمك هذه التكوينات فى حوض النيل الأزرق بـ ٦٠ متراً ، ولكن فى آخر العصر الجوراسى أخذت هذه المنطقة بأكملها فى الارتفاع فانحسرت مياه البحر عن مساحة واسعة ، ولم يبق سوى بعض الجهات الشرقية مغمورة ، وقد انتهت هذه الحركة التى استمرت حتى الكريتاسى بتكوين التواء عريض صحبه هبوط سريع فى منطقة البحر الأحمر والبحر العربى ، فانتاب منطقة الحبشة اضطرابات وانتشرت الشقوق وخرجت منها فى أواسطه وأخره ( العصر الكريتاسى ) مقذوفات بركانية من البازلت التى بلغ سمكها ٧٠٠ متر ، وقد عاصر هذه الاضطرابات وما لفظته أثناءها الأرض من حمم ارساب حجر رملى يشبه الخراسان النوبى فى العصر الكريتاسى ، وقد تعرضت هذه الصخور من البازلت للتعرية فتفكك جزء منها ، كما تأثرت بالحركات الأرضية التالية من التواء وانكسار ، وتسمى طبقات البازلت القديمة باسم طبقات أشانجى ، وبعد فترة قصيرة من الهدوء النسبى فى الأيوسين عادت الاضطرابات وخرجت صخور البازلت لتغطى سطح الهضبة ، فضلاً عن صخور البازلت السابقة وتسمى تكوينات مجدالا ، وقد بلغ سمكها ٢٦٠٠ متر ، وهى أفقية ، ولابد أن هذه التكوينات من اللابة كانت أكثر انتشاراً ، فيغلب على الظن أن البازلت كان يغطى المنطقة الواقعة فى حوض ديدما والنيل الأزرق والعظيرة فنحتتها عوامل التعرية ، وبخاصة المجارى المائية ، وقد استمر الهبوط فى منطقة البحر العربى خلال الأيوسين فتكون أخدود خليج عميق كما هبطت بعض

الجهات المجاورة فى الصومال ، كما تكون اخدود البحر الاحمر وظهرت  
البراكين على جانبي هذا الاخدود .

٤ - تغطى الصخور السطحية الحديثة من البازلت والاليفين التى  
خرجت فى الزمن الرابع منذ منتصف البلايستوسين - سطح الهضبة ، وهى  
منتشرة فى منطقة الاثار عند الحافة الشرقية للهضبة ، وفى نقط متفرقة عند  
أعلى رافد الاباى الصغيرة وجنوب بحيرة تانا حيث تمثل سدا مستعرضا ،  
أو فى بعض جهات فى غرب هضبة الحبشة .

٥ - رواسب بحيرة يايا : رواسب بحيرية سميكة تمتد فى منطقة  
واسعة حول ثنية النيل الأزرق ، وبخاصة الى جنوبه والى الشرق منه ،  
وقد حفر النيل الأزرق وروافده باشيو وفنجانر ، وما بينهما من روافد عديدة  
مجارى عميقة فى هذه الرواسب ، وقد بلغت مساحة هذه البحيرة سبعة  
أمثال مساحة بحيرة تانا ، وقد تكونت هذه البحيرة حين كان سطح الهضبة  
مستويا الى حد كبير فى البلايستوسين الاسفل أى حين لم تكن بحيرة تانا  
قد تكونت بعد ، ولم يكن النيل الأزرق بشكله الحالى قد ظهر ، وقد تعرضت  
الحبشة أثناء هذا العصر لاضطرابات بركانية فخرج رماد بركانى وتكوينات  
من اللابة اختلطت برواسب البحيرة ، كما وجدت فى هذه الرواسب التى  
تتألف من الطين والرمال التى تماسك بعضها جذوع بعض أشجار تدل  
على توفر الامطار والحرارة ، ولكن فى البلايستوسين الاوسط حدث  
اضطراب اندفعت على أثره الحافة الجنوبية الشرقية من الهضبة فى  
الجانب الغربى من الاخدود بمقدار نحو ١٨٠٠ متر ، كما يدل على ذلك وجود  
رصيف قارى عند ماديجو Madjo . وهكذا انصرفت مياه بحيرة يايا  
وانحدرت هضبة الحبشة نحو الشمال الغربى والشمال والغرب ، فأخذ  
النيل الأزرق يشق طريقه خلال تكوينات بحيرة يايا فى البلايستوسين  
الاوسط ، ولذلك فن رواسب بحيرة يايا التى يبلغ سمكها أحيانا ٨٢ مترا  
توجد على مستويات متباينة لأنها تأثرت بالارتفاع كما هو واضح فى وجودها  
على مستوى ٢٧٥٠ مترا فى جنوب شرق الهضبة ، على حين عثر عليها  
على ارتفاع أقل من ذلك فى الغرب لأن أثر الارتفاع كان أقل فى الغرب  
عنه فى الشرق ، ويغلب على الظن أن مستوى بحيرة يايا كان نحو ١٧٠٠  
مترا أو ١٨٠٠ مترا أى قريبا من مستوى بحيرة تانا الحالية .



هذا ويمكن أن نقسم هضبة الحبشة والمنطقة المحيطة بها فى الجنوب الى أقسام التضاريس الاتية : ٠

١ - هضبة الصومال - جلا : تمثل فى الواقع جزءا من الهضبة الافريقية فيما عدا الجهات التى تأثرت بالحركات التكتونية فى الزمن الثالث ، ولذلك فهى فى شكلها المثلث الذى يرتكز على قاعدة يمثلها ساحل المحيط الهندى ترتفع فى الداخل نحو الشمال والشمال الغربى والغرب والجنوب ٠ وقد تأثرت الاجزاء الشرقية من هذه الهضبة عند ساحل خليج عدن بين رأس جاردفوى وبربره بانكسار أخدودى ، وذلك فاننا اذا تجاوزنا اقليم أوجادن نصل الى سلسلة جبلية يصل ارتفاعها الى ١٢٠٠ بل ١٥٠٠ متر فوق سطح البحر تسمى فى الغرب جبال أورسنجىلى وفى الشرق ميجوريتين Medjourline ٠ وتزداد هذه الهضبة ارتفاعا حيث تصل فى الشمال الغربى الى منحدرات الهضبة الوسطى التالية ، ويسود هذه المنطقة التشابه والانحدار الهين حتى لا توجد من المرتفعات قرب الساحل عند الجزء الادنى من وادى شيبىلى Ouabi Chebéli سوى بضع تلال جيرية لا يتجاوز ارتفاعها ١٥٠ مترا ، أما فى الجزء الجنوبى عند الاطراف الغربية للهضبة فلا تبدو الحافة مرتفعة اذ تهبط الارض تدريجيا بين اقليم بورانا ومنخفض بحيرة توركانا ٠ وتنتشر فى أرجاء الهضبة الكير من المنخفضات بعضها كانت تشغله بحيرات ومستنقعات وبعضها الاخر يمثل وديان الانهار، فالمجارى المائية التى تمتلأ عقب الامطار القليلة فى الشمال الشرقى تحمل الحصى والرمال فى قيعانها الضحلة ومجاريها التى لا تبدو واضحة محدودة المعالم ، أما فى الجنوب والوسط فالانهار كنهر أبى شيبىلى وجوبا بروافده الثلاثة تنحرف بالقرب من مصبها فى السهل الساحلى ، مما يدل على أن تغيير مستوى انصبابها كان حديثا ، ولم تستطع الانهار أن تبلغ مرحلة النضوج والتوازن الا بصعوبة ، وكانت هنا بحيرة تمتد هى اعلى نهر جوبا ، كما يوجد مستنقعات تسمى مستنقعات لوريان تعترض نهر Lorian Guasso Nyiro فى الجنوب ، والواقع أن ما يظهر من المنخفضات التى تتراكم فيها الاملاح فى منطقة أوجادن التى كانت مركزا مهما من مراكز استخراج الملح ليست الا بحيرات للمياه المالحة جفت حديثا ٠

٢ - الهضبة الوسطى : تمتد هذه المنطقة بين الهضبة السابقة وبين الفرع الشرقى من الاخدود الذى يمتد من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى ، ففي الطرف الشمالى الشرقى تنحدر الارض ببطء وبخاصة فى السفوح السفلى حتى منسوب ١٢٠٠ متر لترتفع فجأة الى منسوب ٣٠٠٠ متر ، والى جانب الهضاب البازلتية بوكيه Boke وديدا Didda يوجد منخفض تغطيه تكوينات الزمن الثانى من الرواسب الجيرية والرملية تشرف عليه مدينة هرر ، وتطل حافة هذه المنطقة الشمالية الشرقية على الاخدود الافريقى الشرقى فى شكل حائط مرتفع شبه متصل ، أما فى الجنوب الغربى فيتنوع مظاهر السطح وتصبح أقل امتدادا واتصالا ، فالى جانب غطاءات اللابة وهضاب البازلت توجد الكتل الجبلية المتفرقة المنعزلة والقمم المتناثرة والاحواض ، وتبدو البراكين وقد ظهرت فوق رواسب الزمن الثانى مباشرة ولذلك يرجح أنها تمثل طرف المنطقة التى تعرضت لخروج البازلت من باطن الارض فى الاتجاه الجنوبى الشرقى .

وتجرى روافد جوبا الاعلى ووبى شيبلى فى خنادق ضيقة فى داخل الهضبة الوسطى ، ومن ثم تختلف فى مظاهرها عن الاجزاء الدنيا الوسطى من وديان هذه الانهار التى تبدو ضحلة .

٣ - الاخدود الشرقى : تشرف الهضبة الوسطى فى الغرب والشمال على امتداد الفرع الشرقى من الاخدود الذى يختلف فى اتساعه وعمقه وطبيعة الحافة التى تفصله عن المناطق المرتفعة المجاورة من جهة لأخرى لمسافة ١٢ بين خطى عرض ٢ ، ١٥ شمالا ، ففي الجنوب نجد أن الاخدود يمثل حوضا متسعا قليل الارتفاع ، فمنسوب بحيرة توركانا رودلف ٤١٠ مترا ، ويحيط بهذا الجزء من الاخدود مناطق قليلة الارتفاع تمتد شرق بحيرة رودلف باسم بورانا وفى غربها باسم توركانا ، ويقسم الاخدود الى شمال بحيرة توركانا (رودلف) وبالقرب من بحيرة ستيفاتى الى فرعين الاول ويتجه نحو الشمال الشرقى ويمثل الاخدود الرئيسى والثانى ويتجه بين أعالى السويات وبين منطقة توركانا حيث كانت توجد بحيرة متسعة جفت ولم يبق منها الا مستنقعات ، أما الجزء الثانى من الاخدود فينحصر بين عرضى ٦ و ١٠ ، ويمتاز بارتفاع قاعه وحافته كثيرا ، فقاعه عند بحيرة مامو يقع على ارتفاع

١١٥٩ مترا فوق سطح البحر ، وعند بحيرة زواى فى الوسط يصل الى ١٨٠٠ متر ، على حين يبلغ فى شماليه عند وادى هواش الأوسط نحو ٨٠٠ متر ، أما ارتفاع الهضاب التى تحف الأخدود فتصل الى ٢٦٠٠ - ٣٩٠٠ متر ، وهكذا تهبط الارض بمقدار ١٤٥٠ - ٢٤٥٠ مترا بين حافة الأخدود وقاعه . ولذلك فإن الأخدود هنا يتخذ شكلا واضحا كما تنتشر فى قاعه مجموعة كبيرة من البحيرات والبراكين وينابيع المياه الحارة وغيرها من مظاهر النشاط البركانى وخاصة حين يتصل الأخدود بسهولة العفر ، ويمتد الأخدود فى سهل العفر بين ساحل البحر الاحمر حتى حافة الهضبة التى يبلغ متوسط ارتفاعها نحو ٣٠٠٠ متر أو أكثر ، وتكثر فى قاع هذا المنخفض البراكين وطفوح اللابة وغيرها من مظاهر النشاط البركانى الحديث ، ويلتقى هنا فرعان للأخدود الفرع العدننى الذى يحتله خليج عدن وهو يتجه من الشرق الى الغرب والأخدود الذى يقع فى قاعه البحر الاحمر ويتجه من الجنوب الى الشمال بوجه عام ، وتكثر المستنقعات والسبخات المألحة والمنخفضات ويوجد فى شمال سهول الدناقل منخفض كوبر *Kobar* الذى يقع دون سطح البحر ، وهو حوض انكسارى ، على حين تمتد حافة انكسارية قافزة توازى أخدود البحر الأحمر تدعى جبال « الب العفر » ، أما الأخدود فى منطقة ارتريا فيوجد به منخفض الملح الذى يقع أسفل منسوب سطح البحر بنحو ١٢٠ مترا ، وتهبط حافة هضبة تيجرة الواقعة للشمال فجأة من مسـتواها الذى يقع على ارتفاع ٣٢٠٠ متر ، وتظل ظاهرات النشاط البركانى الحديثة واضحة على تباين مظاهرها فى هذه المنطقة . ويضيق السهل الساحلى وتغطى مياه البحر الاحمر الشطر الأكبر من قاع الأخدود الى الشمال من ميناء مصوع .

٤ - هضبة أثيوبيا : هذه هى الهضبة الحبشية التى تخطر بذهننا لأول وهلة حين نذكر هذا الاسم ، تبدو كالقلعة صعبة المرتقى ، حافتها الشرقية التى تمثل حائطا مرتفعا قلما تشقه وديان يقدر ارتفاعها ٢٠٠٠ - ٣٠٠٠ متر ، أما فى الركن الجنوبى الشرقى فهى أقل وعورة ، ولو أنه من الصعب ولوج الهضبة من هذه الجهة ، إذ لا بد أن يصعد الانسان فى مسافة بضع كيلو مترات نحو ١٠٠٠ - ١٥٠٠ متر ، أما صوب الجنوب فالانحدار يصبح أكثر تدرجا وحافة الهضبة تبدو وقد قطعها الانهار كنهر أومو ، كما يصبح من الميسور اختراقها فى اتجاه اقليم كافا فى الجنوب الغربى ، أما

فى الجانب الغربى فان انحدار الهضبة يصبح نحو الشمال الغربى الذى ادى الى تصريف مياهها عن طريق النيل الأزرق والعطبرة فى هذا الاتجاه قد يسر الانتقال نسبيا بين السودان والحبشة ، ولو أن اقتحام هضبة الحبشة من الغرب يقتضى الارتقاء بمقدار ٨٠٠ متر على الاقل ، وتمتد هذه الهضبة نحو ١٣° من درجات العرض ولذلك فهى تختلف فى ارتفاعها ومظاهر السطح فيها من جهة لأخرى ، ويبدو على الحافة الغربية أنها حافة تحتية تراكمية تكونت نتيجة لتراكم المواد البركانية فى بعض الجهات وللتحات فى بعض الجهات الأخرى ، فبين العطبرة والنيل الأزرق يمتد تجويف كبير على هيئة قوس يتجه نحو الهضبة أى الى الشرق ، كما أن السوياط قد نحت واديه فى داخل الهضبة ، وتنتشر الكتل البركانية فى حوض النيل الأزرق والعطبرة ، على عكس السوياط ، ولذلك فقد تأثر هذان النهران فى اتجاههما بما اعترض مجاريهما من الجبال البركانية وأهمها جبل بواهيت Buahit ورأس داشان فى منطقة سيمين فى الشمال بين نهر تكازى وبحر السلام فرعى العطبرة ، أما النيل الأزرق فيحف به فى ثنيته جبال أمبافريت وكولو وجيمن فى الشرق خارج ثنيته ، وتشوكى وأميداميت داخل الثنية قريبا من منابع باى الأعلى ، أما فى الجنوب الغربى والجنوب فتكثر الكتل الجبلية المنعزلة مما يخلق على هذه المنطقة التعقيد والتنوع .

### المناخ :

تعد الحبشة اقليما فريدا فى مظاهره الطبيعية والبشرية يختلف عما يحيط به من الاقاليم ، بحيث يبدو كجزيرة قائمة وسط محيط يغايرها تماما ، كما أنها تضم بين أرجائها المتباعدة تنوعا شديدا ، فهى بحكم موقعها الجغرافى بين خطى ٤ ، ١٨ تعد فى المنطقة المدارية ، ولكن ظروف الضغط المحلى والارتفاع عن منسوب البحر من العوامل التى عدلت هذا المناخ كما يحدده خط العرض ، فالحبشة تقع فى الطرفين الشمالى والشرقى الاقصى بالنسبة لمنطقة يسودها نظام المناخ الموسمى ، كما أنها تقع الى الشرق من مركز الضغط المنخفض فى وادى النيل الاوسط والاعلى فى شهرى ابريل ومايو ، وهكذا تهب عليها رياح شمالية من خليج عدن وجنوبية من المحيط الهندى ، فتسقط المطر فى الجانب الشرقى من الهضبة ومنطقة الاخدود ، ثم يلى ذلك فترة تصبح الرياح مضطربة متغيرة اذ يندمج هذا المركز من مراكز الضغط المنخفض مع الضغط المنخفض فى غرب آسيا ، فلا غرو اذا أن يقلل

المطر حتى يحدث فترة جفاف نسبي بين مطر الشتاء والربيع الذى بلغ أقصاه فى مارس وبخاصة فى شرق الحبشة واقليم بحيرة تانا وبين فصل المطر الصيفى الذى يبدأ فجأة فى منتصف شهر مايو . هذه الفترة الجافة نسبيا تقع فى أواخر مايو وأوائل يونيو فى العادة . ويطول فصل المطر فى الجنوب عنه فى الشمال حيث يمتد من شهر أبريل أو مايو حتى أواسط أو نهاية أكتوبر ، وقد يسقط المطر فى أية فترة وذلك بسبب هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية ، التى تهب من ساحل غانة والمحيط الاطلسى لتمر فوق غابات الكنغر ومستنقعات السدود ، فيزهمر المطر الغزير أثناء موسم هبوبها الذى يمتد من منتصف يونيو الى منتصف سبتمبر .

ولكن ما أن ينقضى هذا الفصل حتى تهب الرياح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة نحو مركز الضغط المنخفض فى وسط القارة وجنوبها أثناء الفترة بين سبتمبر وفبراير ، ويسقط حينئذ القليل من المطر جنوب الحبشة وشرقها . ولكن لطبيعة هضبة الحبشة المعقدة تأثير كبير فى توزيع المطر ، فلولا هذا الارتفاع لما سقط من المطر ما يفوق المتر فى العام فى جهات واسعة ، وفى إقليم الاخدود يقل المطر وبخاصة فى الشمال ، فبينما يبلغ ٥٨٥ ملليمترا فى اداى تولو Adami 'Tullo على شواطئ بحيرة زفائى حيث تسقط فى ٧٨ يوما ، يبلغ ٢٠٠ - ٤٠٠ ملليمتر فى الطرف الشمالى الشرقى ، ويقل المطر نحو الشرق والجنوب حتى يبلغ ٢٥٠ ملليمترا بل دون ذلك فى أوجادين ، ويسقط هذا بين مارس وسبتمبر ويمكن أن نميز موسمين للمطر يتفقان مع مواسم هبوب الرياح فصل جاف أقل وضوحا من فصل الجفاف الرئيسى بين ديسمبر وفبراير .

أما فى الهضبة الوسطى فيوجد فصلان ممطران . الأول وهو فصل الامطار الموسمية الشتوية قصير ومطره قليل ، يظهر بوضوح فى السفوح الشرقية . إذ يعتبر نظام المطر الشتوى امتدادا للامطار التى تصيب السهل الساحلى فى أريتريا حيث يكثر الضباب والندى بل تبلغ نسبة ما يسقط أثناء هذا الموسم فى الشتاء نحو ١٥٪ بين شهرى أكتوبر ومارس ، ويقل المطر بوضوح فى مايو ويونيو شمال الهضبة مما يبرر تقسيم السنة الى فصلين البلج « Belg » فى أبريل ومايو ، « كيريمت » Kerremite بين منتصف يونيو ومنتصف سبتمبر حين يسقط فيه نحو ٨٠٪ من كمية الأمطار ، أما هذا التقسيم فلا يظهر فى الجنوب الغربى حيث يمتد فصل المطر


لفترة طويلة ، ويسقط المطر الغزير فى عواصف راعدة تكثر بالليل فى السفوح المتوسطة ، كما يغزر انهار البرد فى القمم العالية ، ويصحب سقوط المطر هبوب الزوايع العنيفة وحدوث الاضطرابات الكهربائية ، وبينما يسقط فى عدوه ٨٤٠ ملليمترا يصيب غندار ١٢٤٠ ملليمترا واديس أبابا ١٢٧٠ ملليمترا وجما ١٥٢٠ ملليمترا ، وجما ١٥٢٠ ملليمترا ، ويزداد المطر غزارة كلما اتجهنا نحو الجنوب وبخاصة جورى Goró التى يقدر متوسط المطر السنوى فيها بنحو ١٨٠٠ ملليمتر، أما سهل الدناقل فلا يصيبه أكثر من ١٠ ملليمترات حيث يفصل نهر هواش بين سهل عفر المجذب الساحل فى الشمال وسهول أوسا Aussa التى ينمو فيه لقليل من النبات فى الجنوب، أما السهول الغربية فان نظام سقوط المطر يشبه ما يسود الهضبة ، ولو أن مقدار الامطار أقل ، كما يبدو تركيز سقوط المطر أثناء موسم الامطار الصيفية ، فيسقط فى القلابات ٨٦٤ ملليمترا فى ٩١ يوما وفى كرموك ٩٦٥ فى ٩٦ يوما و ١٢٧٠ ملليمتر فى جامبيلا فى ١٠٣ يوما ، ويقتصر سقوط المطر على اشهر الصيف فى الشمال الغربى فى Kaffa وجما .

### الحرارة :

تنخفض درجة الحرارة فى هذه المنطقة المدارية على منحدرات الجبال حتى تصل الى درجة التجمد فى القمم العالية حيث يتراكم الجليد طول العام، كما أن غزارة المطر تخفف من شدة الحرارة أثناء الصيف ، ولذلك فان النهاية الكبرى للحرارة تقع قبل سقوط المطر فيما بين مارس ومايو وبخاصة فى أبريل ومايو . أما النهاية الصغرى فتحدث بين نوفمبر ويناير . كما يلاحظ أن المدى الحرارى الفصلى محدود ، فهو فى اديس أبابا لا يتجاوز أربع درجات وفى جما نحو ثلاثة وفى هرر درجتين ، وأما المدى الحرارى اليومى فهو أكثر وضوحا فى فصل الجفاف .

أما فى المنطقة الساحلية بالقرب من خليج عدن وساحل البحر الأحمر فان الحرارة تتعرض للارتفاع إذ لا تهبط أثناء يونيو ويوليو وأغسطس عن ٢٣ ، وذلك لظهور أثر اليايس بوضوح فى توزيع الحرارة ، وأن كان المدى الحرارى اليومى والسنوى محدود ، أما الى الداخل قليلا فالمناخ يصبح أكثر قارية والمدى الحرارى اليومى وبخاصة فى الشتاء أكثر وضوحا شأن الجهات الصحراوية ، ويعظم المدى الحرارى اليومى والسنوى فى الجهات

### الأقاليم النباتية في الحبشة والصومال



- ١ - حزام سهو الصحراء
- ٢ - أرمال وشجيرات دات والحمامية
- ٣ - سافانا
- ٤ - سافانا شاسية
- ٥ - نبات مساوية الكتان
- ٦ - زراعات
- ٧ - زراعات
- ٨ - زراعات
- ٩ - زراعات
- ١٠ - زراعات
- ١١ - زراعات
- ١٢ - زراعات
- ١٣ - زراعات
- ١٤ - زراعات
- ١٥ - زراعات
- ١٦ - زراعات
- ١٧ - زراعات
- ١٨ - زراعات
- ١٩ - زراعات
- ٢٠ - زراعات
- ٢١ - زراعات
- ٢٢ - زراعات
- ٢٣ - زراعات
- ٢٤ - زراعات
- ٢٥ - زراعات
- ٢٦ - زراعات
- ٢٧ - زراعات
- ٢٨ - زراعات
- ٢٩ - زراعات
- ٣٠ - زراعات

( خريطة رقم ٢٢ )

الجافة وشبه الجافة عند الأطراف الشمالية والشمالية الغربية للهضبة الشمالية ، وعلى أطراف السودان في الغرب وفي سهول الدناقل واقليم أوجادن في همر ، فقد تصل النهاية الكبرى للحرارة في سيدامو الى ٤٠ وفي أوجادن الى ٤٥ والى ٤٩ في الدناقل .

وقد ألف السكان في الحبشة أن يميزوا ثلاثة أقاليم مناخية يختلف مناخها تبعا لارتفاعها كما يرتبط كما منها بنباتات معينة هي :

١ - إقليم القلة الحار Kolla : يقع هذا الإقليم في المناطق المنخفضة في الشرق كإقليم سيدامو وسهل الدناقل وواى هواش وإقليم أوجادن ، فضلا عن سهل السودان في الغرب والوديان المنخفضة في داخل الهضبة . ويمتد هذا الإقليم أسفل ٢٠٠٠ - ١٨٠٠ - ١٦٠٠ متر في السفوح السفلى حيث تنمو نباتات التمر هندي والغار واليورفوربيا ، وقد تتكاثر هذه النباتات التي تصبح اجاما كثيفة ، أما المحاصيل هنا فمتنوعة إذ تشمل الذرة والطباق وقصب السكر والبن ويتراوح متوسط الحرارة بين ٢٠ -

٢٨ م ، وتختلط هنا النباتات المدارية المطيرة كالنباتات المتسلقة والطفيلية والمطاط والموز ونباتات تتحمل الجفاف وبخاصة فى الشرق مثل السنط والدوم والباوباب وغيرها .

٢ - إقليم الويناديجا Weyna Dega وهو إقليم الهضبة ، ويضم أكثر جهات الحبشة العامرة ، وتنمو به الغابات الكثيفة من الخيزران والانواع البقولية من السنط والثين والصنوبر المحلى ، كما تنمو المراعى التى تكثر بها الاركيد والسلفيا *Sylvia* وأشجار البن البرى فى الجنوب الغربى وبخاصة فى كافا ، وتزرع المحاصيل المعتدلة مثل الشعير والقمح والبسلة والكتان ، كما تنمو النباتات شبه المدارية أيضا فى السفوح السفلى من هذه المنطقة .

ويتراوح ارتفاع هذه المنطقة بين ١٨٠٠ - ٢٠٠٠ متر و ٢٤٥٠ - ٢٦٠٠ متر كما تقدر متوسط الحرارة بـ ١٦ - ٢٠ م .

٣ - إقليم الديوجا Dega وهو الاقليم المعتدل البارد الذى تقدر الحرارة فيه بـ ١٠ - ٩٠ ويمتد على منسوب يعلو عن ٢٤٥٠ مترا ، ويعد منطقة رعى ولكن تنمو به الاشجار المخروطية والنفضية ويزرع القمح والفلو، فيزرع القمح بين ٢٠٠٠ متر و ٣٠٠٠ متر ويزرع القمح اللين الذى يقال انه اشد مقاومة لبرودة فى السفوح التى تقع أعلى المنحدرات التى يزرع عليها القمح الصلب ، أما الذرة فلا يزرع الا قليلا وان كان يزرع أحيانا على ارتفاع ٣٠٠٠ متر ، أما الشعير والكتان والبطاطس والعدس والخضروات فتزرع على ارتفاع ٣٢٠٠ مترا عادة .

وينمو الزيتون البرى وأشجار العرعار بين ارتفاع ٢٣٠٠ - ٣٦٠٠ متر ، وقبل أن نتناول الاقاليم النباتية بالدراسة نعرض لتقسيم الحبشة الى اقاليمها المناخية .

١ - هضبة الحبشة : تنخفض فيها الحرارة اذا قورنت بجهات شمال شرق افريقية الاخرى ، وان كانت الوديان العميقة التى تشق طريقها فى الهضبة تمتاز بمناخ حار رطب مزهق ، والمطر هنا غزير يسقط أكثره فى الصيف .



٢ - الهضبة الشرقية والجنوبية الشرقية وتضم هرر : والمطر أقل مقدارا من الاقليم السابق ، كما أن الحرارة أكثر ارتفاعا لانخفاض هذه المنطقة نسبيا اذا قورنت بالسابقة ، ولكن الوديان المتسعة التي لا يبلغ انخفاضها مبلغ وديان الحبشة تعد أقل حرارة .

٣ - الهضاب الداخلية المنخفضة نسبيا وهي أقل مطرا ومناخها أكثر تطرفا من الاقليم السابق ان لا يتجاوز مطرها ٣٧ سم .

٤ - اقليم ساحل الصومال الايطالى وهو أكثر جفافا وتطرقا من السابق .

٥ - اقليم ساحل البحر الأحمر وساحل خليج عدن وهو أشد تطرفا وجفافا من 'الاقليمين السابقين فلا يتجاوز مقدار المطر ١٢٥ سم ، بل لايزيد المطر الذى تحمله رياح الشمال الشرقى فى الشتاء عن نصف المقدار فى زيلع .

#### الاقاليم النباتية :

١ - الغابات الموسمية فى غرب هضبة الحبشة ، ورغم تفاوتها فى الغنى والكثافة فهى تميل للكثافة نحو الجنوب .

٢ - اقليم سافانا الغابات وينتشر فى بقية هضبة الحبشة ، وبخاصة فى الاطراف الغربية والشمالية الغربية من اقليم الهضبة الشرقية ( هرر ) على ارتفاع ٢٠٠٠ - ٢٥٠٠ متر .


٣ - اقليم السافانا التى تقل كثافتها من الهضاب المرتفعة الواقعة فى الشرق والجنوب الشرقى ، اذ يقل المطر حتى تتدرج الاستبس الى شبه الصحراء والصحراء فى الهضاب المنخفضة والجهات السهلية فى عفر والصومال وشرق أوجادين والمنطقة الممتدة حول رودلف .

وتنمو غابات اقليم القلة فى المنحدرات السفلى التى يتجنبها السكان لرطوبتها وحرارتها الشديدة لينتشرها فى اقليم الويناديجا حيث الحرارة معتدلة والامطار الموزعة توزيعا حسنا يمكن الاعتماد عليها ، ويشغل أكثر السكان بالزراعة فى الاقليم الجنوبى حيث المطر متوفر وبخاصة فى الغرب

الذى يعد لسوء حظ الحبشة صعب الاتصال بالخارج سواء عن طريق موانئ خليج عدن أو الصومال أو ساحل البحر الأحمر ، أما فى الشمال حيث يقل المطر ويسود جفاف تدريجى فالسكان ينزعون لممارسة الرعى .

**الانتاج الاقتصادى :** تعد الزراعة عماد الاقتصاد كما يبدو من أن ٧٢٪ من قيمة الصادرات تتألف من الغلات الزراعية ، الى جانب نحو ٢٦٪

### الأقاليم المناخية فى الحبشة والصومال



١- منطقة الساحل والصومال  
الإيطالى سابقا

١- كثلة الهضبة الحبشية  
٢- كثلة جبلية جنوب شرق الأندلس  
مثل هونج  
٣- الهضاب الفخارية المنخفضة نسبياً

( خريطة رقم ٢١ )

من المحاصيل التى تتصل بالزراعة ، ويستغل ٩٪ من مساحة الأراضى لزراعة المحاصيل ، على حين تمثل المراعى ٣٠٪ من المساحة . وتقتصر الزراعة فى الشرق الجاف على مناطق الرى ، وتخصص المزارع نسبة كبيرة من مساحتها لزراعة الحبوب وذلك داخل الهضبة . وتواجه الزراعة فى الحبشة كثيراً من الصعاب الطبيعية : مثل السطح ووعورته وعدم امتداد مساحات واسعة مستوية صالحة لزراعة ، مما يؤدى الى تنوع الانتاج الزراعى وتوزعه فى مساحات صغيرة ، بل ان ارتفاع سطح الهضبة عن منسوب الوديان التى


تشق طريقها عميقا فى وسط الهضبة يفرض عليها العزلة ، ولذلك فان الاكتفاء الذاتى يعد من أهم المظاهر المميزة للزراعة فى الحبشة . كذلك فان انهمار الامطار الغزيرة التى تكتسح التربة تهدد المنحدرات الوعرة بوجه خاص بتعرية تربتها ، ويكفى أن نذكر أن نسبة الطمي العالق فى مياه فيضان نهر هواش تقدر ١٥ر٠٠٠ جزء فى المليون ، وقد لجأ السكان فى بعض الاحيان الى الزراعة على طول خطوط الكنتور واقامة مدرجات على سفوح التلال ، وزراعة الغلات المتنوعة وترك جانبا من الحقل بورا لتنمو فيه الحشائش للمحافظة على تماسك التربة . والتربة خصبة وبخاصة السوداء الثقيلة فى الجهات المستوية فى الوديان والسهول ، وهى حمضية غنية بالفوسفور والمغنسيوم والبوتاسيوم وتحتفظ بالرطوبة مما يجعلها صالحة لزراعة المحاصيل المتأخرة ، أما التربة الحمراء الرقيقة على المنحدرات وهى أقل خصوبة وتكثر التربة الملحية والقلوية والخشنة التركيب فى الجهات الشرقية الجافة ، أما عند الحدود السودانية فهى تربة صلصالية تصلح لزراعة القطن بصفة خاصة .

وأهم الحبوب التيف Teff وهو نوع من الحبوب الغذائية الذى يعد أهم الحبوب التى تستخدم فى صناعة الخبز للاستهلاك البشرى فى اثيوبيا ، وان كان يستخدم علفا للحيوان فى بعض جهات زراعته الأخرى فى الهند واستراليا ، وهو واسع الانتشار اذ يزرع فى الحبشة فى ظل ظروف مناخية متباينة ، فهو يزرع على المنحدرات بين ١٧٠٠ و ٣٠٠ متر ، كما يزرع فى الجهات ذات موسم المطر القصير ، أما الذرة الرفيعة فيزرع منها أنواع متعددة يستخدم بعضها علفا والأخرى لصناعة السكر ، ولكن الذرة الرفيعة التى يستهلكها الانسان فى غذائه من أهم الحبوب فى اثيوبيا ، وهى تزرع فى الوديان والسفوح المتوسطة على ارتفاع ٢٥٩٠ مترا ، وهو شديد الاحتمال كما أنه غزير الانتاج ، ومن أهم المناطق التى توجد بها جنوب Mieso ، وبالقرب من هرر وفى الجهات المنخفضة بالقرب من ديسى ، وكما يزرع فى ارتريا يزرع أيضا فى سهل الاماتا Alamata ويتراوح المطر فى هذه الجهات التى توجد فيها زراعته بين ٦٠ - ٩٠ سم فى السنة . أما الذرة الشامية فتزرع حتى ارتفاع ٢٥٠٠ متر حيث يكفى المطر حاجة النبات ، وتنتشر زراعته فى جنوب غرب البلاد ، وفى هضبة الصومال وبخاصة شمال Chercher وتعد مناطق Wando, Jimma

أهم مناطق انتاجه ، أما القمح فيزرع فى المنطقة الجبلية جنوب هواس على ارتفاع يتراوح بين ٢٠٠٠ - ٢٣٠٠ مترا ، وهو يزرع فى الهضاب الباردة بين ارتفاع ١٨٠٠٠ و ٣٠٠٠ متر ، وتوجد زراعته بالقرب من أميو ، أديس أبابا و Kebra, Berham ، وديسى وجندار ، وقسد زاد الطلب على استهلاكه محليا فضلا عن تصدير الفائض منه ، ولكن أخذ الصادر منه يقل بعد سنة ١٩٤٩ ، ورغم تعدد أنواعه التى يصدر الجيد منها فى أحيان كثيرة ، إلا أن السكان لم يألوا استهلاكه فى غذائهم ، كما أن الظروف الطبيعية الملائمة لزراعته لا تتوافر سوى فى مناطق محدودة نسبيا ، أما الشعير الذى قد يستخدم كنوع من الحبوب الغذائية فهو يزرع على نطاق واسع على سطح الهضبة ، إذ لا يحتاج لموسم مطر طويل ولذلك فقد يزرع مرتين فى العام ، لأنه إذا توافرت مياه الري أو المطر قد لا يزيد موسم نموه عن شهرين تقريبا . ولكن يستهلك معظم المحصول فى صناعة نوع من البيرة المحلية وتعد الحبوب ومحاصيل البذور الزيتية والبقوليات من أهم المزروعات وبخاصة فى الشمال . أما فى الجنوب فتظهر أهمية محاصيل الجذور ، وتختلف الحبوب الشائعة باختلاف الارتفاع فالذرة بنوعيها الشامى والرفيعة تزرع فى إقليم القلة ، أما فى إقليم الوينا ديجا فيزرع القطن والقمح والشعير ، وأن كانت الذرة بنوعيها تزرع أيضا ، أما فى إقليم الديجا فيزرع الشعير والقمح والشيلم .

أما الخضروات فقد كانت لعهد قريب مهمة ، ولكن أخذت صادرات البلاد منها تتزايد بعد الحرب ، وتزرع فى المنطقة المحيطة بأديس أبابا .

أما المراعى فتنتشر فيها أنواع الحشائش المختلفة فى مناطق متباينة متأثرة بالظروف المناخية ، فتتمو المراعى مكان الغابات التى قطعت ، كما توجد المراعى التى تتفاوت فى نضارتها وجودتها فى الجهات الجافة وشبه الجافة ، والواقع أن تركيز المطر فى موسم الصيف يسمح بنمو الاعشاب بسرعة دون أن تكون غنية بالأملاح المعدنية ، ولذلك فإن المراعى أقل جودة للحيوان من مراعى الاقاليم المعتدلة التى يسقط فيها المطر موزعا لفترة طويلة ، أما إذا انقطع سقوط المطر ذوى المرعى سريعا ، ذلك الجفاف السريع الذى من شأنه بدوره أن يقلل من أهمية العلف الجاف الغذائية ، وهذه الظروف تنطبق على ما يسود الهضبة المرتفعة والجهات ذات المطر الغزير ، فلا غرو أن كانت الحيوانات هنا هزيلة لا تجد من العلف كفايتها ، على حين تجد فى الجهات المنخفضة ذات المطر القليل نسبيا من العلف ما يكفيها



على مدار السنة ، ولذلك تظل الحيوانات محتفظة بضخامتها . ويمكن أن نميز ثلاثة أنواع من الماشية قد ترجع الى اختيار سلالات خاصة ، أو توفر الغذاء فترة طويلة ، أو قصيرة من السنة وبخاصة اذا كان المناخ والتربة والحشائش كما فى الجهات المنخفضة من شأنها توفير هذا العلف . وحيوانات الجهات المرتفعة عجفاء هزيلة ، والجهات المتوسطة الارتفاع تجنح لهزال ، والجهات المنخفضة أكبر حجما وأكثر لحما .

وتقدر عدد الحيوانات بـ ٢٠ مليون رأس من الماشية ، ٢٠ مليون رأس من الاغنام ، ١٥ مليون رأس من الماعز ٣٠ مليون من الضيل والبغال ، أما الابل فيقدر عددها بنحو ٦٠٠.٠٠٠ رأس ، وتنتشر تعرية التربة وسوء التغذية والامراض التى تفتك بنحو ١٥ مليون من الماشية كل عام ، ويقل الاقبال كثيراً على لحوم الحبشة لهزال الحيوانات واصابتها بالامراض ، ولذلك تعد الجلود وحدها التى تمثل السلعة الثالثة بعد البن والبذور الزيتية فى سجل الصادرات - أهم السلع الحيوانية .

أما الفواكه فهى تزرع على نطاق ضيق رغم تعددها وعظم امكانيات انتاجها ، فالمانجو تزرع فى مزارع واسعة فى هرر وجما ، كما يزرع الموز فى جنوب غرب الحبشة فى سيدامو وبالقرب من هرر . ويزرع كثير من البذور الزيتية التى يبلغ عدد أنواعها نحو ١٠ - ١٢ نوعا ، يستهلك كثير منها محليا ، وقد أقيمت معاصر أهمها فى أديس أبابا وفى ديسى وهرر ودير داوا ، وتعد ثانى الصادرات قيمة ورغم ملائمة المناخ والتربة لزراعة القطن ، فان ما يزرع منه لا يكفى سد حاجة مصانع النسيج فى أسمره ودير داوه واديس أبابا وغيرها . وربما يضاف الى توفر سوق كبيرة للاستهلاك وجود خط سكة حديدية بين دير داوا والساحل وطرق تصل بين أديس أبابا والمناطق الصالحة لزراعة القطن ويزرع من نباتات الالياف الكتان فى الجهات المرتفعة ، وتنتج البلاد نحو نصف مليون رطل من الطباق سنويا ، تستخدم بعد خلطها بغيرها من الأنواع المستوردة فى صناعة السجاير فى مصنع حديث أقيم فى أديس أبابا ، أما البن فرغم التوسع فى زراعته وتصديره فى السنوات الأخيرة ، فان هناك مساحات واسعة تصلح لزراعة أنواع البن الجيدة ، اذ يعد بن إثيوبيا أرخص من كثير من جهات العالم المنتجة للبن ، وأهمها مقاطعات Kaffa --- Sidamo --- Tlubbabor -- Gofa --- Ukmu وتنمو أشجار البن على ارتفاع يتراوح بين ١٧٠٠ و ٢٠٠٠ متر ، بل أن

المناطق أروس وهارارج الصالحة لزراعة البن تضم جهات قد لا يصيبها قدر كاف من المطر ، ولكن فى مقاطعتى Arussi, Hararge فضلا عن بعض المقاطعات الشمالية يمكن أن تجد كفايتها من الماء عن طريق الري ، أما أهم مناطق الزراعة الحالية فهى :

( أ ) غابات البن التى قد تكون مزارع كبيرة أهملت زمنا ، ثم اتجهت اليها العناية ، وقد تكون غابات طبيعية ، وقد تكون من النوعين ، ولكن هذه الغابات التى تنتشر فى مقاطعات الوبابور وجيمو وجوفا ووليجا Hubabor, Gemu, Gofa, Wollega لا زالت تنتج جانبا كبيرا من صادرات أثيوبيا من البن .

( ب ) مزارع كبيرة تنمو فى ظل الأشجار الضخمة فى مقاطعات أجوجام وسيدامو وكافا ، وهى لا تلقى عناية كبيرة .

( ج ) مزارع صغيرة تتألف من أشجار صغيرة تقلم تقليما عنيفا ولا تنمو فى حماية ظلال الأشجار الوارقة شأن ما يتبع فى الكنغو ، وهى تنتشر فى مقاطعة سيدامو ومنطقة هارارج Hararge وفى مقاطعة Ghercher

( د ) مزارع صغيرة كثيرا ما تروى فى مقاطعة هارارج وهى تلقى عناية كبيرة تظل نامية من ١٥ - ٢٠ سنة قبل أن تدمر لمعود فتنمو من جديد ، ويمثل البن أكثر الصادرات قيمة ، أو ٥٥ - ٦٥٪ من جملة قيمة الصادرات ، ويصدر أكثره الى الولايات المتحدة :

### المثروة الحيوانية :

اليقر هنا من نوع الزيرو الافريقى عادة ، ولضالة ما يدره من اللبن يعد من حيوان اللحم ، وأهم المناطق التى يربى بها البقر الجيد فى مقاطعة أروسى ، وهارارج ، وتصل الصادرات من الماشية الى ديرداوا حيث تستخدم السكك الحديدية لنقلها لجيبوتى التى أصبحت سوقا مهمة لا للتصدير فقط ولكن للاستهلاك أيضا ، ولكن كثرة نفقات شحن الماشية فى سكة حديد جيبوتى عدم توفر العلف فى منطقة جيبوتى مما يتطلب إرساله من أثيوبيا الى جيبوتى ، كل ذلك يضاف اليه رغبة السكان من الزراع فى الاحتفاظ ببعض

الحيوانات للنقل الى جانب ارتفاع مستوى المعيشة ، وزيادة استهلاك اللحوم وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية قد أدى الى هبوط عدد المصادر منها ، ولذلك فان ما كان يصدر لبلدان الشرق الاوسط قبل سنة ١٩٣٢ من الماشية والذي يقدر بنحو ١٢٠٠٠ رأس فى السنة ، قد هبط الى بضعة مئات لارتفاع الاستهلاك فى البلاد المجاورة .

والثروة الغابية أهمية كبرى فى مستقبل البلاد الاقتصادى فهى أولا تمتاز بالتنوع لأن الغابات التى تنمو فى الوديان والسفوح السفلى للجبال حيث المناخ الحار والمطر مركزى فى فصل حار ، تختلف عن غابات الجهات المرتفعة التى يعتدل فيها المناخ وتغزر الامطار ويمتد موسم سقوطه فترة طويلة نسبيا ، فالجهات المرتفعة توجد بها أكثر المخروطيات وأهمها التندو المزيجيا Zegba, Tedh وفى الجهات المنخفضة أشجار الفصيلة السنطية، فالزيجيا شجرة دائمة الخضرة تنمو فى مرتفعات مقاطعة شوا والى جنوب وغرب شوا مباشرة ، ويستخدم خشبها فى البناء وصناعة الأثاث ، وهو يشبه خشب الصنوبر فى الجهات المعتدلة فى خصائصه ، أما التيد فهو الاسم الامهرى لشجرة العرعار وهو يشبه الأرز ، وينمو فى الجهات المرتفعة الى الغرب من خط طول ٤٠ شرقا من اديس ابابا حتى شمال أرتريا ، وفى جنوب اثيوبيا وجنوبها الغربى ، ويستخدم كثيرا فى أعمال النجارة . أما الاشجار السنطية فهى متنوعة فى أهميتها وبعضها غنى بالصمغ ، والآخر بمادة التين ، ويستخدم خشبها الصلب عادة للوقود ، ولكن سقوط المطر الموسمى قد هبط بنسبة ما يغطى اراضى الحبشة من الغابات التى لا تتجاوز نسبتها ٧٪ وتنتشر عادة قطع الغابات دون زراعة بديل عنها ، ولو أن غابات الكافور المزروعة أخذت تنتشر لتزاحم الاشجار الطبيعية المهمة .

### الموارد المعدنية :

أكثر أنواع صخور الحبشة غنى بالمعادن هى الصخور البلورية المتحولة والنارية ، ولذلك فانه حيث تتعرض هذه الصخور الاركية القديمة التى تتألف منها القاعدة للتعرية لتظهر على سطح الأرض توجد المعادن ، كما هو الحال فى أرتريا حتى تيجره ، وفى اثيوبيا نجد أن الروافد التى تنبع من الهضبة الوسطى تشق طريقها فى الناحية الغربية للهضبة الى المناطق السهلية الغربية ، إقليم سيدامو الذى يمتد من نهر أومو و Webi Shebeli



وحدود كينيا ، فضلا عن الهضبة الشرقية أى هضبة مرر بين الصومال البريطاني Ghercher وعند اعلى هواش ووبى شبلى Dawa Patma فالذهب يوجد فى عروق الكوارتز فى الصخور البيللورية فى أرتريا وبنى شنغول وبعض جهات مقاطعة وليجا Wollega ، ويتراوح نسبة المعدن فى الخام من كمية ضئيلة الى ٥٠ جرام فى الطن ، ويستخرج الذهب من رواسب هذه الصخور البيللورية بعد أن تنحت وتتراكم فى وديان الأنهار كالأودية التى تندفع نحو الشمال الغربى لتصل بالنيل فى جوجام وفى وليجا Wollega فى جوجام يستخرج من اقليم وومبيرا Wombera بالقرب من النيل الأزرق وعند قرية كوبا Cuba ، أما فى مقاطعة وليجا فان اقليم نبي شنغول وبخاصة بالقرب من بومو Bomu يعد من أهم مراكز استخراج الذهب ، ويستخرج من منطقة جنوب غرب مدينة أدولا التى استغلت منذ سنة ١٩٤١ ، وبلغ الانتاج منها ٤٠٠٠ أوقية فى الشهر ، ومنطقة أخرى على نهر الاكويو فى مقطعة الو بابور أما البلاتينوم فيستخرج من احد روافد البارو ، ويوجد المعدن فى الصخور البيللورية حيث أدت عوامل التعرية الى ازالة صخور اللابة ، ويقدر سمك الرواسب التى يوجد بها هذا المعدن بـ ٢ - ٥٢ مترا ، وتتراوح نسبة المعدن فى الخام بين ١٠ و ٢٠ جرام فى المتر المكعب ، ولكن استخراجه على نطاق واسع منظم وعلى أساس علمى سليم ضرورى ، لأن ظروف استخراجه تعد جدية من وجهة النظر الاقتصادية ، وينتشر أنواع رديئة من الحديد فى تكوينات اللاتريت الحديدية فى جهات عديدة ، وقد استغل بطرق بدائية منذ عهد قديمة ، ولكن لم يعثر على تكوينات ثمينة تشجع على وضع سياسة لاستغلالها استغلالا منظما ، ويظن أن تكوينات من الليمونيت الغنى بمعدن الحديد توجد فى جنوب شرق جما .

أما الملح فيستخرج من اقليم الدفاقل المنخفض حيث تمتد مساحة ١٢٠٠ كم<sup>٢</sup> تغطيها الاملاح جميعها ، وهو ملح تخلف عن انحسار مياه البحر الأحمر حين ظهرت جبال « الألب الدناقل » لتفصل بين منخفض الدناقل والبحر الأحمر ، ويقدر الانتاج من الملح بـ ١٠٠٠٠ طن فى السنة كما يستخرج من بحيرات ملحة تقع فى فوهات البراكين ، وهى بحيرات ماجادو والسد بالقرب من Mega كما توجد بها بعض أملاح الصودا للصناعة ، ويستغلها السكان بطرق بدائية ، ولكن الحيوانات والانسان

تستهلك قدرا غير كاف لصعوبة المواصلات ، حتى لقد تسير الابل لمسافة ٢٠٠ كيلو متر لترتوى ، كما توجد عند دالول Dalloi وفى منخفض الدناقل أملاح البوتاسيوم التى يقدر ما يوجد بها فى منطقة جبل دالول فقط التى تقتصر على ما يمكن استخراجه بـ ٨٠ر٠٠٠ طن تحتوى على ٥٠ر٠٠٠ طن من البوتاسيوم وكان يستخرج على نطاق صغير قبل سنة ١٩٢٧ حين كان يصدر منه ٢٥٠٠ طن ٠ كما توجد عدة أنواع من الصخر ومن المعادن لم تدرس بعد امكانيات استغلالها مثل الجبس والبوكسيت والصلصال والكبريت والحجر الجيري ٠

**الوقود والقوة المحركة : الفحم :** لا يوجد سوى اللجنيت فى مقاطعات بيجمدر وكافا ووليجا وولو Wollo, Wollega, Kaffa, Begemder وبخاصة فى جنوب غرب جوندرا ، أما فى مقاطعة Wollo فيستخرج نحو ٤٠ طنا فى الشهر وبعد مشروع كوكا Koka على نهر هواش لتوليد الكهرباء أكبر المشروعات فى هذا الميدان ٠ ويعد شرق الهضبة الشرقية وبخاصة سواحل ارتريا ومنطقة ساحل خليج عدن كلها من المناطق التى تلائم ظروفها وجود البترول بها ، وقد منحت شركة بترول سنكلير Sinclars Petroleum Company سنة ١٩٥٢ امتياز استخراج البترول من الحبشة جميعها ، وقد بدأت فى التنقيب عن البترول فى أوجادن ولكنها لم توفق فى العثور عليه حتى الآن ، وإذا كان خبراء الاقتصاد يرون أنه من الممكن أن تصبح إثيوبيا بحكم ثرواتها الزراعية والحيوانية « سلة الخبز » لدول الشرق الأوسط ، فإن هذا الاحتياطى من الموارد الزراعية يمثل أكبر مصدر للثروة القومية حتى الآن ، فلا يتجاوز عدد من يعملون فى الصناعة والتعدين ٢٥ - ٣٠ ألف نسمة ٠

### **الثروة المعدنية فى ارتريا :**

استخرج الذهب منذ سنة ١٨٩٧ ، وقد بلغ مقدار المستخرج منه بعد سنتى ١٩٣٧ و ١٩٤٠ نحو ١٠٧٢ كيلو جراما ، وأهم مناطق استخراجه هى وادى أنسيبا فى كيرين وهضبة هاماسين Hamasien فى إقليم أسمره ، أما الحديد فيوجد فى مناطق متفرقة ولكنه لم يستغل بعد ، ويستغل الملح من تبخير مياه البحر فى Wachiro وعصب ومصوع إذ انتجت هذه البقاع نحو ١٠٠ر٠٠٠ طن فى السنة قبل الحرب ٠

وعلى العموم فإن سهولة المواصلات وقرب مراكز التعدين من موانئ التصدير قد جعل من الذهب والحديد معادن مهمة للتصدير ، وقد عنى الايطاليون باستغلال مواد البناء مثل الاحجار والجبس والرمال ، فاقيم مصنع الجبس غرب مصوع كان ينتج ٤١٦٩ رطنا على حين قدر الانتاج من مواد البناء بنحو مليون طن .

### السكك الحديدية :

تملك الحكومة سكة حديد ارتريا والتي يبلغ طولها ٣٠٦ كيلو مترا تمتد من مصوع لتتعد ٢٣٠٠ متر الى أسمرة ومنها الى كيرين وأجوردات كما يخرج منها خط فرعى من أجوردات الى تسيني Tessenei قريبا من الحدود السودانية ، وهى تنقل نحو نصف مليون راكب و ١٢٠ ألف طن شهريا من البضائع ، وتوجد أيضا سكة حديد جيبوتى الفرنسية ، وليس هناك مبرر اقتصادى لقيامها الا لخدمة التجارة الخارجية والداخلية لأثيوبيا ، لأنها لا تستخدم فى نقل تجارة جيبوتى ، هذا الخط الذى تديره شركة فرنسية تسمى شركة السكة الحديدية الفرنسية الأثيوبية من جيبوتى الى أديس أبابا Compagnie du Chemin de Fer Franco-Ethiopien de Djibouti à Addis Ababa والذى يقدر طوله بـ ٧٨٤ كيلو مترا قد أنشئ فى الفترة ١٨٩٧ - ١٩١٧ بين أديس أبابا وجيبوتى . ويبلغ طول هذا الطريق بين جيبوتى ودير داوا ٣١١ كيلو مترا ، وبين دير داوا وأديس أبابا ٤٧٤ كم ، وهو كثير التعرج وبخاصة فى جزئه الثانى بين دير داوا وأديس أبابا . وهذا الطريق يمر فى وادى هواش فى منطقة تكاد تخلو من السكان ، ولذلك فان امتداده لم يؤد الى ظهور نشاط اقتصادى للافادة منه .

وتنتشر شبكة من الطرق الجوية المحلية والخارجية ترتبط بنيروبى والخرطوم والقاهرة وكراثشى وعدن ، وتخرج هذه الشبكة من الخطوط الجوية من أديس أبابا الى ديسى ومكالى وأسمره ، وشمالا بغرب الى ديرا ماركوس والخرطوم وجنوبا بغرب لجمما وجورى وأسسوسا ASOSA ثم الى أكوبو وجنوبا الى جوبا ونجلى Negelli ، وشرقا الى ديرداوا وجيبوتى وجنوبا بشرق الى عصب ودعن . وقد أنشأ الايطاليون كثيرا من الطرق تطرق اليها الفساد لاهمالها ، ولكن المعونات التى تتلقاها من

الخارج قد ساعدت على اصلاح الكثير منها ، وان كانت طبيعة البلاد الجبلية قد ضاعفت من أهمية النقل الجوى فالخطوط الجوية الاثيوبية تمر بثلاثين مدينة بالبلاد .

وتعد مصوع وعصب ميناءين يصلان الهضبة الوسطى والجهات الشمالية بالخارج ، وذلك بعد ان قام الاتحاد الفدرالى بين اثيوبيا وأرتريا ، أصبح لأثيوبيا ساحل بحرى لأول مرة يبلغ طوله ٨٠٠ كيلو متر ، وقد ظلت ٤٠ - ٥٠٪ من تجارة اثيوبيا ينقل بواسطة سكة حديد جيبوتى ، ولكن ميناء عصب وسكة حديد أسمره أصبحت تنافسه وأهم الاقاليم الكبيرة التى تنقسم اليها الحيشة هى :

١ - مقاطعة أمهره : وتضم منطقة جوجام وجزءا من مقاطعة شسوا ، وتمتاز بأنها تضم اراضى زراعية خصبة وبخاصة فى جوجام التى يفيض ما تنتجه من بذور زيتية وحبوب وبن عن حاجة السكان ، فضلا عن القطن الذى يزرع على طول النيل الأزرق وروافده ، كما أنها غنية بالمغلات والمنتجات الحيوانية ، وقد سلف أن ذكرنا أن الاثيوبيين من الكوشيين نوى الثقافة السامية قد اتخذوا من هذه المنطقة وطنا لهم ، وانتشرت فيها اللغة الامهرية ، ولذلك فالى جانب المركز المتوسط ووجود مجتمع موحد الثقافة على حظ كبير من التقدم ، نجد أن ما تشكو منه البلاد بوجه عام من انخفاض متوسط كثافة السكان غير واضح هنا ، لأن متوسط الكثافة هنا يبلغ ٢٤ نسمة فى الميل المربع ، وقد اتخذت جوندار عاصمة لهذا الاقليم .

٢ - اقليم هور : يعد أكبر الاقاليم مساحة ، وتفوق هذه المساحة مقاطعة هرر القديمة من حيث المساحة ، وان كانت النباتات هنا متعددة فانه يغلب على كل الاقليم الجفاف ما عدا الجانب الغربى من الهضبة الشرقية الواقعة شرق الاخدود ، وتسكن هنا عناصر الجالا والصوماليين مع القليل من الجماعات الحامية من الكوشيين ، وتنتشر فى هذه المنطقة حرفة الرعى .

وكل سكان منطقة أمهره من الحاميين الأثيوبيين يعيشون فى مأمن من غزوات قبائل الصومال والجالا ، معتمدين بقلعتهم الطبيعية ، ولكن هؤلاء الجالا والصوماليون كانوا على اتصال بالحاميين الوافدين من الشرق ومعرضين لتأثير العرب ، فاعتنق الكثير منهم الاسلام وظلوا على اتصالهم

الوثيق ببلاد العرب ، وقد امتد نفوذ الحبشة حدينا الى منطقة هرر وأوجادن على يد الامبراطور منليك الثانى ، وقد كانت هرر مركزا لالتقاء طرق القوافل التى كانت تنقل المواد المختلفة وبخاصة بن مخا الذى كان يأتى اليها من مقاطعة كافا بوجه خاص ، وكانت تفوق اديس أبابا فى هذا الشأن ، وهى مركز للمنطقة الاسلامية هنا ولذلك فهى تجمع الى أهميتها التجارية أهمية دينية ، وربما كان لبعدها عن سكة حديد جيبوتى - اديس أبابا تاثير فى تضائل أهميتها فنشأت عند سفوح الهضبة السفلى مدينة جديدة على السكة الحديدية للافادة من موقع هرر القديمة تسمى اديس هرر Addis Harra .

٣ - أرقريا : وتكون من الطرف الشمالى من الاخدود والسهل الساحلى الى جانب الطرف الشمالى للهضبة الوسطى الحبشية ، وقد كانت قبل اتحادها اتحادا فيدراليا مع اثيوبيا سنة ١٩٥٢ تمثل منطقة ذات جبهة بحرية يبلغ طولها ١٢٠٠ كم يسكنها نحو ١١ مليون وتقدر مساحتها بـ ١١٩٠٠٠ كم<sup>٢</sup> ، ويعد ميناء مصوع وعصب من المنافذ الطبيعية لمنطقة خلفية واسعة ، وقد نمت مصوع بسرعة منذ سنة ١٩٥٢ ولا زال ١٧٠٠٠ من الايطاليين يعيشون بها ، وقد استغل الايطاليون مواردها الطبيعية كما مدوا اليها السكك الحديدية ، واهم عناصر السكان الحامون من بنى عامر الذين يتجمعون فى شرق بركة حيث يمارسون الزراعة وبخاصة زراعة القطن ، بعد ان كانوا يقتصرون على الرعى ، أما الحباب فى شرق الهضبة وشمال مقاطعة كيرين والمنسا Mensa الذين يسكنون شرق مدينة كيرن حتى السهل الساحلى ، والماريا Marea الذين يقطنون غرب راهد بركة الذى يعرف باسم انسسبيا Anseba فهم جميعا من الرعاة الذين يعتنقون الاسلام ، أما البيلين Bilen او البوجوس Bogos فقد اعتنقوا الاسلام فى اول القرن التاسع عشر ليتحولوا الى المسيحية ، ويتكلمون لغة التيجرى وتنتمى هذه الجماعة الى الجماعات من الكوشيين الذين يسمون الاجو Agow وهم من الرعاة وان كان بعضهم يمارس الزراعة . ويقدر ان ٨٠٪ من السكان يعملون فى الزراعة ، على حين لا يتجاوز الزراع المستقرين ٧٠٪ من هؤلاء الذين يزرعون .

وتقدر مساحة اثيوبيا بـ ٣٩٥٠٠٠ ميلا مربعا يسكنها ٤٢٠١٩٤١٨ مليون نسمة سنة ١٩٨٤ يزدحمون فى السفوح المتوسطة بالقرب من طرق


المواصلات حيث يغلب على السطح الاستواء، وتتنوع اللغات وتعدد السلالات بين السكان الذين يشيع بينهم التعصب الاقليمي والاكتفاء الذاتى والامية والاوهام والخرافات وسلطان الكنيسة التى تجند نحو خمس البالغين من الذكور للانتظام فى سلك الخدمة الدينية ، وتستأثر بقسط كبير من الأرض مع الدولة وكبار الملاك الغائبين ، ولذلك فرق الأرض قائم ، بل أن نظام الرق نفسه لم يلغ الا سنة ١٩٤٢ . وقد ثار الشعب على هذه الأوضاع واسقط النظام الامبراطورى الاقطاعى وأعلن الجمهورية عام ١٩٧٤ .

### جيبوتى :

وهى منطقة صغيرة قليلة الموارد لا تعدو أن تكون مركزا لتجارة المرور للحبشة فى هذه المنطقة ذات الاهمية الاستراتيجية التى تطل على بوغان باب المندب ، فقد حصل الفرنسيون على ميناء أبوك سنة ١٩٦٧ الذى انتقلت أهميته كمنفذ طبيعى لمنطقة الداخلية من هضبة الحبشة الى ميناء جيبوتى الذى أصبح يمثل نهاية سكة حديد أديس أبابا - جيبوتى ، وقد افتتح هذا الخط الضيق سنة ١٩٢٩ ، وتبلغ طاقته على النقل نحو ٤٠٠ ألف طن فى العام ، ولكن بعد ضم إثريا تحولت تجارة إثيوبيا الى سكة حديد أسمرة وأجوردات الى مصوع ( أنظر خريطة رقم ٢٣ ) ، وتناظر جيبوتى كمركز استراتيجى وقاعدة تموين على طول هذا الطريق جزيرة بيرم وهى جمهورية استقلت عام ١٩٧٧ وقد انضمت الى الجامعة العربية وتقدر مساحتها بنحو ٢٣٠٠٠ كم<sup>٢</sup> ، ولا يتجاوز سكانها ٨٠٠٠٠ نسمة (١٩٨٧) على حين لا يتجاوز سكان جيبوتى ٢٩٧٠٠٠ نسمة .

### الجزء الشمالى :

وكان قد وضعت تحت الحماية البريطانية منذ الاستيلاء على ميناء بربره سنة ١٨٨٢ الذى يعد المنفذ الطبيعى لتجارة منطقة الصومال وهرر ، وهو يتكون من سهل ساحلى لا يربو اتساعه على ١٨ كم يليه نحو الداخل حافة الجبال المرتفعة التى تبلغ نحو ١٢٠٠ متر تمتد موازية لساحل خليج عدن ، بينما يمتد الى الداخل منطقة منخفضة تنحدر نحو داخل القارة . والجهات هنا جافة أو شبه جافة ، والسكان من الرعاة الذين قد يجمعون بعض الاصماغ والبخور من شجيرات هذه المنطقة شبه الصحراوية ، ويسمى



السهل الساحلى الجاف باسم « جوبان » - « المحروقة » يليه نحو الداخلى سهل مرتفع تتخلله جبال من الحجر الجيري يغطيه السنط وتشقه الوديان الجافة ، وينتهى هذا السهل من الداخلى بحافة مرتفعة ( ٢٠٠٠ متر ) ينمو عليها اشجار الأرز حيث يسقط نصف متر من المطر ، وتمتد هضبة مستوية صوب الجنوب الشرقى ينمو بها الحشائش والسنط ويتراوح المطر بين  $\frac{1}{2}$  متر فى السنة يسقط فى الربيع (Gu) والخريف (Dhair) .

**الجزء الجنوبي :** حصلت ايطاليا على مقديشو سنة ١٨٨٩ ، ثم استعادت بالضغظ على سلطان زنجبار الذى كانت سيادته تمتد على جزء من تلك المنطقة حيناً ، وبالاتفاق مع الحكام المحليين تارة أخرى من توسيع نطاق نفوذها ، وهى منطقة مرتفعة تنحدر نحو الشرق على شكل مدرجات حتى السهل الساحلى ، هذه المنطقة شبه الصحراوية التى يسكنها نحو مليون من الرعاة تقوم فيها بعض الزراعة القليلة على الرى الى الداخلى من مقديشو وبخاصة حول نهر شيبيلى Welii Shubeli ، وتقع ميناء قسمايو عند مصب نهر جوبا الذى يصلح للملاحة فى أدناه ، ولا يعدو ما تنتجه هذه المنطقة جلود الحيوانات وبعض الصموغ التى يجمعها السكان والقطن والذرة التى تزرع على الرى فى مناطق محدودة ، وقد وضع الصومال تحت الادارة الايطالية باشراف الأمم المتحدة حتى سنة ١٩٦٠ عندما قرر سكانه مصيرهم ، ويمتد على طول الساحل سهل تنتشر به الكثبان الرملية ، يليه هضبة منخفضة يقل فيها المطر الذى يقتصر على الربيع والخريف ، وقد يصل المطر الى نصف متر ولكنه غالباً ما يقل  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{1}{3}$  متر وبخاصة فى الداخلى الجاف ، ويشق وادى شيبيلى طريقه من الداخلى الى مستنقعات وكثبان الرمال التى يفقد فيها مياهه ويجرى نهر جوبا أيضاً فى المنطقة الجنوبية .

انضم الصومالان البريطانى والايطالى لتتألف منهما جمهورية الصومال التى تقدر مساحتها بـ ٢٦٢,٠٠٠ ميل مربع وسكانها بنحو ٢ مليون نسمة ، يمثل الرعاة ٧٤٪ منهم ، يربون الأبل بصفة خاصة التى تتراوح نصيب الاسر بين ١٠ - ١٠٠ رأس منها ، وأن كان يصل الى ١٠٠٠ رأس أحياناً ، وتكثر الماشية فى مناطق الجنوب الزراعية ، والماعز والاغنام فى الشمال بصفة خاصة ، وينتقل الرعاة من الساحل حيث تكثر الأبار وخاصة فى



الجنوب الى الداخل ، ولكنهم يتأثرون الى حد كبير بتوزيع مراتع الكلاً ومواطن الملح التي تلحقها الحيوانات ، وتوزيع المراعى القبلية ، وهناك اتجاه واضح الى تغلغل الصوماليين من الرعاة الى اطراف الهضبة الحبشية وبخاصة فى الشمال حيث أدت مكافحة أمراض الحيوانات دون توفير المرعى والماء لها الى زيادة عددها فضاقت بها المراعى ، وحين تنازلت بريطانيا لاثيوبيا سنة ١٨٩٧ عن منطقة هرر نصت على السماح لنصف مليون من الرعاة بعبور الحدود كعادتهم للرعى فى داخل اثيوبيا ، وتقوم الزراعة على الرى وبخاصة فى الجنوب فى وادى شببلى وجوبا حيث يزرع الذرة والذرة الرفيعة ، والموز وقصب السكر والارز والقطن ، وتقدر مساحة أراضى الزراعة المتفرقة بـ ١٥٠ر٠٠٠ فدان فى الشمال و ٤١٨ر٠٠٠ فدان فى الجنوب ، وتقوم مصانع قليلة لتصنيع منتجات الزراعة المحلية مثل مصنع السكر فى فيلا بروزى Villabruzzi على طول وادى شببلى التى تديرها الشركة الزراعية الايطالية الصومالية ، كما يقوم مصنع لانتاج الحبال من أوراق الموز فى مركا كما أن بعض القبائل تمارس صيد الأسماك ، وهى قبائل محتقرة ولكن الموارد السمكية الضخمة التى أدت الى انشاء مصنع لتعليب التونة قد ترك دون اصلاح بعد انتهاء الحرب شأن الكثير من المشروعات الايطالية الاخرى ، ولا يزيد عدد السكان فى المدن عن ١٠٪ من السكان ، ومقديشو العاصمة ( ٩٠ر٠٠٠ نسمة ) ، تعد ميناء مهما أيضا، أما هرجيسة ( ٤٠ر٠٠٠ نسمة ) عاصمة المحمية البريطانية السابقة فهى مركز للادارة وسوق للمنتجات الرعوية والزراعية ، ويعانى الصومال المستقل الفقر والتاخر ، وتعجز ميزانيته عن سد النفقات الاساسية للدولة ، ولن يقل هذا البلد من عثرته الا يظهر ثروة معدنية تمكنه من تشييد كيانه الاقتصادى والاجتماعى على نحو حديث مستقر .



# الباب الرابع

## الصحراء الكبرى

### الفصل الأول

#### مقدمة

لم تعرف كلمة الصحراء الكبرى التي يتداولها الكتاب الان الا حديثا وذلك حين يشيرون الى المنطقة الممتدة بين بلاد البربر واقليم البحر المتوسط فى الشمال وبين السودان فى الجنوب دون تحديد دقيق . فاستخدم بطليموس فى القرن الثانى الميلادى كلمة « ليبيا » للدلالة على داخل القارة الافريقية على حين اطلق كلمة « اثيوبيا » على المنطقة الواقعة الى جنوب مدار السرطان . ولكن العرب الذين تواضعوا على اطلاق كلمة الصحراء على اية بقعة جرداء رملية غبراء الاديم قبل الاسلام ، لم يستخدموا هذه الكلمة للاشارة الى منطقة معينة الا فى القرن التاسع الميلادى على يد ابن الحكم فى كتابه عن فتح شمال افريقية حين ذكر « ارض الصحراء » للدلالة على الجهات الداخلية فى طرابلس ، ثم دارت على اقلام الجغرافيين والرحالة العرب بعد ذلك فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر وبخاصة البكرى والادريسى ، ولكن لم يعنوا بها شيئا له مغزى جغرافى ، فالادريسى الذى اطلق هذه الكلمة على المنطقة الواقعة جنوب النيجر فى خريطته الصغيرة ، وضع كلمة صحراء او الصحراء والرمال فى البقاع المحصورة بين اطلس الصحراء فى الشمال والسودان فى الجنوب وفزان فى الشرق ومناطق صنهاجة فى الغرب ( ١١٥٤ م ) ، وقد احاطها بسلسلة من الجبال ولكن جعل منطقة شط الجريد ولكنه غالبا ما يقال الى  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{1}{3}$  متر وبخاصة فى الداخل الجاف ، ويشق وادى فيه الاسماء فبعث ليون الافريقى فى القرن السادس عشر الميلادى مثلا اسماء القدماء كـ « ليبيا » وغيرها ، ولكن لم تلبث بعض الاسماء مثل « الجريد » التي كانت تطلق على الصحراء الشمالية كلها ان اقتصررت على مناطق محدودة ، كذلك شأن ليبيا واقليم نوميدي « Numidic » فى حين اتسمت دلالة كلمات مثل « الصحراء » التي كانت


مقصورة فى فترة ما على هضبة آير Air فاصبحت تشمل كل منطقة الصحراء وشبه الصحراء بين السودان والبحر المتوسط ، وكان العرب حين غزوا الجزائر يقسمون هذه المنطقة الى اقليمين ، اقليم التسل المطير الخصيب المنزوع واقليم الصحراء الذى يضم السهول او الهضاب العليا التى تلائم الرعى ، وما هذا التوسع فى اطلاق كلمة « الصحراء » الا لاهمية الصحراء حين كان يطغى الرعاة على الاراضى الزراعية ، كما أنه ينطوى على ماكان عالقا بالاذهان من أن كلمة الصحراء تحمل المعنى القديم وهو أنها منطقة غبراء الاديم لا تلائم الا الرعاة وحياة البداوة .

ولكننا يجب الا نقف فى تحديد هذه المنطقة الجغرافية عندما يتناوله السكان من الفاظ تنطوى على معنى وصفى ، كما يحدث حين يذكر ساكن الواحة مثلا أنه ذاهب الى الصحراء لينتجع المرعى ، كأنما كانت الواحة جزءا منفصلا عن الصحراء ، او تعتمد على ما ألفه السكان من استخدام الفاظ فضفاضة ليس لها معنى محدود (١) .

### مظاهر السطح والبنية :

يغلب على الصحراء الكبرى الانخفاض والاستواء والبساطة فى سطحها ، تلك البساطة التى تعكس بساطة فى تكوينها وتاريخها الجيولوجى فالجبال التى اتخذت اشكالا مدببة مختلفة وقد تهشمت صخورها واشتدت انحدار جوانبها وتناثرت عند سفوحها الكتل الصخرية المفككة ( انظر خريطة رقم ٢٤ ) ، والتى تظهر كمارد ضخم ينهض فجأة من الارض التى تمتد حتى آخر الأفق دون أن ينتابها تموج أو تغير يذكر ، تكاد تنحسر الى الشرق من خط جرينتش فى وسط الصحراء ، حيث يعلو سطح الأرض على ٥٠٠ متر ، وتضم هذه المنطقة مجموعة من الهضاب أو الكتل التى تعلو على ١٠٠٠ متر يحيط بها نطاق من الارض لا يزيد ارتفاعه على ٥٠٠ متر قبل أن تصل شمالا الى جبال أطلس أو جنوبا الى جبال الكمرى ، وبوتشى وجوسى وفوتاجالون وغيرها . ومن الطريف أن البدو من سكان الصحراء اذا استخدموا هذا الاسم « الصحراء » لوصف نوع من الارض ، فانما

(١) انظر كتاب « الصحراء الكبرى » من تأليف فيرون وترجمة المؤلف ادارة



( خريطة رقم ٧٤ ) تضاريس الصحراء الكبرى

يعنون أرضا منخفضة منبسطة أو رق « Reg » ومن الغريب أن الطوارق وهم من سكان الجبال فى منطقة الاحجار يتكون الاودية ويرهبونها بل ويحيكون حول قمم هذه الجبال اساطير تكاد تجعل صسعودها محظورا ، وتعد هذه الجبال القليلة متحفا للنباتات القديمة والمنقرضة ، كما كانت - كما دل على ذلك الرسوم المحفورة على روابيها - موطنا لسكان ما قبل التاريخ من الصائدين والقناصين - ولكنها لم تعد لجفافها موثلا لجماعات فقد تجد فيها القوافل الرى والغذاء بعد رحلة شاقة ولكن تغادرها ، فكتلة الاحجار التى يعرف وسطها باسم اتاكور « Atakor » أو الكورية كما كان يسميها العرب تعلق بنحو ٢٠٠٠ متر وتبلغ قمتها ٢٩١٨ مترا ، مع ما يحيط بها من هضاب تتألف من شريطين من صخور الزمن الاول من الحجر الرملى ، فعلى حين تكون الاحجار من الصخور البلورية النارية والمتحولة التى تغطيها صخور بركانية من آثار البراكين الخاملة التى توجد قممها كقمة تاهما « Taha » ، نجد أن نطاق هضاب الزمن الاول لا يبدو ارتفاعه كثيرا ( ١٣٠٠ مترا ) وهى تعرف فى الشمال باسم تاسيلى آجر .

وفى الجنوب باسم سيجراد وغيرها . وتمتد كتلة الاحجار نحو الجنوب الشرقى من تومو Tummo لتصل الى تبستى بقممها مثل Tarso Tesside ( ٣٢٦٥ مترا ) ، Tarso Muri ( ٢٢٥٠ مترا ) Elmi Koussi ( ٣٤١٥ مترا ) وتفصل منطقة برقو Borko المنخفضة بينها وبين مرتفعات انيىدى Ennedi واداي التى يزيد ارتفاعها على ١٠٠٠ متر ، وهذه المنطقة المرتفعة التى تمتد عبر تبستى الى دارفور ليست الا نتيجة لحركة رافعة أصابت القاعدة البلورية على حين ظلت صخور الحجر الرملى محتفظة بسطحها المستوى . وتمتد العروق المتحركة فى الشمال من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى فى اتجاه الرياح التجارية السائدة ، على حين ثبت كثير من العروق فى جنوب الصحراء الكبرى حيث تنمو النباتات التى تثبتها وتوجد عروق ايجيدى وشيش فى الغرب ، والعرقان الشرقى والغربى الكبيرين فى الشمال ، كما نجد عروق اساون وأوبارى ومرزق وبحر الرمال فى الجنوب الشرقى والشرق وقد اعترضت الطرق بين الشمال والجنوب .

وتنتشر مجموعة ثانية من الهضاب المكونة من الحجر الرملى اقل ارتفاعا وتماسكا من الشمالية لتعرضها لعوامل التعرية العنيفة ، وهى

تحيط بالكتلة الوسطى ، وتضم تمترين ، تسيلي أدرار ، وتاسيلي وان -  
الحجار Tassili onan, Ahaggar, Tassili des Adrar, Timelrine  
التي تمتد لمسافة عشر درجات طولية ، أو نحو ٢٠٠ كيلو متر ، ويمتد الى  
الجنوب من هذه المجموعة كتل أكثر ارتفاعا هي ادرار أيفوغاس  
Adrar des Iforas التي تمثل الحافة الجنوبية للأراضي المرتفعة  
فى وسط الصحراء الكبرى ، ثم يلي هذه الهضاب أراضي منبسطة قليلة  
الارتفاع تدعى فى الغرب تنزورفت ( أرض الظلمة ) Tanezrouft ، وفى  
الشرق تينيرى ( أرض خصوبة ) Ténéré التي تنتهى على الجانبين  
ايضا ببقاع منخفضة هي اروان Araouane وتمبكتو فى الغرب وبلمبا  
وبوديلي Bodéle, Bilma فى الشرق .

وتمتد هضاب جيرية فى شكل قوس ، يعترض الطريق بين الاحجار  
والاطلس ، ولكنها قليلة الانحدار ، تعرضت فى تكوينها لحركات أرضية  
محدودة ، فهضبة تدمائيت Tademait ترتبط بالجزائر بواسطة هضاب  
القليعة وميزاب التي تفصل بين حوضين هما الساوره وأغرغر  
Saoura تغطيهما تكوينات قارية من رواسب الزمنين الثالث والرابع ،  
أما حوض أغرغر فينحدر من الجنوب الى الشمال حتى شط مليفغ الذي  
يقع على عمق ٣١ مترا تحت سطح البحر ، ثم منخفض الساوره الذي  
ينحدر من الشمال الى الجنوب ، ويغشى جانب من هذين الحوضين الكثبان  
الرملية ، ويمثل هذان الموضعان اللذان يضمنان فى منطقتهما واحات قرارة  
ونوات وتيديكلت النهاية الشمالية لأراضي الزمن الاول والعصر الكريتاسى .  
وأما الى الشرق من هضبة تادمايت فتنتشر هضاب من الحجر الجيري ،  
تنتهى من الشمال بمنحدرات وعرة مرتفعة ، تسمى جبل دمر فى تونس ،  
وجبل نفوسة فى طرابلس ، ويبلغ ارتفاع هذه الحافة المرتفعة نحو  
٦٠٠ متر فى تونس ، وهذه الهضاب التي تستمر حتى المنطقة الساحلية بين  
قايس ومصراته يغطى بعضها ، وبخاصة الحمادة الحمراء التي يبلغ  
اتساعها ١٠٠٠٠٠ كيلو متر مربع صخور اللابة البركانية فى منطقة  
الهاروج الاسود ، وجبل السودا حيث يبلغ ارتفاعها ٩٠٠ متر ، وتطل على  
منخفض فزان ، وبخاصة المنطقة التي تسمى حفرة مرزق ، ويفصل كتلة  
برقة التي يبلغ ارتفاع الجبل الاخضر فيها أكثر من ٥٠٠ متر منخفضات  
عن بقية الهضبة الافريقية فى الجنوب . أما فى الصحراء الليبية فتوجد

كتلة العويينات التى تتكون من النيس والجرانيت التى يبلغ ارتفاعها ١٩٠٧ مترا ، وتغطى صخور الحجر الرملى المعروفة بالخرسان النوبى مساحة كبيرة من هذه الجهات ، وعلى حين توجد هضاب العصر الكريتاسى شرق خط يمتد بين فجيج والساوره وتوات نجد السهول التحاتية التى تنتمى صخورها للزمن الاول تنتشر فى الغرب من هذا الخط .

وتمتاز الصحراء الغربية بقلة ارتفاعها وندرة جبالها وكثرة كثبانها الرملية ، وتمتد من هضاب الصحراء الكبرى السنة من صخور الشست والحجر الرملى الديقونى والصخور الجيسرية التى تنتمى للعصر الفحسى حتى سلاسل الاطلس ، وتسود المناطق المنخفضة فى الصحراء الجنوبية بين النيجر وتشاد ومنخفضات كوارو بوديلى Kaouar, Bodolé وأراضى تشاد المنخفضة ، التى تنتهى بحافات شديدة الانحدار ، وهذه الحافات المعروفة بالمكويستا تعد من الظاهرات التضاريسية المهمة فى الصحراء ، وقد تسمى لوضوحها بأسماء خاصة مثل تيجيدى Todjeddi فى جنوب أير وتعد التكوينات الطينية والرملية من العصرين الكريتاسى والايوسين ، هى النوع السائد فى هذه الجهات المنخفضة . ولا يزيد نسبة ما تغطيه الرمال من الصحراء الكبرى عن ٧/١ مساحتها .

وهكذا يبدو سطح الصحراء وقد غلبت عليه الهضاب التى يتفاوت مستواها نتيجة للتعرية العنيفة ، كما تكثر به الجبال المنعزلة الى جانب المنخفضات والاحواض المقلية ، وان كانت قد تعرضت جهات الصحراء المختلفة لحركات أرضية مختلفة : فالصخور الببلورية والبركانية قد تعرضت للالتواء قبل العصر الكمبرى ، وتسمى سلسلة الصحراء الكبرى وتمتد بين الشمال والجنوب ، وانما كانت صخور الزمن الأول تعرضت للحركة الهرسينية فتكونت سلاسل جبلية من نوع الالتاى ممتدة بين الشمال والجنوب ، فان عوامل التعرية الصحراوية الجافة هى التى طبعت الصحراء بطابعها الغالب ، والتى جانب الحافات التى تكونت قبل الزمن الرابع حين كانت بعض الانهار تشق طريقها بين التكوينات الهضبية ، نال بعض هذه الحافات النحت الشديد ، فأصبحت تنحدر ببطء ، وكف البعض الاخر عن التراجع أو التآكل بفعل التعرية .



## البنية :

إذا كنا قد أطلقنا مناقشة الاسانيد التي أعتمدنا عليها في تمييز الصحراء عن الجهات المجاورة من النواحي الجغرافية ، فليس تحديد الصحراء من الناحية البنيوية بأمر شاق ، إذ تمتد الحدود بين اغادير وقفصة ، وهى فى جزئها الغربى تتبع وديانا طولية هى غويس وداس ، أما فى الجانب الشرقى فيوجد منخفض من الشطوط يسمى الشطوط الجزائرية التونسية ، وقد أدى التواء منطقة جنوب الاطلس الى اخراج كتلة أوراس ، ومنخفض الحضنة من الصحراء التى تضم مع ذلك الاطلس الصغرى ، وكتلة سرغو وغارطه Ougaria . وهكذا لا تتفق حدود الصحراء من ناحية البنية كثيرا مع النواحي الجغرافية الاخرى .

تتكون قاعدة الصحراء ونواتها الجيولوجية من صخور قارة جندوانا القديمة وذلك من الصخور البلورية وبخاصة النيس والميكاشست ، الى جانب. بعض الصخور الرسوبية القديمة التى تعرضت للالتواء والتحول مثل الكوارتزيت ، وقد تخللتها جميعا لابة قد خرجت منصهرة الى جانب عروق من الجرانيت منتشرة فى طياتها ، فقد أمكن للجيولوجيين أن يتعرفوا على تكوينات تمثل حلقات فى التطور الجيولوجى لهذه البلاد ، ويقال هذا التحول من القاعدة نحو السطح حتى تظهر على السطح بعض الصخور الرملية أو الرسوبية الاخرى ، وقد أمكن تمييز أربع مراحل تكتونية فى الصحراء الوسطى والجنوبية هى السوجارى والفاروسى Pharusien ، Suggarica فى منطقتى الاحجار وادرار الايفوغاس ثم النجرى Nigritien فى شمال غربى هذه الهضبة الاخيرة ، أما المرحلة الرابعة والاخيرة فهى أزوادا Azaouada التى توجد فى نطاق محدود فى المنطقة المسماة باسمها ، وقد وجدت تكوينات المرحلة الاولى وحدها فى تبستى والثلاثة الاخرى فى مراكش الجنوبية . وقد تعرضت هذه الكتلة للتعرية العنيفة فى آخر العصر السابق للكمبرى فتحولت الى كتلة صلبة قديمة حتى اثرت فيها الحركات التكتونية ، ولكن أكثر هذه الصرركات أدت الى اضطرابات بركانية وخروج طفوح اللابة وظهور الكتل الانكسارية المندفعة أو الاخايد الهابطة ، وقد تمخض عنها مثلا تكوين حوض تسلماين الكبير وحوض تمسنا الطوارق Teslamin بين كتلتى ادرار الايفوغاس وآير .

ولكن بعد تسوية هذه الكتلة بواسطة عوامل التعرية فان اختلاف نوع الصخور التي تعرضت لهذه التعرية العنيفة لا زال يؤثر على السطح الحالى فتوجد قمم من طبقات من الكوارتزيت تمثل فى منطقة الاحجار مجموعة متصلة مطردة الاتجاه بين الشمال والجنوب ، كما يظهر الجرانيت فى صورة قمم تتجه من الشمال الى الجنوب أيضا ، وفى غربى موريتانيا يبدو الكوارتزيت وقد ادى الى ظهور قمم تتخذ نفس الاتجاه ، كما هو الحال فى ساحل غانة وداهومى ، ولا تبدو هذه الكتلة القديمة فى صورة متصلة الا فى الصحراء الغربية حيث تبرز فى صورة نطاق بين تبريس وأغلب وتسمى ظهر الرقيبات المتبلور Dorsale cristaline Reguebat ، ثم ظهر فى الاطلس الصغرى وفى أقصى جنوب سلسلة جبال وغازته Ougarta ثم ظهر فى منطقتى تيمترين وأزواد Azaouad Timetrine الى الغرب من ادرار الايفاغاس ، أما فى الصحراء الوسطى والجنوبية فتنظر وقد أحاطت بها تكوينات رسوبية فى الاحجار وادرار الايفوغاس ، وأير وشمال تبستى ، ولكنها تختفى فى الجهات الاخرى ، وان كان ينم على وجودها غلبة الطبيعة الهضبية أسفل الرواسب أو التكوينات الغرينية .

### مناخ الصحراء :

تطالعنا الصحراء لأول وهلة بجديها وقحولتها ، فتضن على الاحياء بما يحفظ عليهم الحياة الا بشق الانفس ، وتصبح معركة الحياة مع هذه البيئة الضئيلة الشحيحة عبئا على الانسان ، فلا يتاح له ذلك الا فى أماكن مبعثرة محدودة ، ويسود الصحراء الكبرى التى تعد رغم اتساعها جزءا من صحارى العالم القديم نوع من المناخ يمتاز بالبساطة والاطراد الممل والمتشابه فى مساحات واسعة ، وفى الصيف تهب رياح الهرمتان من منطقة الضغط المرتفع الازورى وهى رياح مدارية قارية جافة متجهة نحو الضغط المنخفض من الشمال فى شرق الصحراء ومن الشمال الشرقى فى غربها ، ولكنها لا تتوغل جنوبا فى الصيف أكثر من عرض ١٧ شمالا ، أما فى الشتاء فيمتد أثرها من خط ٣٠ شمالا حتى قرب ساحل غانة ، هذه الرياح الدفيئة الجافة التى قد يشند هبوبها نهارا تهبط سرعتها اثناء الليل ، وتكتسب الحرارة بعد مرورها على الرمال المتلظية ، ولكنها تفقد الرطوبة التى تؤدى الى حدوث اضطرابات اعصارية تسفر عن سقوط بعض المطار ، كما أنها

تبرد سريعا بعد صعودها الى أعلى قبل أن تصل الى نقطة الندى لتصادف انقلاب الحرارة أى دفع الهواء الذى يكون على ارتفاع بضع مئات من الامتار مكونا طبقة تحول دون تكاثف البخار وسقوط المطر ، وهكذا يشتد الجفاف لهبوب الرياح القارية المدارية الجافة الحارة ، وان كانت هناك أسباب اخرى أقل أهمية مثل امتداد سلاسل جبال أطلس لتحول بين البحر المتوسط وأعاصيره المطيرة وبين الثلغل فى الصحراء يضاعف هذا الجفاف وبعد الكتل الجبلية العالية عن اقرب البحار لها كما يبدو من وقوع تبستى فى قلب الصحراء بعيدا عن خليج غانة ، كما أن مرور تيار كنارى البارد يسلب الساحل قدرا من الرطوبة والمطر ، فخط ٢٠٠ ملليمتر المتساوى يمر فى الشمال من ساحل المحيط الاطلنطى جنوب وادى سوس ليلتف حول جبال أطلس الصغرى والكبرى ، ثم يتجه شمالا متوغلا فى شرق مراكش ، ثم يتبع أطلس الصحراء ليوغل شمالا فى منخفض الحضنة ويصل الى البحر عند صفاقس ، وهكذا لا ينال جنوب تونس - ما عدا جبل مطماطه الذى يصيبه ٢٥٠ ملليمتر من المطر فى العام - وطرابلس وكل المنطقة الى الغرب من خط طول ١٢ شرقا الا هذا القدر الضئيل من المطر وهو ٢٠٠ ملليمتر ، أما فى الجنوب فيمر هذا الخط جنوبى تجانت والحوض وهما فى الواقع من مناطق الساحل - كما يمر عند منحنى النيجر ليخترق فى الشرق اراضى سفانا البساتين ٠ ويشتد جفاف المنطقة الغربية الداخلة لمسافة عشر درجات

من خطوط العرض من بنى عباس حتى تين زولتر Tin Zauloter حيث لا يصيبها أكثر من ٧٥ ملليمترا فى العام ، ورغم أن ارتفاع سطح الأرض فى مناطق الاحجار وتسيلى آجر واميدير وندمايت يؤدى الى زيادة يصيبها من الامطار ، فان هذه الامطار لا تتجاوز ١٠٠ ملليمتر ٠ وقد يسترعى الانتباه وجود بعض الاشجار وتوافر المياه فى بعض جهات تاسيلى والاحجار ولكن لا يعزى ذلك الى غزارة المطر بقدر حسن الافادة من المياه لحدائث مظاهر التعرية المائية وعدم مسامية الطبقات ، ولا يزداد المطر بالارتفاع باطراد ، ففى تبستى تختفى الاشجار على القمم التى لا يتجاوز ارتفاعها ٣٠٠٠ متر ، ومن الجهات التى يصيبها قدر معتدل من الامطار تلك الشقة من الارض الممتدة بين حمادة درعة وأدرار موريتانيا ، وتعد الصحراء الغربية التى يسقط بها ٦٠ ملليمتر منطقة استبس خفيفة ، أما فى وسط الصحراء فالاحواض الداخلية شحيحة المطر مثل عرق تشيش وامتداده فى منخفض تاونديت ان يصيبها نحو ١٠ ملليمتر وبلما ٢٢

مليمتر ، اما عرق مرزق الذى تحقق به من ثلاثة نواحي الجبال المرتفعة فلا يتجاوز مطره ١٠ مليمتر اذ يختفى النبات من داخله البتة .

ورغم ما يشاع من ان الصحراء تصيبها السيول الجارفة ، الا أن مثل هذه الامطار التى تسقط هى صورة سيول لا تمثل على الاقل فى شمال الصحراء الكبرى الا مظهرها شائنا ، ولا تؤلف الا نسبة ضئيلة من الامطار ففى صحراء الجزائر لا يوجد غير بلدة تندوف يسقط نصف أمطارها فى سيول ينهمر فى كل سيل ٣٠ مليمترا من المطر أو أكثر فى مدة ٢٤ ساعة ففى غارداية Ghardaia التى يبلغ متوسط مطرها ٦١ مليمترا فى العام ٣١٪ يتكون من المطر القليل ، ٧٪ من المطر الغزير ( يقصد بالقليل هو ما يقل فيه المطر الساقط فى مدة ٢٤ ساعة عن ٤٥ مليمتر ) ثم بلدة الاغواط التى يصيبها ١٧٣ مليمترا كمتوسط سنوى لا يتجاوز نسبة المطر القليل ١٩٪ والغزير ١١٪ ، ولكن يبدو أن المطر الغزير أكثر أهمية فى الصحراء الوسطى ففى تمانراست Tamanrassit التى يقدر متوسط المطر السنوى فيها بـ ٤٠ مليمترا سقط بها فى سبتمبر ١٩٥٠ نحو ٤٤ مليمترا فى ثلاث ساعات ، كذلك فى الصحراء الجنوبية قد يصيبها ٣٠ مليمترا فى اليوم كما حدث فى أكتوبر سنة ١٩١٢ ، ونجد أن التفاوت بين أمطار السنوات المتعاقبة كبير ، ففى تمانراست سقط ١٥٩ مليمترا فى عام ٣٦ و ٣٧ مليمتر فى عام آخر ، على حين انقطعت الامطار فى عام ثالث ، ومن ثم أصبح متوسط المفارقة فى سقوط المطر على جانب كبير من الأهمية ، فعلى حين تبلغ ٨١٨٠ فى الجزائر تصل الى ٣١٠ فى الاغوار و ٤٨٠ فى غارداية و ٤٩٠ فى طوغرت ، وقد يبالغ البعض فى تقدير طول فترة الجفاف والواقع أنها لا تقل عن عشرين شهرا فيما عدا المنطقة الساحلية حيث تقتصر فترة الجفاف عن الداخل ، هذا اذا استبعدنا المطر الذى لا ينفذ فى التربة والذى يقل عن خمس مليمترات ، وقد ذكر الطوارق من سكان تلك الجهات الداخلية أن أطول فترات الجفاف بلغت فى تادميت Tademait ثلاث سنوات ، وخمس سنوات فى أميدير Immidir وأكثر من خمس سنوات فى الاحجار ، ولذلك قيل أنه لا توجد بقاع فى السودان الغربى قد مر عليها أكثر من عشر سنوات دون أن يصيبها مطر غزير نسبيا أو تسعة دون أن يسقط بها مطر لا يقل عن ٥٤ مليمتر ، ويكثر الندى المتكاثف فى ساحل مابس والمحيط الاطلنطى وبالقرب من العيون والابار والكثبان الرملية فهى

لا تقل عن ٤٥ سنتيمتر مكعب فى ابر العباس على المحيط الاطلنطى ، حيث يغزر الندى ويكثف الضباب وترتفع نسبة الرطوبة ، ويتوغل أثر المحيط لمسافة ٢٥٠ كيلو مترا داخل الصحراء ، وصفوة القول أن الصحراء الكبرى لا نظير لها بين صحراوات العالم الاخرى فى قسوة جفافها وشدة وطائه ، ولا يشبهها فى ذلك الا صحراء اتكاما التى تقل كثيرا فى مساحتها عن الصحراء الكبرى .

والواقع أن كمية المطر لم تعد وحدها مقياسا لما يسود هذه الاصقاع من جفاف فطبيعة سقوط المطر وتوزيعه الفصلى ليس دون ذلك أهمية ، إذ أن مطر الشتاء حين تنخفض حرارة الليل أقل أهمية من مطر الربيع كعامل من عوامل النمو النباتى ، كما أن شدة البخر فى الصيف تنقص كثيرا من أهمية مطر الصيف - كل تلك الظروف تؤثر فى تقويم مفعول المطر وأهميته ، ولذلك تتضح أهمية تمييز الاطراف الشمالية التى يسقط مطرها فى الشتاء عن الجنوبية التى يصيبها مطر الصيف والغربية الساحلية التى قد يسقط مطرها فى الفصليين والجهات الصحراوية القاحلة التى لا ينالها المطر فى فصل معين ، ولما كان البخر لا يقل أهمية عن المطر فى تحديد الجفاف ، فقد اقترح البعض نسبة معينة تزداد كلما ابتعد الانسان عن الصحراء ، وقد قدر أن الصحراء تنحصر تبعا لهذه النسبة ( وقد سميت كفاية المطر Pluvio — efficacite ) بين ٤ و ٥ على الاقل فى جهاتها الشمالية ، لأن الجنوب لم تتوافر لدينا فيه محطات الارصاد لقياس البخر لتقدير هذه النسبة . هذا وقد أمكن تقسيم الصحراء الى الاقاليم الاتية من ناحية المطر وهو الذى يميز بقاع الصحراء : -

١ - الاقليم المتوسط الجفاف وتنحصر نسبة فعالية المطر فيه بين ٤ - و ١٢٥ وتضم هذه المنطقة السفوح الجنوبية لاطلس الصحراء ، أى مراكش الجنوبية فى الغرب ، أما فى الشرق فتشمل تونس الجنوبية والجفاره ، أما فى الغرب فهذه المنطقة التى يمكن أن نصفها بالاستيس الصحراوية Saharo — Steppe فتمتد نحو الجنوب .

٢ - الاقليم الشديد الجفاف . ونسبته بين ١٢٥ و ٣٠٠ وتشمل أودية جنوب مراكش التى تقع فى ظل المطر والسطوح الصخرية أو الحمادة فى جنوب الجزائر ، وكتل الصحراء الوسطى الجبلية والاحجار وتاسيلى

التي يقل فيها البخر ، ويغزر المطر لارتفاعها ، وتضم هذه المنطقة نطاق ساحل المحيط الاطلنطى فى شطرها الجنوبي ، فضلا عن الكتل الجبلية الجنوبية التي تصيبها الرياح الموسمية مثل أدرار الايفوغاس وتبستى .

٣ - اقليم بالغ الجفاف ، وهى الجهات التي تقل فيها نسبة فعالية المطر عن ٣٠٠ وتشمل منخفضات الصحراء الوسطى : تنيرى وتنزروفت وفزان .

### الحرارة والبخر : نشوء الحرارة حين تصب

الشمس الساطعة شواظها على رمال تصل درجة حرارتها ٧٧° م ، وان كانت لا تغلغل كثيرا فى التربة فلا تتجاوز ٢٧.٢° م على عمق ٣ متر من السطح الذى تصل حرارته الى ٥٥° م . ولا يخفف من حرارة الهواء الملامس للارض صعوده لوجود ظاهرة انتشار الهواء الساخن فى طبقات الجو العليا وقد ارتفعت الحرارة فى عين صالح لمدة ٤٥ يوما متوالية الى درجة ٤٨° م ( متوسط النهاية الكبرى ) و ٢٨.٥° م فى نهايتها الكبرى المطلقة و ٢١° نهايتها الصغرى . اما العزيرية فقد ساعدت رياح الفوهن المحلية فى رفع حرارتها حتى أصبحت اكثر بلاد العالم حرارة حيث يبلغ متوسط الحرارة الشهرى ٤٣.٣° م فى الفترة بين مايو وسبتمبر ، ولكن ما ان تغرب الشمس حتى تهبط الحرارة بمقدار ١٥° - ٢٠° م ولكنها تظل مع ذلك مرتفعة تتراوح بين ٢١° و ٢٨° م ، ولكن مع ذلك يعد الشتاء فى الصحراء دفىء محتمل ، ولكن اثناء الليل قد تنخفض الحرارة الى دون درجة التجمد فتغطى القنوات فى واحة توغرت طبقة رقيقة من الجليد ، ويسقط الصقيع نحو ست مرات فى العام المتوسط فى هذه الواحة فى الشمال ولكنه لا يسقط فى الجنوب ، اما على ساحل المحيط الاطلنطى فتنخفض الحرارة بنحو ١٠° م عن الداخل لكثرة ما يسود الجو من الضباب وسحاب منخفض ورطوبة .

ويتراوح البخر فى الصحراء الشمالية بين ٢٥ - ٦ مترا ونحو ثلاثة بل اربعة أضعاف نسبة البخر فى بلاد المغرب ، ولا يقل البخر عن ذلك فى جنوب الصحراء عند حدود السودان فيصل فى نيمما Nema الى ٦٦.٦ متر . ولكن فى منطقة الصحراء الغربية التي تطسل على المحيط الاطلنطى فتهبط نسبة البخر فى منطقة الصحراء الغربية التي تطل على المحيط الاطلنطى فتهبط نسبة البخر الى ثلاثة أمتار وهى فى النهاية القصى للبخر فى شهر

ديسمبر فى بورت أئين ، وفى مارس فى نواكشوت ، وذلك لتأثير تيار كنارى،  
والواقع أن نطاقا ينخفض فيه البخر السنوى والشهرى يمتد على طول ساحل  
المحيط بين كيب فردى وسوس .

والواقع أن موارد الصحراء الاقتصادية محدودة وسكانها قليل ،  
فالواحات لا تمثل إلا بقاعا صغيرة متفرقة كثيرا ما تكتظ بسكانها وتعجز  
عن توفير أقتواتهم ، فالبلح والملح وبعض الصمغ من الجنوب ، والاسماك  
من موريتانيا تكاد تكون الى جانب بعض الحيوانات وجلودها هى أهم  
ما تنتجه الصحراء ، ولكن التجارة بالمقايضة وبخاصة الملح والبلح وتجارة  
المرور هما أهم ألوان النشاط الاقتصادى فى تلك الجهات ، فسكان الاستبس  
فى الشمال كثيرا ما يهاجرون كل شتاء حاملين معهم الشعير والقمح  
والصوف والزبد والمصنوعات ليستبدلوا بها البلح من سكان الواحات ، أما  
البلح فهو أهم السلع التى يحملها سكان الصحراء الوسطى الى سكان  
أطراف السودان مقابل الحصول على الذرة الرفيعة والرقيق فى عهد الرق ،  
وفى موريتانيا يذهب « المور » الى شمال غرب أدرار الموريتانية ليستخرجوا  
الملح من سبخاتها ليحصلوا مقابله على الحبوب والمنسوجات القطنية من  
الجنوب . ولكن هذا النوع من التبادل قد أضمحل كثيرا ، فقد انتشرت  
التجارة النقدية فى الشمال ، ولم يعد البلح فى نظر سكان الاستبس سلعة  
ذات أهمية ، أما الملح فقد أدى انتشار طرق المواصلات التى تغلغل استخدام  
ملح السنغال فى منطقة النيجر الشمالية وعند أطراف الصحراء ، ولم يعد  
من اليسير اغراء الزنوج على استخدام ملح الصحراء . وقد عثر على  
موارد ضخمة معدنية ، استغل منها الكثير وفى مقدمتها البترول والصدئ  
والفوسفات والرصاص والزنك والفحم والقصدير والنحاس ، ولكن لا زال  
الكثير منها لم يستثمر بعد ، وسوف تتناول دراسة كل معدن فى موضعه  
المناسب مع كل وحدة سياسية يوجد بها أو تستغله .

وكانت تمتد عبر الصحراء طرق متعددة للقوافل تربط بين الأقاليم  
السودانية ذات المطر الصيفى وبين مناطق البحر المتوسط ذات المطر الشتوى،  
وكانت تدر هذه الطرق على سكان الصحراء وبخاصة حول الواحات وينابيع  
المياه القليلة اخلاف الرزق ، فهناك طرق طولية تمتد على طول منطقة الساحل

الشمالي وقد عنى المستعمرون برصفها وبخاصة أثناء احتلال الايطاليين  
بليبيا ، أما الطريق الجنوبي فهو يسير عند أطراف السفانا فى السودان ن  
السنغال غربا الى شرق السودان عند ساحل البحر الاحمر شرقا ، وهى  
تعتبر منطقة مكشوفة تتوافر فيها موارد المياه وفرص العمل لكثير من  
الجماعات والحجاج الذين اتبعوا هذا الطريق فى رحلتهم الطويلة للوصول  
الى 'الاهك' المقدسة فى الحجاز ، وقد وجه الفرنسيون بعد أن ربطت  
الصحراء مستعمراتهم فى غرب افريقية بمستعمراتهم فى بلاد المغرب  
اهتمامهم الى انشاء الطرق المزودة بالكثير من وسائل الراحة وأهمها .

١ - الطرق بين نهاية سكة حديد الجزائر وسكة حديد النيجر ، وهو  
يربط بين كولومب بشار فى الشمال وجاو على النيجر ، وهو من اهم  
الطرق .


٢ - طريق يصل بين سكة حديد الجزائر من توغرت عبر الاحجار  
حتى مدن وسكة حديد شمال نيجيريا عند زند وكانوا مارا بعين صاح  
وأغادس .

٣ - طريق موريتانيا ويصل بين سكة حديد مراكش مارا بتندرف حتى  
تمبكتو وسنت لويس .

٤ - طريق فزان ويربط بين طرابس وفزان ومنطقة تشاد .

٥ - طريق يصل برقة عن طريق واحة الكفرة بمنطقة تشاد فى شمال  
افريقية الاستوائية الفرنسية سابقا . وقد اقترح الفرنسيون مد سكة حديدية  
على طول تنزروفت ، ولكن لا زالت نهاية سكة حديد الجزائر عند كولومب  
بشار تبعد نحو ١٤٠٠ ميل من جار التى سوف تتصل بنيامى كذلك بسكة  
حديدية ، وذلك قبل أن يتصل هذا الطريق المقترح بسكك حديد غرب افريقية  
( انظر شكل ٢٥ ) .





## الفصل الثانى

### الأقسام السياسية والاقاليم الطبيعية

#### فى الصحراء الكبرى

##### التقسيم السياسى :

ريما كان الدافع القوى لسيطرة الدول الاوربية على الصحراء هو تأمين تخوم مستعمراتها ومناطق نفوذها الغنية فى الشمال والجنوب ، فقد حصل الفرنسيون فى سنة ١٨٩٠ باتفاقهم مع انجلترا على المنطقة الواقعة جنوب على نهر النيجر وبين Say بلاد المغرب حتى خط يمتد بين Barrova على بحيرة تشاد ، وقد أعيد تحديدها عدة مرات سنة ١٨٩٨ وسنة ١٩٠٤ وسنة ١٩٠٦ ، وفى سنة ١٨٩٩ عقد اتفاق اخر حصل بمقتضاه الفرنسيون على تبستى وبورقو ووادى ، ثم عقد اتفاق ثالث ليحدد منطقة النفوذ الاسبانية فى سيدي أبنى والساقية الحمراء وريودورو ، كما أبرمت اتفاقات مماثلة لتحديد تخوم ايطاليا فى ليبيا ولكن أصبحت غير ذات موضوع ، وقد حاول الفرنسيون اخضاع الصحراء دون أن يبذلوا جهدا أو نفقات باهظة ، فاستخدموا الابل يركبها رجال من الوطنيين مسلحون بالاسلحة الحديدية ، أخذوا يزحفون من مراكزهم فى الشمال والجنوب فى وقت واحد حتى استطاعوا اخضاعها .

وتضم الصحراء الكبرى عدة وحدات سياسية وبعض أجزاء من وحدات سياسية أخرى تقع خارج نطاق الصحراء ، مثل الاقاليم الجنوبية و جنوب الجزائر ومساحتها ٢ مليون كيلو متر مربع ، ويبلغ سكانها نحو ثلثى مليون نسمة ، وتسمى هذه المنطقة بالصحراء الشمالية وتتوغل فى الجزء الاوسط حتى هضبة تسيلي أو الاحجار ، أما بقية ما كان يسمى بالصحراء الفرنسية فقد أصبح يمثل جزءا من أفريقية الغربية الفرنسية سابقا ومنها موريتانيا الواقعة فى الغرب ويسكنها نحو نصف مليون وتنحصر أهميتها الاقتصادية فى الملح والابل وبعض الاسماك على الشاطئ والصنغ

فى الجهات الجنوبية عند حدود السودان وثروتها من النحاس والحديد ، ويدخل جزء كبير منها فى ليبيا وسنتناولها بالحديث فى موضعها المناسب ، كما أن أفريقية الاستوائية الفرنسية كانت تضم جزءا كبيرا من حوض تشاد ، ولما كانت أكثر جهات هذه المستعمرة السابقة يقع خارج نطاق الصحراء فسندرجى الحديث عنه الى أن نتناول بالدراسة أفريقية الاستوائية الفرنسية كجزء من أفريقية الوسطى ، أما فى الغرب فتوجد منطقة كانت تسمى بالصحراء الاسبانية تضم اقليم ريودو ورو Rio de Oro و اقليم الساقية الحمراء ويقطنها نحو ٤٠ ألف كما يدخلها نحو ٣٠ ألف من البدو انتجعا للكلأ ، وقد سمي الجزء الجنوبى باسم ريودورو أو نهر الذهب ، وقد كان السكان الاصليون يجلبون التبر أو تراب الذهب ليعرضوه بالقرب من قلعة برتغالية ترجع للقرن الخامس عشر ، وتعد ملكا خالصا لاسبانيا ، كانت مستعمرة أما المنطقة الوسطى وهى التى تسمى مراكش الجنوبية هى تحت الحماية ولكنها نالت استقلالها وتعرف الآن بالصحراء الغربية وقد وضعت حدود تلك المناطق سنة ١٩٠٢ وسنة ١٩٠٤ وسنة ١٩١٢ بمقتضى اتفاقات أبرمت مع فرنسا المجاورة فى أفريقية الغربية الفرنسية سابقا . ولكن كل هذه الحدود التى تبدو مستقيمة أو هندسية انما هى وليدة ما يسود هذه الجهات من جذب وجفاف ، فهى حدود مصنوعة تماما لم يراع فى تخطيطها أية اعتبارات بشرية أو ظروف طبيعية ، والواقع أنه من الصعب أن نميز اقاليم مختلفة فى الصحراء ، فالسلاسل الجبلية والانهار والوديان والهضاب التى تكسوها النباتات الكثيفة معدومة وقليلة الأهمية فى فصل الاقاليم اذا وجدت ، فكل الجهات تحمل طابعا ينطوى على الجفاف والجذب، فكانما هذا الاختلاف فى مظاهر السطح قد سادته الجفاف بغلالة متجانسة حتى يكاد لا يتبين الانسان من ورائها اختلافا اقليميا مهما ، ومن ثم لا نجد السكان قد أطلقوا اسما يدل على اقليم معين محدود ، فالكلمات التى دارت على أقلام الجغرافيين ليست الا أسماء تطلق على ظاهرات معينة اضطر الجغرافيون مكرهين على أن يتخذوها أعلاما ذات دلالة اقليمية ( مثل حمادة وتنزروفت وتينيرى وأيدايين وأدرار Adrar, Ideyen والجوف وأواكر Aouaker ) فخط النخوم السياسية بين موريتانيا الصحراء الغربية يتبع خط طول ١٢ غربا ويقطع بذلك هضبة زمور ، والحدود بين تونس

والجزائر تقطع العرق الشرقى ، فبدو الواد فى الجزائر ينتقلون عبر الحدود الى تونس ، كما تكثر العصابات والجماعات فى منطقة الحدود بين البلدين ، كما أن الحدود بين ليبيا والجزائر سنة ١٨٣٩ فصلت طوارق آجر الايفوغاس عن واحتى غات وغدامس فى ليبيا وهما من أسواقها المهمة .

وهكذا كانت هذه الحدود توضع بغض النظر عن تنقلات البدو وهجراتهم أو خطوط القوافل وطرق التجارة .

وقد بذل N. Murat, B. Zolotarevsky أولى المحاولات لتقسيم الصحراء لاقاليم طبيعية على ضوء الظاهرات الطبيعية للمسطح والنبات الطبيعى ، ولكن لم يلقيا بالا لنظام تصريف المياه رغم أهميته فى التخفيف من حدة الجفاف وأثره فى نظم الحياة السائدة .

ولكن مهما كانت الأسباب التى يتذرع الجغرافى للاستعانة بها فى تقسيم المنطقة الى اقاليم طبيعية ، فانه يجد فى الاختلاف المناخى بين الشمال الذى يتعرض للاعاصير الشمالية التى تسبب سقوط المطر فى الربيع والشتاء والخريف ، حيث برودة الشتاء تكفى لنمو الشعب وزراعة القمح والشعير فى المناطق التى تتوافر فيها التربة والرطوبة مثل منخفضات الدايات والماندر ، وبين الجنوب الذى يصيبه مطر الصيف الموسمى فى منطقة الصحراء الساحلية مما يساعد على نمو العشب الذى يظل حتى الربيع ، فتفيض الانهار وتجرى المياه فى بعض الوديان وتتكون المستنقعات تسمى « القرارة أو المناقع » حيث يزرع بعض الذرة الرفيعة والسسم - مظهرا للاختلاف ، يضاف الى هذا الاختلاف المناخى نوع من التباين فى مظاهر السطح ، فالى الشرق من منخفض بسكرة نجد الانتقال فجائى بين جبال أوراس ومنخفض الجريد على بعد ٦٠ كيلو مترا منه أما فى الشطر الغربى فنجد الهضبة الصحراوية وقد اختفى سطحها تحت رواسب سميكة وصفوة القول أن السبخة والحماة هما الظاهرتان المميزتان للصحراء الشمالية ، على حين نجد السهول الفسيحة كتنزروفت وتنيرى Ténéré وقد تراكت على سطحها الرمال أحيانا أو ظل سطحها عاريا أحيانا أخرى هما الظاهرتان المميزتان لسطح الصحراء فى الجنوب ، وإن كانت فى الحالتين خالية من

اثار الوديان والجبال ، التى كشفت التعرية عن باطنها البللورى القديم بعد أن تاكلت بفعل التعرية حينما وأن كانت قد ارتفعت فى بعض المناطق بفضل ما تراكم عليها من حمم البراكين . ولكن اذا أدركنا توافر هذه الظروف الطبيعية فى الشمال من الانهار والوديان والينابيع والمياه الباطنية وقربها من السطح اذا قورنت بجنوب الصحراء ، لم ندهش لظهور التقدم فى استغلال المياه فى الواحات وانتشار الزراعة وبخاصة البلح الذى توجد ١٢ مليون نخلة من بين ١٥ مليون فى انحاء الصحراء التى كانت تتبع فرنسا كلها ، ويجب الا نغفل تقدم سكان هذه الجهات وكثرة الواحات التى نشأت بها « القصور » الحصينة ومارس سكانها نشاطا تجاريا جعل من هذه « المدن الصحراوية » محطات للتجارة والوساطة التجارية وذلك مثل تفيلاط وتوات وزيبان والجريد أما فى صحراء الجنوب فالنخيل ليس له أهمية الا فى أدرار فى موريتانيا ووديان آير وتبستى ومنخفضات كوار وبرقو ، ولا تنتج سوى النوع الرديء الذى لا يقارن بثمار نخيل البلح فى وادى الرق والجريد، بل ان المناطق الزراعية المحدودة فى الصحراء الجنوبية - لبعده المياه السطحية وصعوبة الوصول اليها وعدم توافر المياه الباطنية الارتوازية - انما نشأت حديثا على يد الأرقاء من « الحراثين » الذين لا يبذلون براعة فى الزراعة أو رفع المياه ، والواقع أن البقاع التى تقوم فيها الزراعة لا يجدر أن يطلق عليها اسم واحة الا فى موريتانيا وكوار فحسب .

ولكن اذا كانت الصحراء الجنوبية قد افتقدت النشاط الزراعى ، فان توافر الملح فيها وبعض المراعى فى منطقة الساحل حتى فى موسم الجفاف ساعد على قيام بعض المدن فى الجنوب حيث تقوم بها الحرف اليدوية أو تتخذ مراكز للنشاط التجارى كما هو الحال فى ولاته وتمبكتسو وأغادس وأهم هذه الاقاليم الجغرافية فى الصحراء هى :

١ - الصحراء الشمالية : هذه هى صحراء الواحات والهضاب الجيرية والكثبان الرملية ، تمتد بين سلاسل الأطلس وموطن الطوارق فى جبال الصحراء الوسطى ، فتنشر الواحات فى الجهات المنخفضة حيث تتوافر المياه الباطنية ، أما كثبان الرمال فتمتد فى شكل مقوس بمثل الجهات المنخفضة أما الهضاب الجيرية فهى ليست دون التنزروفت فى الصحراء

الوسطى جدبا وقحولة ، أما الكثبان الرملية التى تشغل مساحة واسعة فقد تضم بعض موارد المياه ، ويقطن هنا الشعانبة من خصوم الطوارق الالداء ، وهم من البدو العرب الذين ينتشرون حول واحات ورقله والواد والقلية ، تضم بعض موارد المياه ، ولما كانت أكثر الواحات تقع فى الصحراء الشمالية فقد يفوق عدد المستقرين فى الواحات من العرب والبربر والحراثين عدد البدو فى الصحراء .

فحين تتجاوز واحة الاغواط وجبسال أطلس الصحراء نجد اقليم « الدايات » الذى يتكون من رواسب الزمنين الثالث والرابع ، وهو يمثل فى الواقع حلقة اتصال بين أحواض شرق الصحراء الجزائرية وغربيها ، الجيرية ، ورغم كثرتها فهى قليلة العمق قد تتراكم بها المياه عقب سقوط وتنتشر فى هذا الاقليم المنخفضات المغلقة التى يتميز بها النحت فى الجهات السيول التى ينمو على أثر سقوطها شجر البطوم أو ما يعرف باسم « فستق الصحراء » ، ويلي ذلك الى الجنوب هلال من الحمادة أو الهضاب الجيرية التى تحيط بمنخفض ملغيغ أفرغر وهذه الهضاب الجدباء التى لا ينمو بها نبات يذكر تسمى بحق « بلاد الظما » إذ يسميها السكان بهذا الاسم لتقابل « لاد الايار » أو الابار كما يطلق على الواحات فى الصحراء ، وتشمل هذه الهضاب مزاب ، تادميت ، وحمادة الحمراء تنهبرت ، ولا يقل ارتفاع هذه الهضاب عن ٦٠٠ - ٧٠٠ متر ، تنحدر الوديان فيها من الغرب الى الشرق حيث توجد واحات مزاب وغردايه وبنى يسقين وبنونرا والعطوف وميلك Gen Noura, Beni Isguen, Mzah, Ghardaia, Melik, El Ateuf والى جانب واحات وادى ميزاب توجد واحات تقع فى منخفضات أخرى هى قرره ، ومثليلى وبريان ، وبعد قيام واحة ميزاب التى لجأ اليها الاباضيون من الخوارج مثلا لاغفال الانسان للظروف الطبيعية ومقتضياتها ، فهى تستمد مياهها القليلة من ابار تحفر لعمق ٥٠ مترا أو أكثر لتصل الى الطبقة التى يلتقى بها الحجر الجيري بالطفل ، وقد أقيمت قناطر للفادة من مياه وادى ميزاب ، ولكن قد يمر العمام دون أن تمطر السماء أما فيضان هذا الودى فلا يحدث أكثر من مرة كل ثلاثة عشر سنة ، أما المياه الارتوازية فقد أمكن بعد حفر ٤٣٣ مترا الوصول اليها سنة ١٩٣٧ ولولا ما يملكه هؤلاء السكان من احراج النخيل فى ورقله ، وما ينالونه من

أجور حين يهاجرون للعمل فى مدن اقليم التل ، وما يكسبونه من وراء قيامهم بالوساطة التجارية وقيادة القوافل فى المنطقة التى يقيمون فيها ، لتعذر عليهم فى بيئتهم القاسية أن يحصلوا على ما يمكسك رمقهم رغم عنايتهم المثالية بما يملكونه من حدائق فى واحتهم .

وتمتد هضبة ميزاب الجيرية نحو الجنوب الى القليعة لتنتهى من ناحية الغرب بحافة مرتفعة تشبه حافة اللواء السالفة الذكر ، ولكن عند التقاء هذه الحافة بالعرق الغربى قامت واحة القليعة بقصبتها الحصينة وعلى حين نجد الهضبة الجيرية قاحلة ، يزرع الحراثون والزناطية من المغاربة النخيل وغيره فى هذه الواحات التى تحفر فيها حديثا كثير من الابار الارتوازية ، وتمتد الى الشرق من الهضبة الجيرية هضبة رملية أحدثت فى تكوينها الجيولوجى ينشقها وادى مياه الذى يتجه من هضبة تادمايت حتى غرب ورقله حيث يبلغ عرضه ٣٠ كيلو مترا ، وتمتاز هذه الهضبة بأنها قاحلة تنحدر بشدة نحو الجنوب ، وان كان انحدارها نحو الشمال أكثر تدرجا وبطئا ، ومن ثم كانت الأودية الشمالية تسمح بنمو الحشائش ، ولكن تنتهى هذه الهضبة من الجوانب بمنحدرات شديدة وعرة بوجه عام تسمى « الباطن » وتطل المنحدرات فى الجنوب الغربى على واحات توات وتيديكلت وهكذا تبدو هذه الهضاب وقد شقتها وديان كبيرة عميقة هى وادى زقزير ووادى النساء ووادى ميزاب ، تتقاطع فى مناطق تسمى « الشبكة » وكما يتخلف من التعرية المائية والجوية فى قيعان الأودية كتل جبلية تسمى « محاسر » ، يعلو ظهر الهضاب كتل مختلفة تسمى « القور » ، وكثيرا ما تسمى حافات هذه الهضاب التى يطلق عليها أحيانا اسم جبال الكهوف . وكانت من قبل تصل الى صبخة قرارة ، ولو أن المياه الآن فى بعض الفيضانات تتسرب أسفل الكتلان لتصل الى السبخة وتضيف الى أملاحها السطحية . الواقع أن واحات قرارة وتوات وتيديكلت تمثل وحدة جغرافية إذ تحصل بواسطة طريقة الفجساره على المياه المتسربة فى هضبة تادمايت والتى تقع هذه الواحات عند أطراف ثنية محدبة فيها . فتقع قرارة وهى أهم هذه الواحات فى منطقة منخفضة تنحدر اليها الوديان من جبال وهران ومن هضبة تادمايت وتنتشر السيخات وأهمها تميمون بين تكوينات الزمن الاول

أما حوض الساوره وحوض توات فهما يقعان الى الغرب من هذه الهضاب ، حيث كانت تمتد أهم المجموعات النهرية فى العصر المطير بين نهر النيل والمحيط الاطلنطى مثل وادى الساوره ووادى زوزفانه ، فكانت تستمد حينذ مياهها من منطقة متسعة تقع بين هضبة أغلب والاحجار ، كما كان يتصل بها وديان تنبع من أطلس الصحراء فى جنوب وهران وهى وديان الغربى ووادى سيقور ووادى زرقون وهى كلها روافد الساوره ، ولكن الكتبان التى تدعى عروق الساوره تعترضها • فتتراكم الرواسب • فلا عجب أن ظهرت الواحات هنا وأهمها واحة توات وقورارة وتيد كيلت أما واحة وات فتمتد فيها غياض النخيل لمسافة ٢٠٠ كيلو متر بواحة قراره نحو ٢٥٠٠٠ ساكن يملكون نحو مليون نخلة ، وقد يبدو لاول وهلة لكثرة السبخات أن هذه الواحة تدين بحياتها لامتداد وادى الساوره الى الجنوب ، ولكن الواقع أن أقرب الويان اليها هو وادى مسعود الى غربيها ، على حين تدين بقيامها الى تسرب مياه هضبة تدمائت وتعد واحة تيديكلت الواقعة جنوبي هضبة تدمائت امتدادا للواحتين السابقتين وهى تقع شأن الواحتين السالفتى الذكر فى المنخفضات وتستخرج مياهها من التكوينات السفلى من الحجر الجيرى الكريتاسى ، واحة تيديكلت تمتاز بأنها أكثر افادة من انكسار يمتد من الشمال للجنوب ، كما أنها لا تقنصر فيما تحصل عليه من مياه على هضبة تدمائت ، بل تستمد البعض الاخر من هضبة اميدير فى الجنوب • وهناك واحات متفرقة كان لها ظروفها الخاصة ويختفى الامتداد على طول خطوط الينابيع وغياض النخيل كما لوحظ فى واحة قرارة وتوارت ، وأهم هذه الواحات هى عين صالح وعين غار ( منطقة تيديكلت ) •

ولواحة تيديكلت أهمية خاصة ان تقع عند نهاية منطقة انتشار اللغة العربية ويمثل العرب والبربر نحو ثلثى السكان ، أما الثلث الاخر فمن « الحراثين » الارقاء ، ولكن للعرب السيطرة وان كان الطوارق يترددون عليها ، والواقع أن بعض سكان هذه الواحة ذات الطابع الانتقالى يشبهون سكان الجنوب فى تشبثهم بالمرعى وعزوفهم عن الزراعة ، ويقابل حوض اغرغر ووادى عير من الرق من هضبة تدمائت الجيرية منخفض الساوره ، كما تنتشر فى هذا المنخفض تكوينات الزمنين الثالث والرابع التى تمتد



عبر العرق الشرقى الذى يقابل فى الجانب الاخر برزخ القليعة والعرق الغربى .

وينتهى العرق الشرقى فى الجنوب بهضاب جيرية مرتفعة فى الجانب الشرقى وكثبان رملية وغرود فى الجانب الغربى ، أما فى الشمال فتتخفض الكثبان الرملية حتى تختلط بمنخفضات منها شط الجريد ، ويتخلل هذه الكثبان مناطق تخلو من الرمال تمثل الوديان القديمة لنهر اغرغر الذى كان ينبع من الهضبة الوسطى وبخاصة من تاسيلى وتزهرت ليصب فى الشمال وقد كان ( الودى الطويل ) الذى كان ينتهى عند ورقله شمالا يمثل رافدا لهذه المجموعة . كما كان وادى ( مياه ) يتصل بوادى اغرغر عند ورقله من قبل ، وتعد واحة ورقله التى تمثل منخفضا يحيط به الكثبان الرملية والسبخات العديد أكبر واحات صحراء الجزائر ، وتتدفق المياه من باطن الارض حيث ينمو بها نحو مليون من نخيل البلح من عمق يبلغ ٢٥ مترا .

أما وادى ريغ الذى ينتهى عند شط مليغ والذى لا تجرى فيه مياه سطحية فليس الا دلتا نهر اغرغر القديم ، وقد تراكم ما يزيد على ١٠ أو ٢٠ كيلو متر من رواسب هذا النهر القديم ، عند مصبه فادت الى انفصال وادى ريغ حتى قلما تجرى المياه فى واديه الان ، فضلا عن جفاف الصحراء ، وينحدر وادى ريغ من ٧٩ مترا حتى منسوب - ١٣ مترا عند شط ملغيغ . وتمتد هناك منطقة عظيمة من مناطق الواحات بفضل ما توافر فيها من مياه ارتوازية أدت فى كثير من الاحيان الى احداث فتحات تشبه فوهات البراكين ، لتخرج منها المياه بتأثير الضغط الهيدروليكي وتسمى هذه الينابيع الطبيعية اسم قريات ( قرى ) وتوجد غياض النخيل من بلدية أمور على بعد ٢١ كيلو مترا جنوب توغرت حتى شط مروان لمسافة ١٢٠ كيلو مترا ، وتتكون رواسب وادى ريغ من تكوينات نارية من الزمن الثالث تغطيها رواسب نهريه - بحيرية استمر ارسابها منذ الميوسين الاوسط حتى الان ، وتنحدر المياه مع انحدار الطبقات السفلى من الجنوب الى الشمال ، وتقع هذه المياه على ابعاد متباينة تصل ١٢ مترا فى بعض الجهات و ١٦٠ مترا فى توغرت وبعض الجهات الاخرى ، ويبدو أن ما تحويه هذه الطبقات من مياه لا يمكن أن يتجاوز ١٦ مليون لتر ، ولذلك يفكر البعض فى

حفر آبار أشد عمقا لتصل الى طبقات الحجر الرملى التى تمتد أسفل الحجر الجيرى ، والواقع أنه لوحظ أن حفر آبار جديدة يسفر عن الاقلال من مياه الابار القديمة وبخاصة التى تقع فى جهات مرتفعة نسبيا .

ويزرع هنا نخيل دجلة نور ومن المهم توفير أسباب الصرف للتخلص من تراكم الاملاح ولذلك حفرت القنوات « الخنادق » لتحمل المياه الملحة الى شط ملغيغ أما واحة صوف التى يسكنها نحو ٥٠ ألف نسمة وتملك نحو ١٢٠ ألف من النخيل ، ويهاجر عدد كبير من سكانها للعمل شأنها - شأن كثير من سكان واحات الصحراء كميزاب وبسكرة وغيرها - فتعتمد على المياه المتراكمة فى الرمال فلا توجد بها ينابيع أو آبار

ويوجد الى شمال ريغ بضعة واحات فى اقليمى الزيبان وجريد تستمد مياهها من الشمال ، وهى تقع مع صوف وورقله فى منطقة يمكن أن نسميها حوض اغرغر الذى يضم أكثر من أربعة ملايين من النخيل . وهكذا تعد هذه المنطقة من أغنى جهات الصحراء ، وقد تمكن البعض من تمييز المناطق المختلفة فى الصحراء الشمالية تبعا لطريقة الحصول على الماء ، ففى الشمالى الغربى اهدى السكان براعة كبيرة فى الافادة من الوديان التى تهبط من جبال أطلس الكرى فى جزئها الاوسط مثل درعة ودادس على حين نجد البعض الآخر يقع فى الشرق مثل غريس والزيز وعير ، وتفيض هذه الأنهار فى الربيع والخريف على السواء ، ولذلك يمكن الانتفاع بمياهها فى السهول الفيضية maaders بشق الطريق أمام الفيضان ، لتغمر هذه البقاع أو باستخدام السواقي لرى غياض النخيل بوجه خاص ، وتمتد هذه السهول الفيضية لمسافة ١٠ - ٢٠ كيلو مترا على طول وادى درعه الاوسط ، ولكن مع ذلك تكثر الهجرة من هذه الواحات التى قد تتناول نصف بل ثلثى سكان الواحة ، مما يؤدى الى اضمحلال الزراعة واهمال السواقي والقناطر وأعمال الرى الأخرى، أما الى الشرق من وادى غير فى أطلس الصحراء فتقل الأمطار ويكثر الاعتماد على الآار والفوجارة وبخاصة عند حافة هضبة تدمائيت حيث تلتقى صخور الحجر الرملى والحجر الجيرى ، فيستمد بعضها الماء من هضاب « الحمادة » أو من رمال العرق الشرقى ، أو من آبار قد حفرت فى الرواسب المفككة ، أما الى الشرق من المنخفض المعروف

بالقنطرة فتنشر الينابيع والابار الارتوازية ، فالياه الباطنية تنسرب من سفوح الجبال وهى لا تقل أهمية عن مياه الوديان والفوجارة ، ولذلك كانت واحات بسكرة وقفصة وتوزر وغدامس من أكثر جهات الصحراء الجنوبية رخاءا .

وخلاصة القول أن الصحراء الكبرى الشمالية التى تعرف باسم بيدمونت الصحراء الكبرى ، عبارة عن حوض كبير يزداد اتساعا وهبوطا نحو الشرق ، وهو اقليم واحات يمتد جنوبا عن طريق واحات ميزاب وتادمايت وقرارة وتوات وتيديكلت .

#### الصحراء الوسطى :

تقوم فى وسط الصحراء الكرى كتل جبلية ضخمة تخفف من وطاة جفاف الصحراء ، هى الاحجار وما يحيط به من كتل أميدير وتسيلى Tassili وأهنت اسجراد الى جانب كتلتين أخريين تمتدان للمجنوب هما آير وأدرار الايفوغاس ، ويتألف معظم هذه الكتل من صخور الكتلة الاركية القديمة التى تعرضت للالتواء فظهرت التواءات العصر الالجونكى المسماة جبال الصحراء الكبرى ثم خرجت اللابة لتغطى مساحة من سطح الارض ، وأكثر الصخور أنتشارا هى الشسست الى جانب صخور متحولة أخرى .

#### الاحجار ( الحجار ) :

تتكون من سلسلة من الهضاب التحاتية ذات السطح المستوى ، شقتها وديان عميقة ، وهى تتألف من الصخور البلورية والقاعدية ، أما أكثر جهات هذه الهضبة ارتفاعا فهى اتاكور أو الكويدية وهى قبة قد انتشرت فوق سطحها البراكين ، وحولتها عوامل التعرية الى سهل تحاتى ثم رفعها جمعاء ، فصدعتها الشقوق التى تخللتها الصخور البركانية كالاندسيت والتراهيت والبازلت ، وكثيرا ما ترتفع فوهات البراكين القديمة بنحو ٤٠٠ - ٥٠٠ متر على سطح الهضبة القديمة . وتبدو هذه الكتلة التى يعوزها التجانس وقد مزقتها العوامل التكتونية والتعرية ، وترتفع بعض

القسم البركانيّة مثل امات ( ٣٠٠٦ مترا ) ، ولامان ٢٨٣٢ مترا ) ويششق وادى اغرغر الطريق بين نفرست ( ٢٨٣٢ ) و Eguère ، ويمتد من هضبة أتاكور هضبة أناهف التى لا تختلف عنها من حيث البيئة ، وتمتد هضبة تسمى أما درور Amadar الى شمال كتلة أتاكور ، وقد تعرضت هذه المنطقة جميعها لتمزيق عنيف بواسطة الوديان التى تتصل باغرغر وتلك التى تنتهى فى تنزروفت ، ومن المتوقع أن تطورا حدث فى ظروف النحت فى مثل هذه الأودية التى يدل سمك رواسبها الحديثة على تعرض هذه المنطقة لامطار أكثر مما يصيبها الآن - فقد تأثرت بحركات تكتونية وتغييرات فى المناخ . وكما يتكون فى هذه الأودية بعض البحيرات تنتشر بعض البحيرات القليلة العمق ، وقد توجد فى الجهات المرتفعة مجارى مائية دائمة أو فصلية ، ولكن مراكز الزراعة القليلة لا توجد فى الجهات المرتفعة جدا ولكن على ارتفاع نحو ١٥٠٠ متر فوق سطح البحر فحسب ، ولا يزيد سكان هذه المنطقة المتسعة عن ٥٠٠٠ نسمة من الطوارق الذين يتشبهون بحياة الرعى والانتقال ، وتكثر هنا مراكز الزراعة التى يسميها الطوارق أريم « Aerem » « واحات لا تنمو بها النخيل » كما ذكرنا من قبل . وتتأثر أير بالنشاط البركاني العنيف على عكس ادرار الايفوغاس ، وقد سلفت الاشارة الى وجود المخروطات والاعمدة البازلتية فى الاحجار ، على حين نجد أن الاحجار الرملية فى تاسيلي آجر قد شققتها الوديان الى هضبات مستوية منعزلة .

ويحيط بهذه الهضبة المكونة من الصخور البللورية سياج أو نطاق من الهضاب الرملية المستوية تسمى Tassilis أو « هضاب » وقد اطلق عليها حزام الهضاب وهى مودير أو اميدير ، وأهنت ، وأسجراد ، وأجر ، ويختلف اتساع هذه الهضاب ، فقد تتسع كثيرا كما فى منطقة آجر ، ولكن هذه الهضاب التى تمتد لمسافة ١٢ من درجات الطول تلعب دورا مهما لغناها سواء بالمياه أو الرعى ، فالوديان والحجر الرملى الذى يسود فى هذه الهضاب يسمح بتوافر المياه السطحية والباطنية .

أما مناطق التنزروفت التى تدل - بغض النظر عن طبيعة سطحها - على أشد الجهات قحولة فى الصحراء ، فهى الصحراء بمعنى الكلمة ،

ويطلق هذا الاسم على منطقة تقع غربى الكتلة الوسطى تمتد بين اهانت وأدرار الأيفوغاس يبلغ عرضها ٥٠٠ كيلو متر ، وهى تتكون فى شماليها من سهل تحاتى من الصخور البلورية وفى جنوبيها من الحجر الرملى الذى ينتمى للزمن الثانى ، ولكن سطحها يغطيه الحصى ٠ أما منطقة التنزوفت الشرقية فتسمى Ténéré وهى حوض قديم بين آير والاحجار ٠ ورغم جذب هاتين المنطقتين من الفيافى « التنزوفت والتيرى » فمن اليسير على الأبل اختراقها ، كما أنها لا تخلو من المياه القليلة فى الحجر الرملى الديقونى فى عين زيزا ٠ أما هضبة « أدرار الأيفوغاس » فيبلغ متوسط منسوبها ٨٠٠ متر وأن كانت بعض القمم الجرانيتية تبلغ ١٠٠٠ متر ، وقممها المستديرة ذات الشكل القبابى بفعل التعرية تنتشر فى غربها ، ولا تختلف هذه الهضبة عن غيرها فيما عدا ما يصيبها من مطر الجنوب الموسمى ، فكثير من سكانها مستقرون يرعون البقر فى الوديان ، وكما يلجأ سكان هذه المنطقة الى منطقة الاحجار لبيع محصولاتهم وبخاصة الأبل التى لا يمكن أن تباع فى إقليم النيجر ، فان سكان الشمال من طوارق الاحجار يلجأون اليها فى سنوات الجفاف والقحط ٠

ويحيط هضبة آير جهات سهلية منخفضة نسبيا ، ويحكم موقعها وطبيعتها يمكن أن تعد من الفيافى أو التنزوفت لولا ارتفاعها ، وتجرى بها بعض المجارى التى تتدفق فيها السيول نحو ٣ - ٤ مرات فى العام ، ويبدو التناقض بين وديانها الناضجة المتسعة التى تكونت فى الهضبة القديمة التى تحولت الى سهل تحاتى والتى يبلغ ارتفاعها ٨٠٠ متر احيانا ، وبين القمم البركانية التى يصل ارتفاعها الى ١٠٠٠ بل ١٤٠٠ متر احيانا ، ويبدو على منحدراتها الجدة والشباب ، وتنددر تلك الانهار التى تسمى « كورى » من الشرق الى الغرب لتلقى برواسبها فى منطقة تلك Talak فتتوافر فيها المراعى النضرة والمياه ويطبق اتساع هذا الحوض أو المنخفض أكثر من ٢٠٠ كيلو متر ٠ ويغلب على القرى هنا الطابع التجارى ويختلط سكانها من الطوارق والهوسا والمولدين ، ويغلب على هذه المنطقة السهولة وتنددر نحو الغرب ، وتفصل كتلة أغلب القديمة المرتفعة نسبيا بين حوض تندوف فى الشمال وتاودينى فى الجنوب ، ويعد سهل تنزوفت بما يغطيه من الحصى فى الجنوب الشرقى أكثر جهات الصحراء جدبا ٠

## الصحراء الغربية :

أقل جهات الصحراء تمزقا وتباينا فى مظاهر السطح ، حيث يخفف قربها من المحيط الاطلنطى من قسوة الجفاف وجذب الصحراء ، وذلك بفضل الندى الغزير والضباب الكثيف والسحاب المنخفض المتراكم والحرارة المنخفضة وبخاصة فى الصيف ، ويلطف نسيم البحر الحرارة ان يتوغل لمسافة ٢٥ - ٥٠ كيلو متر فى الداخل ، لأن السطح يتألف من هضيبات أو جبال صغيرة تدعى القليب .

فكثيرا ما يكون الخريف ممطرا فيظل الكلا يانعا نضرا ويسمى « الربيع » وهو يقابل كلمة « عشب » فى الجزائر ، وتنتشر فى هذه الجهات الساحلية منخفضات يغطيها الصلصال وتنمو بها الاعشاب وتسمى « قرارات » ويبنى السكان فيها الشعير تاركين الاعشاب وهى نامية لتحميها من الرياح ومن الحيوان وينتشر فى الداخل نباتات اليوفوربيا ، والواقع أن هذه المنطقة الغربية تتكون من التواءات متسعة ضحلة قد اتجهت من الجنوب الغربى للشمال الشرقى . أهمها هذا الانثناء المحذب يمتد لمسافة ١٥٠٠ كيلو متر من الطرف الشرقى لنجد « أغلب » الى جنوب الصحراء الغربية ، وقد تعرض للتعرية حتى تحول الى سهل تحاتى تحيط به هضاب قديمة من ضخور الزمن الأول ، وكلها تسير متوازية لمسافة طويلة ، وهكذا تنتشر الهضاب الصخرية المستوية أو الحمادة الى جنوب وادى درعة ، كما أن هناك سهولا ساحلية بحرية حديثة يتفاوت اتساعها تمتد على طول الساحل ، وهكذا يغطى سطح الأرض هنا الحصى أو الرمال ، ولكن يسود الاتجاه من الجنوب الغربى للشمال الشرقى كل أرجاء هذه المنطقة ، وهكذا يصبح الاستواء من أهم الظاهرات المميزة لهذا الجزء من الصحراء الذى ظل منذ حركة جبال الصحراء دون أن يتأثر كثيرا بالحركات التكتونية .

يتكون الشطر الشمالى الغربى من كتلة أغلب القديمة المؤلفة من ضخور اركية من سلاسل جبلية قديمة من النوع الهوسينى ، تحولت الى هضاب تحاتية من الحجر الرملى تخللتها الرمال ، كما توجد مساحات شاسعة من الرمال هى عرق ايجيدى فى الغرب وعرق شيش فى الشرق ، وقد سبق أن ذكرنا أن ما يصيب هذا الجزء من المطر أكثر مما يصيب المنطقة

الداخلية ، فآثار التحات المائى واضحة ، كما أن هناك بعض الاودية تنتهى بالمحيط مثل درعه والساقية الحمراء التى تنتهى بدالات تنمو بها الشجيرات والحشائش الكثيفة ، أما الجزء الجنوبى من الصحراء الغربية فهو فى الواقع امتداد للصحراء الجنوبية ، يتكون من صخور الجرانيت والنيس ( ٣٠٠ - ٣٥٠ مترا ) ولا تخلو هذه المنطقة من بعض كتل جبلية قديمة مثل أدرار سوتوف التى يعلو سطحها بمقدار ١٢٠ مترا عن سطح المنطقة المحيطة، وتنتشر السهول الحصوية الى الشرق من هذه الكتلة ، وقد تتناثر فى أرجائها سلاسل جبلية صغيرة من الكوارتزيت وبعض القباب من الجرانيت ، والواقع أنه يوجد بين جبال ادرار فى موريتانيا الواقعة قريبا من الساحل ( تسمى Adrar Timar ) وبين الهضبة القديمة الداخلية سبخات وكتبان رملية ، وقد شقت السيول وديانا عميقة يوجد الماء قريبا من سطحها فى أدرار الموريتانية حيث يستقر السكان ، وتمتاز الكتبان الرملية التى تتخللها منخفضات عارية من الرمال التى تحيط بأدرار الموريتانية بعدم انتظامها ، وأن كان يغلب عليها الاتجاه الجنوب الغربى - الشمال الشرقى أى فى اتجاه الرياح السائدة .

ومما يميز هذه المنطقة من الصحراء أن العرب الذين التفتوا حول هضاب وجبال مراكش فى القرن الحادى عشر انتهى بهم المطاف اليها حيث استقروا فى منطقة الساقية الحمراء ، والتى خرجت منها حركة انعاش الاسلام وأحيائه فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، وتطغى اللغة العربية هنا كما يشهد تمسك السكان بالدين الاسلامى ، وأهم السكان جماعة التكنة بين درعة وبورت آتين ، والقريبات وهى من البربر المستقرين يتجولون بين وادى درعة وادرار الموريتانية ، أما أولاد دليم من الغرب فينتشرون بين الساقية الحمراء ورأس ميريك ولا تزيد المسافة بين المراعى بعضها والبعض الاخر عن سفر يوهين أو ثلاثة ، كما لا تزيد المسافة بين الآبار عن ٦٠ كيلو مترا ، من الطريف أن المراعى تظل فى مناطق الكتبان مدة أطول منها فى الجهات الاخرى ، وان كانت أقل غنى من حيث موارد الماء من الصحراء الحصوية « السرير » ، وتربى هنا الابل والبقر والماعز والاغنام وبخاصة فى منطقة « أدرار سوتوف » ، وقد يبدو لأول وهلة أن مرور تيسار كنارى البارد وتوافر المواد الغذائية اللازمة لتكاثر الأسماك على ساحل المحيط الاطلنطى الذى يبلغ نحو ١٢٠٠ كيلو متر سيجعل من حرفة صيد الاسماك

نشاطا اقتصاديا مهما ، ولكن كثرة الضباب وكثرة الرعوس الصخرية وسرعة التيار وعدم توافر الحماية للسفن قد قلل من أهمية الصيد .

### الصحراء الشرقية :

تمتد هضاب جيرية فى الشرق بين الاغواط وتادمايت فى شكل قوس يقترب كثيرا من خليج سرت ، ومن أهم هذه الهضاب هضبة تنغرت التى تضيق بين الكثبان الرملية فى الشرق منها والتى تعرف باسم ايدارين وبين كثبان اغرغر فى الغرب ، أما هضبة الحمادة الحمراء التى تبلغ مساحتها نحو ١٠٠٠٠٠٠ كيلو متر مربع فلا يتجاوز ارتفاعها ٤٥٠ - ٥٠٠ متر ، وهى هضبة مستوية قاحلة تماما ، ولذلك فمظاهر الحياة توجد فى الاطراف حيث الواحات مثل واحة غدامس ، ومع ذلك فان مياهها التى تقع على عمق ١٢٠ مترا فى صخور العصر الكريتاسى ، لم تكن لتوفر لها أسباب البقاء لولا موقعها الجغرافى قريبا من طرابلس وتنتهى هضبة حمادة الحمراء فجأة فى الجنوب عند حمادة تنغرت . ومن الشرق توجد منطقة منخفضة تفصلها عن هضبة برقة وطرابلس ، وقد تعرضت الاجزاء الشرقية من حمادة الحمراء لخروج اللابة البركانية ، فظهر جبل السودان وجبل هاروج الاسود (٩٠٠ متر) وقد استمر خروجها بين الزمن الثالث والعصر الكريتاسى ، ويقع عند منحدراتها الشمالية واحات فى منخفضات هى الهون وعين زلة وسكنة ووادن .

وقد تحدثنا عن بقية المناطق الصحراوية الشرقية فى طرابلس وفزان وبرقة حين تناولنا بالحديث عن ليبيا التى تضم هذه المناطق داخل حدودها ( انظر شكل ٢٦ ) .

### تيسسى :

تمثل منطقة مرتفعة وبخاصة ان الجهات المنخفضة تحيط بها فيبدو ارتفاعها شاهقا وتقدر مساحة هذه الهضبة ذات الشكل المثلث بـ ١٠٠ ألف كيلو متر مربع ، ويقل ارتفاعها فى الشمال ، وتتكون من ثلاث طبقات السفلى وهى من الشست والصخور الاخرى المتبلورة التى تحولت الى سهل تحاتى امتدت فيها التواءات من الشمال للجنوب ، ثم طبقات من الحجر الرملى





بين يوليو وسبتمبر قليلة ، كما تنتشر بها أودية ضيقة فى أعلاها حيث تشق طريقها فى القمم البركانية لتتسع مجاريها بل تجف فجأة اذا هبطت الى الهضاب ، والواقع أن الجبال المرتفعة لا تتوافر فيها لا التربة ولا المياه الباطنية التى تتوافر عند حافات الهضاب حيث تقوم القرى ، ولذلك اقتصرت الزراعة على بقاع صغيرة أهمها باراداي الواقعة على المنحدرات الشمالية الشرقية ، والتبو الذين يتخذون هذه الهضبة معقلا لسكانهم من البدو ، ولا يزيد عددهم على ١٢ ألف نسمة يربون الابل والضأن والماعز ، وأهم المحصولات الزراعية الذرة الرفيعة والنخيل ، وتشبه انيدى الهضاب التى تحيط بهضبة الاحجار فى جافة قد قطعتها الاودية ، ويفصلها عن تبستى منخفض كبير ، ويمارس التبو من سكانها حرفة الرعى أيضا ، ولا يقتصر التبو على سكنى هضبتى تبستى وانيدى ، وانما ينتشرون فى اقاليم تشاد المنخفضة وبورقو وبحر الغزال وبوديلى .

### الصحراء الجنوبية :


تمثل هذه الصحراء تلك السهول المنبسطة التى كانت تمتد فيها أذرع المحيط فى الزمنين الثالث والرابع ، فعلى حين نجد أن الصحراء الوسطى والشمالية تتألف من هضاب أو مرتفعات قديمة ، يغلب على هذه الجهات الجنوبية الصخور الرسوبية الحديثة التى خلفها البحر حين طغى على هذه الجهات فى آخر الزمن الثانى ، ولا شك أن هذا البحر كان يتصل بالخليج الذى امتد من مصر عبر الصحراء الليبية من الشرق كما كان يمتد البحر غرب كتلة الاحجار من الغرب ، بل ظل يغطى الجهات الغربية فى موريتانيا حتى الزمن الرابع ، تنتشر فى الصحراء الجنوبية الكثبان الرملية الثابتة التى لا تبلغ سمكا كبيرا فى أكثر جهاتها .

أفضى أنبساط سطح هذه الجهات الى أن المياه أصبحت تنصرف اليها ، كما فى حوض تشاد وعند ثنية النيجر ، ويتفق هذا النطاق الجنوبى من الصحراء مع ما عرف باقليم « الساحل » ويزداد العمران كما يختلط السكان من البدو الرعاة مع المستقرين من الزراع كلما اتجهنا نحو الجنوب ، وفى الغرب يمتد أثر المطر الموسمى الذى يقتصر على شهر أغسطس عند رأس ميريك ، وتنتشر هنا الهضاب الاركية القديمة والهضاب المكونة من الحجر

الرملى كهضبة تاجانت Tagant التى يبلغ ارتفاعها ١٥٠ - ٢٠٠ متر ، كما توجد الابار على عمق ٣ - ٦ متر فى وديان تمتد عليها واحة تيجيجا « Tidjikja » . وكثيرا ما توجد بعض صخور « الديابيز » الشديدة المقاومة التى تبدو فى شكل حافات مرتفعة ، كما تبدو الظاهرات التى ذكرناها فى موريتانيا كالكتبان الرملية التى تمتد من الشمال الشرقى نحو الجنوب الغربى تتخللها مساحات تخلو من الرمال والسبخات ، وتزداد الصخور حداثة كلما اقتربنا من ساحل المحيط ، وينمو هنا الاثل والطلح والسنط والاشجار الشوكية ، ولكن اشجار الكرام Kram Kram تقل كثيرا كلما اقتربنا من الساحل .

وربما ساعدت بعض السيول التى تنحدر من اقليم تاجانت الجبلى على توفير المياه للزراعة فى منطقة البراكنة ، وفيما عدا ذلك تقوم الزراعة على ضفاف السنغال ، وتعد حرفة الرعى التى يمارسها السكان من البراكنة والطرارزة الحرفة الاولى ، كما تمتد سهول منخفضة تغطيها صخور الحجر الرملى الذى يتركز فوق الصخور النارية القديمة بين النيجر والسنغال ، وهناك ثنية مقعرة فى منطقة اروان تنحصر بين الالتواء المحذب فى منطقة تبريس فى الغرب ومنطقة ادرار الايفوغاس فى الشرق ، وتمثل اروان نفسها مركزا او قاع بحيرة قديمة كان يلقى فيها النيجر برواسب من الرمال والصلصال قبل ان يحدث الاسر النهري عند بلدة توساي Tosayo فقد كان النهر القديم يمتد فى منطقة فوم ركة Fom Rekha ويفصل هذه المنطقة عن تانزروفت فى الشمال صخور قديمة مرتفعة ، وتسمى هذه المنطقة بالمرأة « مراية » وتنتشر هنا الكتبان الثابتة فى منطقة اروان ، ولكن لا تزال هذه الكتبان متحركة بين اروان وحافة كيناشيش ، ويقل سمك هذه الرمال كلما اتجهنا شمالا ، بعيدا عن قاع المنخفض فى اروان . وتنتشر اعشاب الاستبس الصحراوية بين اروان وأولاته ، كما ينمو نبات الحاد فى منطقة ازواد حيث يتجول البرابيش والكونته الذين يفصلون بين الطوارق فى شمالهم والطوارق فى تمبكتو ، وقد قلت أهمية الملح وتجارته الان ، ولذلك يعتمد السكان على تربية الماشية والضأن حتى عرض ٢١ شمالا تقريبا .

أما منطقة منحى النيجر فتغطيها رواسب قارية بحيرية من الرمال والصلصال ، وتنتشر المستنقعات لسوء الصرف فى أرجاء تلك الجهات



تقسيم الصحراء التي كانت تسمى "بالأسبانية"  
بين المغرب وموريتانيا

أما الى الشرق من ذلك فيقتصر العمران فى هذه المنطقة المنبسطة على الوديان حيث تقسوم بعض القوى مثل وادى بوسو ووادى ماورى Dallol Bosso, Dallol Maouri ويتخللها جهات جافة تشبه الصحراء ، تدعى أزواك Azaouak حيث يتجول الطوارق والفولاني فى جمهورية النيجر الحالية ، ثم يلى ذلك شرقا هضبة جييرية تنتشر عند حافتها - لأسباب دفاعية - قرى السكان من الطوارق والزنوج تسمى هضبة أدر Ader عند تهوا Tahoua ، وتنتشر الهضبيات الرملية والجيرية الطينية ، تتخللها السهول وبعض الكتل الجبلية القديمة من الصخور المتبلورة فى المنطقة الواقعة بين عيروزندر غربا وبلما شرقا ، ويمكن اعتبارها منطقة واحدة ، لأن نظام الصرف فيها يتجه نحو الجنوب الغربى للنيجر ، وهذه الأودية التى ترجع لزمن الرابع تدل على أن المناخ قد أصابه التغيير ، وتعد منطقة تجاما Tagama المرتفعة فى الشمال اقليم بين اقليم السودان الغربى فى الجنوب ، واطليم الساحل ، فيمكن زراعة الحبوب على المطر . وبخاصة الذرة الرفيعة ، ولكن لا زال لتربية الحيوان أهمية كبرى ، وقد قامت مدينة زندر سنة ١٨٢٠ ويسكنها الهوسا ، كما توجد مدن صغيرة أخرى مثل كانو التى تعد منافسا مهما لزندر . وسنرجى الحديث عن المنطقة الواقعة الى الشرق من ذلك ، وهى تشاد ، حتى نتحدث عنها كجزء من أفريقية الاستوائية الفرنسية سابقا حين تتناول أفريقية الوسطى بالدراسة .

يعيش أربعة أخماس سكان الصحراء الكبرى فى أطراف الصحراء الشمالية ، وفى تبستى والحجار حيث يقيم التبو والطوارق الذين يتحدثون لغاتهم الخاصة ، فالتبو الذين لا يزيد عددهم عن ١٠٠.٠٠٠ نسمة يمارسون الرعى ويستخدمون عناصر زنجية فى زراعة الوديان ، ويتحدث سكان بعض الاطراف الشرقية والغربية والشمالية اللغة العربية ، يعيش الرعاة والزراع الذين يختلفون من النواحي الاجتماعية والاقتصادية ، فالى جانب رعاة الضأن والأبل من سكان شمال الصحراء الكبرى الذين ينتجعون مراعى الشمال صيفا فى جبال أطلس مثلا ، يعتمد فريق آخر من الأباله على مراعى الصحراء الكبرى كالمرقبيات والشعانية فلا يغادرونها ، على حين يجمع بعض هذه القبائل شبه المستقرة بين زراعة الوديان وتربية الحيوان ورعيه كالمرازيق فى جنوب تونس والزناتان والريانية فى طرابلس .

ولكن تجارة القوافل التي أصبحت مقصورة على تنظيم قوافل الملح التي تضم ٢٥٠٠٠ من الابل لاستخراج ملح تاوديني وبيلمة لمدة أسبوعين أو ثلاثة قد قلت أهميتها ، كما اختفت الاتاوات بعد استباب الامن ، وتنتشر الواحات فى الشمال جنوبى المغرب فى أعالي وادى درعة ووادى الساورة حيث توجد الفجارات ، وتنتشر الآبار العميقة فى وادى عير وواحر ميزاب كما تحفر فى العرق فى واحة صوف الحفر لتمكين أشجار النخيل من الوصول الى منسوب المياه فى رمال العرق الشرقى ، وتكثر الينابيع والآبار عند سفوح الحافات فى واحات فزان ، وتجذب الواحات ٥/٤ سكان الصحراء فى مناطق الساحل أو فى حقول التعدين فى الداخل ، وتتنوع المحاصيل تونس والجزائر وليبيا بصفة خاصة بحثا عن العمل ومباهج الحياة سواء ورغم أن عدد هؤلاء السكان قد زاد حديثا الا أنهم أقبلوا على الهجرة فى الزراعية فى الواحات من خضروات الى أشجار الفواكه والحبوب ، ولكن أشجار نخيل البلح التي أخذت تمد الاسواق فى الشمال بحاجتها من البلح تعد أهم محصول تجارى ، ويسود نظام « الخمس » وهو نظام الشرك الذى ييخس الزراع حقهم فيقدمون على هجرة الحقول وبخاصة بعد توافر ظروف العمل وتحلل نظام رق الأرض الذى كان يربط هؤلاء الحراثين بأرض الواحات وأصحابها ، وقرى الواحات المزدحمة ، التى تضيق طرقها وقد اتخذت مساكنها شكلا مستطيلا أو مربعا تحصر بين أسوارها أفنية واسعة نسيبا ، تلحق بها مخازن حصينة مما يعكس الحرص على أراضى الواحة بتوفير طرق الدفاع عنها والحجاب السائد .

### الثروة المعدنية :

كانت الصحراء الكبرى بأرجائها الشاسعة تمثل مناطق خلفية لوحدة سياسية أخضعها الدول الأوروبية وضممتها ، اذا أنشأت الدول الاستعمارية وفى مقدمتها فرنسا مناطق نفوذ شمالى الصحراء الكبرى وجنوبها على السواء ، وان كان الشطر الأكبر من الصحراء الكبرى قد خضع للاستعمار الذى قدم متغلغلا من الشمال ، وقد اقتصر العمران على الوديان المتناثرة وبعض العيون والآبار حيث نشأت الواحات ، وكانت هذه الآبار قليلة العمق فى أكثر الأحيان ، ولم تنتشر الآبار العميقة الا بعد أن اتجهت العناية الى استخدام آلات الحفر العميق ، فاكتشفت مناسيب عميقة لياه الباطنية أهمها

المنسوب القارى المتداخل فى التكوين الالى الذى ينتمى للفترة بين الجوراسى والكوريتاسى Inter Calay Continental Alpienne كما عثر على مياه عميقة فى طبقات الحجر الرملى من عصور الزمن الاول كما فى عين صالح .

أما الموارد المعدنية التى أحدثت ثورة فى النظم الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى بعض جهات الصحراء الكبرى ، وبددت المزاعم القديمة التى كانت تصور هذه الفياض الجرداء كمناطق موات وجدب ، فقد فرضت عليها الدول الأوروبية حدودا هندسية مصنعة ، لا يسدرك سكانها من الرعاة مغزاها ، ولا تحرص الدول المحيطة بها على أن تستكثر من أراض الصحراء أو تعين حدودها وتؤمن تخومها لتحصل على مزيد من مناطق تجوس فيها الاشباح وتغطيها الرمال الظامئة ، ولا تبشر تكويناتها من الزمن الاركى بأن محتوياتها من المعادن عظيمة فكان كل ما يراود الدول الممتدة على أطراف الصحراء الكبرى أن تأمن شرورها ، وربما كان نشوب الحرب العالمية الثانية سببا عرقل المضى فى التنقيب عن ثروتها المعدنية واستغلالها وبخاصة بعد أن تبين أن ثلثى مليون ميل مربع فى الصحراء تتألف من صخور رسوبية يحتمل أن تحمل فى طياتها ثروة البترول ، حتى لتوشك أن تتكشف عن وجود نطاق جديد ضخم من البترول يمتد عبر الصحراء ايزانا بدخولها ميدان الاقتصاد الدولى من أوسع أبوابه ، بعد أن ظلت نسيا منسيا منذ أقدم العصور . ففى سنة ١٩٥٦ كشفت شركات البترول عن حقلين فى جنوب الجزائر وهما حقل حاسى مسعود وحقل العجيلة ، الأول شرق الجنوب الشرقى من ورقله والثانى على بعد ٣٠٠ كم الى الجنوب الشرقى ثم توالى كشف الحقول حول العجيلة وبينها وبين حاسى مسعود ويمتد خطان للنايب لنقل البترول أحدهما الى بجايه من حقل حاسى مسعود والاخر من حقل العجيلة الى الصخيرة فى جنوب تونس ، أما الثالث فيمتد من حاسى مسعود والمنطقة التى تقع منها الى أرزيو ، وقد تزايد الانتاج الجزائر من ٢١ مليون طن سنة ١٩٦٢ الى ٢٩٠٥ مليون طن سنة ١٩٨٥ ، أما ليبيا فيصدر البترول من خمس موانى هى مرسى الحريقة بالقرب من طرېق، ومن مرسى البريقة والسدرة ولانوف والزيتينة فى ساحل سرت ، ويستخرج من حقل زلطن التابع لشركة ايسو وحقل راقوية التابع لمجموعة ايسو سرت ، وحقل البيضاء التابع لمجموعة أموزيس ، وحقول زكوت والظهرة

والواحة والسماح التابعة لشركة أوزيس ، وحقل الحفرة التابع لشركة موبل - جلسنبرج ، الى جانب ٨٢ بليون متر مكعب من الغاز وهى الكمية التى انتجتها شركة ايسو من حقل زلطن ، وايسو سرت من حقل الراقوية ، وايسو أويزيس من مجموعة حقولها المختلفة ، وقد تطور الانتاج الليبي من ٩ مليون طن سنة ١٩٦٢ الى ٢٣ مليون طن سنة ١٩٦٢ الى ٥٠ مليون طن سنة ١٩٨٥ وقد اخذت تكتشف حقول صغيرة فى جهات متعددة من أطراف الصحراء فى المغرب وتونس وموريتانيا والصحراء الاسبانية ، وتنتج الجزائر قدرا كبيرا من الغاز من حسى رمال على بعد ٢٨٠ ميلا من البحر وينقل الى أرزيو بواسطة خط من الانابيب حيث يكتف لتصديره وأن كانت قد اتجهت النية يوما ما لتصديره بواسطة خط من الانابيب يمتد أسفل مياه البحر ، ولكنه الآن ينقل بواسطة البواخر الخاصة بذلك الى ايطاليا وفرنسا واسبانيا وبريطانيا بصفة خاصة ، كما اكتشفت ابار غازية أخرى فى عين صالح على بعد نحو ٦٠٠ ميل من البحر المتوسط .

وتستغل معادن أخرى أقل أهمية من البترول يوجد الجانب الاكبر منها فى الصخور القديمة ، فالحديد يستخرج من قار جبيلات حيث يقدر احتياطى الحديد بثلاثة مليارات من الاطنان تقع فى جنوب شرق واحة تندوف بـ ٧٥ ميلا ، كما يستغل حديد موريتانيا الذى ينقل من مناجمه فى فورت جورو « Fort Gouraud » بواسطة سكة حديد طولها ٤٠٠ ميل لتصديره عن طريق بورت ايتين ، أما النحاس فقد عثر عليه فى اكجوجت فى موريتانيا جنوبى فورت جورو بمسافة ٢٥٠ ميلا ، ولكن مشروع استغلاله وتصديره عن طريق ميناء بورت ايتين بعد مد خط السكة الحديدية لهذا الغرض - لم ينفذ بعد ، ويوجد نحو مليون طن من المنجنيز فى جبل قطارة جنوبى كولب بشار بنحو ٩٥ ميلا ، كما يوجد فى تواز الواقعة غربى كولب بشار بـ ١١٠ ميلا منجم اختلط فيه الرصاص بالكبريت والحديد ويقدر الخبراء أن به ١٧ مليون طن من الحديد الى جانب قدر أكبر من الرصاص وهكذا اخذت الصحراء تزيح النقاب السميك الذى نسجته صعوبة المواصلات ولفح الجو وقلّة السكان وتأخرهم والجهل الذى كان يشوب معرفتنا بجيولوجية الصحراء الكبرى وثروتها الدفينة من المعادن بل والمياه العميقة ، ولكن ما ان مزق الحجاب عن بعض ما كان يتستر وراء قسّمات وجهها العابسة حتى أصبحت الواحات « جنان الصحراء القديمة » تعجز عن الإبقاء على سكانها




الذين أخذوا يضيعون بحياتها ، حتى ان فرنسا فى محاولاتها العديدة للابقاء على ثروات الصحراء بيديها - من عزل جنوب الجزائر عن شمالها - الى انشاء منظمة الاقاليم الصحراوية O.G.R.S. Organization التي تتولى تحت اشراف فرنسا ادارة وحكم الصحراء الكبرى فضلا عن استغلال ثروات المعدنية - قد ساومت الجزائريين على ان تترك لهم شمال الجزائر بمزارعه الغنية مقابل ان يتركوا لها الصحراء على نقيض ما كانت تحرص عليه من قبل ، واخذت هذه السياسة تستهدف فى نفس الوقت ضمان خضوع هذه الجهات اقتصاديا لفرنسا حتى لو استقلت الدول التي تتبعها ، وكانت تضم هذه المنظمة مالى والنيجر وتشاد والجزائر ، وبعد انسحاب مالى والجزائر منها ظلت تشاد والنيجر تتلقى العون والمشورة من فرنسا لتمويل وتنفيذ مشروعات استغلال ثروات الصحراء المعدنية وغيرها ، وكان لهذا الكشف والاستغلال الذى لا زل فى بدايته اثار اجتماعية واقتصادية وعمرانية وسياسية بعيدة المدى لم تظهر سوى بوادرها ، ويكفى أن نذكر أن الحدود السياسية التي كانت تبدو بدعا فى نظر المجتمعات فى الصحراء الكبرى بل والدول التي تحيط بها وتضم بقاعها داخل نطاق حدودها السياسية - أصبحت ذات أهمية كبرى بل ومثار خلاف بين الدول المتجاورة كما هو الحال فى الصدود الجزائرية وغيرها .

#### وأهم الوحدات السياسية هي :

١ - موريتانيا ، وهي دولة نشأت حديثا فى صميم الصحراء الكبرى ، ولكن بفضل امتدادها على طول ساحل المحيط الاطلنطى حيث تخف وطأة الحرارة والجفاف وينتشر الضباب وتكثر الثروة السمكية ، ويفضل قيام الزراعة الفيضية فى نهر السنغال وديانه وبخاصة وديان جوروجول Gorgei وسهل الشمامة ، ويفضل توافر المياه الباطنية قريبا من سطح الارض فى تكوينات القارى النهائية Terminal Continental من عصر الايوسين مما أدى الى ظهر العمران فى مناطق الطراز والبراكنة والاصابعة Assabe ، ثم العثور على نوع جيد من الحديد فى منطقة فورت جورو بمقادير ضخمة ، كل ذلك قد سمح لهذه المنطقة الصحراوية بان تقوم كوحدة سياسية أو دولة ( انظر خريطة ٢٧ ) .

ورغم أن تبعيتها لفرنسا قد وجهها نحو الجنوب - صوب السودان ( مالى الحالية ) والسنغال وغيرها ، فإن انتماء السواد الاعظم من السكان للعناصر العربية والبربرية التي تسود فى شمال أفريقية ، وانتشار ( ٥/٤ ) للعناصر العربية والبربرية التي تسود فى شمال أفريقية ، وانتشار الاسلام بينهم قد ربطهم ببلاد المغرب ، كما أن موريتانيا تجد فى مدن السودان فى الجنوب أسواقا نافقة للماعز والاغنام ، على حين تتجه ابل شمال موريتانيا الى أسواق وادى درعة وادى نوب جنوبى المغرب ، وصفوة القول أنها تمثل منطقة انتقالية بين المغرب والسودان .

تقدر مساحة موريتانيا بـ ١٠٣٠٧٠٠ كم مربعا يقطنها ١٩٩٣٩ر١٤١٩ نسمة ١٩٧٦ تبلغ نسبة كثافة السكان فيها نحو ٢ فى الميل المربع ، وتتألف من مجموعة من السهول المنخفضة كسهول طرارزة والبراكنة ، الى جانب بعض الكثبان الرملية الثابتة التي تعترض سكة حديد فورت جورو وسنت اذين ، كما يوجد بها كما ذكرنا نصف وادى السنغال فى منطقة شمامة ، كما تنتشر حافات الكوستا « والقارات » المنعزلة فى الداخل ، وذلك الى جانب مناطق متسعة منخفضة كاقليم حوض الذى ضم من مالى الى موريتانيا سنة ١٩٤٤ . وتنخفض حرارة المنطقة الساحلية الغربية لتتراوح بين ١٢°م و ٢٥°م فى ديسمبر ، وبين ٢٥°م و ٣٣°م فى سبتمبر ، وتمثلان متوسط النهايتين الصغرى والكبرى فى هذين الشهرين ، وإذا كان المحيط الأطلنطى بتياره البارد قد ميز بين الساحل والداخل فليخط العرض أهميته ، فالسفانا القصيرة ( الاستبس ) فى اقليم الساحل تنتهى عند خط ١٩ شمالا فى الشمال ، فلا غرو أن يحتشد معظم السكان فى الجنوب ليزرعوا الأرز والذرة الرفيعة والطباق والحناء والبطيخ والخضروات على فيضان السنغال ووديانه حيث أقيمت سدود طينية صغيرة لهذا الغرض ، كما أخذ يهاجر الطوارق فى داخل موريتانيا وبخاصة طبقة الحراثين من الزراع الفقراء الى الجنوب من النيجر وغانة وغيرها ، لا فى صورة هجرة فصلية ولكن كهجرة دائمة ، وهى ظاهرة واضحة فى كل أرجاء موريتانيا حيث يجتذب الجنوب بمطره ومياهه ومراعيه وأسواقه سكان الشمال وبخاصة من الرعاة البدو ، حتى أصبحت منطقة حوض فى أقصى الجنوب الشرقى مصدرا مهما للحيوان والذرة الرفيعة ، ولكن الغرب بفضل ثروته السمكية التي استغلّت منذ سنة ١٩٠٧ فى بورت اتين حيث أقيم مصنع



( خريطة رقم ٢٧ )

للتجفيف ، ثم أهميته كمنفذ للحديد من الداخل ، قد اجتذب بعض العمران أيضا ، فنشأت العاصمة « نواكشوت » Nouakchott على الساحل حيث يخفف نسيم البحر وتيار كناريا من وطأة الحرارة ، أما بورت أتين فتربطها بالداخل سكة حديد طولها ٤٠٠ ميل لاستخراج حديد الهيماتيت وهو من نوع جيد ( ٦٣٪ ) قليل الشوائب وبخاصة الفوسفور ، ويستخرج من صخور الكواتزيت من العصر السابق للكمبري من تلال كوديه إيجيل ، وكان نقل الحديد لساحل يمثل مشكلة كبرى ، فميناء Villa Cisneros اقرب منافذ الحديد عبر الصحراء الاسبانية للمحيط كثير الاطماء ، كما ان تعنت اسبانيا التي أرادت أن تملئ شروطها مقابل مد خط السكة الحديدية من كوديه إيجيل مباشرة الى بورت أتين ، قد اضطرت الشركة القائمة على امر التعدين - وهى شركة MIFERMA « شركة مناجم حديد موريتانيا » التي تملك فرنسا ٥١٪ من أسهمها و ٣٤٪ تملكها شركة فروبيشر « Frobisher » - تفضل مد خط للسكة الحديدية أطول ( ٤٠٠ ميل ) داخل الأراضى الموريتانية مما تطلب حفر لنفاق فى تشوم Choum جنوب شرق الصحراء الاسبانية ، فضلا عما يتطلبه طغيان الرمال من اصلاح دائم للخط ، وقد كان لاستغلال هذا الحديد القريب من أسواق أوروبا من أسباب تطلع موريتانيا لاستغلال حديد منطقة « أتر » Atar فضلا عن نحاس أكجوجت ، مما أخذ يجلب لها أسباب للثراء ويبشر ببتولييد دعائم التطور الاجتماعى والاقتصادى ، ولم يبق من آثار طرق القوافل القديمة الا قوافل الملح القليلة ذات الأهمية المحلية .

# الباب الخامس

## غرب أفريقية

### الفصل الأول

قلما نجد اقليما فى أفريقية يسهل تحديده سواء من وجهة النظر الطبيعية أو البشرية مثل غرب أفريقية ، فهذا الاسم يطلق بوجه عام على المنطقة المعروفة بساحل غانة التى يحدها شمالا الصحراء الكبرى وشرقا محور جبال الكمرون البركانية الذى يمتد من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى ، ولكن هذه الجبال التى تمزق وحدة الكمرون بشطريه التحسث بالانجليزية فى الغرب والفرنسية فى الشرق قد اتخذت كحد شرقى لغرب أفريقية ، لأن الكمرون الفرنسى أشد ارتباطا من النواحى السياسية والاقتصادية بأفريقية الاستوائية منه ببقية ساحل غانة ، وبخاصة الجهات المتممة له من الناحية الطبيعية كالكمرون الانجليزى واللغة ونيجيريا الجنوبية .

أما من الغرب فتصل حدود الاقليم الى نهر السنغال لا بل الى أقصى العمران عنى رأس فرد على حين يحده جنوبا المحيط الأطلنطى . هذا من الناحية الطبيعية ، أما من الناحية السياسية فيضم غرب أفريقية اتحاد غرب أفريقية الفرنسية سابقا *Afrique Occidentale Française* الى جانب ثلاث مناطق كانت تخضع للنفوذ البريطانى هى غمبيا وسيراليون ونيجيريا اما المستعمرة الرابعة البريطانية فهى ساحل الذهب التى ظفرت باستقلالها وسميت « غانة » عام ١٩٥٧ ، كما أن احدى المستعمرات الفرنسية وهى غينيا الفرنسية قد ضاقت بالنفوذ الفرنسى وتخلصت من ريقته من ١٩٥٨ ، كما ظفرت نيجيريا باستقلالها سنة ١٩٦٠ ، وعلى حين انضم نحو ثلث توجو الى غانة ، استقل ثلثا المستعمرة القديمة الألمانية باسم توجو ، أما الكمرون فقد استقل سنة ١٩٦٠ وهو يتألف من الكمرون الفرنسى اللسان وجزء من الكمرون الانجليزى اللسان على حيبن انضم جزء من الكمرون البريطانى السابق الى نيجيريا ، ويتكون من غانا وغينيا ومالى اتحاد الدول الأفريقية ، ومن النيجر وداهومي وساحل العاج والفلتا العليا ما تسمى بحلف بنين الساحل ، ورغم أن هذا الحلف غير دقيق الترابط الا أنه يعد أكثر تماسكا من الاتحاد الجمركى الذى

يضم مستعمرات فرنسا السابقة فيما عدا غينيا ، ومن اتحاد جمركى اخر قام بين غانة وبوركينا فاسو .

أما ليبيريا فهي أقدم الدول المستقلة فى هذا الجزء من أفريقية ، ولها ارتباط وثيق بالولايات المتحدة ، الى جانب غينيا البرتغالية التى تعد من بقايا الاستعمار البرتغالى فى أول عصور الكشف الجغرافى ، كما تملك البرتغال جزيرتى ساوتومى وبرنسيب كما لا زالت أسبانيا تحتفظ بجزيرتين أخريتين هما فرناندوبو وأنويون ، ويبلغ طول هذا الاقليم من السنغال الى النيجر نحو ٢٨٠ كم ، أما امتداده نحو الداخل حتى الصحراء حيث يمكن اتخاذ خط ٣٨ مم لمطر المتساوى حدا شماليا للاقليم فيقدر بنحو ٩٦٠ - ١٢٤٠ كم .

وقد كان هذا الاقليم من أول اقاليم أفريقية المدارية - ولا زال من أوثقها - اتصالا بالاوربيين رغم أنه لا يصلح كثيرا لسكناهم ، وقد انتقل الاستعمار الاوروبى هنا من مرحلة الى مرحلة : من مرحلة الاقتصار على احتلال الجزائر كجزيرة Goré الفرنسية والجزائر الأخرى الصغيرة التى لا زالت ملكا للدول الاستعمارية القديمة كاسبانيا والبرتغال ، الى انشاء المحطات والحصون والقلاع لاتخاذها مخازن للسلع وفى مقدمتها الرقيق والعاج والذهب وريش النعام . الى نشر النفوذ فى الداخل ، تلك المرحلة التى كان لابد أن يسبقها مرحلة كشف تلك المناطق . لما كانت هذه المستعمرات استغلالية فلم ينشأ فيها - الا فى حيز ضيق حول المدن - مشكلة التفريق العنصرى كما ظهرت فى جنوب أفريقية أو شرقها . والاتصال الاوروبى المبكر بتلك الجهات وجهوا الزراعة فى بعض المناطق توجيها تجاريا ، بالتخصص فى إنتاج محاصيل محدودة ، بل محصول واحد كالكاكاو أو المطاط أو القول السودانى . ولكن لم يؤد ذلك الى انشاء مزارع كبيرة الا فى بعض المستعمرات الفرنسية السابقة ، فالمزارع الصغيرة التى يزرعها الوطنيون أو يملكونها هى الطابع المميز للنظام الاقتصادى فى ذلك الاقليم اذا قورن بشرق أفريقيا مثلا . وتتباين كفاية النظم الاقتصادية وطرق استغلال الأرض أشد التباين ، فاذا كانت الزراعة قد بلغت شأوا بعيدا من الكثافة اذا ما قورنت بالزراعة فى جهات أفريقية المدارية الأخرى ، وبخاصة حيث يتجه الانتاج الزراعى نحو التجارة والتخصص فى زراعة محصول

واحد ، فلا زال هناك زراع يتبعون طرق الزراعة المتنقلة البدائية لانتاج ما يمسك رمقهم من محاصيل الغذاء .

تقدر مساحة غرب أفريقية بنحو ٢٤ مليون ميل مربع يطبقها نحو مائة مليون ، ولكن بينما كانت تمثل أملاك فرنسا السابقة التي بدو متصلة أو شبه متصلة وبخاصة فى الجهات الداخلية نحو  $\frac{1}{3}$  مساحة هذا الاقليم ، فان أكثرها جهات قليلة الموارد والسكان ، لا يقطنها أكثر من ثلث سكان هذه المنطقة فحسب .

من أهم الظواهرات الجغرافية التى تسود غرب أفريقية وتطبعها بطابع مميز توزيع الظواهرات الطبيعية كالمناخ والنبات والتربة ، والبشرية كالسكان ونظم الزراعة والثقافة والتوجيه التاريخى توزيعا فى شكل نطاقات تمتد من الشرق الى الغرب موازية لخطوط العرض ، وهكذا يبدو الاختلاف الرئيسى بين الشمال والجنوب ، فالمناخ الصحراوى وشبه الصحراوى والسودانى ذو المطر الصيفى الذى تطول فترة سقوطه كما يغزر ويصبح أقل تعرضا للتذبذب كلما أوغلنا نحو الساحل جنوبا حتى تصل للاقليم الموسمى بل والاستوائى ، كلها تتوالى من الشمال الى الجنوب ، ويساير هذا التتابع فى النطاقات العرضية للاقاليم من الشمال الى الجنوب تدرج الاقاليم النباتية من الصحراء وشبه الصحراء الى السافانا الفقيرة فالسافانا البستانية فالغابات ، ولا يقتصر هذا النظام من التوزيع على هذه النواحي ، فالاختلاف واضح بين الشمال حيث تعيش جماعات قد اختلطت دماؤها بالدماء الحامية وكانت على اتصال عبر الصحراء الكبرى بشمال أفريقية فتلقت تيارات الحضارة السامية الدين الاسلامى ونظم الحكم وتقاليده الرعى الذى تصلح له البيئة شبه الجافة هنا - وبين الجنوب الذى تسكنه العناصر الزنجية التى تتعدد بينها اللغات ، وتمزق الى قبائل تعيش فى عزلة ، ومن ثم كانت أكثر نقاء ، كما تنتشر بها الزراعة التقليدية المتنقلة بين الزوج . وكان فى الجنوب بعض الامارات ولكنها أقل عددا وتقدما من السلطنات والدول التى نشأت فى الشمال ، فقد نشأت امبراطورية غانا التى بلغت أوج قوتها فى القرن العاشر الميلادى ، وكانت عاصمتها غانة التى تقع فى الصحراء غرب تمبكتو بنحو ٢٥٠ ميلا ، ثم ورثتها امبراطورية مالى التى اتخذت بلدة مالى عاصمتها فى القرن الثالث عشر وهى تقع غرب النيجر

قريبا من بلدة سيجو Segou ، ولكن لم يلبث أن أصبح امبراطورها من قبائل الماننجو الذين كانوا يمثلون الطبقة الحاكمة أن غادرها سنة ١٦٦٠ م ، وقد بلغت هذه الامبراطورية - التي تعد اكبر الامبراطوريات التي انشأها الزنوج اتساعا - أوجها في القرن السابع عشر ، كما أن امبراطورية الصونغاي التي اتخذت عاصمتها Gao ، وقد بلغت أوجها حوالي سنة ١٥١٥ م ولكنها ما لبثت أن خضعت لجماعات قدمت من الشمال ، وقد ورثت هذه الامبراطورية - التي نشأت على حافة الصحراء حيث الرعى والزراعة على الرى أو على المطر القليل والتجارة تمثل أساسا اقتصاديا متكاملا متنوعا - بعض امارات صغيرة كممالك قبائل الفولاو الموسى Mossi وغيرها .

وعلى حين تعد محاصيل الذرة والسمسم والفول السوداني ، غلات الشمال الرئيسية ، تزرع محاصيل درنية وأشجار دائمة في منطقة الغابات في الجنوب كاليام والكسافا كما يزرع الأرز . والواقع أن الاستعمار الاوربي قد أسرف في استغلال موارد البلاد المعدنية والغابات والمرعى ، فأخذ ينضب معين المعادن كما أدى قطع أشجار الغابات والقضاء على المراعى الى تعرية التربة التي فقدت خصوبتها في كثير من الارحاء . ولكن فطنت الدول الاستعمارية الى نتائج هذا الاستغلال المدمر ، فأخذت ترسم الخطط السليمة للتنمية الاقتصادية ، ولكن هذا المجهود لا زال في بدايته لتأخر طرق النقل في كثير من الجهات .

ويستمد هذا الاقليم أهميته الاستراتيجية من قربه من شمال أفريقيا والبحر المتوسط من جهة ومن غرب أوربا من جهة أخرى ، فهو يمثل الجزء الغربي من الحزام الافريقي الذي يكون خط الدفاع والتموين الامامى للدول الغربية جنوب الصحراء الكبرى اذا ما أغلق البحر المتوسط ، فقد حدث في الحرب العالمية الثانية أن كانت دكار ثم تاكوراى مركزين لتموين وارسال الامدادات العسكرية الى شمال أفريقية والشرق الاوسط ، كما اتخذ الحلفاء مونروفيا عاصمة لبييريا قاعدة لحماية قوافل المحيط الاطلنطى وتأمين الجناح الجنوبي بعد نشوب معركة استرداد شمال أفريقيا .

وقد انتهت تاريخ استعمار هذه الجهات الى انشاء قواعد أو مراكز



تجارية على الساحل للارتكاز عليها قبل أن تتجه الدول المستعمرة للتوغل نحو الداخل ، إذ تم تحديد هذه المناطق الداخلية قبل كشفها تماما فى بعض الاحيان ، فكانت كل دولة تحاول أن تضم قاعدتها الساحلية أكبر مساحة تظن أنها غنية ، بغض النظر عما يتعارض مع ذلك من تنظيم عرضى لنطاقات المناخ والنبات الطبيعى ، وهكذا أصبحت كل مستعمرة تقريبا تضم قطاعا كاملا لكافة الاقاليم الطبيعية التى ينقسم اليها غرب افريقية ، وقد تأثرت النواحي البشرية بهم التقسيم المصطنع الذى أسفر عن تمزيق القبائل وتحطيم وحدة الجماعات ، كما أدى توزيع هذه المستعمرات بين بريطانيا وفرنسا - ولكل منها سياسة تليديية فى الحكم وادارة المستعمرات - الى تأكيد الاختلاف بين الاقاليم أو الوحدات السياسية المتجاورة ، فالفرنسيون يجنحون للحكم المركزى الذى لا يقيم وزنا لظروف البيئة المحلية والذى من شأنه أن يربط اقتصاديات المستعمرة بفرنسا ، كما تميل تشجيع الاحتكارات على يد الشركات الكبيرة ، وتجد فرنسا أن هدفها المثالى من الحكم أن تفرض على السكان الثقافة والتقاليد ونظم المعيشة الفرنسية ، ويتبعون فى سبيل ذلك كل وسيلة مهما كانت صارمة أو وحشية ليتمتع السكان بمزايا الحكم الفرنسى ويجنوا ثماره : أما بريطانيا فقد كانت تؤثر ترك المجتمعات الوطنية تحيا كما ألفت : تخضع لحكامها المحليين ، وبذلك قد يظل السكان تحت الحاكم البريطانى قرونا دون أن يصيبوا تقدما يذكر ، كما أن بقاء هذه الجماعات مفككة لا يعدها لتحكم نفسها ولا يؤدي الى نضوجها السياسى أو تكوين وعيها القومى بمضى الزمن .

### البيئة :

تمثل صخور ما قبل الكمبرى أكثر أنواع التكوينات انتشارا فى غرب افريقية ، وهى تتألف من صخور بلورية متحوّلة وبركانية مثل الشست والكوراتزيت والميكاشست والنيس التى تتخللها صخور الجرانيت والديوريت ، وتسود هذه الصخور الاركية فى ثلثى مساحة الاراضى الواقعة جنوب خط ١٢ شمالا ، فهى تنتشر عند ثنية النيجر وفى ساحل غانة وأكثر أرجاء نيجيريا والكمرون ، كما تمتد خارج نطاق هذا الاقليم الى وادى وغيرها ، والواقع أن هذه التكوينات القديمة تنتشر جنوب خط يمتد من كوناكرى غربا الى أنسونجو شرقا . وقد تعرضت هذه الصخور الى التواءات الصحراء الكبرى

من العصر الالجونكى ، وتمتد الالتواءات القديمة من جنوب مراكش حتى ساحل العاج ، ولكن هذه الالتواءات القديمة التى يغلب عليها الاتجاه من شمال الشمال الغربى الى جنوب الجنوب الشرقى قد فتتها عوامل التعرية وغطتها رواسب من الحجر الرملى ترتكز ارتكازا يعوزه التناسق على القاعدة الاركية القديمة ، وقد صحب هذا الارساب ظهور نشاط بركانى وانتشار البسود ، ولكن عوامل التعرية قد اتت على هذه التكوينات الرسوبية فهدت القاعدة الاركية من جديد ، وتظهر هذه الصخور الرملية بصفة متصلة من موريتانيا حتى ميناء كوناكرى ومن خليج غانة حتى همبورى Hombori لمسافة نحو ١٥٠ كم ، وتنتشر هذه التكوينات شرقا الى انيىدى ووادى والسودان والصحراء الليبية ، ولكنها لم تتعرض الا لحركة من التواءات ضحلة خفيفة أثرت فى باطن الارض فى آخر العصر الفحوى ( انظر شكل ٢٩ ) .

ولكن قبل المضى فى دراسة التكوينات التالية لتكوينات ما قبل الكمبرى نذكر أقسام هذه التكوينات لانتشارها :

١ - تكوينات ما قبل الكمبرى السفلى : وهى أقدمها وتشمل الاركية ( الداومية ) وهى متحولة كالميكاشست والنيس والكوارتزيت ، الى جانب البريمية Birrimian System التى تتكون طبقاتها السفلى من الصخور الطينية واللاية والرماد البركانى اذا تعرضت للالتواء الشديد ، اما العليا فهى تتألف من الصخور البركانية ، وعلى حين توجد الصخور الاركية فى سيراليون وموريتانيا ونيجيريا نجد التكوينات البريمية فى جنوب غينيا وساحل العاج .

٢ - تكوينات ما قبل الكمبرى الاوسط : وهى الاكوايىمى Akwapimian التى يغلب على الظن أنها أرسبت على الرصيف القارى ، وتتكون من الكوارتزيت والحجر الجيرى الرملى ، الى جانب نوع آخر من هذه التكوينات يسمى التاركوى Tarkwaian ويتكون من الكوارتزيت والشست .

٣ - تكوينات ما قبل الكامبري الاعلى وتشمل الفلمبي Falemian  
 فى موريتانيا والسنغال الشرقى وطبقات أخرى فى سيراليون وثالثة فى غانة  
 وتوجـولاند وداهومى ، وهى تتألف غالباً من الكوارتزيت والصلصال  
 الصفائحي .



( خريطة رقم ٢٨ )

ولم تدرس التكوينات التى ارسبت اثناء الزمن الاول ودراسة شاملة ،  
 وقد تكونت فى اول الامر فى صخور الحجر الجيرى والجيرى الدولوميتى ،

يرتبط توزيعها بحدوث التواء فى تاودينى ، وتظهر هذه التكوينات ن جنوب غرب صحراء الجزائر جنوبا حتى السنغال وحافة تمبوارا Tambaoura ما تمتد هذه التكوينات شرقا فى السودان الفرنسى سابقا كما تظهر فى ثنية النيجر ، وتغطى صخور العصر الاوردفيشى جبال فوتاجالون فى غينيا وبعض هضاب فى السودان الفرنسى كهضبة بندياجارا ، وقد تراجع البحر فى هذا العصر ليعود فيغطى على الصحراء الكبرى ويبلغ عمقا كبيرا فى العصر السيلورى \*

أما فى الديقونى فقد طغى البحر وانحسر بضع مرات مخلفا وراءه تكوينات فى منطقة أكرا فى غانة وفى غينيا ، أما فى البرمى الأسفل فقد أرسب البحر الحجر الجيرى الى جانب رواسب قارية وأخرى خليجية أرسبها أثناء البرمى الاعلى وهى تنتشر فى غانة ، وقد تعرضت بعض الجهات للحركة الهرسينية التى اتخذت اتجاهين الأول من الشمال الشرقى نحو الجنوب الغربى ولم يكن تأثيرها واضحا ، أما الثانى فمن الشمال الغربى نحو الجنوب الشرقى ، فيوجد عند الحدود بين السودان الفرنسى سابقا والسنغال فى فوتاجالون ، وقد صاحب الحركة الهرسينية أعقبها نشاط بركانى وبخاصة فى فوتاجالون \*

وقد ظلت جهات واسعة فى غرب السودان الغربى وغينيا وسيراليون وليبيريا وأكثر جهات ساحل العاج وغانة فوق سطح البحر منذ الزمن الأول ولم تتعرض الا لبعض آثار النشاط البركانى والحركات الارضية ، أما الجزء الشرقى من الاقليم الذى تعرض لطغيان البحر منذ الكريتاسى الأدنى فقد أدى الى أن منطقة كأراضى نيجيريا تتكون اما من صخور العصر الكريتاسى أو العصور التالية ، هذا اذا لم تكن قد ظلت تغطيها الصخور الاركية \* ويسى تكوينات عهد الجوارسى والكريتاسى الأدنى باسم القارى المتدخل Continental Intercalaire وهى مكونة من الحجر الرملى والمجمعات والصلصال ، تختلط بها للأسمك والزواحف والأخشاب المتحجرة \*

ثم طغى البحر فى أثناء العصر الكريتاسى الاعلى والايوسين من جهتين : الأولى عن طريق خليج غانة ثم عن طريق وادى نهر بنوى حتى

حوض النيجر الأوسط وتشاد ، وكان يتصل بالبحر المتوسط الذى كان يطغى على منطقة واسعة فى شمال أفريقية ، وكان أكثر هذه التكوينات من الحجر الرملى والصلصال وطبقات الفحم فى أنوجو فى نيجيريا ، أما الثانى فكان يشمل غينيا البرتغالية وساحل منطقة ساحل العاج وأقصى جنوب غرب غانة ودلتا نهر الفلتا وتوجو لاند وداهومى ونيجيريا \* وأهم رواسب هذه الهضبة تتكون من الحصى والرمال والصلصال والحجر الجيرى والفحم الاسمر والحجر الرملى التى يختلط بها الفوسفات والملح \*

وقد سادت ظروف قارية فى أنحاء غرب أفريقية منذ عصر الاوليغوسين ، الا فى الجهات الساحلية وبخاصة فى السنغال ، وقد ظهرت السطوح الصحراوية وتسمى الرق الحصوية فى الشمال الى جانب الكتبان الرملية أو العروق فى الجهات الواقعة عند حافة الصحراء ، ولكن فى الزمن الثالث وأثناء الزمن الرابع كان النيجر الأوسط يتكون من سلسلة من البحيرات الضحلة \*

#### الصخور التكتونية :

تعرضت بعض تكوينات العصر الكريتائى وصخور القاعدة القديمة للالتواء فى وادى بنوى ، كما ظهرت الانكسارات فى فوتا جالون وهضبة جوس ، وخرجت المقذوفات البركانية فى جنوب غرب هضبة جوس وفى مرتفعات الكمرون ومرتفعات بامندا وجزر فرناندوبو وبرنسيب وساوثومى وغيرها ، والواقع أن النشاط البركانى قد ظهر فى عصر الايوسين حين تراجع البحر ، كما تجدد فى العصور التالية حتى عصر البلايوسين ، وهذه الثورات متصلة بحركة تكوين جبال الالبى الشمال ، وقد تجدد فى الزمن الرابع ظهور دورات للثمة والارساب نتيجة لتغير مستوى البحر وتطور نظام الصرف ، والواقع أن جهات النيجر تعرضت لتأثير عصر مطير يتكون من ثلاث فترات تتخللها ادوار جافة \* وتوجد وديان جافة تتصل بالجانب الأيسر من النيجر الأوسط ، وربما كانت هناك وديان أخرى فى أعالي النهر قد جفت أيضا غطيتها الرمال الزاحفة الان ، كما يوجد أنهار جافة فى السنغال ، وقد أدى تغير الظروف المناخية الى وجود المدرجات

النهرية جنباً الى جنب مع الوديان الجافة وانتشار البحيرات فى النيجر الاوسط ، وربما ساعدت حركة الارض التى تعرضت للارتفاع حينئذ فى حدوث هذه التغييرات ، وتعاقبت فترات الجفاف التى تشد اثناءها التعرية الجافة فتحمل الرياح الرواسب لترسيبها فى نطاق واسع شمال خط يمتد من زاريا الى واجاهوجو الى بماكو وديكار ، أما اثناء ادوار الرطوبة النسبية فتغضى الانهار برواسبها على الجهات الملاصقة المستوية وهكذا تكونت فى الزمن الرابع رواسب بحيرية ونهرية امتدت لمسافة ١٠٠ كيلو متر أسفل سانسندنج (Sandsanding) أما منخفض تشاد فقد تراكمت فيه الرمال والصاصل والكثبان الثابت منها والمتحرك .

وصفة القول ان بنية غرب افريقية تمتاز بالتشابه الذى يعزى لأسباب عديدة أهمها : انتشار التكوينات الاركية فى كثير من ارجاء المنطقة ، وأن هناك تكوينات متجانسة قد طمرت مظاهر السطح والبنية التى قد تكون متباينة ، فالرمال فى الشمال وتربة اللاتريت السمكية فى الجنوب تضع على الأرض قناعاً من التجانس .

رغم الاختلافات المحلية بين بقعة وأخرى من شواطئ غرب افريقية ، فإنه يغلب على أكثر أجزائه الطبيعة المنخفضة الرملية ، فلا يصلح من جهاته لقيام الموانى الا مصبات الانهار حيث يساعد النحت النهري والأمواج على تطهير هذه المصبات من الرواسب حتى تظل مفتوحة للملاحة ، كما هو شأن فريتاون ولاجوس وكلايار ، بل ان بعض المواقع على مصبات النيجر تتعرض لتراكم الحواجز الرملية مثل شطوط Escraves ، ويهدد تراكم الشطوط الرملية بعض الموانى النهرية الاخرى بالاختفاء كما يحدث فى موانى كوكو Koko ووارى Warri وغيرها فى دلتا النيجر ، وهكذا تتضامر تكوين الشطوط الرملية والمستنقعات والبحيرات الشاطئية والغابات الكثيفة من امانجروف وتفشى الحميات وانتشار العواصف البحرية والتفاوت الكبير فى مستوى المياه فى المد والجزر على جعل قيام الموانى صعباً كثير النعقات .

## التضاريس :

يغلب على السطح الاستواء الى حد كبير ، فقلما نجد منطقة يربو ارتفاعها على ١٠٠٠ متر فيما عدا الكميرون ، وقد ألفت الانسان امتداد هذه السطوح التحتائية القديمة التى تجرى على وتيرة واحدة لمسافة طويلة حتى ان ارتفاع منطقة صغيرة ارتفاعا ضئيلا اذا قورن بالمنطقة المحيطة بها يبدو أمرا مبالغا فيه . فيتراوح ارتفاع السهل التحتائى المكون من صخور ما قبل الكمبرى ين ١٥٠ و ٥٠٠ متر فحسب فوق سطح البحر ، وقد تعرضت هذه التكوينات القديمة للتعرية العنيفة ، ولكن كثيرا من جهاتها المرتفعة نسبيا قد قاومت التعرية كما هو الحال فى تلال سيراليون التى تتجه من الشمال للجنوب ، وتنتشر التواءات الجرانيت القبابية الى تخلاف بعض اجزائها ، فضلا عن ان الجرانيت الحديث يمثل بفضل صلابته بعض الجهات المرتفعة كهضبة جوس فى نيجيريا . وتنتشر الحافات التحتائية التى تتكون من صخور الزمن الاول سواء تعرضت للالتواء أم لم تتعرض له ، وهى تعد مرتفعة رغم ما أصابها من تمزيق مثل حافات فوتاجالون ، ولو أن بعض هذه الحافات المرتفعة انكسارى كما هو الحال فى بعض الانكسارات التى تمتد داخل مرتفعات فوتاجالون من الشمال الى الجنوب والواقع أن عوامل التعرية قد طمست فى اكثر الاحيان معالم الالتواءات القديمة الهورونية والهريسينية الا اذا أصابها تجديد ، بأن ارتفع بعضها بالاندفاع أو بخروج اللافا من باطن الأرض على حين ظلت الجهات الاخرى منخفضة ، أما تكوينات الزمنين الثانى والثالث فيغلب على سطحهما السهولة والأستواء ، ولو أن حافاتهما تمتاز بالارتفاع فى بعض الاحيان ، كما فى شرق نيجيريا حيث تمتد من الشمال الى الجنوب . كما أن الصخور المحولة والسدود كثيرا ما تمثل مناطق مرتفعة مثل جبال سيراليون وبعض جهات فوتاجالون وغينيا . واذا كانت الحركات التكتونية وتفاوت صلابة الصخور واحتمالها لعوامل التعرية من العوامل التى شكلت سطح الأرض ، فان النشاط البركانى فى العصر الكريتاى وفى الازمنة التالية قد أدى الى ظهور كثير من المرتفعات كهضبة جوس ومرتفعات بامندا Bamanda والكمرون وجزائر عديدة مثل فرناندوبو وساوتومى وجورى وغيرها . ولكن نعود مرة ثانية للاقلال

من أهمية الارتفاع كمظهر اقليمي مميز فى غرب أفريقية بوجه عام ، هذا وان كانت لبعض المرتفعات التى ذكرناها أهمية محلية فحسب ، فلا غرو أنه باستثناء جهات قليلة مبعثرة مثل هضبة جوس ومرتفعات غينيا وفوتاجالون والكمرون وجبال الكمرون وجزائر بيسافرا وبامندا فان نطاقات المناخ والنبات يمتد بانتظام واضح فى اتجاهها من الغرب الى الشرق ، بل يغلب على ماهر السطح الكبرى امتدادها فى شكل نطاقات أيضا . فان كانت منطقة الجنوب الغربى قد تعرضت للارتفاع ، فالى الشمال منها يمتد منخفض شاسع بين السنغال وبحيرة تشاد ، ثم يقع الى شمالها الشرقى مرتفعات آير وأدرار الايفوغاس ، وهكذا نجد أن مظاهر السطح المرتفعة هنا تمثل أربعة أنواع هى : حافات الهضاب التى تشرف على السهول ، ثم الالتواءات المحدية من الجرانيت أو الديريريت ، وبقايا الكتل القديمة المتخلفة من تأثير التعرية ، وما لفظته الارض من باطنها من صخور بركانية . فهذه الحافات أو الجزائر المبعثرة تبدو فجأة وسط المنطقة المنبسطة ، « كأنما هبطت من السماء » كما يذكر الرحالة .

## المناخ :

### ١ - الكتل الهوائية :

تعد غرب أفريقية ملتقى كتلتين هوائيتين متباينتين ، الاولى الكتلة القارية المدارية الجافة المتربة التى يصحبها هبوب الرياح الشمالية الشرقية والشرقية ، والثانية هى الكتلة البحرية المدارية التى تقترن بهبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية . وتتعرض هاتان الكتلتان لتغيرات فصلية واسعة المدى ، فتتقدم الكتلة الاولى جنوبا فى يناير الى دائرتى عرض  $5^{\circ}$  -  $17^{\circ}$  شمالا ، كما تزحف الثانية فى شهرى يوليو وأغسطس شمالا حتى عرض  $17^{\circ}$  على الساحل و  $21^{\circ}$  فى الداخل . وتقدم الكتلة الهوائية المدارية البحرية نحو الشمال الغربى فى مايو حتى أغسطس وسبتمبر ويقدر سمكها بنحو  $1000$  -  $15000$  متر حتى تكفى لسقوط المطر الذى يتباين غزارته لاختلاف سمك الهواء من ناحية بين يوم وآخر ولاختلاف موقع ملتقى الرياح أو جهة التقاء الكتل الهوائية بين المدارين من ناحية



أخرى • ويعلم هذه الكتل الهوائية فى طبقات الجو الوسطى الرياح الشرقية الاستوائية التى تشبه الرياح التجارية الشمالية الا أنها رطبة لما تحملها من رطوبة المحيط الهندى ، وإلى جانب أهميتها فى الملاحة الجوية فهى تؤثر على المناخ فى الفصول الانتقالية ، وتعلوها الرياح الغربية العليا التى تسمى أحيانا التجارية العكسية • وقد أدى امتداد خليج غانة الى أن جبهة التقاء الرياح بين الدارين لا تنتقل هنا سثناء جنوب خط الاستواء شأنها فى القارات الأخرى بل تنتقل بين خطى عرض ١٢° و ١٣° شمالا وبين خط الاستواء

### ٢ - السطح :

يغزر المطر فى الجهات المرتفعة التى تواجه الرياح الجنوبية الغربية عند هبوبها ، كما يحدث فى دوتا جالون فى غينيا ومرتفعات غينيا فى الكمرون وعلى حافات جبال مامبونج Mampong فى غانا ، ويتفاوت المطر تحت تأثير التضاريس بشكل واضح كما يحدث فى مدينة فريتاون اذ على ارتفاع ٢٥٠ مترا من سطح البحر يستقط نحو ٤٥ متر على حين تهبط هذه الكمية بمقدار نحو متر فى الحى المنخفض من المدينة نفسها • وتصبح هذه الرياح جافة بعد اصطدامها بالحافات الجبلية كما فى مرتفعات غينيا وحافة مامبونج وجبال توجولاند ، ولذلك نجد أن المطر يقل فى وسط سحل العاج وشرق غانة وسواحل توجولاند ، وللارتفاع تأثير فى الحرارة أيضا •

### ٣ - التيارات البحرية :

يمر تيار كنارى البارد الذى يصل الى كيب فرد قبل أن يذهب بعيدا فى المحيط ، ويصحب مرور هذا التيار كثرة الضباب والندى وهبوط الحرارة وانخفاض الرطوبة وبرودة المياه ، كما يظهر فى منتصف العام تيار قادم من المحيط ربما يكون فرعا من فروع تيار بنجويلا البارد ليمر على سواحل غانا الشرقية وداهومى وتوجولاند ، وربما كان لهذا التيار تأثيره فى جفاف هذه الجهات نسبيا ، أما تيار غانة الدفء فيمر بسواحل غانة ليغذى الرياح الموسمية الجنوبية الغربية بشيء من الرطوبة •

## ٤ - الرياح :

الرياح التجارية الشمالية الشرقية : تتبادل هذه الرياح التأثير مع منطقة الركود شمال نهر غمبيا ، ولذلك فمصدر المطر هنا هو مرور الاعاصير التى تتجه نحو الغرب على طول منطقة الركود فى الفترة بين يونيو وأكتوبر حين ترابط هذه المنطقة بين خطى عرض ١٠ و ٢٩ شمالا ، وتسود الرياح الشمالية الشرقية فى بقية العام ، كما يمر تيار كنارى البارد الذى يؤدي الى هبوط حرارة الساحل بمقدار نحو ٥° م لارتفاع كبير فى الضغط لا يسمح بتكوين الاعاصير أو سقوط الامطار ، وتهب رياح بحرية قوية على السنغال تخفف من حرارته اذا قورن بالمناطق الداخلية .

**الهرمستان :** تهب فى الداخل الرياح الشمالية الشرقية الجافة اثناء فترة الجفاف ، فتثير الغبار مما يؤدي الى ضعف الرؤية ، ويخفف جفافها من حدة الرطوبة ولكن قد يقلق الراحة ، وتقل السحب فيزداد التفاوت بين حرارة النهار القائظة والليل البارد الذى قد يشعر فيه الافريقيون ببعض البرودة فيستخدمون الاغطية ، أما الأوربيون فيجدون فى برودة الليل ماينعش نفوسهم التى ارهاقها النهار الحار .

**الزوابع Line Squals :** تاتى زوابع من الشرق والشمال الشرقى متجهة نحو الغرب والجنوب الغربى وتسير على طول مسالك تدل على عدم الاستقرار فى ظروف المناخ فى طبقات الجو العليا ، وتمر هذه الزوابع الممطرة فى فترات الانتقال بين الفصول من مايو الى يونيو ومن سبتمبر الى أكتوبر ، وقد تجلب بعض الامطار الى ساحل غانة فى تلك الفترة ، ان تغذيها الرياح الجنوبية الغربية الرطبة ، وتصبح هذه الزوابع عواصف رملية جافة الى الشمال من خط ١٥ شمالا فى الداخل و ١٧ على الساحل والمنطقة الغربية .


أما الرياح الجنوبية الغربية فهى تسود طول العام جنوب خط ٦ شمالا أما فى شهر يوليو فتصل الى خط عرض ١٧° شمالا على الساحل بل ٢١° شمالا فى الداخل فى شهر أغسطس . وينهمر المطر بغزارة لفترة طويلة على

السواحل والجهات التى يشتد بها هبوب الرياح الموسمية ، ولكن قلما يسقط المطر فى الداخل لفترة طويلة • وينتشر السحاب الكثيف كما يكثر الضباب فى الصباح ، وتوجد قمتان للمطر على المنطقة الساحلية من ساحل غانة ، تحدث الأولى حين تهب العواصف بين مايو ويوليو يعقبها فترة جفاف حتى أغسطس نتيجة اما لتحرك جبهة التقاء الرياح المدارية نحو الشمال ، أو لوجود تغير فى نظام توزيع الحرارة مصحوب بهبوب الرياح التجارية الجنوبية الشرقية التى تظهر على ارتفاع ٨٠٠ متر ، ويسقط المطر فى هذه الفترة حين تعترض هذه الكتلة الهوائية جبال مرتفعة كالكمرون أو هضاب متوسطة الارتفاع تتعرض لهبوب رياح معينة مطردة كفو تاجالون أو لارتفاع حرارة الهواء القريب من سطح الأرض فى الجهات الداخلية •

كما أن نسيم البحر يظهر أثره لمسافة عشرة أميال للداخل ، وقد تضعف قوته فى الجهات الجبلية كما فى فريتاون وجبال الكمرون ، كما أن الرياح تعارضه فيضعف أثره ، ولكن رغم تعدد الرياح فالرياح السائدة هى الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية •

### الحرارة :

تقل درجة الحرارة هنا عن متوسط الحرارة فى أنحاء العالم الأخرى فى نفس العروض وذلك فى الشتاء فى الشمال شبه الجاف وصيفا فى الجنوب الرطب ، ولكنها ترتفع عن ذلك المتوسط فى أبريل ويوليو وأكتوبر فى المنطقة الوسطى والشمالية ، أما فى الجهات المرتفعة وسواحل السنغال وتوجولاند وشرق غانة فتهبط الحرارة دون هذا المتوسط طول العام • والواقع أن الحرارة ترتفع حتى فى الجنوب فى آخر فصل الجفاف ، ويؤدى ارتفاعها الى ظهور مرض مؤلم « حرارة قاسية » Prickly heat وتبلغ الحرارة نحو ٢٣° - ٢٤°م على شاطئ السنغال و ٢٥ - ٢٦ على ساحل غانة ، ٢٦° - ٣٠°م فى الداخل • ويتفق فصل الحرارة مع تعامد الشمس الظاهرى لولا أن الامطار تغزر فى ذلك الفصل مما يخفف من وطأة الحرارة ، ولو أن الحرارة تنخفض كما فى مرتفعات الكمرون ، الا أن هذا الانخفاض دون ما كان متوقعا • وكلما طال فصل الجفاف اتضح الفرق



( شكل ٢٩ )

الفصلى واليومى فى درجة الحرارة ، ويوجد قمتان للحرارة فى الشمال الاولى تحدث فى ابريل ومايو ، ولكن لا تلبث ان تهبط الحرارة فى اغسطس حين سقوط المطر من  $30^{\circ}$  -  $35^{\circ}$  بل ٤٠ أحيانا الى ٢٧ م ) ثم تعود الحرارة للارتفاع فى أكتوبر ، وتتقدم فترة الحرارة العظمى الاولى كما تتأخر الفترة الثانية كلما اتجهنا نحو الجنوب . ( انظر شكل ٣٠ )

### الامطار :

تعد اهم العناصر التى تميز المناخ المدارى فى توزيعه الاقليمي ، فهو العنصر الذى يحدد مقدار صلاحية الارض لنوع معين من الاستغلال ، كما يؤثر على حرف السكان وكثافتهم ، ويتراوح المطر بين ٣ متر فى الجنوب و ١/٢ متر أقل من ذلك عند اطراف الصحراء فى الشمال ، ويقصر فصل المطر كما تقل غزارته تبعا لتعامد الشمس الظاهرى وما يتبعه من حركة جبهة التقاء الرياح بين المدارين بين الشمال صيفا والجنوب شتاء . ويسقط المطر هنا لعدة أسباب فبعضه يسقط للتصاعد وهو النوع المألوف فى الجهات المدارية ، وبعضها ينشأ ن اصطدام الرياح بالجبال التى تواجهها ولكن أعاصير التورنادو تؤدي أيضا الى سقوط الامطار ، وإذا

كانت المنطقة الجنوبية تصيب من المطر قدرا يفيز عن حاجتها بل ويلحق بها الضرر ، فان الجهات الشمالية يعوزها المطر الذى يسد حاجة سكانها ويمكن أن نقسم أقاليم المطر الى نطاقات للتبسيط على النحو الآتى :

متوسط المطر السنوى	متوسط عدد أيام المطر فى الشهور الممطرة	عدد شهور المطر (أكثر من ٥ سم فى الشهور)	نطاقات المطر
١٢٥ سم وأكثر	٢٠ - ١٥	٧ - ٨	من الساحل حتى عرض ٩° شمالا
من ٢٥ - ٢٥ سم	١٥ - ١٠	٤ - ٧	من ٩ - ١٥ شمالا
١٠ سم وأقل	١٠ وأقل	٣ أشهر وأقل	من ١٥ شمالا الى الحدود الشمالية

وقد وجد أنه لا بد أن يسقط نحو ١٠ سم حتى يستطيع أن يستفيد منها النبات كما يجب ألا يقل طول فصل المطر عن ٣ - ٤ أشهر يسمح بنمو النباتات السريعة النضوج كاذرة الرفيعة ، ولكن هذا النطاق الشمالى يقصر فصل المطر فيه ويقل مقداراه يشتمد فيه البخر والنتج مما يؤثر فى أهمية المطر الساقط ، كما أنه شديد التعرض للتغيرات بين عام واخر بل وبقعة وأخرى قريبة فى نفس العام ، ومن الطبيعى أن يرتفع معامل النتج والبخر كلما عظم الفرق بين الرطوبة النسبية وبين درجة التشبع ، فقد قدر هنا النتج والبخر بنحو ٨ ملليمترات فى اليوم بين منتصف فبراير واخر أبريل فى الفصل الحار الجاف ، ولكنه يتراوح بين ٣ - ٥ ملليمترات فى اليوم فيما عدا هذه الفترة .

وفى الجهات التى يتوزع فيها سقوط المطر توزيعا متناسبا على مدار السنة ، يقدر أن سقوط ١٢٥ مترا من الأمطار يعد كافيا ، بل مثاليا للوفاء بحاجة الزراعة ، ويسمح وجود قمتين للمطر جنوب خط عرض ١٠ بزراعة محصولين فى العام الواحد .

ويتركز المطر بصورة واضحة فى منطقة الكمرون ودلتا النيجر فى جنوب شرق المنطقة ، فسفوح مرتفعات الكمرون المواجهة للبحر ، يصيبها نحو ٢٥ متر من المطر ، بل قد يقع فى دبونجا Debunja على الساحل

نحو ٩١٣٥ متر ولى أن خليج بيافرا والمنطقة التي تحيط به يصل فيها مقدار المطر الى ٢ متر فقط . ويغزر المطر فى يوليو وأغسطس وسبتمبر حين يكون هبوب الرياح الجنوبية الغربية شديدة القوة والثبات ، أما فى شهور الشتاء فتصل رياح الازهرمتان الجافة للساحل ، ولذلك يعد ديسمبر ويناير وفبراير شهورا شبه جافة ، وفى المنطقة الجنوبية والغربية يغزر المطر الذى يبلغ ٣٧٤ مم فى سيراليون ، ويفصل بين المنطقتين نطاق ساحلى ضيق يمتد بين كيب ثرى بوينتس ونيجيريا حيث يقل المطر فيه عن ٣٤٠ متر وان كان يزداد مقداره نحو الداخل حتى يبلغ ١٢٤٠ متر ، والواقع أن موازاة الرياح للساحل فى هذه المنطقة منه ، مع ظهور رياح باردة حين يجتذب تيار غانة الدافئ مياه السطح الدفيئة أيضا هى أهم الاسباب التى أدت الى ظهور هذه المنطقة .

#### توزيع الأمطار فى بعض الجهات :


المحطة	متوسط الأمطار السنوى ( بالمتر )	عدد أيام المطر فى العام	عدد أيام المطر فى أكثر شهور السنة مطرا
فريتاون	٣٧٥	١٥١	٢٦ ( يوليو )
لاجوس	١٨٠	١٠٣	١٧ ( يونيو )
كلابار	٣٠٠	١٧٣	٢٤ ( أغسطس )
زونجيرو	١١٢	٩٠	٢١ ( سبتمبر )

#### الاقليم المناخية :

ويمكن أن نقسم البلاد الى الاقاليم المناخية الآتية ( أنظر شكل ٢٨ ) :

١ - إقليم الموسمي حيث تتكون السنة من فصل جاف قصير يعقبه فصل طويل رطب وهو ينقسم الى الاقاليم الصغرى الآتية :

( أ ) الموسمي الساحلى الجنوبى الغربى : ويضم الجهات الساحلية من غينيا بساو وجمهورية غينيا وسيراليون والساحل الجنوبى فى فرناندوبو ، ويعقب فصل المطر الحار الذى يبلغ فيه المطر أقصاه فى يوليو فصل جفاف طويل قد يمكن النباتات من النمو بضعة أشهر ، ولا يسمح الا



( خريطة رقم ٣٠ )

بنمو غابات قليلة الكثافة ، ويعتبر أرز المستنقعات المحصول الرئيسي ، ويصلح المناخ لنمو النباتات الشجرية ، ولا تلائم الرطوبة في فصل المطر الحار نشاط الانسان كثيرا .

( ب ) الليبيرى : هو اقليم انتقال بين الموسمي الساحلى والاستوائى ويمتاز بأنه أقل مطرا من الأول رغم أن المطر هنا موزع على فترة أطول ، ويقل المطر بين آخر يوليو ومنتصف أغسطس ، ولكن حدوث هذه الفترة التى لا تكفى للحصاد وعدم انتظامها لا يجعلها ذات أهمية تذكر إلا فى أنها تجعل الطرق جافة صالحة للمرور .

( ج ) اقليم سيراليون الداخلى : وهو يشبه الموسمي الساحلى الذى يقع على نفس العروض ولو أن الأول أكثر جفافا ، ويوجد هذا الاقليم فى سيراليون وشمال غربى ليبيريا ، وهو اذا قورن باقليم فوتو جالون يعتبر أكثر حرارة وأغزر مطرا .

( د ) الفوتا جالونى : وهو الاقليم الموسمي الساحلى الذى تأثر فى

الداخل بوقوعه فى مرتفعات فوتاجالون ، وهو فى الحقيقة يعد اقليما انتقاليا بين الاقليم الموسمى وبين اقليم السفانا الجنوبى . ويقل المطر فى الاقليم الفوتاجالونى الذى يتراوح بين ١٥ - ٣ مترا عنه فى الاقليم الموسمى الساحلى ولكنه أطول منه موسما ، وتعد السفوح الجنوبية والغربية أغزر مطرا ، كما تتعرض الأرض هنا للتعرية ، والمطر هنا أقل انتظاما منه فى الساحل ، والحرارة وبخاصة فى الشتاء أقل من المنطقة الساحلية ، كما تهبط درجة الرطوبة فى هذا الاقليم الجبلى .

( هـ ) سفوح غينيا : وهو اقليم انتقالى بحكم موقعه بين جبال فوتاجالون ومرتفعات غينيا وبين الأقاليم المنخفضة السالفة الذكر وبين اقليم السفانا الجنوبى ولا تختلف حرارته كثيرا عن الاقليم الفوتاجالونى .

( و ) مرتفعات غينيا : وهو يمثل المناخ الموسمى الساحلى وقد عدل الارتفاع منه ، وهو يقع فى منطقة الحدود بين غينيا وسيراليون وليبيريا وكتلة مان فى ساحل العاج . وهو أغزر مطرا من الاقليم الفوتاجالونى ويبدو عليه الطابع الاستوائى ان يحدث به قمتان للمطر فى بعض السنوات ، كما أن الحرارة غير متطرفة رغم البعد عن الساحل ، فضلا على أن فصل الجفاف لا يعدو شهرا فى العام .

## ٢ - الاقليم الاستوائى :

وهو يقتصر على جنوب ساحل العاج والجزء الجنوبى الغربى والجنوبى الاوسط من غانة وساحل دلتا النيجر ، ويمتاز بحدوث قمتين للمطر يفصلهما فصل جفاف نسبى ، ولكن المطر هنا أحسن توزيعا على مدار السنة من الاقليم الموسمى وان كان أقل كمية ، فلا يقل ما يسقط فى أى شهر من شهور السنة عن ٢٥ مم ويبلغ متوسطه السنوى نحو ١٥ متر ، لكن لحسن توزيع المطر فيسمح بنمو الغابات الاستوائية وبخاصة أن الحرارة المرتفعة التى تتراوح بين ٢٥ - ٢٧ م والرطوبة النسبية التى لا تهبط دون ٧٧٪ متوفرة ، ويمكن استخدام الطرق وحصاد المحاصيل اثناساء فترة الجفاف .



### ٣ - الإقليم شبه الاستوائي :

( أ ) الاستوائي شبه الفصلى : ويضم شمال اشانتى وجنوب توجولاند ويمتد خلال داهومى ونيجيريا ، ويبدو عليه خصائص المناخ الاستوائى ، إلا أن الفرق الحرارى السنوى واليومية أكبر منه فى هذا الإقليم ، كما أن المطر أقل وبخاصة فى ديسمبر ويناى .

( ب ) الاستوائى الفصلى : هو أكثر جفافا ومداه الحرارى أشد وضوحا من الإقليم السابق ، ورغم وجود قمتين للمطر فإن فصل الجفاف يمتد لفترة تقدر بنحو ثلاثة أشهر أو أربعة ، فلا تنمو الغابات الكثيفة التى تصبح نادرة ، ومن الطريف أن بعض الجهات الواقعة فى هذا الإقليم كساو تومى الواقع على خط عرض ٩٠ ° ٠ يجف فيها المناخ بين يونيو وسبتمبر كأنما هى تقع فى نصف الكرة الجنوبى ، وربما كان لتيار بنجويلا تأثيره فى هذا الصدد .

( ج ) إقليم الكرا وتوجولاند الساحلى النجاف : يسقط أكثر من مترين من المطر جنوبى خط بينا بالقرب من جنوبى تاكورادى ليمر خلال ثم يسير بالقرب من الحدود الجنوبية لتوجولاند إلى جنوب باليمى Palimé واتاكامى Atakpamé فى توجولاند ، ثم يخترق داهومى حتى يصل إلى الساحل غربى كوتونو Cotonou والمطر هنا أقل من الاستوائى ولو أن نظامه يشبه الإقليم الاستوائى ، وتنخفض الحرارة كثيرا عن الاستوائى بين يوليو وسبتمبر والمكثف الصلى قليلا فيما عدا هذه الفترة ، فضلا عن أن الرطوبة النسبية هنا أكثر ارتفاعا ، وقد واجتذب هذا الجفاف الأوربيين الأول ، فاقاموا أكثر قلاعهم على ساحل هذا الإقليم ، وربما كان توفر الذهب من أسباب ميلهم للهبوط فى هذه المنطقة ، وقد اختلف العلماء فى تفسير الجفاف فى هذا الإقليم ، فمرور التيار البارد على ساحل غانة بين يوليو وسبتمبر يخفض من الحرارة ويقلل من فرص تصاعد بخار الماء كما أن الرياح الجنوبية الغربية تتحول فى الداخل إلى رياح غربية وبخاصة فى شهر أغسطس ، لذلك تصبح جافة فى وسط ساحل الغاج وشرق غانة ونسبها وعلى السواحل توجولاند وداهومى .

٤ - الاستوائى الموسمى أو الكمرنى : وهو يسود حيث يقل منسوب

الأرض عن ٩٠٠ متر فى مرتفعات الكمرن وبامنداد وجبل الكمرن وتهر كروس Cross وجزيرة فرناند يوما عدا طرفها الجنوبى ، أما الجهات التى يعلو منسوبها عن ذلك فتنتشر بها أنواع من المناخ المحلى حسب ظروف الارتفاع ، ويجمع هذا النوع من المناخ بين النظامين الموسمى والاستوائى فهو يشبه الاستوائى فى حرارته ونسبة رطوبته ، ولكن مطره الذى يغزى فجأة ، وهبوب رياح قوية أثناء فصل المطر يجعله شبيها بالمناخ الموسمى .

#### ٥ - المدارى :

(١) السافانا الجنوبى : وهو يتفق فى توزيعه مع النطاق الأوسط الفقير نسبيا الذى يقع بين عرض ٧ و ٨ شمالا ، وحوالى ١١ فى نيجيريا و ١٢ شمالا فى يوركاتوفو ، ١٣ شمالا فى الغرب ، ويساير فى امتداده الاقليم النباتى المعروف باسم سافانا غانة ، ويسقط المطر لفترة سبعة أشهر تنخفض فيها الحرارة ، ولكن يتضح المدى الحرارى فى فصل الجفاف ، تتراوح نسبة الرطوبة بين ٥٠ و ٨٠٪ ولكن تهبط الى ٧٠٪ فى الفصل الجاف .

(ب) هضبة جوس JOS : وهو امتداد للاقليم السابق ، ولكن الارتفاع يؤدى الى انخفاض الحرارة والتفاوت فى سقوط المطر الذى يغزر فى الطرف الجنوبى الغربى .

(ج) السافانا : ينحصر بين عرضى بين ١١ و ١٣ فى الجنوب و ١٢ - ١٤ فى الشمال ، وهو أقل مطرا من الاقليم الاستبس كما أن فصل المطر أقصر ، إذ يقتصر على خمسة أو ستة أشهر ، كما يتعرض كل من المطر والحرارة لتغير واسع المدى .

(د) السنغال الساحلى : يقتصر على شريط ساحلى ضيق يمتد من شمال سنت لويس جنوبا حتى مصب نهر غمبيا ، فالحرارة هنا أقل من اقليم السافانا المحيط بهذا الشريط ، وتبلغ الحرارة اقصاها فى فصل المطر حين لا تظهر المياه الباردة على سطح المحيط بعد تراجع الرياح التجارية « البحرية » للشمال ، وترتفع الرطوبة فى فصل الجفاف بسبب هبوب هذه الرياح ، وتقل الحرارة كما تجف حدة تقلباتها هنا عن الجهات الداخلية .

( هـ ) « الساحل » الجنوبي : ينحصر بين عرض ١٢ - ١٤ فى الجنوب و ١٥ - ١٧ فى الشمال ، وهو يضم الاجزاء الداخلية الشمالية من السنغال وجنوب موريتانيا وجنوب منطقة ثنية النيجر فى السودان الغربى وشمال نيجيريا ويتراوح المطر الذى يكاد يكفى حاجة الزراعة دون اللجوء للرى بين  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{1}{4}$  متر ، يسقط فى فترة بين ٣ - ٥ اشهر ، ولكنه شديد التذبذب .

( و ) « الساحل » الشمالى : يمتد بين خطوط عرض ١٥ - ١٧ و ١٧ - ١٨ شمالا ، فى موريتانيا الوسطى والسودان الغربى الأوسط والنيجر ويقدر متوسط المطر بنحو ٤٠ مم العام ولا يتجاوز ٣٥ مم فى اكثر الاحيان ، وهو يتعرض للتغير الكبير فلا يصلح الا لنمو النباتات السريعة النضوح التى ربما يصيبها الاخفاق أيضا ، ولا يكفى المطر الا لنمو الشجيرات الشوكية ، ولذلك يعد من اقاليم الرعى ، كما أن المطر القليل لا يؤدى الى هبوط الحرارة أثناء فصل سقوطه لتصل الى ادناها ، ولكن كثرة السحب تهبط بها بنسبة تزيد على ١٠٪ .

( ز ) الصحراوى الجنوبى : يقع بين ١٧ - ١٨ و ٢١ شمالا وذلك فى الجزء الشمالى الأوسط من موريتانيا وفى السودان الغربى واقليم النيجر ، ويسقط المطر لفترة نحو شهر ونصف نتيجة لهبوب الرياح الجنوبية الغربية ، ولا ينمو هنا سوى بعض الحشائش والشجيرات الجافة ، وتنخفض الحرارة فى الجهات المرتفعة كما فى ادرار الايغوتماس وأير .

#### ٦ - ساحل موريتانيا :

يمتد فى شمال موريتانيا الصحراء الغربية ، يسقط مطر قليل فى الشتاء كأنما يعتبر الطرف الجنوبى للاقليم الذى يتأثر بالبحر المتوسط ، وترتفع الرطوبة النسبية بسبب هبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية السائدة ، وتنخفض الحرارة ويقل مداها بسبب تيار كناريا البارد .

#### الصحراوى :

يسود شمال ٢١ وقد يسقط المطر النادر فى أى فصل من فصول السنة ، والحرارة مرتفعة للغاية فى الصيف عن جنوب الصحراء الكبرى ولو أنها

تشبه الاقليم الصحراوي الجنوبي فى نظامها وتقتصر الزراعة او الرعى هنا على الواحات .

الواقع ان غرب افريقية بما يضم من اقاليم مناخية متعددة لا يقاسى الكثير من الحرارة المرتفعة ، ويستطيع الرجل الأبيض ان يعيش فيه اذا اتبع نظاما قاسيا دقيقا فى حياته ، يمارس بعض الرياضة البدنية ولا يحتقر العمل اليدوى ، ويرتدى الملابس القضاضة الخفيفة ، ويتناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والاملاح ، ولا يعاقر الشراب ، يحيا حياة ملؤها النشاط بعيدا عن الجهات الموبوءة او الملوثة .

### الحياة النباتية :

تتأثر الحياة النباتية بعوامل متعددة بعضها يتصل بالظروف الطبيعية غير العضوية كالتربة والمطر والمناخ والبعض الاخر بالكائنات العضوية كالنباتات السائدة والحيوانات والانسان .

المناخ يرسم الخطوط العريضة لهذه الاقاليم ، فيعين الانواع السائدة فى كل اقليم ، ولكن التربة ونظام الصرف يؤثران فى الاختلاف المحلى وبخاصة فى اطراف الاقليم النباتية وبالقرب من مناطق الانتقال فى المناخ وللرطوبة النسبية والمطر اكبر الأثر فى نوع النباتات السائدة ومبلغ كثافتها وخصائصها العامة واهم الاقاليم النباتية هى :

١ - نباتات الشطوط الرملية فوق خط المد : وتنمو الحشائش والاعشاب والشجيرات الفقيرة على الألسنة والشطوط الرملية فى ساحل السنغال وخليج غانة .

٢ - اقاليم الغايات واهمها غايات المانجروف : التى تمتد فى النطاق الساحلى وخاصة فى الكمرون وليبيريا وسيراليون ، والتربة هنا سواء فى المستنقعات او دالات الانهار طميية لزجة رطبة تتعرض لحركات المد والجزر الصعبة ، ومن ثم يبدو عليها مظاهر الجفاف ، واهم الاشجار هى الأنواع التى تتعمق جذورها فى التربة وتتشعب فى شكل شبكية ، وهى اشجار باسفة دائمة الخضرة متشابكة القروع ، ويمكن زراعة الارز اذا استطاعت مياه المطر ان تطرد مياه البحر الملحة .

٣ - غابات المستنقعات العذبة : تنمو فى المستنقعات والبحيرات الداخلية والانهار بعض سدود البردى والشجيرات والحشائش وأهمها نخيل الرافيا ، ثم يليها فى الداخل اقليم غابات المستنقعات التى قد يصل ارتفاعها الى ٢٨ مترا ، ولكنها متناثرة تتخللها اشعة الشمس ، وتعد الاشجار هنا من الانواع ذات الاخشاب القيمة كالكابلى وبعض نخيل الرافيا الذى يستخدم فى صناعة الاسبنة .

٤ - غابات الجهات المنخفضة الغزيرة الامطار : تعد امتدادا لغابات الكونغو ، رغم أنها أكثر غابات افريقية تنوعا وغنى بنباتاتها ، فهى أقل غنى من الغابات الاستوائية فى الجهات الأخرى من العالم ، وتتوزع هذه الغابات فى منطقتين يفصل بينهما منطقة فقيرة نسبيا لقلة مطرها ونشاط الانسان فى تدميرها ، وتنوع الاشجار كما تعلق وتتكاثر ، وتسمح الغابات هنا يتخلل اشعة الشمس لتصل الى ارض الغابة التى تنمو فى ارضها الحشائش ، وتتخلل هذه النباتات سريعا ، فتنتشر فى أرجائها النباتات الثمينة ، وقد اختفى نحو نصف مساحة الغابات فى القرن الأخير ، ويمتاز هذا الاقليم بجودة اخشابها مثل الكابلى والجوز الافريقى African Walnut » وتصدر أكثرها من غانة وساحل العاج ونيجيريا . ويبدو أن وادى نهر كروس يمثل آخر امتداد للاشجار والنباتات التى تسود فى غابات وسط افريقية نحو الغرب ، والواقع أن تربتها البركانية التى تسود تتكون من صخور ما قبل الكامبرى تصلح لنمو الغابات الكثيفة ، على حين أن غابات بنين التى تنمو فى جهات رملية مسامية أقل كثافة وان كانت غنية باشجارها كالكابلى .

وقد أدى تدخل الانسان الى ظهور أنواع أخرى من الغابات ، فهناك :

( ١ ) الغابات التى قطعها الانسان تماما أو قطع بعض الاشجار فأصبحت أشجارها متباعدة كما هو الحال فى مناطق بينين وأندو « Ondo » فى نيجيريا ومناطق استغلال الاخشاب فى ساحل العاج - تمثل خليطا من اشجار الغطاء الأول من الغابات أى الغابات البكر والاشجار التى نمت من جديد .

( ب ) الغابات الثانوية ( أو العقر ) : وهى التى تنمو بعد قطع أشجار

الغابات البكر أو أحراقها للزراعة المتنقلة غالبا ، ويصحب قطعها تغيير في ظروف النمو : التربة تصبح مفككة وأكثر حرارة وأقل مقدرة على الاحتفاظ بالمرطوبة ٠٠٠ الخ مما يؤدي الى نمو شجيرات أو حشائش ونباتات متسلقة وأشجار من الأنواع الشديدة الاحتمال السريعة النمو التي تتكون من أخشاب لينة ، كما تقل كثافة أنواعها لتحل محلها أنواع أكثر طولاً وضخامة وأكثر حاجة لضوء وأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية .

( ج ) السافانا بديل الغابات : اذا كانت التربة فقيرة وفترات الزراعة طويلة وأمعن الانسان فى احراق وتدمير الغابات ، فسرعان ما تغزو هذه المناطق حشائش السافانا تتخللها بعض الأشجار التي تقاوم الحرائق ، وهي توجد على أطراف الغابات الاستوائية وبعض جهاتها الداخلية مثل سهول سوبو Sobo فى بنين الجنوبية ، وقد تظل بقايا الغابات القديمة وسط هذه الحشائش .

٥ - ادغال كزامانس Casamance woodlands : تنمو فى اقليم كزامانس فى السنغال والجهات المنخفضة فى غينيا البرتغالية ، وهي اشبه بالادغال منها بالغابات الاستوائية ، وقد أدت قلة كثافتها الى قطع الانسان لها فنمت أشجار نخيل الزيت مكانها . ونباتات هذه الادغال أقل تنوعا ، ويبدو أنها تتكون من نوعين من النباتات يختلفان من حيث الارتفاع : الأولى تنفرح على ارتفاع قليل من الأرض اذا قورنت بأشجار الغابات الاستوائية ويبلغ ارتفاعها نحو ١٥ - ٢٠ متر ، أما الثانية فيتراوح ارتفاعها بين ٣ - ٦ متر فقط .

فوتاجالون : يغلب على الظن أن نباتات فوتاجالون كانت من ادغال كزامانس مختلطة ببعض أشجار الغابات الاستوائية ، وقد دمرت حرائق قبائل الفولا هذه الغابات منذ قرن ونصف حتى لم يبق منها سوى بعض شجيرات قصيرة وحشائش وأعشاب متفرقة ، بل أن اراضى فوتاجالون تتكون من تربة صخرية عارية من النبات أو من تربة اللاتريت الجدياء التي تسمى بـ bowé .

## ٦ - ادغال السافانا Savanah Woodland

رغم أن الحدود الفاصلة بين هذه الادغال والغابات الاستوائية واضحة، إلا أنها ليست طبيعية بل نشأت نتيجة نشاط الانسان ، فالسافانا ليست المظهر المثالى لنبات فى هذا الاقليم ، ولكنها نشأت نتيجة لاحراق الانسان للغابات، وتدميرها ، وهكذا اتسع المجال أمام الحشائش لتسود ، وقضى على الاشجار التى لا تقاوم الحرائق لتحل محلها أنواع أخرى تستطيع مقاومة الحرائق ، وقد يؤدي تعرض الارض لطغيان المياه وانحسارها أو وجود تربة من اللاتريت القليل الخصوبة الى نموها ، ويمكن أن نميز عدة أنواع من هذه الادغال تبعا لكثافتها وطولها وأنواع أشجارها التى تمتاز بالتجانس والتي تكون نفضية وأهمها هي : -

**احراج وحشائش الاقليم الساحلى فى غانة :** يساعد ارتفاع الرطوبة النسبية رغم قلة الامطار على نمو الغابات والادغال ، ولكن يبدو أن أحراق الانسان لهذا الغطاء النباتى قد قصر النباتات الآن شرقى أكرا على الحشائش والاحراج الكثيفة التى تتكون من أشجار الغابات الاستوائية والادغال على السواء والادغال فحسب غربى أكرا .

**سافانا غينيا :** ويتفق مع الاقليم المناخى الذى يعرف باسم اقليم السافانا الجنوبى بين خطى عرض ٨ - ١٣ درجة تقريبا ، ويتراوح المطر بين متر ومتر وربع فحسب ، كما أن فصل المطر لا يتجاوز ٤ - ٥ أشهر ، وقد تهبط الرطوبة النسبية الى ١٤٪ ويمكن أن نميز ثلاثة أنواع منها : -

( أ ) **اقليم غينيا الجنوبى :** وتنمو الحشائش التى تتراوح ارتفاعها بين ١٥ - ٣ متر تتخللها أشجار نفضية ذات أوراق عريضة يبلغ ارتفاعها ١٣ - ١٥ مترا ، وهى جميعا تقاوم المطر ولكنها تحترق عاما بعد آخر .

( ب ) **اقليم غينيا الشمالى :** وهو لا يتصل باقليم الغابات الاستوائية وتنتشر به الشجيرات ، ولكن الاشجار قد تبلغ من الكثافة حدا يحول دون نمو الحشائش ، وقد تسود الحشائش حيث تصبح الاشجار متفرقة ، وهى تشبه الاقليم السابق ولكنها أقل غنى وتنوعا ، وتنمو بها أشجار نافعة مثل شجرة الزيد Farité Shea Butter

( ج ) **اقليم هضبة جوس** : تتكون النباتات الآن من الانواع التى تنمو فى الجهات المرتفعة ولكنها قليلة اذا ما قورنت بنباتات اقليم غينيا الشمالى ، ويقدر متوسط سطح الهضبة بنحو ٩٠٠ متر وقد عجل بتدمير الغطاء النباتى الاصلى نشاط حركة استخراج المعادن مثل القصدير والكولومبيت .

### اقليم سافانا السودان :

تمتد فى نطاق يبلغ عرضه ٢٠٠ - ٣٨٠ كم بين السنغال ونيجيريا الى الشمال من سافانا غينيا ، ويعتبر هذا الاقليم من أكثر الاقاليم تنوعاً من النواحي النباتية والمناخية والبشرية ، ولكنه من أكثرها تعرضاً لنشاط الانسان ، وقد كانت هناك دائماً حركة زحف اليه من الاشجار الشوكية من الشمال ومن الجنوب على السواء والاشجار المتفرقة التى تمتاز بما تحمله من تيجان عظيمة يبلغ ارتفاعها ٨ - ١٥ متراً ، أهمها البواباب وشجر الزيد والكايوك Kapok وأكثر الاشجار ذات الأوراق ضغيرة ، والششائش قصيرة رفيعة تصلح للرعى مما دفع السكان للابقاء عليها لهذا الغرض .

### نباتات ساحل السنغال :

يتفق مع اقليم ساحل السنغال المناخى ، وهو لا يمتد كثيراً نحو الداخل اذ لا يبعد أكثر من ٣٠ ميلاً من الساحل ، وتنمو بعض اشجار اقليم سافانا غينيا حول المناطق المنخفضة ذات التربة الصلبة حيث تقترب المياه الباطنية من سطح الأرض كما هو الحال فى نياس Niayes ( منخفضات بين كثبان الرمال تعنى ادغال نخيل الزيت ) فى السنغال و Aftouts فى موريتانيا ، وتنتشر اشجار البواباب ونخيل الزيت .

### سافانا الساحل :

وتتعد من جنوب موريتانيا وشمال السنغال الاوسط لتضم معظم اراضى ثنية النيجر وجنوب الفيض وشمال شرق نيجيريا ، وتمتد فترة الجفاف لفترة ثمانية أشهر جافة ، وتمثل الادغال الشوكية الغطاء النباتى الاول فى هذه المنطقة والاشجار أكثرها من الانواع السطوية هنا ، وقد تكثرت الشجيرات بحيث تسود فى المنطقة .



قد تنمو بعض الغابات فى الجهات المتطرفة حيث تستمد مياهها لا من الامطار ولكن من مواد المياه الباطنية حول مجارى الانهار والمستنقعات فى ادغال المسافانا .

#### تباينات الصحراء وشبه الصحراء :

**اقليم الصحراء الجنوبي :** تنمو هناك بعض الشجيرات الشوكية والاعشاب عقب المطر الطبيعى القليل ، ولكن بعض النباتات تعتمد على ندى الشتاء ، والنباتات هنا خليط من اعشاب البحر المتوسط واشجار الاقاليم المدارية ، وتنمو نباتات سفانا الساحل فى مرتفعات ادرار والايفوغاس وآير .  
أما الاقليم الصحراى فتتنمو به الشجيرات الشوكية المتفرقة التى تعتمد على طبيعة التربة وما قد يتوفر فيها من مياه باطنية ، ولكن عقب سقوط المطر النادر ينمو العشب ، ومن أهم النباتات التى تعد علفا جيدا « الحاد » .

#### تباينات الجهات المرتفعة :

يؤدى الارتفاع الى التخفيف من شدة الحرارة وزيادة الغيوم وارتفاع نسبة الرطوبة وقلة البخر ، ولذلك تنمو الغابات الاستوائية التى تجد فى هذه الجهات المرتفعة ظروفا ملائمة لها فوق منسوب ٩٠٠ متر فى مرتفعات بامندا والكمرون وجبل الكمرون وجزائر خليج بيافرا ومرتفعات غينيا ، أما على منسوب ١٤٨٠ - ١٥٥٠ مترا فتصبح الاشجار اصغر حجما واقل تنوعا ، وان كانت تكثر الاشجار المعتدلة ، وتعد هذه المنطقة والمنطقة التى ترتفع عنها باسم منطقة غابات الضباب لما يكتنفها من الضباب « mist forests » اذ يصل ارتفاعها الى منسوب ١٩٠٠ متر ، ولا يعدو المنسوب الذى تنمو عنده الغابات عادة ١٤٥٠ مترا فى مرتفعات الكمرون وبامندا ، أما على جبال الكمرون فلا تنمو فوق منسوب ١٥٠٠ متر فى الشمال وفوق ٢٤٠٠ متر فى الجنوب الغربى .

#### الزراعة :

تعد عماد الحياة الاقتصادية فى غرب افريقية : وتتأثر الزراعة بموامل متعددة بعضها طبيعى وبخاصة المناخ والتربة وبعضها بشرى يعزى الى نظم

حياة الانسان وتقاليده ومثله : فاقليم السافانا يصلح لخلوه من ذباب تسي تسي لتربية الماشية ، ولكن الرعاة الذين يربونها لا يقبلون على الزراعة مما يحول دون ظهور نوع من الزراعة المختلطة كما كان منتظرا . وتختلف الزراعة فى اقليم السافانا فى الشمال عنها فى اقليم الغابات ، فمزارع السافانا أكبر مساحة والزراعة فيها أقل تنوعا وكثافة منها فى اقليم الغابات . ولكن كلما توافرت الامطار الكافية المضمونة والتربة الجيدة انصرف السكان الى العناية بالمزراعة ، كما يلاحظ أن ازدياد كثافة السكان يؤدي الى اتباع طرق زراعية كثيفة كما هو الحال بين الهوسا فى شمال نيجيريا .

أما الزراعة فى الغابات فتقتصر على بقاع صغيرة متفرقة قد اجتثت منها الاشجار ، وتفقد التربة هنا خصوبتها بسرعة فضلا عن تعذر توفير الأسمدة العضوية لتعذر تربية الحيوان وصعوبة الحصول على الأسمدة الكيماوية ، وتمتاز الزراعة هنا بتنوع المحاصيل التى تزرع فى نفس الأرض، وتنتشر زراعة المحاصيل الشجرية كالكاكاو ونخيل الزيت والبن ، ويمتد موسم الزراعة طول العام فهو ليس فصليا شأن الزراعة فى السافانا .

وتوجد فى مناطق زراعة الغابات تقاليد اجتماعية خاصة لتقسيم الأعمال الزراعية بين الجنسين : فمثلا يقيم النساء الاكوام التى يزرع عليها الرجال نبات اليام الذى تجود زراعته ، كما أن زراعة الخضروات من نصيب النساء ، وتنتشر زراعة أكثر من محصول فى الأرض فى وقت واحد مما يخفف من التعرية ويكفل نوعا من الطمأنينة ، ولكنه يحدد الانواع من النباتات التى تصلح لهذا النوع من الزراعة . كما أن بعض الجماعات تؤثر زراعة محصول معين بل وممارسة حرفة خاصة دون سواها فجماعة الفولانى تكره الزراعة ، ويمكن أن نقسم الزراع هنا الى فريقين يفصل بينهما ساحل العاج : جماعة زراعة الأرز فى الغرب West Atlantic Group وجماعة زراعة اليام فى الشرق ويطلق عليهم East Atlantic Group

وحين وصل الاوربيون كتجار الى ساحل غرب أفريقية أدخلوا محاصيل يمكن اخزان ثمارها دون أن يتطرق اليها عطب أو فساد مثل الكسافا والفول السودانى والذرة والقطن من العالم الجديد ، كما أدخلوا زراعة الأرز وقصب السكر والموز من آسيا .

ويتأثر توزيع النباتات باعتباريات كثيرة ، فكثيرا ما فرضت سلطات الاستعمار زراعة محاصيل معينة ، كما حدث فى ساحل العاج حيث أجبر الاهلون من الزراع على زراعة محاصيل غذائية خاصة ، فضلا عن الكاكاو ، وقد استطاعت مستعمرات فرنسا بفضل قلة سكانها من انتاج محاصيل تجارية تفيض عن حاجة السكان ، رغم أن نظام الزراعة التقليدى هو الاكتفاء الذاتى ، ومن ثم نجد كثيرا من الاراضى تشغلها محاصيل متباينة نتيجة لمحاولة ادخالها .

ولا بد من توفر المواصلات ووسائل النقل لانتاج المحاصيل التجارية كالقفل السودانى ، وينتج صغار الملاك المحاصيل التجارية فى مستعمرات بريطانيا السابقة لأن نظام الملكية لا يسمح للأوربيين بأن يمتلكوا مزارع واسعة ، أما المستعمرات الفرنسية السابقة فقد انتشرت فيها المزارع الكبيرة ، وقد زرع المطاط فى ليبيريا لأن نظام الملكية يسمح بامتلاك شركة فيرستون لمزارع مطاط كبيرة Firestone Rubber Comp

وقد ادخلت زراعة الآلات فى جهات مثل سوتو ( انظر شكل ٣١ ) شمال نيجيريا وفى السنغال ومنطقة النيجر الداخلية فى السودان الغربى .

#### وأهم الاقاليم الزراعية : -

١ - الاقليم الجنوبى الغربى لزراعة الأرز ومحاصيل الاشجار : ويشمل جنوب السنغال وغينيا وغينيا البرتغالية وسيراليون وليبيريا وغربى غانة ، وقد وجد الأرز هنا ظروفًا ملائمة واقبالا من السكان على زراعته ، مثل زيادة عدد سكان المدن ، وارتفاع معيشة البعض وتعود البعض الآخر حين اقامته فى الخارج أثناء الحرب استهلاكه ، وتقل نفقات الارز بالنسبة لقيمه كما يمكن تخزينه ، فضلا على أنه لا يحتاج الى العناية بالتربية كثيرا ، ان يزرع فى جهات تغمرها المستنقعات ، ولا تصلح كثيرا لزراعة غيره ، وبخاصة أن مستعمرات بريطانيا وفرنسا السابقة فى غرب أفريقيا التى كانت تستورد نحو ١٩٣٩ مليون طن قبل سنة ١٩٣٩ منه اضطرت لانتاجه أثناء الحرب ، فهناك نوع يزرع فى دلتا النيجر وهو يزرع بالتبادل مع القطن والذرة ولا يحتاج لاكثر من ٩٠٠ ملليمتر من المطر لزراعته ، ثم أرز المستنقعات ويزرع



( خريطة رقم ٣١ )

### الاقليم الزراعي في غرب أفريقيا

في جهات سيراليون وغانة ونيجيريا والسهول الفيضية والمستنقعات في الداخل ، أما أرن المرتفعات فيزرع في ظروف الجفاف في هضبة جوس وفوتا جالون وهو يشبه الأرز المعروف ويسمى Hungry rice .

أما الموالح فتزرع في السفوح الرطبة في المرتفعات الداخلية وهي تزرع في غينيا للتصدير ، فالبرتقال يزرع بعيدا عن البحر ، ولكن لونه الأخضر لا يشجع على تصديره ، وإلى جانب الموالح يزرع الطباق في الجهات المرتفعة ، ويصدر للخارج .

٢ - اقليم الكسافا واليام والذرة ومحاصيل الأشجار : وهو يقع في المنطقة الاستوائية ، وتنتشر زراعة الكسافا واليام والخضروات والفواكه كالموز والاناناس ثم قصب السكر والطباق والأرز والذرة ونخيل الزيت ونخيل جوز الهند والكولا . ويسقط به أكثر من متر من المطر ، ويصدر الكثير من المنتجات كالكاكاو والمطاط والبن .

ويزرع الكسافا والمانيوق ، وهو شديد الاحتمال للجفاف والجراد ،

كما أنه ينمو فى أى نوع من أنواع التربة ، وان كان وجود فى التربة الطفلية  
الحسنة الصرف .

وهذا النبات الذى يظل فى الأرض عاما بعد آخر مجهد للتربة ، وذلك  
يمثل نهاية المطاف فى الدورة الزراعية ، ويوجد فى الجهات التى يصيبها  $\frac{3}{4}$   
متر فاذا أصابها أكثر من ذلك يزرع فى ظل الأشجار .

ويعتبر الياق لونا أساسيا للغذاء فى حياة سكان منطقة سافانا غينيا  
الجنوبية ، وتحتاج زراعته الى شروط معينة ، فهو يوجد فى التربة الطفلية  
فقط كما أنه لا يحتاج للمظل ولا يحتمله ، والواقع أنه يعتبر اذا قورن  
بالكسافا التى تشببه « طعاما كماليا » ، فهو أغلى سعرا ومن ثم كان سلعة  
تجارية مهمة .

اما الذرة فتعتبر محصول الحبوب الرئيسى فى جهات الغابات والسافانا  
خارج مناطق زراعة الأرز ، ويحتاج الى تربة طفلية رملية أو طفيلة غنية  
بالدبال ، ويمكن انتاج محصولين منه فى العام اذا توفر فصلان ممطران ،  
يبلغ متوسط المطر السنوى فيهما بين  $\frac{3}{4}$  - ١ مترا ، أو على البرى بالقرب  
من الانهار . أما نخيل الزيت فهو يزرع فى الجهات التى اتصلت بالاوربيين  
منذ زمن بعيد ، وهو أول نبات يزرعه الزراع بعد قطع أشجار الغابات ويقبل  
السكان على زراعته فى مناطق السكنى الكثيفة فى جنوب شرق سيراليون ،  
كما كانت زراعته منتشرة فى ساحل العاج وغانا وداهومي ، والى شرق  
النيجر وغربه فى منطقة الدلتا ، وذلك قبل انتشار زراعة الكاكاو ، ويصدر  
غرب أفريقية ٨٠٪ من ثمار نخيل الزيت Palm Kernels ، ونحو ٤٠٪  
من زيتة ، وهما يمثلان ١٠ قيمة صادرات نيجيريا ، ونحو نصف صادرات  
سيراليون وداهومي ، ويزرع فى الجهات التى يصيبها نحو  $\frac{1}{4}$  متر من المطر ،  
موزعة على ثمانية اشهر على الاقل ، والنوع الناتج أقل جودة منه فى جهات  
العالم الاخرى ، وبخاصة فى جنوب شرق آسيا .

ويزرع فى مزارع الوطنيين الصغيرة ، لأن الاوربيين يؤثرون زراعة  
المحاصيل المجزية الأخرى . ويعد الكاكاو أهم المجاصيل من حيث قيمته  
اذ يزرع للتصدير ، وتنتج أفريقية محصوله فى العالم ، وهو يمثل  $\frac{3}{4}$  قيمة

صادرات غانة وجزائر ساوتومى وبرنسيب ٥/٢ قيمة صادرات ساحل العاج وتوجولاند و ١/٤ صادرات نيجيريا ، وتنتج الكاكاو المزارع الكبيرة على المستعمرات الفرنسية السابقة ، والصغيرة فى املاك بريطانيا السابقة ، أما البن فيعد أهم صادرات العاج من حيث القيمة ، وهو يزرع على نطاق واسع فى غينيا وليبيريا ، وسيراليون وتوجولاند والجزائر التابعة للبرتغال .

والنوع المعروف بالبن العربى يزرع على منسوب ٦٠٠ متر ، أو اكثر فى مرتفعات غينيا وجبل الكمرون ، كما تزرع أصناف أقل جودة أهمها بن روبستا Coffea robusta الذى تنتشر زراعته فى ساحل العاج ويزرع فى المزارع الكبيرة ، ويحتاج اعداده للآلات ، أما الكولا فقد كانت من أهم السلع التى يصدرها غرب أفريقية منذ زمن بعيد ، وتزرع فى اقليم الغابات الاستوائية حيث لا يهبط المطر الساقط دون ١٢٥ متر فى العام ، ويزرع فى شمال ساحل العاج ، وجنوب سيراليون الوسطى ، وجنوب شرق غينيا وسهولها الساحلية ، وتمتد غابات جوز الهند على سواحل توجولاند وداهومى وساوتومى حيث يسقط نحو ١٣٦ متر من الامطار أما الموز فهو يزرع فى التربة العميقة الخصيبة التى يتراوح مطرها بين متر ومترين ونصف ، وقد انتشرت زراعته بالقرب من السواحل لتصديره ، من منطقة جبال الكمرون وساحل العاج الوسطى ، وفى وديان فوجالون وسواحل غينيا ، ويزرع فى مزارع كبيرة فى مستعمرات فرنسا السابقة .

٣ - اقليم ذرة غينيا Guinea corn وشجرة الزيت Shea Butter وال فول السودانى :

يتفق هذا الاقليم الزراعى مع اقليم سافانا غينيا ، كما يعد آخر المناطق التى تلائم تربية الماشية فى الجنوب ، ويزرع الذرة الرفيعة حيث لا تلائم الظروف زراعة الذرة الشامية أو الأرز ، وتعتبر شجرة الزيت مصدرا مهما للزيت فى هذا الاقليم اذ تزرع بين خطى عرض ١٠ - ١٥ شمالا ، ويزرع جماعات اللتيف فى نيجيريا السمس الذى يصدر من مقاطعة بنوى ، ويزرع القطن فى كل أنحاء غرب أفريقية فيما عدا نطاق الغابات فى الجنوب ، فيزرع مع الذرة الرفيعة والفول السودانى فى الشمال ، وهو يزرع لتصدير والاستهلاك المحلى الأمريكى ، وهناك نوعان آخران يزرعان فى الجنوب للاستهلاك المحلى مع اليام والذرة الشامية فى نفس الارض .

#### ٤ - اقليم الدخن والبقول السوداني :

ويتفق مع اقليم سفانا السودان والساحل ، ويصلح لزراعة نباتات الاقليم السابق اذا استثنينا اليام وشجرة الزيت والفواكه ، وتعتبر هذه المنطقة صالحة تماما لتربية ماشية الزيغو التي يمكن تربيتها الى الشمال من ذلك أيضا ، ويعتبر الدخن الذي يلائمه الجفاف ، وتطرف الحرارة ، وتوفر اشعة الشمس نوع البقول الغذائية الرئيسى فى منطقة النيجر والسنگال وموريتانيا والجزء الاوسط من مالي ، أما البقول السوداني الذي يزرع فى التربة الرملية بين خطى عرض ١١ و ١٢ شمالا ويكفيه نحو ٢٥٥ سم من المطر فى الجهات الساحلية ، و ٦٣ - ٩٠ سم فى الجهات الداخلية ، فقد ظل حتى سنة ١٩٥٠ وفقا على مزارع الافريقيين حتى أدخلت الزراعة الآلية فى مناطق *kaffrine* (كافرين) وسديو *Sédhiou* فى السنغال ، وفى كونتاجورا *Kontagora* فى نيجيريا ، ويوجد فى السنغال نحو نصف مليون مزارع ، يزرعون نحو ٢ مليون فدان بهذا المحصول ، ولا يصدر الا حيث تتوافر وسائل النقل وبخاصة السكك الحديدية .

#### تربية الحيوان ومصايد الاسماك :

تربى الماشية فى نطاقات تشبه المحاصيل الزراعية ، فالجنوب بتربته التى تتعرض لفقد العناصر المغذية من طبقتها السطحية لغزارة الامطار تحتاج الى قيام نوع من الزراعة المختلطة للمحافظة على خصوبة التربة ، ولكن انتشار ذباب تسي تسي قد حال دون تربية ماشية الزيغو ، وأصبحت الحيوانات مقصورة على جنوب خط ١٠ شمالا على أنواع من الماشية صغيرة الحجم لتستطيع أن تعيش فى هذه البيئة القاسية على الحيوان . وأهم أنواعها ثلاثة: نداما *Ndama* وتشاد ، والشورت هورن القزمى *Dwarf Shorthorn* والواقع أن هذه الانواع كانت هى السائدة فى كل أرجاء غرب أفريقية قبل قدوم قبائل الفولانى ، أما فى الشمال فندرة المياه وبخاصة فى موسم الجفاف وعدم العناية بالمرعى قد أدى الى عدم النهوض بالانتاج الحيوانى ، والواقع انه لو جمع زراع الجنوب بين الزراعة وتربية الماشية ورعاة الشمال بعد استقرارهم بين الزراعة وتربية الحيوان لقام نظام حسن للاستغلال ، وتربى الماشية الصغيرة بين ٩ و ١٠ شمالا ، وبين ١٢ و ١٤ شمالا على حين

تنتشر بين ١٣ و ١٤ شمالا ماشية الزيرو الجيدة ، وتعانى ماشية الشمال من نقص الغذاء قبل سقوط المطر اثناء فصل الجفاف لمدة ثلاثة اشهر ، وتنتج غرب افريقية الفرنسية سابقا نحو ٢٠٠.٠٠٠ رأس من الماشية لاستهلاك لحومها ( انظر خريطة ٣٣ ) .

أما الثروة السمكية فهي متنوعة هنا ، وقد كانت تقتصر حتى الاستعمار الأوربي على صيد الزوارق فى خليج غانة التى يقوم بها سكان سواحل جمهورية غانة من قبيلة الفانتى *Fanti* ، ولصيد الاسماك اهمية خاصة فى سولجى موريتانيا والسنغال ، وقد اجتذبت مصايد الاسماك بعض الصيادين من جهات أخرى كجزائر كنارى وغيرها ، وتقوم صناعة تجفيف الاسماك فى خط عرض ١٠ شمالا حيث تقل تربية الماشية ، ومن أهم مصايد المياه الداخلية منطقة بحيرة تشاد وثنية النيجر والسنغال .

#### المعادن والقوة المحركة :

عرف غرب افريقية استخراج المعادن منذ عصور قديمة ، فامبراطوريته القديمة كامبراطورية غانة أو مالى كانت تستخرج الذهب ، أو تحصل عليه بالمبادلة ، فكان الذهب والدقيق والكولا من أهم حاصلات الاقليم الجنوبي من غرب افريقية ، على حين كان الملح والماشية من أهم منتجات الشمال ، وقد استخرج البرتغاليون من فاليمى *Falémé* الذهب لتصديره . ولم يقتصر الأمر على الذهب ، فقد كانت صناعة الحديد ثم الزنك والقصدير والنحاس من المعادن التى استغللت قبل قدم الاوربيين احيانا وبعد ذلك احيانا أخرى .

وفى سنة ١٧٧٨ مارس الأوروبيون استخراج المعادن بأنفسهم ، فمدت سكة حديدية فى أرجاء غانة لنقل الذهب والبوكسيت ، وفى نيجيريا لتعدين القصدير والفحم ، كما مدت سكة حديدية من تلال بومى *Bomy Hills* الى مونروفيا سنة ١٩٥٠ فى ليبيريا لاستخراج الحديد ، وكذلك استخدمت سكة حديد سيراليون فى استغلال الكروميت .

وهذا الجانب من جوانب النشاط الاقتصادي مهم سواء من ناحية توفير العمل لليدوى العاملة ، والمساهمة فى موارد الدخل للدول أو من ناحية رءوس





الأموال التي توظف ، وتتولاه شركات فيما عدا فحم نيجيريا الذي تستغله الدولة ، والمستعمرات البريطانية السابقة أكثر غنى في ثروتها المعدنية من المستعمرات السابقة الأخرى ، فسيراليون ونيجيريا فضلا عن غانة من أهم المناطق التي تحتوى أرضها على ثروة معدنية كبيرة ، وقد عزفت رموس الأموال الفرنسية عن الاتجاه لاستثمارها في هذا المجال ، كما أن عدم توفر وسائل المواصلات أو الموانئ لم يشجع أصحابها على استغلالها أيضا ، ولم ييسد الفرنسيون عناية واضحة بالتعدين إلا منذ سنة ١٩٤٧ ، ومع ذلك فإن كثيرا من مشروعات التعدين في مستعمرات فرنسا السابقة تتولاه شركات غير فرنسية ففي غينيا كان البريطانيون يستخرجون الحديد والماس والكنديون البوكسيت .

فالذهب يستخرج من غانة من عروق الصخور البهلورية التي تنتمي لعصر ما قبل الكامبري ومن الرواسب ، ويستمد ٧٠٪ من الذهب من مجمعات تشبه ما يوجد في وتوتزر أند في جنوب أفريقية ، ويأتي أكثره من أشانتي والمنطقة الغربية ، إذ تعد مناجم الذهب التي تملكها Ashanti Goldfields Corporation من أغنى حقول الذهب في العالم وهي تقع أبوازي Obouasi ، يستخرج من الرواسب في غينيا في شمال غرب سيجيري Suigiri وقد بلغت صادرات انة منه ١٩٣٨ ٧٦٦٥ ألف أوقية و ٨٥٢٦٦ ألف أوقية سنة ١٩٦١ ، يليها أفريقية الغربية الفرنسية سابقا التي استخرج منها ١١٨ ألف أوقية سنة ١٩٣٨ ولم ينتج شيئا سنة ١٩٦١ ، أما عن الماس فغرب أفريقية ينتج ضعف ما ينتجه جنوب أفريقية من حيث الوزن ، ولكنه من الأنواع تستخدم في أراض صناعية ومن ثم فقيمه قليلة ، ويستخرج الأوربيون الماس من حوض بيريم Birim Basin في غانة ، والوطنيون يستغلون مناجم حوش بونسا Bansa Basin ، ويستغل بعض مناجم الماس في ساحل العاج وغينيا وليبيريا وسيراليون ولكنها أقل أهمية ، أما الحديد فقد كان يستخرج من سيراليون قبل الحرب ، ولكن عثر عليه في ليبيريا حيث يستخرج من تلال بومي Bomi Hills بالقرب من مونورفا ، كما يوجد في غينيا بالقرب من كوناكري مناجم الحديد تنتج نحو ٣ مليون طن في العام منذ سنة ١٩٥٣ ، أما البوكسيت فقد عثر عليه في غانة أثناء الحرب العالمية الثانية ، واستغل من أوازr Awaso جنوب غرب كوماسي ، ويوجد في جهات أخرى من غانة ، ولكن استغلاله مشروع توليد الكهرباء

على نهر فولتا ، أما فى غينيا فيوجد فى فريا Fira حيث ينتظر انشاء مشروع لتوليد الكهرباء لانتاج نحو ١٠٠ ألف طن من الألومنيوم فى العام كما يستخرج من كارسا Karsa جزائر لوس Los ، أما المنجنيز فهو يوجد فى بقع متفرقة فى غانة وبالقرب من تاكوراى بصفة خاصة ، أما مشروعات توليد الكهرباء فان امكانيات اقامتها محدودة ، لأن المطر الفصلى يجعل من الضرورى اقامة سدود ضخمة لحجز المياه امامها ، فأهم مشروعات توليد الكهرباء على منحدرات هضبة جوس فى نيجيريا حيث يوك ٢٠٠٠ كيلو وات لاستخدامها فى استخراج القصدير ، وقد اقيم فى غينيا محطة لتوليد نحو ٩٥٠٠ كيلو وات سنة ١٩٥٤ عند Grandes Ghutes ولكن من أهم المشروعات المقترحة مشروع نهر الفولتا فى غانة ، ومشروع مساقط Kaleta فى غينيا بالقرب من كينديا على نهر كونكورى Konkouré

ويستخرج الفحم من نيجيريا منذ سنة ١٩١٥ ، والبتروى من شرق نيجيريا منذ سنة ١٩٥٧ ويستخدم الغاز الطبيعى فى بورت هاركورت .

#### المواصلات :

اتصلت الاطراف الشمالية من غرب افريقية بالصحراء المتاخمة لها وبشمال افريقية من ورائها منذ أن ادخل الجمل بعقد القرن الثامن الميلادى اتصالا وثيقا الا انه حين غزا الترك بلاد المغرب انقطعت العلاقات التى كانت تربط هذه الجهات الداخلية من الصحراء بعالم البحر المتوسط والعالم الغربى ، ولكن كثافة الغابات فى الجنوب وانتشار الامراض وبخاصة امراض الماشية وصعوبة تربية الحيوان هنا قد فرضت العزلة على الجزء الجنوبى من غرب افريقية ، وكانت سواحل غرب افريقية ليست أكثر تشجيعا للمكتشفين الا الذين احتكروا نقل العبيد للعالم الجديد ، اذا كانت افريقية تقع داخل منطقة نفوذهم ، فاقيمت المحطات التجارية فى الجزء الاوسط والشرقى من ساحل غانة لخلوه من الغابات ، ولامكان الحصول على كل منتجات غرب افريقية المهمة من ذهب وعاج وريش وعبيد ولفل وغيرها ، ولكن على حين أخذ الفرنسيون الذين شعروا بعدم مزاحمة البريطانيين لهم فى غرب افريقية يتوغلون منذ وقت مبكر عن طريق السنغال للداخل حتى وصلوا الى اعلى



النيجر ، نجد أن البريطانيين قد أبدوا عدم أكثرث فى غرب أفريقية ، نفس النصف الثانى من القرن الماضى حاولوا أن ينسحبوا من عدة جهات ، وأخيرا أخذت مشروعاتهم يدب فيها النشاط بعد أن تبين للجميع أهمية غرب أفريقية ، وأنه من الممكن أن يصبح مصدر كثير من المواد الغذائية والمواد الخام والمعادن والمحصولات الزراعية ذات الأهمية التجارية وذلك فى الربع الثانى من القرن التاسع عشر ( انظر شكل ٣٣ ) .

ويعد السنغال والنيجر أهم الانهار الملاحية ، وتحاول السكك الحديدية أن تستكمل النقص فى الملاحة النهرية ، ذلك أن أنهار أفريقية غير منتظمة الانحدار . كما أنها فصلية الجريان كثيرة الالتواءات ، ويعتبر نهر غمبيا من أهم الانهار الصالحة للملاحة ، ولكن انفصال أعماله عن أجزاءه الدنيا والوسطى كما تقضى بذلك الحدود السياسية قد غرض من أهميته الملاحية .

أما النقل بالسكك الحديدية فقد ظل حتى الحرب العالمية الاولى وسيلة فعالة ، لا تجد منافسا لها سواء كطريق من طرق النقل أو أداة من أدوات الربط بين الجهات المختلفة ، وبخاصة النائية وبسط لواء الأمن والادارة الفعالة فيها ، ثم أخذت تتقدم طرق النقل بالسيارات وانشئت خطوط للطيران فى الداخل مما أدى الى منافسة السكك الحديدية .

ومن الطريف أن المنطقة الوسطى الفقيرة التى تجتمع بها صعوبات الحياة فى السافانا والغابات ، على حين حرمت من مواردهما والتى تقل بها كثافة السكان . تمثل عقبة اقتصادية تعترض مد السكك الحديدية نحو الشمال كثيرا ، كما أن نقص الفحم حتى سنة ١٩١٥ حين استغلت حقول اينوجو Enuga فى نيجيريا كان يمثل عقبة أخرى ولكن السكك الحديدية الفرنسية حاولت استخدام زيوت الفول السودانى لتسييرهما كما استخدمت الاخشاب التى لا تعد وقودا جيدا لهذا الغرض .

وقد حاول الفرنسيون أن يربطوا منطقتهم المتصلة الداخلية بسواحل خليج غانة والمحيط الاطلنطى ، وقد توخوا أن تكمل السكك الحديدية والمواصلات المائية فى النيجر والسنغال ، وأهم الخطوط هنا هى دكار - النيجر ، وكوناكرى - النيجر ، وأبيدجان - النيجر ، وبنين النيجر وهى كلها خطوط مدت للاستغلال الاقتصادى المحلى فضلا عن تيسير تكوين وحدة

اقتصادية متكاملة فى اتحاد افريقية الغربية الفرنسية سابقا ، ولكن البرتغاليون وبخاصة بوحي من الغرف التجارية فى موانى انجلترا وبمساعدة يوسف تشمبرلين الاستعماري البريطانى - قد مدوا خطوطا متباعدة منعزلة كل يسير فى مستعمرة قائمة وحدها .

وقد أصبحت الطرق منذ الحرب العالمية الأولى مكلمة للسكك الحديدية وهى ليست بديلا للسكك الحديدية الا حيث لا تمد السكك الحديدية ، وتحتاج الى نفقات فى الصيانة أكبر بكثير مما تحتاج اليها السكك الحديدية ، وهى أكثر مرونة فى النقل ، وان كانت تتعطل أثناء فصل المطر فى كثير من الاحيان وتنتشر الطرق الجيدة فى غرب السنغال وفى غينيا وجنوب ساحل العاج وجنوب غانة وغرب نيجيريا وشرقها . وقد ظل النقل بالسكك الحديدية فى غرب افريقية سائدا حتى حوالى سنة ١٩٣٠ . أما الطرق الجوية فتجد بعض الصعوبات فى أثناء فصل المطر ، ولكن الحاجة اليها حينئذ تقل لتراخى النشاط التجارى فى هذا الفصل ، ويكثر الضباب خلف الشواطىء ، ولذلك فانه يستحسن اقامة مطارات المناطق الساحلية عند السواحل مباشرة حيث يقل ضباب الصباح الباكر نسبيا .

## الفصل الثانی

### الاقالیم الطبیعیة والاقسام السیاسیة

#### السنگال :

أولى مستعمرات فرنسا فى غرب أفريقية وأقرب المستعمرات السابقة المتطورة فى الاقالیم المداریة الى أوریا ، تقدر مساحتها بنحو ١٩٧٢٠٠ كم٢ يسكنها ٦٤ مليون الى جانب ٣٢ر١٨٢ نسمة من غیر الافريقيين .

وتنحصر أهمية السنغال الان فيما تنتجه من الفول السودانى فهى أولى دول العالم فى هذا الصدد ، كما انها الى جانب عاصمتها سنت لويس يوجد بها ميناء دكار الذى يعد أهم موانى غرب أفريقية الغربية الفرنسية سابقا ، وربما كان لما يسود ساحلها من مناخ لطيف أثره فى أن يشيع فى هاتين المدينتين دكار وسنت لويس جو يشبه ما يسود مدن جنوب فرنسا .


ويمتاز سطحها بالاستواء المطرد ، فهى تتكون من سهول متموجة تنحدر من حافة الكتلة القديمة فى الشرق نحو الغرب ، وتنتشر بها الرمال التى يتخللها بعض الصلصال ، وقد تظهر الرمال على شكل كثبان ، وعلى حين نجد أن الساحل منخفض رملى بين نهر السنغال ورأس كيب فرد حتى يصبح صخرى تحف به الجزائر يعود رملها منخفضا جنوب دكار حتى سانج أمور Sang Amour ، ولكن يصبح بعد ذلك صخرى تتخلله الخلجان كما هو الحال فى خليج سلوم ، كذلك الحال فى ساحل كازامانس وكازامانس اقليم يفصله عن السنغال غمبيا وتنمو الحشائش القصيرة والشجيرات الشوكية فى المنطقة الساحلية ، كما تزرع الذرة الرفيعة والشامية فى وادى السنغال ، وتوجد منخفضات بين الكثبان الساحلية تسمى نياس تمتد بين مصب السنغال وشبه جزيرة كيب فرد ، ويزرع فى اقليمى كاواك وكايور Cayor, Kaplack الفول السودانى على حين نجد منطقة فيرلو Ferlo شبه صحراوية ، أما اقليم سلوم فتقوم به زراعة الفول السودانى ويندر العمران فى الشرق والشمال الشرقى من السنغال حيث توجد اياه

على أعماق بعيدة ، أما فى غرب اقليم كايور وفى اقليم نيورو دى ريب Nioro du Rip فتقترب المياه الباطنية حيث يزرع المزارعون من قبائل اللولوف السيرير Serer الذرة الرفيعة والبقول السودانى ، وقد انتقلت مراكز زراعة البقول السودانى الرئيسية نحو شرق الجنوب الشرقى من سنت لويس صوب كاواك لاستنفاد خصوبة الارض ، أما شرق وجنوب شرق دكار حيث يزرعه السيرير الذين يربون عليه الحيوان ٠٠ فقد استطاعوا صيانة خصوبة التربة .

وقد قامت هيئة ، بعثة تنظيم استثمار السنغال Mission d'Aménagement du Sénégal باستصلاح مساحة من الارض تقدر بأكثر من ٢٥٠٠ فدان تروى بالراحة الى شرق مدينة ريتشارد تول الواقعة عند رأس الدلتا ، كما أقامت مشروعا للافادة من بحيرة جوير Guiers الواقعة جنوب غرب ريتشارد تول ، لزراعة الأرز بوجه خاص ، قد بدىء تنفيذه باسم مشروع رى الدلتا Delta Irrigation Scheme سنة ١٩٤٧ ( انظر خريطة ٣٤ ) .

وتعد دكار التى انشئت سنة ١٨٥٧ ونمت فى الربع الاخير من القرن الماضى أهم مدن أفريقية الغربية الفرنسية سابقا ، فقد نشأت أسفل سفوح منطقة بركانية تتصل ببقية القارة الافريقية بواسطة لسان من الرمال . وقد أفادت دكار من حماية جزيرة جورى « Cape Manuel » وكيب مانويل Gorée واتصلت بالداخل وبسنت لويس بالسكة الحديدية ، كما أضفى عليها اتخاذها فى أواخر القرن الماضى قاعدة بحرية ذات أهمية استراتيجية ، يضاف الى ذلك موقعها كمحطة تجارية كبرى على اتصال بالداخل وفى الطريق لخطوط الملاحة الى جنوب أفريقية . وقد بلغ عدد سكانها نصف مليون منهم ٢٦٠٠٠ من غير الافريقيين ، أما سنت لويس - عاصمة السنغال الادارية فتقع فى مصب السنغال على جزيرة من السهل الدفاع عنها ، وقد نشأت منذ وصل التجار الاوربيين الى هذه المنطقة. لما تتمتع من الحماية ، ولقربها من طريق التجارة بواسطة الرياح ، كما أنها كانت منفذا للصمغ والعبيد والذهب ، ولولا سبقها الذى مكنها من الاحتفاظ بأهميتها كمنفذ طبيعى لتجارة السنغال وجزء من موريتانيا ومالى لما زادت أهميتها فى هذا الشأن .





( خريطة رقم ٣٤ )

الأقاليم الساحلية بين غامبيا ورأس بلماس : رغم أن المنطقة التي تمتد بين غينيا حتى رأس بلماس تتقاسمها عدة وحدات سياسية فهي تمثل اقليما جغرافيا متصلا ، فهنا نجد أن المناخ المدارى بأقطاره الغزيرة ونيئاته الكثيفة تسود فى هذه المنطقة .


تشمل المنطقة الداخلية من ليبيريا وسيراليون وساحل العاج مجموعة من المرتفعات تضم مرتفعات غينيا ومرتفعات فوتاجالون : فوتاجالون التي توجد فى داخل غينيا ليست الا جزءا من الكتلة الافريقية القديمة المكونة من صخور ما قبل الكامبرى ، وقد غطتها صخور الحجر الرملى الافقية ثم ظهرت فوقها صخور بركانية ، هى ليست مستوية ، تتفاوت صخورها فى الصلابة ، وما اعترها من انكسارات متعامدة ، وما يخرقها من أخاديد وخنادق عديدة قد مزق وحدتها ، ويغضى سطح هذه الهضاب الحصى والمجمعات وتربة اللاتريت الجرداء . ويبلغ متوسط ارتفاع فوتا جالون نحو ١٠٠٠ متر ، وان كان فى بعض الجهات قد يصل ارتفاعها الى ١٢٠٠ متر ، وتعتبر من خطوط تقسيم المياه الهامة ان تنبع رنھا النيجر والسنغال وغينيا ، فضلا عن عدد كبير من الانهار التي تنحدر بسرعة نحو الغرب أو الساحل على حين تجد أن منحدرات الهضبة الشرقية بطيئة هينة يبدو عليها مظهر قاحل ، ان لا تنمو هنا الغابات وانما الحشائش والادغال الفقيرة ، وقد يعزى ذلك الى فقد التربة وانتشار الحرائق ومسامية الصخور الرملية ، وتنمو فيها حشائش غضة فقيرة ترعاها الماشية التي تهبط الوديان فى فصل الجفاف ، وتصعد الى سطح الهضبة فى فصل المطر ، والواقع أن وديان مرتفعات فوتا جالون غنية نسبيا .

أما الكتلة الثانية وهى مرتفعات غينيا التي تقع فى ليبيريا وسيراليون فتغطيها الصخور البللورية التي تظهر على السطح ، وتكثر فى أرجائها قمم من صخور الدياتيز والجرانيت التي تتقابل حتى لتبدو كسلسلة جبلية ، وتنتشر فى شمال سيراليون صخور الجرانيت والنيس التي تبدو فى صورة جبال مرتفعة ، كما توجد بعض جبال من الشست والكواتزيت كجبل نمبا Nimba ( ١٨٥٠ مترا ) الذى يفصل بين غينيا وساحل العاج ، وتمتد هذه الكتلة الجبلية فوق منسوب السهول بمقدار ١٠٠٠ - ١٢٠٠ متر فى شمال ليبيريا وهى تنحدر بسرعة نحو الساحل وتدرجيا نحو السهول

الداخلية ، وتنتشر أحواض خصيبة فى مناطق الساحل من ليبيريا وسيراليون وفى الاجزاء الوسطى منهما ، ورغم غزارة الامطار التى قد تبلغ أربعة أمتار فى المتوسط على المنحدرات الجبلية الغربية مما يساعد على نمو الغابات على حين تنمو السافانا فى الجهات المنخفضة ، فان هناك فترة جفاف واضحة تمتد بين ديسمبر ومارس . أما السواحل جنوب دكار فانها من نوع خلجان *Kruus* الرياس تحف بها الكثير من الجزائر ، اذ تمتد الخلجان متغلغلة فى الداخل لمسافات قد تبلغ ٣٠٠ كيلومتر ، وهكذا نجد ان ساحل غينيا « البرتغالية » وقد تعرض لهبوط فكثرت به الجزائر والرءوس وأشباه الجزر الصخرية ، قامت به الموانى مثل كوناكرى وفريتاون على جزر أو أشياء جزر تتمتع بالحماية من اضطرابات المحيط وعواصفه ، ويتجه الساحل فى جنوب جزيرة شوبرو *Shubru* نحو الجنوب الشرقى ، وهو منخفض كثير المستنقعات ، وهو يشبه بقية ساحل غانة فى رأس بلماس شرقا ، ولكن الارساب لم يمض شوطا طويلا بعد ، فلا زالت خلجان الانهار مفتوحة لم تطمر .

### غامبيا :

عرفت غمبيا فى منتصف القرن الخامس عشر حين اكتشفها البرتغاليون ثم باعها أحد أمراءهم لبعض بيوت بريطانيا التجارية ، ثم أنشأت بريطانيا مستعمرة كبيرة لها فى هذه المنطقة سنة ١٧٦٥ تدعى سينيفامبيا *Sénégal* اتخذت سنت لويس عاصمة لها ، ولكن ما لبث البريطانيون والفرنسيون ان اقتسماها ، فظفر الفرنسيون بالسنگال وحصلت الشركة الافريقية البريطانية على غامبيا التى أصبحت مستعمرة للتاج سنة ١٨٢١ . ورغم أن نهر غامبيا يعد من أحسن الانهار الملاحية فى غرب أفريقيا فان اقتطاع الجهات الداخلية منه لم تمكنه من اداء وظيفته كطريق للخارج ، وهكذا افضى هذا الاتفاق السياسى الى تحطيم وحدة سينيفامبيا الطبيعية . وقد اقيمت عاصمتها باثورست *Bathurst* عند مصب نهر غامبيا حيث يضيق مجراه بحيث لا يتجاوز عرضه ميلين ، وهى معرضة لطغيان النهر اثناء الفيضان فى بقعة منخفضة ، ولذلك فان اختيار موقعها يعزى للاعتبارات الاستراتيجية فحسب ، وتقاسى من انتشار الحميات وبخاصة الملاريا ، كما أن عدد سكانها الذين يبلغون نحو ٢١ ألف نسمة لا يجدون مسمعا من




الأرض ليأيموا مساكنهم . والواقع أن الوظائف الرئيسية التي تقوم بها بوئارست ادارية وتجارية إذ عندها تشحن السفن بالفول السوداني الذي يرد من الداخل إليها .

وتقاسى غامبيا من الاعتماد على الفول السودانى وحده ، ويعهد استخراج معدن الالمينت *Ilustrative* موردا جديدا من موارد هذه البلاد ولم تستغل غمبيا موقعها كمنفذ لمنطقة واسعة باقامة مصانع لاستخراج زيت الفول السوداني واجتذاب محاصيل الداخل مثل الجلود : بل ان بائورست لم تتحول الى ميناء تجارى حر .

### غينيا بيساو :

هى مستعمرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها ١٣٩٤٨ ميلا مربعا يسكنها اكثر قليلا من نصف ميلون نسمة ( ٥٤٤١٨٤ ) ظلت مركزا لتجارة الرقيق التي كان يمارسها البرتغاليون فترة طويلة ، وقد انتقلت عاصمتها عدة مرات من Geba الى Bolama الى Bissau العاصمة الحالية ، ويمكن أن تنقسم غينيا الى قسمين : الأول الذى يتكون من السهول الساحلية والخلجان والمستنقعات حيث يعيش زراع من المزوج مثل *Bloup balante* ثم الداخل حيث القبائل الرعوية من المسلمين من الماندينج والفولانى ، وقد تطورت زراعة الارز بسرعة منذ العقد الرابع من هذا القرن ، ويمثل الفول السودانى ونخيل الزيت وزيتهمانحو ٩٠٪ من صادرات هذه المستعمرة ، وتكون السهول الساحلية من الصخور الرسوبية تنتمى الى ما بعد الايوسين . على حين تمتد فى الجنوب والشرق هضاب فوتاجالون المنخفضة من الحجر الجيري السيلورى والديفونى ، ويتراوح المطر بين ٢ - ٣ متر فى الساحل ، ١٣ - ٢ متر فى الداخل ، ويكثف السكان حيث جففت المستنقعات فى الساحل لزراعة الأرز والموز ونخيل الزيت وجوز الهند ، وتقطر زيوت هذه المحاصيل التى تشمل الفول السودانى الذى يزرع مع القطن والذرة الرفيعة والخضروات فى الداخل ، وتحترق البرتغال التجارة إذ تقوم بها شركة برتغالية واحدة .




## غينيا :

كانت تسمى غينيا الفرنسية قبل أن تغال استقلالها ، وتقدر مساحتها بنحو ٢٤٥٤٠٠ كم مربعا يسكنها نحو ٥٠٠٠٠٠٠ نسمة منهم ٦٧٢٢ من غير الافريقيين ، وهى أكثر مستعمرات فرنسا كثافة ، إذ تقدر كثافة سكانها بنحو ٥٠ نسمة فى الميل المربع ، ويهاجر عدد كبير من سكانها لعمل فى زراعة الفول السودانى فى غامبيا والسنغال ، وهى تمتاز بسواحلها المعمورة الكثيرة الخلجان ، ومرتفعاتها الداخلية حيث تمثل فوتاجالون الغزيرة الامطار التى تلائم ظروفها سكنى غير الافريقيين من أصحاب المزارع الكبيرة - خط تقسيم مياه مهم فى هذه المنطقة ، وينتمى خمسا السكان الى عناصر الفولانى الذين استقر كثير منهم ، وتعد الفواكه وبخاصة الموز والمعادن وبخاصة الذهب من أهم الصادرات ، ولكن انتشار تربة اللاتريت الجدياء تقلل من الانتاج . وصفوة القول أن غينيا تعد فريدة لتنوع تضاريسها ومواردها ، فالى جانب الأرز ونخيل الزيت التى توجد على الساحل ، يزرع الموز فى وديان المرتفعات الداخلية التى تنمو بها اشجار الفواكه الاخرى . الواقع أن مستقبلها الاقتصادى زاهر ، وبخاصة بعد أن اكتشف الحديد واليوكسيت ، وقد انشئ مشروع لتوليد الكهرباء عند فريا Fria على نهر كونكورى Konkouré الواقعة على بعد ١٥٠ كم من كوناكرى لاستخلاص الالومينا من اليوكسيت ، وترسل الالومينا الى كوناكرى ومنها الى الكمرون لصناعة الالومنيوم ، وتتجه النية الى انشاء مصنع للتكرير يعتمد على الكهرباء من النهر عند فريا أيضا . وتحتاج الى التوسع فى سد طرق للسكك الحديدية واتخاذ تدابير واسعة تكفل الحيلولة دون جرف تربة مرتفعات فوتا جالون ، وتعد ميناء كوناكرى من أهم الموانى فى غرب افريقية ( انظر شكل ٣٥ ) .

## سيراليون :

نشأت كمستعرة بريطانية فى أول القرن التاسع عشر ، وكانت تقتصر حينئذ على شبه جزيرة ، وعلى حين كانت مراكز من مراكز تجارة الرق حاول البريطانيون بعد ذلك أن يجعلوا منها مأوى للمعتق من الارقاء ، فنقل اليها بعض من حرر من الرقيق من زنج امريكا ممن حاربوا فى صفوف



( خريطة رقم ٢٥ )




البريطانيين ضد الأمريكيين في حرب الاستقلال الأمريكية ، ثم وفد إليها بعض زنوج جمايكا ، ويسمى نسل هؤلاء الأرقاء الذين تختلط فيهم العناصر الزنجية غير الأفريقية بعناصر أخرى بالكريول Cereol ، وقد احاطت بها كل من ليبيريا وغينيا ، مما حال دون امتدادها للمداخل حين حاول البريطانيون في آخر القرن الماضي أن يسعوا من نطاق مستعمرة سيراليون في الداخل التي أضيفت إلى محمية سيراليون على الساحل ، ورغم أن سيراليون كانت قاعدة اتخذها البريطانيون لاستعمار نيجيريا وغانا ( ساحل الذهب ) إلا أن التعارض والاختلاف بين المحمية والمستعمرة ، وما أشيع عنها حينئذ من أنها ( مقبرة الرجل الأبيض ) ، وتناوب المطر الغزير مع الجفاف الشديد مما أدى إلى جرف التربة وحال دون زراعة نباتات مثل نخيل الزيت ، جعل تطور سيراليون بطيئا فلا زالت الروح الإقليمية شائعة بين السكان ، كما أن شبه الجزيرة التي تسكنها عناصر غير أفريقية تعد من أهم الجهات المنتجة ، والواقع أن ثلاثة أخماس سيراليون يعد فقيرا ، إذ يغلب على هذه الجهات الجبلية ظاهرة فقد التربة لمواردها المعدنية بالانابة من الطبقة السطحية بل واكتساحها ، فالجهات الساحلية أكثر إنتاجا ، والواقع أن اقتصاديات المستعمرة لم تتقدم إلا حديثا ، فلا زالت تعتمد على إنتاج زيت النخيل من صنف غير جيد .

وقد أنشئت فريتاون العاصمة سنة ١٧٩٢ ، فأختير موقعها في المنطقة العميقة المياه على ساحل شبه الجزيرة الصخرية ، حيث تطل على خليج يتغلغل كثيرا في الداخل ، ولتوافر المياه النقية ، كما كان موقعها رائعا كذلك لحراسة قوافل السفن في المحيط الأطلسي الآن ، وفي القضاء على تجارة الرقيق أثناء القرنين الماضيين ، ويقدر عدد سكان فريتاون بنحو ٣١٦٣١٢ نسمة يضعون نحو ١٧٣٣١ نسمة من عناصر الكريول Cereol إلى جانب بعض الأوربيين والهنود واللبثانيين .

#### الإقليم الطبيعية في سيراليون :

تمتد على طول الساحل المستقعات التي يبلغ عرضها نحو ثلاثين كيلو مترا ، وقد استصلحت لزراعة الأرز وبخاصة عند مصبات الأنهار وحول مدينة بورت كوكسر Port Koko حيث امتدت مزارع الأرز الصغيرة

التي لا تتجاوز مساحة المزرعة ثلاثة أفدنة في المتوسط لمسافة تتراوح بين ٦ و ١٥ ميلا . والى الداخل توجد منطقة تنمو بها حشائش السفانا في المياه العذبة التي تفيض في موسم المطر ، وتنتشر في منطقة بونثي وسليمة Bonthe-Sulima اراضى المستنقعات حول البحيرات والانهار حيث تنمو اشجار نخيل الرافيا ، ويستخرج منها الياف اليباسفا التي تستخدم لصناعة الكانس ، وتغمر المياه العذبة هذه المستنقعات ، ورغم تنظيم حرق مساحة كبيرة تبلغ نحو ١٦٠٠٠ فدان بالطرق الالية باشراف الهيئات الحكومية لزراعة الارز ، فان الانتاج المحلى لا يكفي لسد حاجة السكان ( انظر خريطة رقم ٣٦ ) .



سييراليون (انصارية)

( خريطة رقم ٣٦ )


ويلى هذه المنطقة للداخل السهل الساحلى الذى يمتد لمسافة ١٦٠ كم ولا يتجاوز ارتفاعه ١٣٠ مترا وينتهى من الداخل بحافة الهضاب المرتفعات الداخلية ، ويتألف من صخور الجرانيت وما قبل الكمبرى ، وعلى حين فقدت منحدرات الوديان خصوبتها أصبحت قيمانها هى المناطق الزراعية أسوة بالمنطقة الساحلية التى تنتشر بها المستنقعات العذبة ، أما مناطق تقسيم المياه الفاصلة فتغطيها تربة اللاتريت ، ويعد الحديد من نوع الهيماتيت الذى بدأ استغلاله منذ سنة ١٩٣٢ ليتحول المعدنان الى نوع من الخام غير جيد ( ٤٥٪ الذى يركز قبل نقله لتصديره من ميناء بي « Pepel » ) ( ١٥م موارد هذا الاقليم ، والحديد الخام ثانى الصادرات ، ويستخرج البوكسيت من تلال موكانجى Mokanji بالقرب من مويامبا Moyamba

ويلى السهل الساحلى نحو الشرق هضاب قديمة من الجرانيت يوجد بها حديد الهيماتيت الخام ، ولكن يستخرج الماس من رواسب الانهار بصفة خاصة وهو يمثل أولى صادرات سيراليون ، ويخشى أن يكون على وشك الاستنفاد .

وتتكون هذه المنطقة من صخور الجرانيت القديمة التى تغطيها انواع فقيرة من التربة تعرضت للاكتساح على المنحدرات وبخاصة فى الشمال ، كما انهكت مناطق التربة المنتجة ، وتنتشر من الشمال زراعة الذرة الرفيعة وال فول السودانى ، كما تربي ماشية ( نداما ) التى تقاوم ذباب تسي تسي ، أما فى الجنو بالشرقى حيث لا زالت الغابات تنمو فيزرع الكاكاو والبن ، أما نخيل الزيت الذى ظل أهم مصدر للثروة حتى الثلاثينات من هذا القرن ، بل لا يزال نواه يعد أهم الصادرات الزراعية . فتنتشر زراعته فى الجنوب بصفة خاصة ، وتنتشر السكك الحديدية الضيقة البعيفة بين الساحل والداخل ، والتى لا تتسع بحمولتها المحدودة لنقل السلع بانتظام فى الوقت المناسب ، ولا ريب أن الدور الذى أصبح يلعبه الماس فى اقتصاديات البلاد منذ سنة ١٩٥٥ ، بعد أن ظلت المحاصيل الزراعية وحدها تمثل كل الصادرات حتى سنة ١٩٣٠ وسدس قيمة الصادرات الان - له أهميته ، وتتجه أهداف التنمية الاقتصادية فى سيراليون الى التوسع فى انتاج الارز بنفقات معتدلة ثم انشاء المزارع الكبرى للكاكاو والبنى والمطاط والموز ونخيل الزيت لتوفير المحاصيل التجارية للتصدير ، ولكن الاعتماد فى انتاجها على المزارعين




تحسين ظروفها الاقتصادية واستقرار أحوالها السياسية ، وبخاصة أنها لا تعد منطقة غنية من حيث الموارد الطبيعية ، لغزارة أمطارها التي تجرف التربة وتسلبها المواد المعدنية ، فضلا عن صعوبة توفير أماكن صالحة لقيام الموانئ على سواحلها ( انظر شكل ٣٧ ) .



## ليبيريا (الطغ والرقليم)

( خريطة رقم ٢٧ )

أما مونروفيا العاصمة فقد أُنشئت سنة ١٨٢٢ ، وتقباين عناصر سكانها وسكان الجهات القريبة منها التي تشبه قبائل الزنوج مثل الكرو والفسانتى Kru, Fante فضلا عن زنوج أمريكا ، وتقوم الميناء ذات المياه العميقة عند جزيرة بوشرود Bushrod ، وتعد الميناء الحرة الوحيدة بغرب أفريقيا ، وهي تصدر حاصلات ليبيريا وبخاصة المطاط والحديد وزيت النخيل ( انظر خريطة رقم ٣٨ ) .



## ليبيريا واقصارية

( خريطة رقم ٣٨ )

### اقاليم ليبيريا الطبيعية :

تتكون ليبيريا من سهل ساحلى لا يوجد على طولله نطاق متصل من المستنقعات شأن سيراليون ، وقد قامت الموانى على رعوس من صخور الديوريت مثل منروفيا ، وقد اقتصر سكان ليبيريا من الذين ينتمون لاصل امريكى على سكنى هذا السهل فى بادئ الامر ، ثم بدأت سلسلة الاحتكارات الاجنبية تتابع منذ سنة ١٩٠٦ حين انشأت شركة بريطانية بالقرب من منروفيا مزرعة للمطاط ، وفى سنة ١٩٢٦ استأجر فيرستون نحو مليون فدان لم يزرع الا ١٠٪ منها بأشجار المطاط ( ١٠ - ١١ مليون شجرة ) شمال شرق منروفيا ، وقد ظل المطاط وما يدفعه فيرستون من ضرائب على انتاجه للحكومة يمثل الصادر الوحيد تقريبا لبيريا ، واهم مصدر الدخل الحكومة حتى بدأ استغلال الحديد سنة ١٩٥١ .

من الوطنيين الذين ينتظمون فى سلك جمعيات تعاونية يعد خيرا من انشاء مزارع كبيره للأجانب يعمل فيها الوطنيين كأجراء فحسب .

### ليبيريا :

نشأت ليبيريا فى بادىء الأمر كوطن للارقاء من زنوج الولايات المتحدة الذين حررتهم جمعية تحرير الارقاء الامريكية التى كانت تعرف باسم American Colonization Society ولذلك أصبح سكان المنطقة الساحلية وبخاصة مونروفيا يتكونون ممن أعتق من زنوج أمريكا ، وممن حملهم الاسطول الامريكى من الارقاء ممن حرروا فى عرض البحر ، وظلت هذه الجمعية تتولى مساعدة هذه المستعمرة الجديدة حتى سنة ١٨٤٧ حين أعلن استقلال ليبيريا ، ولكن لهذه الدولة المستقلة متاعب جديدة ، فالزنوج الامريكويون الذين يحتقرون سكان الساحل ويزهون بثقافتهم الامريكية كثيرا ما كانوا ينفرون من العمل اليدوى ، وتطلع كثير منهم أن يحيا حياة رغدة فلا عجب أن جر ذلك عليهم عداوة سكان الداخل من زنوج افريقية ، كما أن استقلالها قد عرضها لعداوة الدول الأخرى المحيطة ، ورغم ما كانت تمنحه الولايات المتحدة اليها من قروض، فلم يكن من ورائها سوى اغراقها فى الديون، وانصراف سكان الداخل عن الانتاج للتصدير ، فقامت اقتصاديات البلاد على القروض والمعونات ، واستتاثرت الولايات المتحدة بنحو ٩٠٪ من الصادرات و ٦٦٪ من واردات البلاد ، والواقع أن نظامها الاقتصادى متداعى الى حد كبير لأن النشاط الاقتصادى منذ سنة ١٩٢٦ حين انشأ فيرستون مزارع المطاط وكثرت رموس الأموال الامريكية الأخرى لاستثمار موارد البلاد لم تدع للافريقيين مجالا الا أن يعملوا كأجراء ، تنوعت صادرات البلاد فأضيفت الى نخيل الزيت والبن والبياسافا Piassava بعض الصادرات الأخرى من المطاط والمعادن ، الا أن ٥٣٪ من ارباح الاسهم فى هذه الشركات الاستغلالية يرسل للخارج . وقد تبين للامريكويين منذ أن هبطت جنودهم سواحل ليبيريا سنة ١٨٤٢ أهمية ليبيريا الاستراتيجية بموانئها الجيدة ، ومواصلاتها الميسورة ، وتعبانى ليبيريا الكثير من قلة السكان ومن حاجتها لاستيراد جانب كبير من المواد الغذائية وبخاصة الأرز ، ولكن توفر رموس الأموال الامريكية لاستغلال موارد البلاد ، فضلا عن اشراك زنوج الداخل من الافريقيين فى الحكم منذ سنة ١٩٥٠ قد يفضى الى

وبعد أن أدرك الأمريكيون أثناء الحرب العالمية الثانية أهمية ليبيريا أخذوا فى تزويدها بالطرق ، والموانى ، والمطارات ، فمدوا الطريق الأوسط من منروفيا حتى جانتا Ganta عند الحدود قبل أن يخرج منها فرعان لربط المقاطعتين الشرقية والغربية على السواء ، ولا شك أن انشاء ميناء جزيرة بوشرود Bushred العميقة ، ومجموعة أخرى من المرافىء فى بوكائن Buchanan ، وجرينفيل Greenville قد ساعد على الاستثمار الاقتصادى ، وانتشرت مزارع البن فى شمال منروفيا ومزارع الموز وبخاصة فى الجنوب شمالى نهر كافالى .

ويلى السهل الساحلى جملة من التلال المنخفضة والهضاب تتألف من الصخور القديمة بصفة خاصة تتخللها فى الشمال الشرقى منطقة من الجبال المنخفضة الداخلية ، كما تمتد فى الشمال الشرقى من البلاد أطراف مرتفعات غينيا نحو الغرب ، ومن أهم موارد هذه الجهات الحديد الذى استغل من تلال بومى Bomi شمال غرب منروفيا ، وفى سنة ١٩٦١ مد خط للسكة الحديدية وآخر يربط منروفيا بمنطقة حوض نهر مانو Mano الغنية بخام الحديد ، وفى أقصى الجنوب الشرقى يمتد خط ثالث للسكك الحديدية بين ويبو Webو فى حوض نهر Harbor وميناء هاربر كافالى سنة ١٩٦٣ ، وأخيرا مد خط ثالث من جبال بونج Bong شرق منروفيا الى منروفيا ، ولذلك أصبح الحديد ثم المطاط يمثلان أهم صادرات ليبيريا التى تطور اقتصادها بين سنة ١٩٣٦ و ١٩٤٨ فى المرحلة الاولى ، ثم بعد ١٩٤٨ فى المرحلة الثانية ، ولكن اعتمادها على ما تدفعه شركات الامتياز سواء التى تحتكر المناجم أو المزارع الكبيرة جعلها تمثل بلدا لا يتطور بأيدى أبنائه الذين لا يسدون حاجة هذه المزارع أو تلك المناجم ، وليبيريا تمثل آخر نطاق غرب أفريقية وحلقة الاتصال بينه من جانب وساحل غانة من جانب آخر ، كما أنها تمثل بحق مساوئ الكيان الاقتصادى القائم على منح الامتيازات والاحتكارات .

### اقليم ثنية التيجسر :

تمتاز هذه المنطقة بأنه يغلب عليها استواء السطح فتبدو نطاقات التكوينات الاركية عند التقائها بالسهول الرسوبية المرتفعة ، والواقع أن



الكتلة الاركية تشغل الجزء الشرقى والجنوبى من هذه الثنية ، وتمثل سهلا تحتيا قليل الارتفاع والتباين ، وتسمى بأسماء متعددة مثل موسى وجورما حيث لا يغير من استواء السطح سوى بضع كتل من الصخور البركانية وتغطى الصخور الرملية الكتلة الاركية فى كثير من الجهات ، وفى الجزء الشمالى يتألف منها منخفضات مثل منخفض السنغال فى أقصى الغرب والنيجر فى الوسط وفتا الاسود فى الجنوب فى غانا ، ولكن يحيط بهذه المنطقة المنخفضة حافات مرتفعة فى شكل قوس بين همبورى واجل أهمها مابندنج وهمبورى وندياجرا وبانفورا ويبلغ ارتفاع الحافات نحو ٥٠٠ متر ، وان كانت تصل الى ١٠٠٠ متر فى همبورى ، وكثيرا ما خلفت التعرية هضابا ذات سطح مستو تحيط بها منحدرات وعرة كما هو الحال فى مرتفعات مابندنج بالقرب من مدينة بماكو ، وتنتشر الرواسب الفيضية فى كثير من الجهات وبخاصة فى النيجر الاوسط .

ويعتبر نهر النيجر بطوله الذى يبلغ نحو ٤٠٠٠ كيلو متر شريانا مهما من شرايين الحياة وال عمران والمواصلات فى السودان الغربى ، ولا يفصل النيجر عن الانهار الاخرى كالسنغال أو شارى وغيرها من الانهار التى تصب فى المحيط الاطلنطى أو خليج غانة مرتفعات كبيرة ، وتمثل ثنية النيجر جزءا مهما من افريقية الغربية « الفرنسية سابقا » تنقسمها عدة وحدات سببسية هى ساحل العاج وداومى بل وغينيا التى تمتد الى السواحل ، كذلك فقد ضم اقليم الفتا الاعلى الى ساحل العاج وبخاصة بعد مد سكة حديدية لربط الاقليمين ، ويجب الا يتبادر الى الذهن أن هذه الوحدات السياسية التى تقطع بعض مناطق من اقليم ثنية النيجر مقصورة عليه بل تمتد فى المنطقة الساحلية التى سوف يأتى ذكرها بعد ذلك ، أما دولتا مالى والنيجر وهما يقعان شمالى ثنية النيجر فيضمان مساحات واسعة من الصحراء الكبرى .


### بركانو قاسو :

تعد من أشبه بلاد ساحل غرب افريقية بالبلدان الجافة مثل مالى والنيجر ، وان كانت اكثر منها رطوبة بحكم موقعها الى الجنوب من هذين البلدين ، وقد ظفرت باستقلالها سنة ١٩٦٠ ، وانضمت الى الاتفاقية الودية

التي تربط مستعمرات فرنسا السابقة ما عدا غينيا بعضها بالبعض الآخر  
وهي ساحل العاج والنيجر وداهومى وتعرف باسم حلف بنين - الساحل .  
وتقدر مساحتها بـ ٢٧٤١٠٠ كم مربعا يقطنها ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ نسمة ،  
وهي تشكو من موقعها الداخلى وعزلتها ، ولذلك فتجارة المرور بين كل من  
مالى من جانب وغانة وساحل العاج من جانب آخر فى غلات مثل الفول  
السودانى ومنتجات الحيوان وثمار الكولا تعد من مصادر الدخل ، وهي  
تعانى من سوء توزيع السكان ، وشدة ضغط هؤلاء السكان على مناطق  
محدودة رقيقة التربة غير خصيبة فى أكثر الاحيان ، بل أن بعض الجهات  
الخصيبة - كإقليم لوبى Lobi الذى يقع فى الجنوب الغربى قد تعرضت  
للغزوات من الشمال مما أدى الى قلة عدد السكان عما يمكن أن تستوعبه  
هذه الجهات ، كما أن مناطق ضفاف الانهار تخلو لمسافة ١٢ كيلو مترا من  
السكان خوفا من طغيان الفيضانات وتفشى مرض النوم ( انظر خريطة  
رقم ٣٩ ) .

وفى جنوب غرب البلاد تسود الظروف المناخية التي تسمح بنمو  
حشائش اقليم السفانا حيث يسقط نحو متر من المطر بين مايو وأكتوبر  
( تسود الصخور الرملية المنفذة للمياه ) كما فى بوبو ديوب لاسو Bobo  
Dioulasso التي كانت حتى سنة ١٩٥٤ نهاية للسكة الحديدية ، كما أنها  
تعتبر مركزا لتجمع الغلات المهمة المنقولة من « واجادوجو » العاصمة  
وبخاصة القطن والفول السودانى والماشية ، وتمتد هنا حافة بانفورا  
Banfora ، كما تنتشر الصخور القديمة ، وتسكن جماعات اللوبى Lobi  
والببوبو Bobo ، حيث تمارس زراعة الفول السودانى وزيد الشى  
Shea butter ويحول تفشى مرض النوم وعداوة الموسى لهاتين الجماعتين  
دون هجرة الموسى من ديارهم المزدحمة الى هذه المنطقة .

أما إقليم ياتنجا Yatanga وإقليم وموسى Mossi فتسود  
أراضيها قاعدة من الصخور الاركية القديمة تغطيها الرمال فى باتنجاتربة  
اللاتريت فى موسى ، ويقل المطر الى نحو ٣٠ متر ، وقد أدى انتشار  
التربة الرقيقة وفقر النبات على اثر سوء استغلالها الى قلة الموارد ، ولكن  
خلو المنطقة من ذباب تسي تسي قد أجتذب الرعاة من الفولانى .



( خريطة رقم ٢٩ )


أما منطقة التخوم الشرقية وجورمه Gourma فتنتشر فى أرجائها صخور الحجر الرملى والرمال الحديثة التى تغطى صخور القاعدة الاركية ، وتنتشر الوديان الضحلة التى تمثل روافد نهر النيجر فى الشرق ، ويقل السكان نحو الجنوب الشرقى ، وهم من المستقرين الذين ينتشر بينهم رعاة من قبائل الفولانى \*

أما اقليم موسى فى الجزء الاوسط الجنوبى حيث تنتشر صخور الحجر الرملى وتسد أنواع التربة الرقيقة ويقل المطر ، وينسدر النبات ، فتتمو الحشائش القصيرة التى تتخلها أشجار التبلى أو البوابب وأشجار زبد الشى ، وتقع هنا وأجادوجو العاصمة القديمة لمملكة موسى ، ويبلغ عدد السكان نحو ٥٨٠٠٠ نسمة وهى مركز مهم للتبشير بين الوثنيين \*

أما امتداد هضبة سيكاسو Sikaso نحو الشرق حيث تسود صخور الحجر الرملى وتمتد حافة بانفورا Banfara بصخورها من الحجر الرملى السيلورى المسامى ، فيمكن أن تقوم بها بفضل غزارة المطر رغم مسامية التربة زراعة مستقرة يمارسها السكان من البوبو ، وتتعدد المحاصيل التى تشمل أشجار زبد الشى Shea butter والفول السودانى الذى يزرع فى الجنوب والجنوب الغربى ، والسيزال فى المزارع الاوروبية بالقرب من بوبو ديولاسو ، فضلا عن القطن ، ويوجد الذهب والمنجنيز ولكن لا يستغلان ، ولكن الحديد يستغل بالطرق البدائية على يد الوطنيين ، وقد دفع فقر التربة وقلة الموارد الاقتصادية الى الهجرة الى الدول المجاورة \*

### النيجر :

أما فى جمهورية النيجر التى يسكنها نحو ٥٠٩٨٦٥٧ مليون نسمة فتمتد بين خطى عرض ١٢ و ٢٤ شمالا ، ويعد أكثر أصفاعها صحراويا ماعدا الجزء الجنوبى الذى يبلغ عرضه نحو ١٥٠ كيلو مترا حيث يقوم بعض العمران والانتاج ، وتسكنه عناصر الهوسا التى تكون على اتصال وثيق بسكان نيجيريا \* وتقوم الزراعة هنا بالقرب من النيجر وبخاصة حول زندر ، وتعد تربية الحيوان الحرفة الرئيسية ، ويزرع الهوسا فى الأراضى الرملية



( خريطة رقم ٤٠ )

التي يصيبها نحو نصف متر القبول السوداني وقليل من القطن والذرة الرفيعة حول مارادى Mar وزندر وتساوه Tessaoua فى اقاليم جوبرودامجرام ومنيو Gober, Damagram, Mounio ويزرع الجرم الارز فى وادى النيجر فى الجنوب الغربى ، كما يزرع على المطر القبول السودانى والذرة الرفيعة ، وتقوم زراعة قليلة فى وديان آير ، وتنتشر تربية الحيوان فى اقاليم الشمال والوسط حيث يقطن الطوارق من الرعاة فى منطقة تاهوا ، وهكذا توجد ثلاث مناطق للعمران والتقافة مما افقد النيجر الوحيدة اقتصاديا كما هو الحال فى مالى وثقافيا كموريتانيا ، وتتجه العلاقات التجارية الى كانو وسوقطو فى شمال نيجيريا ، وقد كانت نيامى Niamey العاصمة ، ولكنها أصبحت زندر التى يبلغ عدد سكانها اكثر من عشرة الاف ولكنها نقلت الى نيامى من جديد لاتصالها بسهولة بشمال داهومى ، وقد تم الفرنسيين اخضاع النيجر بين سنة ١٩٦٧ وسنة ١٩٠٠ ، وفى سنة ١٩٢٢ أنشئت نيامى ثم اتخذت عاصمة سنة ١٩٢٦ ( انظر خريطة رقم ٤٠ ) .


وقد ذكرنا أن الهوسا من أهم عناصر السكان ، يضاف اليه الصنونغاى والجرما وهم من المستقرين ، أما البدو فهم من الفولانى والطوارق . والواقع أن النيجر تشكو قلة الوارد المياه ، وأهم الجهات المنتجة هنا هى الجزء الاوسط الجنوبى بين زندر ومارادى Maradi ، يضاف الى قلة مواردها الاقتصادية موقعها الداخلى ، ولذلك فان اجتذاب نيجيريا لها كبير .

### مالى :

نشأت على أطراف الصحراء الكبرى أيضا ، ولذلك فهى تعاني من الجفاف والجذب وندرة الموارد الاقتصادية فضلا عن الموقع الداخلى ، فمساحتها التى تقدر بـ ١٢٠٤٠٠٠ كم مربعا يسكنها ١٤٩١٤٠٣٨٨ نسمة ، ويتركز العدوان فى الجنوب والغرب شأن موريتانيا بسبب الأمطار التى يتراوح متوسطها السنوى جنوب خط ١٨ بين  $\frac{1}{2}$  - ١ متر مما يكفى لقيام الزراعة الجافة على المطر ، فضلا عن امتداد أعمالى النيجر والسنگال وروافدهما مع ارتفاع منطقة المنابع نسبيا فى قوتاجالون ، ويعوز مالى الشكل المنتظم فيضيق وسطها كثيرا رغم أن امتدادها من الشرق الى الغرب

ومن الجنوب الى الشمال لا يقل عن ١٠٠٠ ميل مما يجعل الانتقال بين أطرافها أمرا غير اقتصادى .

تظهر صخور القاعدة القديمة فى الشمال الشرقى فى كتلة أدرار الايفوغاس على سطح الأرض ، وقد سلفت الاشارة الى اندفاع هذه الكتلة الى أعلى فى عصر جيولوجى حديث نسبيا ، وقد أسفر ما كان يصيبها فى العصر المطير من المطر الغزير نسبيا على انتشار الوديان العميقة فى أرجائها ، وتغطى صخور الحجر الرملى من الزمن الاول هذه الكتلة فى امتداد جبال فوتاجالون الذى يظهر فى بامبوك Bambouk وجبال Manding فى الغرب ، وفى هضبة سيكاسو Sikasso وحافة باندياجارا Baudiagara وجبال هومبورى Homberi وتنتشر العروق من الرمال فى مناطق سهلية فى شرق إقليم الساحل الجنوب الغربى وأقيم تانزروفت فى الشمال الشرقى ح أنظر خريطة رقم ٤٢ ) . ويعد نهر النيجر شريانا للحياة والمواصلات فى مالى ، فهو صالح لملاحة حتى باماسو Bamako العاصمة ، ولكن تعترضه الشلالات بين بامكو وكوليكورو Koulikero الذى يصبح فيها النهر الذى تعترضه فروع دلتا داخلية مهما من النواحي الزراعية من ناحية وكطريق للنقل بين منطقة الدلتا حيث أقيم سد سانسو دنج وبين مينائى جاوموبتى وغيرهما من جهة أخرى ، وقد أقيم السد ليرفع المياه أمامه بنحو ٦٤ متر ، ثم حفرت القنوات لتصل المياه الى فروع الدلتا القديمة ، وتقدر مساحة الارض بـ ١٠٠ر٠٠٠ فدان يزرعها بالطرق الآلية أرزا بصفة خاصة نحو ٣٠ر٠٠٠ من الزراع ، ولو أن تخطيط المشروع الاول كان يستهدف زراعة القطن الذى يزرع ثلث ما تنتجه مالى فحسب ، لأن السكان وجدوا أن الظروف تساعد على زراعة الأرز ، ورغم أن نفقات المشروع كبيرة فهو لا يعدو أن يكون نظاما للمرى الفيضى البسيط ، ويمكن انتاج محاصيل أخرى كقصب السكر بالطرق الآلية أيضا ، ويزرع الفول السودانى على المطر فى الغرب فى إقليم الساحل ، ولذلك تشمل الصادرات غلات أهمها الحيوانات ومنتجاتها التى تصدر برا الى غانة وساحل العاج كما كانت تصدر الفول السودانى والقطن عن طريق سكة حديد النيجر - دكار ، كما كانت دكار تستورد جانبا كبيرا من واردات مالى حتى حدثت عقب تفكك اتحاد مالى سنة ١٩٦٠ القطيعة التى أغلقت



( خريطة رقم ٤١ )



هذا المنفذ ، ولكن استأنفت مالى استخدام هذا الخط الحديدى بعد سنة ١٩٦٣ على نطاق ضيق الى جانب طريق سكة حديد ساحل العاج ، والواقع أن مالى تعتمد على تربية الحيوان فى الشمال بصفة خاصة حيث تنتقل القطعان بين مراعى النيجر النضرة عقب الفيضان وبين مراعى مناطق الساحل وتنزروفت والميدى Medene وأزاواك ، وينتقل الى النيجر ودلتاه وبعض أقاليم نهر السنغال للزراعة الفيضية .

### غانة :

تعد غانة أكثر الدول الأفريقية التى ينتمى سكانها الى عنى زنجى تقديما ، فمساحتها التى لا تزيد عن ٢٣٨٥٠٠ كم ميلا مربعا لا يزيد سكانها على ١٢٢٥٠٥٧٤ نسمة تعد من أكثر جهات أفريقيا غنى بموادها المتنوعة فهى أولى دول العالم انتاجا للكافور وثالثتها انتاجا للماس من حيث الوزن والمنجنيز ، ودخل حكومتها وميزانياتها تبلغ نحو نصف الكونغو ( كينشاسا ) الذى يفوقها كثيرا من حيث المساحة ، بل أنها بمساحتها التى تقل عن ١٠/١ مساحة الكونغو تتجر فى سلع لا تقل قيمتها عن ٣ قيمة تجارة الكونغو ، كما ظلت أولى دول غرب أفريقيا المنتجة للمعادن حتى سنة ١٩٦٣ ، وقد لعب اتصالها المبكر بالغرب دورا فى تثقيف عدد كبير من أبنائها ، فبرزت كدولة أفريقية ناهضة .

تقع العاصمة أكرا فى حوض صغير من الصخور الرسوبية ، ولكنها تتعرض لاضطرابات وزلازل عنيفة كثيرا ما دمرت المدينة ، وقد كانت قرية تقع شمال غرب موقع أكرا الحالى عاصمة لجماعة الجا « Ga » السدين وفدوا من نيجيريا فى القرن السادس عشر ليتجسروا مع البرتغاليين ، ثم توالى مراكز الهولنديين والبريطانيين والدانمركيين التجارية ، ثم بعد الغاء الرق الذى كان السلعة الرئيسية ألف السكان أن يجلبوا سلعهم كالكافور من الداخل الى الساحل فى أكرا ، وقد امتدت سكة حديدية الى مدن الداخل فوصلت الى كوماسى Kumasi ١٩٢٣ ، وقد ظلت أكرا الميناء الرئيسى لتصدير الكافور حتى انشئت تاكوراى سنة ١٩٣٨ ، ورغم أن أهميتها كمنفذ للبلاد قد انزعتها تاكوراى ، فهى لا تزال مركزا ثقافيا وصناعيا عظيم الأهمية ، إذ أفادت من تطور غانا الاقتصادى .

أما مشروع نهر فلتا فهو مشروع ضخم يرمى الى إقامة سد يبلغ ارتفاعه ثمانين متر تقريبا عند أجينا Ajena عند خانق فى الفلتا يقع على بعد ١١٢ كم من الساحل ، وبذلك تتكون بحيرة صناعية يبلغ طولها ٣٢٠ كم فقط تغطى ٢٪ من مساحة البلاد ، وبذلك يتوفر أسباب توليد ٥١٢ر٠٠٠ كيلو وات يمكن أن تزيد لتصل فى المستقبل الى ٧٦٨ر٠٠٠ كيلو وات وبذلك يمكن صناعة ٢١ر٠٠٠ طن من الالومنيوم فى العام ، ولكن توليد القوة المحركة سوف يفيد التعمير والتعدين فى هذه المنطقة ، ويدخل تحسينات على الملاحة والرى وصيد الاسماك ، ويخلق طبقة من العمال الفنيين ويزيد من دخل الدولة كثيرا .


وينطوى اعتماد غانة على الكاكاو الذى تمثل صادراته ثلثى صادرات هذه البلاد ، على خطر كبير وبخاصة أن سعره كما كان قبل الحرب العالمية الثانية يتعرض للتقلبات وقد ظهر مرض Swollen Shoot الذى يهدد محصول الكاكاو ( أنظر خريطتى ٤٢ ، ٤٣ ) .

والواقع أن استغلال ثروة الاخشاب والمعادن والعمل على التوسع فى انتاج محاصيل زراعية أخرى يكفل الطمأنينة والاستقرار لصرح البلاد الاقتصادى .

وتمتاز غانة بأن الظروف الطبيعية من سطح وبنية قد تضافت على خلق أقاليم متميزة هى :

١ - إقليم حوض الفلتا : يشغل نصف مساحة غانا الذى يمتاز بقلة موارده ، بتكويناته من الحجر الرملى الاوردوفيشى والسيلورى ذات التربة الفقيرة ، فلا غرو أن يقطنه نحو ١٧٪ فحسب من سكان غانة ، ولكن قد ينبض بالحياة حين تتم إقامة سد فلتا عند أكوسومبى « Akosombo » وهو فضلا عن توليد قوى محرركة كهربائية تتزايد من ٥١١ر٠٠٠ كيلو وات ساعة الى ٧٦٨ر٠٠٠ كيلو وات ساعة سوف يرفع الطاقة الكهربائية الى ٨٥٤ر٠٠٠ كيلو وات ساعة ثم الى ١ر٠٤٤ر٠٠٠ كيلو وات ساعة بعد إقامة سدين أحدهما صغير صوب المصب من السد الرئيسى عند كبونج Kopong ، والاخر أكبر منه عند الفلتا الاسود أعلى السد الرئيسى





غانا، اقتصادية

( خريطة رقم ۴۳ )

أى صوب المنيع عند بوى Bui ، ورغم أن هذا المشروع تم سنة ١٩٦٦ إلا أن مصاهر الألومينا فى تيمبا Tima تستورد الألومينا لصناعة الألومنيوم حتى يتم استخلاص الألومنيوم من البوكسيت فى غانة ، ولكن هذا الاقليم سوف يفيد من جوانب أخرى للمشروع أهمها غمر أراضى واسعة مما يسمح بزراعتها زراعة فيضية ، فضلا عن صلاحية النهر أعنى السد للملاحة ، الى جانب تربية الاسماك ، ولذلك سوف تتوافر الظروف لاستقرار ٦٧٠٠٠ نسمة من السكان فى هذا الاقليم . ويحدد تخوم هذا الاقليم حافات مرتفعة شكلتها عوامل التعرية تعرف بأسماء مختلفة هى حافة مامبونج Mampong Scarp وحافة ونتشى Wenchi Scarp وحافة كونكورى Konkori Scarp وحافة جمباجا Gambaga Scarp تلال زيزوجو Zabzugu Hills

٢ اقليم هضاب الشمال والغرب : تتألف من صخور الزمن الاول ، ويعيش السكان فى الشمال الشرقى فى قرى تقع عند خطوط تقسيم المياه فى اكواخ متفرقة بعيدا عن المنخفضات الموبوءة بذباب تسي تسي ، ويشهد ضغط السكان على المناطق المحدودة العاصرة مما أدى الى انهالك التربة وجرفها ، ثم الى هجرة السكان نحو الجنوب ، أما فى الشمال الغربى فيقل السكان وتتفشى ذباب تسي تسي .

٣ - اقليم تلال الجنوب الغربى ووديانه : تمتد من الجنوب الغربى نحو الشمال الشرقى ، وديان وسلاسل من التلال الموزانية ، ويعد هذا الاقليم بفضل اتساع وديانه وغازارة مطره وتعدد موارده قلب غانة النابض ، إذ يتركز هنا ثلثا سكان غانة فى مساحة لا تربو عن ثلث مساحتها ، فالكاكاو الذى يمثل ثلثى صادرات غانة أو ثلث محصول العالم من هذه الغلة قد زرع فى جنوب شرق المنطقة لينتشر فى غرب الشمال الغربى حتى اذا واجهت قلة المطر انتشره فى هذا الاتجاه عاد لتمتد مساحته صوب الجنوب الغربى ، وتنتج غانة معظم محصولها من الكاكاو الذى يقدر بنحو ٣٠٠٠٠٠ - ٤٠٠٠٠٠ طن سنويا من هذا الاقليم ، ويمارس الاشائنتى التى تعد كوماسى عاصمتهم زراعة الكاكاو فى مزارع صغيرة تتراوح مساحة المزرعة بين فدان وثلاثة افدنة .

وتنمو الغابات التى تستخدم أخشابها فى أغراض البناء وصناعة الأثاث وبخاصة كقشرة للأثاث فى تلال الجنوب الغربى ، وتصدر غانة ١٠٪ من الأخشاب العالم التى يتعد كثير منها فى مصانعه فى سامربوى Samroboi وللمعادن أهمية كبرى فكل من الذهب والماس والمنجنيز بـ ١٠٪ من الصادرات فيستخرج الذهب من نوعين من التكوينات : من الكوارتز من صخور البيريميى Birrimian « السابق للكهبرى الأسفل » وذلك من مناجم أوبوازي Obuasi ، بيبانى Bibiani ، كونوجو Konongo أى من مجتمعات التاركوى « السابق للكمبرى الأوسط والاعلى » وهو أقل غنى ، ولكن الذهب يستنفد سريعا فقد أغلقت كثير من المناجم .

وتعد غانة أولى الدول المصدرة للمنجنيز الذى يستخرج من نسوتا Kibi ، وفى الشرق عند حافة مامبونج شرقى هذا الاقليم ، كما يستغل من مناجم أواسو Awaso .

وتعد غانة أولى الدول المصدرة للمنجنيز الذى يستخرج من نسوتا Nsuta شمال تاكورادى ، أما الماس فتستخرجه أربع شركات من مناجم بيريم فى اكواقيا كادى وأودا Akwatia, Kade, Oda كما يستغله الأفريقيون من وادى يقع جنوبى تاركوا ، وهى ثانية الدول انتاجا للماس

٤ - السهول الساحلية الجنوبية الغربية والوسطى ( سهل أكرا ) وسهول الفلثا السفلى : يمتد سهل ساحلى ضيق يزرع فى جنوبه الغربى الرطب جوز الهند والأرز وفى جزئه الأوسط والجنوبى الشرقى حيث يقل المطر نسبيا الكسافا واليام ، وتعد المياه العامل الحاسم فى استغلال هذه السهول ، فالترية فقيرة بوجه عام فى سهل أكرا ، وحيث تسود التربة الطينية السوداء التى نشأت لتحلل صخور النيس التى تغطى سطح الأرض لأبد من الحرت العميق ، أما حيث توجد رواسب الفلثا الفيضية من الرمال والطين ، فالرى ضرورى ، ويقتصر الانتاج حتى الآن عند تربية الحيوان وصيد الاسماك وزراعة الخضروات فى نطاق ضيق ، وتوجد هنا العاصمة أكرا ، وقد نشأت كعاصمة وطنية قديمة ثم أصبحت مركزا من مراكز ارتكاز النفوذ الاوروبى منذ عصر مبكر على الساحل ، وقد ساييرت فى تطورها تطور غانة ، وترتبط بداخلها بالمطرق البرية والجوية كما توجد أيضا تاكورادى ( ١٢١٠٠٠ نسمة

هى وسيكوندى ) وهى ميناء غانة الاولى . وقد تتصل بالداخل بسهولة .  
كما أن مياهها العميقة تجعل منها مرفأ جيداً . وتقوم بها عدة صناعات .  
ويليها تيمبا ثانية موانى غانة ، التى انشئت سنة ١٩٦٢ . وهى ميناء صناعى .  
وقد خططت المدينة الصناعية بحيث تتسع لانشاء مصنع للسكر - ريزر البترول  
ومصهر للالومنيوم .


٥ - جبال الكواپيم Akwapim وجبال توجولاند وغبرهما : تمتد  
من سهل أكرا لسلسلتان جبليتان صـسـوب الشمال الشرقى هما الكواپيم  
وتوجولاند ، تعبران داهومى وتوجو حيث تعرفان باسم جبال اتاكورا . وتنتهى  
السلسلتان الى صخور ما قبل الكمبرى . وقد هامت زراعة النكاو على نطاق  
ضيق هنا ، وان كانت تزداد أهميتها فى بعض الجبال الداخلية فى الشرق .

وتتمتع غانة بمركز سياسى وثافى ممتاز بين دول غرب افريقية رغم  
صغر مساحتها وسكانها نسبيا ، كما ان هـشـمـو ، الهاتا سوه ، يؤكد ما تتمتع  
به من دخل قومى كبير ومستوى معيشى مرتفع بعد ان يؤتى ثماره التى يعد  
من أيعنها انتاج ٧٨٠٠٠ طن مبدئيا من الالومنيوم سنويا الى ١٢٥٠٠٠ طن .

## توجو :

قسمت مستعمرة توجو الالمانية السابقة سنة ١٩١٤ بين بريطانيا  
وفرنسا ، ولكن بعد استقلال غانة سنة ١٩٥٧ سارعت توجو البريطانية - وهى  
القسم الاصغر - بالانضمام الى غانة ، اما توجو الفرنسية فقد استقلت .  
وتقدر مساحتها بـ ٥٦٠٠٠ كم مربعا ويسكنها ١٠٠٠٠٠٠ نسمة .  
ويمكن أن نميز الاقاليم الاتية فى توجو وهى : -

١ - اقليم السهل الساحلى - يمتد ساحل رمالى مستقيم جاف ، المناخ  
نسبيا ، تحفه المستنقعات التى تتحول الى بحيرات تنمو على سواحلها غابات  
جوز الهند الذى يجد سكان هذه المنطقة فى صناعة ابه الهى كوبرا وعصر  
زيته وتربية الحيوانات وصيد الاسماك وتجفيفها فى هذه المنطقة الغيرة اهم  
أوجه النشاط ، ولكن ارتفاع الامواج يحول دون رسو السفن لنقل الحاصل  
فى ميناء لومى العاصمة مباشرة ، فتتقل الحمولات الصغيرة من السلع الاثر  
لا تزيد عن ٣٠٠ طن ، مما يعرقل تصدير زيت النخيل .





٢ - اقليم الصلصال Terre de Barre تربته صلصالية ثقيلة خصبة يزرع بها نخيل الزيت والذرة والكسافا ، وعلى حين يصدر نوى نخيل الزيت تستهلك المحاصيل الأخرى داخل البلاد ، ويستخرج الفوسفات من شمال شرق بحيرة توجو الواقعة جنوبى هذا الاقليم الذى يمتد عبر توجو الى غانة غربا والى داهومى ونيجيريا شرقا .

٣ - هضبة مانو Mano وهى هضبة رملية قليلة المطر يزرع بها محاصيل اليام وال فول السودانى والقطن ، ويزداد الضغط على الأرض الوعرة التى استنفدت خصوبتها ، وهى تروى كما تسمد فى منطقة كبراى Kabrai


٤ - جبال أتاكورا وتوجو - تمثل امتدادا نحو الشمال الشرقى للجبال الجنوبية الشرقية فى غانة ، وهى أشزر مطرا فى توجو حيث يزرع البن والكاكاو اللذان يمثلان المحصولين الرئيسيين ، ويربط بين جبال توجو وبين أتاكورا التى تعد أقل منها مطرا منطقة ضيقة مرتفعة عند سوكوندى Sokode

٥ - هضبة أوتى Oti ، وهى امتداد لحوض الفلتا فى غانة بحافته المرتفعة التى تعرف هنا باسم توجو ( تعرف باسم جامباجا فى غانة ) ، وتقل خصوبة ويشتد الضغط على الارض الزراعية التى تتعرض للتعرية العنيفة .

تعد توجو بلدا فقيرا صغيرا قليل السكان ، يرتبط بفرنسا برباط وثيق ، ولكن لا يغنيه ذلك عن حسن علاقة الجوار مع جارتها الكبرى غانة ، وتصدر توجو البن والكاكاو وقليل من لب الهند ونوى نخيل الزيت والفول السودانى والقطن والفوسفات ( انظر خريطة رقم ٤٤ ) .

#### بينين ( داهومى سابقا ) :

تعتبر آخر مستعمرات فرنسا السابقة على ساحل غانة نحو الشرق ، وترتفع بها كثافة السكان لأنها كانت موطننا لدولة أفريقية قديمة ، عرفت فى التاريخ بمملكة داهومى كانت تنتشر فيها عادة تقديم الضحايا البشرية ، وكانت آخر مستعمرات ساحل غانة التى تنجر بالرقيق ، وقد استخدم هؤلاء الرقيق فى اقامة مزارع نخيل الزيت، ومن ثم فهى تعتمد فى حياتها الاقتصادية على مساحة ١٥٥٠ ميلا مربعا ) .




يشبه السهل الساحلى بمستنقعاته وكثبانه الرملية ما يسود فى توجو ، ولكنه أكثر مطرا وأكثر زراعة ، وتنتشر هنا مزارع جوز الهند الكبيرة التى لا يملكها الافريقيون ومزارع نخيل الزيت والارز ، وقد أقيمت ميناء



( خريطة رقم ٤٤ )

مشروع فلتا فى غانة

وتونو Cotonou سنة ١٩٦٤ ، كما نشأت بورتو نوفو كعاصمة تقع عند الطرف الشمالى لمستنقع ساحلى ، وتزرع أراضى المستنقعات المظمورة ، ويقبل سكانها على زراعة المحاصيل الغذائية فى سهولها الرسوبية ، ولكن أمطارها قليلة وبخاصة فى شماليها الفقير وكما تعاني من صغر مساحتها فان ساحلها



( خريطة رقم ٤٥ )


لا يسمح بقيام موانئ تذكر ، ولا يتجاوز سكانها المليون ونصف الا قليلا ،  
كما أن مساحتها تقدر بنحو ٤٤٦٨٤ ميلا مربعا .

ويقع شماليه اقليم الصالصال Terre de Barre وهو اكثرى  
زراعة ( المحاصيل الغذائية ونخيل الزيت ) وسكانا عنه فى توجو ، وتوجد  
هضبة مشابهة ( الى شماله ) يفصلها منخفض لاما Lama الذى يمكن أن  
تقوم فيه زراعة الأرز ، على حين تنمو نخيل الزيت فى الاقليمين الشمالى  
والجنوبى ، وتمتد الى الشمال جبال اٲاكورا القديمة وحوض فلٲا بصخوره  
الرملية الفقيرة حيث تزرع محاصيل تنمو فى تربة أقل خصوية وتقع بقدر  
أقل من المطر هى : الفول السودانى والقطن والذرة الرفيعة .

### ساحل العاج :

أكبر مراكز الانتاج الاقصادى فى غرب أفريقية الفرنسية سابقا  
بمواردها المتنوعة ، وامكانياتها الكبيرة ، فهى تضم أكبر مساحة من الغابات  
الاستوائية فى مستعمرة فرنسية فى غرب أفريقية ، وتبلغ مساحتها نحو  
٣٢٢٥٠٠ كم مربعا وعدد سكانها نحو ١٠٠٥٦٠٠٠ نسمة ولذلك فإنها  
قد ضمت تحت ادارتها اقليم الفلٲا العليا لتشجيع السكان على الهجرة الى  
ساحل العاج ، وقد شجع الفرنسيون غير الافريقيين على انشاء مزارع  
كبيرة لانتاج اكثر الصادرات الزراعية من الكاكاو والموز والبن ( انظر  
خريطة رقم ٤٦ ) .

تقع العاصمة « ابيجان » على الساحل الشمالى لمستنقع ابريه Ebrié  
وقد أصبحت العاصمة منذ سنة ١٩٤٣ ونهاية الخط الحديدى من واجدوجو  
الذى يبلغ طوله ٧١٦ ميلا ، وقد بدأ شق قناة فريدى سنة ١٩٢٦ التى تمت  
سنة ١٩٥٠ ، فأصبحت تصل هذا المستنقع بالساحل ، ولذلك أدت هذه القناة  
الى وصول السفن الى ابيجان التى ظهرت فيها صناعات حديثة نشيطة أهمها  
يعمل فى اعداد المحصولات للتصدير كالبن والكاكاو والاشباب وحفظ الفواكه  
وغيرها ، ويكفى أن تعرف أن ثلث تجارة غرب أفريقية الفرنسية سابقا تختص  
بها مستعمرة ساحل العاج ، ومن الممكن التوسع فى استغلال موارد هذه  
البلاد العديدة وبخاصة فى الغرب والجنوب الغربى ، وتتابع اقاليم التضاريس  
من السهل الساحلى فى الجنوب الى السهول الداخلية الوسطى التى تنتهى




### ساحل العاج - انقلايم وساحل العاج

( خريطة رقم ٤٦ )

الى الهضاب الشمالية ، ولكن المناخ والنبات الطبيعي يعدان عنصرين هامين في تمييز الاقاليم المختلفة ، فاقليم غابات الجنوب الاستوائى وهو أكثر غنى تنتشر به مزارع البن والكاكاو والموز الواسعة التى يسمع لغير الافريقيين ، ويملك الاوروبيون ١/٢ مزارع البن ، و ٩٪ من مزارع الموز ، ٥٪ من مزارع الكاكاو ، ويزرع البن فى مساحة ١٣ مليون فدان فى ظل ظروف تتوافر أيضا فى غانة لضمان سوق للبن الناتج فى ساحل العاج فى فرنسا وصلاحيه زراعة البن للمزارع الكبيرة بصفة خاصة .

ويزرع نوع الروبستا الذى يقاوم الامراض ويمثل البن نصف الصادرات وتمثل مزارع الكاكاو المقصورة على الشرق امتدادا عبر الحدود لمزارع كاكاو

غانة ، ويقدر أن الكاكاو - ثانياً صادرات ساحل العاج - يساهم بـ  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{1}{4}$  قيمة الصادرات ، أما الموز الذى ينمو فى مزارع كبيرة فهو قليل الأهمية فى تجارة البلاد الخارجية ، ومناطق زراعته متفرقة أهمها ما يقع خلف ابيجان وساسندرا *Sassandra* ويعد الخشب وبخاصة الكابلى ثالث الصادرات أهمية ، وتتجر البلاد مع الفلتا العليا ومالى فى ثمار الكولا لمبادلتها بماشية كل منهما . واهم معادن ساحل العاج هو الماس الذى يستخرج من بو *Bou* وشجالي *Séguéla* سيجيلى ، وتستغل مقادير ضخمة من المنجنيز على الساحل فى جراند لاهو *Grand Labou* ، وتعانى ساحل العاج من نقص الأيدي العاملة ، كما يمتاز انتاجها بالتنوع وخاصة بعد انتعاشها الاقتصادى منذ سنة ١٩٥٠ ، وتقوم بها بعض الصناعات على أساس اعداد



( خريطة رقم ٤٧ )

المحاصيل الزراعية والمعادن للتصدير ، يعتمد بعضها على محطة توليد الكهرباء على نهر بيا Biz عند أيامى Ayamè ، وتمر بها تجارة المرور القادمة من مالى .

### نيجيريا :


تعد نيجيريا أكثر بلاد أفريقية سكانا اذ يقدر عددهم بنحو ٩٤ مليون نسمة ، وهكذا يمثلون نحو ١٤٪ من سكان أفريقيا ، وتقدر مساحتها بنحو ٩٢٢ر٨٠٠ كم مربعا .

و اذا كانت نيجيريا تمتد بين عرضى ٤ ، ١٤ شمالا ، فلا غرو ان كانت ظروفها الطبيعية وعناصر سكانها ونظمها الاقتصادية متنوعة متباينة ، فمطرها الغزير فى الجنوب حيث يبلغ اكثر من ٤ - ٥ متر يتدرج فى القلة حتى يقتصر على بضعة عشر سنتيمترا تسقط فى شمالها اثناء فترة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة ، ورغم أن سفانا غانة تمثل نطاقا متسا يشغل جزءا كبيرا من نيجيريا ، فظروفها النباتية لا تقل عن ذلك تنوعا ، وتتنوع مظاهر السطح من سهول ساحلية الى جبال الكمرون وبامندا فى الشرق الى هضبة جوس فى الوسط التى يصل ارتفاعها الى نحو ١٩٠٠ متر ، كذلك نجد التكوينات الجيولوجية تختلف من صخور ما قبل الكمبرى التى تنتشر فى مساحة كبيرة، الى صخور العصر الكريتاسى والحديث والصخور البركانية ( أنظر خريطة رقم ٤٨ ) .

أما عناصر السكان فمنهم الهوسا والفولانى فى الشمال واليوروبا فى الجنوب الغربى الايبو Ibo فى الجنوب الشرقى ، وهى عناصر تختلف من حيث ثقافتها ودرجة رقيها ونظمها الاجتماعية ، ورغم تنوع مواردها الاقتصادية ، فان هذه البلاد المزدهمة بالسكان التى ينصرف سكانها لانتاج محاصيل الغذاء كالكولا واليام وتربية الحيوانات ، ويتبادلون التجارة داخليا على نطاق واسع ، لا تعدد فيها كثيرا المحاصيل التى تصدر ككاكو فى الجنوب الغربى وزيت النخيل والبتروى فى الجنوب الشرقى ، والموز من جنوبى الكمرون والقطن والفلو السودانى والجلود والقصدير من الشمال ،







الشمالي والجنوبي دون أن ينال من مميزتهما شيئا ، بل أن مدنه خليط من مدن أنشأها المسلمون كبيدا Bida ، وأخرى أنشأها الأوروبيا من سكان الجنوب، وبعض المدن الأوروبية الأخرى مثل كادونا Kaduna وجوس Jos

وقد كانت لاجوس التي نشأت في منطقة منخفضة كثيرة المستنقعات تتفشى فيها الأمراض ، مركزا برتغاليا لتلاتجار بالرقيق ، تنتهي إليها المجارى الملاحية من الداخل ، من داهومي ويوروبا وبنين ، وهي ممالك كانت تبيع أسراها في الحرب والمعتقلين السياسيين رقيقا ، وقد انتزعها البريطانيون سنة ١٨٦٢ حين أصبحت مستعمرة بريطانية ، وأكثر جهات مدينة لاجوس ازدحاما بالسكان هي منطقة الشمال الغربي ، أما الجنوب الغربي فقد أصبح الحى التجارى ، على حين قامت في الجنوب الشرقى منه دواوين الحكومة وأصبح مقرا لبعثات التبشير والمستنقعات والمدارس وحى سكنى للوربيين ، أما الجانب الشرقى فقد كان أول الأمر الحى الأوروبي ، على حين كان وسط الجزيرة التي يسمى « الحى البرازيلى » موطن أرقاء البرازيل ، وقد ظلت لاجوس والمنطقة المحيطة بها وتدعى « مستعمرة لاجوس » حتى سنة ١٩٠٦ منفصلة عن محمية جنوب نيجيريا حين اندمجتا مما زاد من أهمية ميناء لاجوس ، وقد أصبحت لاجوس « منطقة فدرالية » أى مستقلة عن بقية مقاطعات نيجيريا ، وقصد قطع ذلك الاتصال بينها وبين منطقتها الخلفية ( انظر خريطة ٤٩ ) .

ومن أهم المصاعب التي تواجه نيجيريا فقدان الاتصال والتشابه والتجانس بين جهاتها المختلفة ، وما يكتنف التعدين من صعوبات ، وضرورة الاقلال من الاعتماد على زيت النخيل وكاكاو ، وتعد مشكلة جرف التربة شائكة وتستدعى حلا عاجلا . والواقع أن استغلال بعض المناطق بتوفير موارد المياه في البعض ، والقضاء على ذباب تسي تسي في البعض الآخر وتشجيع السكان على الهجرة من المناطق المزدحمة الى الجهات القليلة السكان في البعض الثالث تعد من أهم وسائل النهوض بهذه البلاد .



( خريطة رقم ٤٩ )

### غانة الاسبانية :

يمتد انكسار جبل الكمرون في عرض البحر متجها نحو الجنوب الغربي مارا بجزائر فرناندوبو وانويون الاسبانييتين ويونسديب وساتومي البرتغالييتين وتعد هذه الجزائر من اثار النشاط البركاني الذي يرجع للعصرين الثالث والرابع . وقد اضعف الاسبانيون على البترغاليين الذين استولوا على البرازيل على نقيض ما نصت عليه معاهدة تورديلاس التي منحت ما يقع غربي خط طول ٥٠ غربا لاسبانيا ، كما حققوا عليهم لانهم اخذوا يبيعون

لمطالب اسبانيا ومنحتها جزيرتى فرناندوبو واتويون Fernando

Po, Annobon والمنطقة الساحلية على نهر النيجر وأجوى Ogowe

سنة ١٧٧٨ ، وقد استأجر البريطانيون فرناندوبو بعد فترة حاولوا شرائها ولكن رفض الاسبان ، كما أخذوا يكتشفون المنطقة المحيطة بخليج ريوميني Rio Muni على اليباس الافريقى . وقد انتهزت فرنسا فرصة هزيمة اسبانيا وطردها من أمريكا على يد الولايات المتحدة سنة ١٨٩٨ ، فضيقت الخناق على منطقتى ريوميني حتى أصبحت لا تزيد مساحتها على ١٠١٦٢ ميلا مربعا ، وقد عنى الاسبان باستغلال أملاكهم هذه بعد الحرب الأهلية الأسبانية سنة - ١٩٣٩ .

ويطلق كلمة غانة الاسبانية على المنطقة المعروفة بهذا الاسم فى اليباس الافريقى التى تحذب به وجزيرتى فرناندوبو وأتويون ، ويقيم الحاكم العام كما تقوم الحكومة المركزية فى منطقة سانتا ايزابيل Santa Isabel الواقعة فى جزيرة فرناندوبو ، وتقوم ادارة محلية فى باتا Pata فى اليباس الافريقى ، فجزيرة فرناندو التى تتجه من الشمال الشرقى نحو الجنوب الغربى تبلغ مساحتها ٧٧٩ ميلا مربعا وتربها البركانية الخصبة وأمطارها الغزيرة يجعلان منها مركزا مهما لزراعة الكاكاو الذى هو ملك الشركات والملك الغائبون والمستوطنون من غير الافريقيين ، أما أتويون فهى جزيرة بركانية صغيرة تصدر منتجات زيت النخيل والكاكاو .

لم تأخذ اسبانيا فى العناية باستغلال موارد ريومونى الا سنة ١٩٥٤ حين أخذت تشارك فرناندوبو فى جذب أهتمام اسبانيا ، ورغم غزارة مطرها فى المنطقة الساحلية الذى يسقط طول العام وبخاصة فى الاعتدالين ، فانها تقع جنوبى منطقة المطر الغزير حول ٢ شمالا ، وتنمو فى المنطقة الساحلية الغابات بأخشابها التى تستغل حول الانهار التى تستخدم فى نقلها ، ويحتكر عشرون من أصحاب عقود الامتياز ستغلال نصف مليون فدان من الغابات تنتج أخشاب الاوكيمى الكابلى ، وتوجد بعض مزارع نخيل الزيت أيضا . ويلي السهل الساحلى هضاب تنمو بها بعض نباتات المرتفعات ووحشائش السافانا الا فى الوديان . حيث تنمو الغابات الاستوائية ، وتوجد مزارع البن الكبيرة فى الجزء الاوسط من الهضاب الواقعة شرقى باتا ، ولكن أكثر البن

ينتجه الافريقيون فى مزارعهم شأن الكاكاو الذى يزرع فى المناطق الشمالية الشرقية القصوى ، كإمتداد لمناطق زراعية وراء الحدود فى الكمرون الجابون، وتجذب احتكارات الغابات لاستغلال أخشابها والمزارع الكبيرة بمهاجرين من لسكان نيجيريا ، الى جانب عشائر الفانج Fang من الزنوج الذين يعيشون فى جابون والكمرون على السواء الى جانب حفنة من الاوربيين المهاجرين سكان ريومونى ، التى كانت تشكو من قلة الاهتمام وصعوبات البيئة وقلة السكان فضلا عن سياسة أسبانيا التى تحرص على احتكار تجارتها وقصر نقل هذه التجارة على سفنها .

تعد فرناندو جزيرة بركانية تقع على الرصيف القارى ، كإمتداد الجبال الكمرون ، هذه الجزيرة الجبلية تمتد فى جنوبيها جبال انكسارية من الغرب الى الشرق ، وتوجد بوسطها قممتان مرتفعتان ، وأكثر سكانها من زنوج البانتو من جماعة البوبى Bubi الذى اختلطوا مع الاوربيين وعناصر أخرى لتكوين طبقة من الكريول Creole .

ويسكن هذه الجزيرة ٤٥٠٠ من الاوربيين الذين يملكون نحو ٦٠٠ مزرعة يبلغ متوسط مساحة كل ١٥٠ فدان ، الى جانب ٥٦٦٩٧ نسمة من الافريقيين الذين يملكون ٤٠٠٠٠ فدان موزعة بين ٣١٠٠ مزرعة لا يتجاوز متوسط مساحة كل مزرعة عن ١٣ فدانا .

ويزرع الكاكاو والبن فى الجهات المنخفضة ، ويلقى الموز ظله على أشجار الكاكاو وتبلغ مساحة هذه المحاصيل ٩٠٪ من أراضى الجزيرة الزراعية .

• ويحتشد نصف السكان فى العاصمة سانتا ايزبيل .

## البترول فى « نيجيريا »

- الإنتاج : ٨٩٢ مليون طن ( سنة ١٩٨٣ ) .

- مناطق الاستخراج : أفام - أولوبيرى - بومو - أموشيم - أموريفر  
( حقول البترول ) كوروكور - أوكين ( فى المياه الاقليمية ) .

- ميناء التصدير : « بونى » .

تعتبر نيجيريا من الدول الافريقية التى شهدت نموا كبيرا فى انتاجها البترولى ، وقد تصبح دلتا النيجر من الاقاليم الرئيسية المنتجة فى العالم فى المستقبل . لقد انتزع البترول المكانة الاولى فى صادرات نيجيريا . وأصبحت ثانى دولة افريقية بعد ليبيا . ولكنها قفزت الى المكان الاول بعد أن حددت ليبيا انتاجها .

تنتج نيجيريا نحو ٢٩٢٪ من انتاج البترول فى افريقيا ( سنة ١٩٨٤ )  
وتعتبر « يورت هاركورت » مركز العمليات البرولية ، وتصلها أنابيب البترول من الحقول المنتجة التى تنتهى بميناء التصدير « بونى » على الساحل . واختيرت مدينة « الم » على بعد ١٤ ميلا من يورت هاركورت لانشاء اول معمل تكرير فى نيجيريا .





## الباب السادس

### أفريقيا الوسطى

#### الفصل الأول

يقصد بها المنطقة التي تمتد غربى هضبة شرق أفريقية حتى المحيط الاطلنطى ، أما تحديد المنطقة التي عند أطرافها الشمالية والجنوبية فتكتنفه صعوبات كبيرة ، لأن الحدود السياسية لا تتفق والظروف الطبيعية السائدة وبخاصة فى افريقية الاستوائية الفرنسية سابقا التي تمثل فى شكلها الفريد وامتدادها من الاقليم الاستوائى الى الاقليم الصحراوى أسوأ حدود سياسية من وجهة النظر الجغرافية ، تنتهى الحدود عند المنطقة الجافة وشبه الجافة من افريقية الاستوائية الفرنسية التي تعرف باسم تشاد ، هذا من الناحية الشمالية والشمالية الشرقية ، أما فى الجنوب فنجد أنجولا تمتد حتى نهر كوينين الذى يمكن اتخاذه الحدود الجنوبية لهذه المنطقة ، وبذلك تصبح هذه المنطقة الواقعة بين المداريين حول حوض الكنغو الذى تبلغ مساحته ٥٠ مليون ميل مربع ، والتي تتصرف مياهاها نحو الغرب عن طريق الكنغو إلى الأنهار المستقلة الصغيرة كنهر كوينين وأوجوى Ogowe, Kunene

أفريقية الاستوائية التي تضم من الناحية السياسية زائير والكمرون وجمهوريات الكنغو برازافيل والشطر الأكبر من جنوب جمهورية أفريقية الوسطى وجابون فضلا عن غانة الاسبانية سابقا وكابنده وأنجولا تمثلان أفريقية الوسطى ، وهكذا يبدو وسط القارة وقد أصبح اقليما متجانسا حارا غزير المطر الذى لا يقل متوسطه عن متر ، وهو يكفى لنمو النباتات المدارية المطيرة وسافانا البساتين والسافانا ، ورغم أن المناطق الصالحة للزراعة متسعة جدا فن مايزرع فعلا منها لازل محدودا .


ولا يصلح هذا الاقليم كثيرا لسكنى الاوربيين لشدة الحرارة والرطوبة، فالمناخ بتأثيره المباشر وغير المباشر من شأنه ، أن يجعل مناطق السكنى التي تلائم الاوربيين محدودة ، وكانت بلجيكا والبرتغال لا تستطيمان

لمقدرتهما المحدودة تمويل المشروعات الانتاجية الضخمة لاستثمار موارد هذه البلاد الضخمة ، أما فرنسا فكانت تؤثر أن توجه عنايتها وتستغل أموالها فى مناطق نفوذها ومستعمراتها السابقة القريبة منها فى غرب افريقية وشمالها الغربى ، فضلا عن ما يمتاز به سكان هذه المستعمرات من تقدم نسبي قبل أن تبسط فرنسا نفوذها عليها .

### أنجولا :

تعد أكبر مستعمرات البرتغال إذ تقدر مساحتها ١٢٤٧٠٠٠ كم مربعا ، ولكن يقل بها عدد السكان عن ٧١٠٨٠٠٠ ، نسمة وبذلك لا تتجاوز كثافة السكان ٦ فى الميل المربع ، ورغم أنها أقدم المستعمرات الأوربية على الساحل الغربى لافريقيا ، فقد اقتصر البرتغاليون على اتخاذ قواعد ساحلية للنشاط التجارى حتى سنة ١٨٧٠ ، فكانوا يمارسون نشاطهم التجارى فى موانئ كابيندا التى احتفلوا بها شمال نهر الكونغو الى جانب لواندا وبنجويلا على ساحل أنجولا ( انظر خريطة ٥٠ ، خريطة ٥١ ) ولذلك فقد ظلوا منذ وطأت أقدامهم ساحل غرب افريقية فى مطلع القرن السادس عشر حتى الربع الاخير من القرن الماضى لا يعنون كثيرا بالمناطق الداخلية ولكن ما ان وجدوا أن الدول الأوربية تتهافت على الاستعمار وتتنافس وتتنافس لمد مناطق نفوذها فى داخل القارة حتى أخذوا يطالبون بالمنطقة الخلفية التى تتأخم أحواض الكونغو والزمبيزى ويسكن أنجولا ٣٠٠٠ من الأوربيين ، يتألف سوادهم الأكبر من مزارعى جنوب البرتغال الذين تشجع بينهم الامية وقلة الخبرة وهم يفدون من البرتغال معدل ١٠٠٠ - ٢٠٠٠ نسمة فى السنة .

وعلى حين اقتصرت جهود البرتغاليين قبل سنة ١٩٢٠ بوجه عام وسنة ١٩٥٠ بوجه خاص على منح الشركات الالمانية والبريطانية احتكارات كان يحول دون تقدمها قلة الايدى العاملة ، أخذت البرتغال فى تنفيذ مشروعات استغلالية مثل مد الطرق والتعدين وانشاء المزارع والمصانع ، بل حتى سنة كانت زراعة المحاصيل التجارية وقفا على البرتغاليين وكان ١/ من الوطنيين هم الذين أندمجوا فيهم ويعرفون بـ بالندمجيين Assimilados . وقد حصلت أنجولا على استقلالها فى نوفمبر ١٩٧٥



( خريطة رقم ٥٠ اقتصاديات انجولا )

ومن الظاهرات الطبيعية التى تميز أنجولا أنها ملتقى كثير من الظاهرات الطبيعية التى تبلغ أقصى وضوحها خارج أنجولا : فهى تمثل من ناحية البنية جزءا من الكتلة الإفريقية القديمة فى جنوب القارة ، فيغطى جانبها من سطحها تكوينات رسوبية من الزمن الأول ، ويقدر متوسط ارتفاعها بألف متر عند ساحل المحيط الأطلنطى ، أما الجزء الداخلى فى هضبة بيهى Bihé فتصل فى الجزء الأوسط الغربى لارتفاع ٢٥٠٠ متر ، وتحد المياة نحو الجوانب فتتجه روافد الزمبىزى نحو الجنوب الشرقى ، والكنغو نحو الشمال ونهر اكونين Kunene كوانزا Cuanza عن لواندا فيفصله عن الهضبة مدرجات غير منتظمة وعرة .


تتألف أنجولا من عدة هضاب تختلف من حيث السطح والمناخ والنبات ، فالسهل الساحلى الذى لا يربو عرضه عن ١٠٠ ميل تغطيه تكوينات رسوبية بحرية وبحيرية حديثة نسبيا ، وقد تآثر بتيار بنجويلا البارد الذى ساعد على زيادة الجفاف وتلطيف الحرارة ، كما ضاعف من أهمية الثروة السمكية فضلا عن انشاء السنة رملية تعتمد موازية للساحل وتحصر بينها وبين اليابس مرفأء عميقة صالحة لرسو السفن ، ويقل المطر فى الجنوب حيث تسود الصحراء فى الشقة الساحلية بين الحدود الجنوبية وميناء بنجويلا ، على حين تنتشر نباتات شبه الصحراء كاللتبلدى واليوفوربىسا فى الساحل الأوسط بين بنجويلا ولوانده ( ١/٢ متر من المطر السنوى ) .

كما تنمو السفانا الغنية فى الثلث الشمالى بين لوانده ومصب الكنغو ، وتكثف النباتات عند أدانى الانهار ، وهى من الجنوب الى الشمال كونين وكاتومبيلا وكوانزا وندى Dande ، وتزداد أهمية المراقىء جنوبى لوبيتو كمراكز لصيد السمك وتصنيعه . حيث أنشئت أكثر من عشرة مصانع لهذا الغرض .

والانتقال من السهل الساحلى نحو الهضاب الداخلية يحدث فجأة فى الجنوب الوسط حيث تغطى صخور القاعدة القديمة صخور صلبة من الكوارتزيت وحجر الحديد ، ولذلك لا تصلح الانهار فى الوسط والجنوب

للملاحة فى مسافات كبيرة ، كما هو شأن الشمال حيث يسمح قلة الانحدار بامتداد الاجزاء الصالحة للملاحة فى نهري دندى وكوانزا لمسافة بطويلة نسبيا ، وقد اقيمت مشروعات توليد الكهرباء فى النقط التى تنتقل فيها الانهار من هضبة لآخرى ، واذا كانت الجهات الساحلية الشمالية غير صالحة لسكنى الاوروبيين لتوافر الحرارة والرطوبة معا ، فان الهضاب المتتابعة فى الداخل اشد منها حرارة فى الصيف ، وتهبط بها حرارة الشتاء حتى ليسقط الصقيع فى أكثرها ارتفاعا فى الداخل ، وتنمو بها السافانا التى تعد الغطاء النباتى السائد ، وان كانت منطقة الشمال الشرقى حيث يجرى كاساى رافد الكنغو رطبة كثيفة الغابات حتى لتعد مكملة لحوض الكنغو .

وصفوة القول أن الهضاب فى الداخل تنقسم الى هضبة يقدر متوسط ارتفاعها بـ ٣٣٠ مترا ، يليها نحو الداخل هضبتان : الشمالية وتسمى ما لانج والجنوبية وتسمى هويلا Huila ويتراوح ارتفاعها بين الف و ١٣٠٠ متر ، يليهما هضبة أكثر ارتفاعا تنتهى شرقا بمرتفعات تقسيم المياه بين الكنغو والزمببىزى ويقدر بمتوسط ارتفاعها بـ ١٦٠ - ٢٠٠٠ متر وتسمى هضاب بيا Bié بنجويلا ، ويمكن أن نميز بين جمع الكاكو وزراعة نخيل الزيت فى الطرف الشمالى حيث تسود الظروف المدارية الرطبة فى الوديان ، ويزرع الاوروبيون البن عند حافات الهضاب الرطبة وبخاصة فى اقليم كارمونا ، كما يزرع القطن فى هضبة مالانج الشمالية ، وتمتد مشروعات زراعية كبيرة شمال مالانج وجنوبها ، ويختص الزراع البرتغاليون بممارسة الزراعة هنا ، ولكن اقيم مشروع شمال مالانج عند دامبا Damba للوطنيين ، ويعد القطن والفول السودانى وزيت النخيل والذرة والبن أهم المحاصيل ، وبخاصة حول كوانزا فى مالانج ، وقد اجتذب خط سكة حديد بنجويلا الذى يمتد الى اليزابثفيل مزارع البرتغاليين التى انتشرت فى هضبة بيا عند سيللا Cela ، فنشأت مراكز للانتاج الزراع والتصديرى نونفا لسبوا وسيلفابور Silva Porto, Nova Lisboa ويتركز انتاج الذرة والقطن والفول السودانى كما يمتد محور للتعمير على طول خط سكة حديد موساميدس حيث توجد مزارع الاوروبيين عند ماتالا ،



### اسجولا

المعادن ومركز الصراة وتونج - الكورباة والبرسطان والكمه الحديريه

( خريطة رقم ٥١ )

سادى بانديرا ، بل يوجد مركزان اخزان للاستغلال الزراعى أحدهما شمال ماتالا للوطنيين والاخرى للاوروبيين فى الجنوب عند أعالي وادى نهر كوين Forte Rocandias ، وقد أشرنا الى أهمية الذرة والبقول كغذاء فى الوسط ، والى خلو الجنوب بل والوسط من ذباب تسمى مما ضاعف من أهمية الماشية ، وهكذا أخذت تحل مراكز الداخل وأسواقه محل منافذ الساحل وموانيه ، فمالانج نافست لوانده ، ونالسبوا اجتذبت بعض أهمية لوبيتو كما أن ماتالا أخذت تشاطر موساميدس أهميتها ، كمراكز متقدمة للعمران وكأسواق لمناطق للانتاج وبخاصة الزراعى منه ، فلا غرو أن ارتفعت نسبة كثافة السكان فى هذه البقاع المنعزلة الى خمسين نسمة فى الميل المربع ، وتنتشر الثروة المعدنية التى بدأ استغلالها جديا فى الهضاب الداخلية ، ولذلك سنعرض لها من الشمال الى الجنوب .

الثروة المعدنية : ففي أقصى الشمال الشرقى يستخرج الماس من مناجم كاساى وهو يمثل امتدادا لثروة الكنغو من هذا المعدن ، ويقدر الانتاج الذى يستخرج على سطح الأرض بنحو ١٠٪ من الانتاج العالمى من الماس ، وهو من الصنف الجيد النادر ، ويستخرج المنجنيز والحديد والاسفلت والفوسفات والنحاس شمال خط سكة حديد لوانده - مالانج ، كما توجد بعض مناجم المنجنيز شمال بنجويلا وجنوب لوانده ، أما خام الحديد فيوجد شرق ماتالا وحول خط سكة حديد بنجويلا وبخاصة نوفالسبوا وجنوبها ، كما يوجد البترول شمال لوانده والنحاس شمال موساميدس والملح فى سبخات الساحل ، وتعتمد لوانده على قوتها المحركة المولدة من البترول ومحطة توليد الكهرباء من المياه المعروفة باسم محطة مابوباس Mabubas أما مركز القوة المحركة الثانى فى الوسط فيمد لوبيتو وبنجويلا بحاجاتهما من محطة الكهرباء من تدفق المياه وهى معروفة باسم بيوبيو Biopio أما فى الجنوب حيث تزداد أهمية الرعى وحفظ اللحوم فى منطقة تربية الماشية الرئيسية ، فيعتمد هذان النوعان من النشاط على القوة المحركة من محطة ماتالا Matala التى تغذى منطقتى ماتالا وسادى بانديرا .

تعد لوانده التى يبلغ سكانها ١٤ ليون نسمة المدينة التى تضم أكبر جالية أوربية فى أفريقية المدارية ( ٥٠ر٠٠٠ ) ، ورغم أن نشأتها التى ترجع

الى أربعة قرون قد أضفت عليها شهرة قديمة كأقدم مراكز العبران البيضاء جنوب الصحراء ، فقد أعيد بناؤها سنة ١٩٣٨ ، وهى منفذ لبن الداخلى وموارده من الحديد والمنجنيز ، ولها تجارة نشيطة كمحطة جوية ذات أهمية عالية ، فضلا عن أن مرفأها العميق الامين يعد أهم منافذ أنجولا التجارية وقد قامت بها صناعات أهمها تكرير البترول والنسيج وصناعات اعداد الحاصلات الاخرى للتصدير .

أما لوبيتو التى انتزعت أهميتها كميناء لعمق مرفئها من بنجويلا ، وأصبحت منفذا لمنطقة واسعة مما جعلها تبز لوانداه كميناء من حيث مقدار ما تتجر فيه ، وان كانت لوانده لا زالت أولى الموانى من حيث قيمة ما تتجر فيه ، فهى تصدر بعض صادرات روديسيا منذ مدت السكة الحديدية سنة ١٩٣١ ، ١٩٣١ ، ولكن لم تصدر حاصلات الكنغو ( كاتنجا ) الا بعد أن سمحت بلجيكا بذلك سنة ١٩٥٦ وبخاصة بعد الاستقلال ، وتصدر ايضا الحديد من كاسينجا وكيفا Guima, Cassinga جنوب نوفالسبوا ، ومن روبرت ويليمز ، كما تصدر الذرة من هضبة بيا - بنجويلا ، كما تجتذب بفضل فرعها الذى يصل الى الشمال الشرقى الماس من تلك الجهات .

أما موسالميدس التى نشأت كميناء لصيد الاسماك وتصنيعها وتصديرها فتصدر الحديد من منطقتها .

لاشك أن محاولة اجتذاب تجارة الداخل فى الكنغو وزيمبابوى وتصنيع كثير من المحاصيل ، واقامة صناعات وتنشيط التعدين يستهدف زيادة موارد البلاد الاقتصادية التى تشكو من الاهمال والركود الاقتصادى وتعويض سياسة البرتغال التى تقوم على الاحتكار حتى أن الصناعات والمحاصيل الزراعية لا تشجع أو تقاوم الا اذا كان ذلك فى مصلحة البرتغال أولا ، بل ان تصدير حاصلات أنجولا الى الدول الأجنبية كان محظورا حتى سنة ١٩٦١ حتى يثبت أنها تفيض عن حاجة البرتغال نفسها ، التى تحظر نقل تجارتها الا بسفن برتغالية ، ولكن لم تنجح سياسة انكار كيان الشعب الافريقى بقمعه وسوقه للعمل نصف العام عن طريق السخرة ولم تنجح البرتغال فى أن تعمر هذه الجهات التى سلطت عليها النخاسة ثم الاسترقاق الذميم والسخرة المقيتة - بالاستعانة بحفنة من البرتغاليين الذين يواجهون



مشكلات اتساع البلاد وجفاف جزء منها ووعورة الجزء الآخر ولم تستطع البرتغال بانكارها أن للافريقيين مصالح مستقلة ووجودا مستقلا - بتأييد من روديشيا الجنوبية وجنوب أفريقية بسياستهما العنصرية المقينة أن تظل تحكم بالعسف والارهاب فى منتصف القرن العشرين بسلافا تهب عليها ربح التحرر هواء . ان السخرة والاندماج بين الوطنيين والمستعمرين ، والنظر للمستعمرات كغنيمة أبدية وحق للملكية مطلق أمور قد عفى عليها الزمن . وحصل أخيرا شعب أنجولا وشعوب زامبيا وزيمبابوى على استقلالها .

### زائير :

يمتاز الكونغو باتساع أرجائه وتنوع أقاليمه وموارده ، شهد دولا وطنية فى القرون الوسطى مثل بالوبا ولوانده والكنغو ، وقد وصل اليه النفوذ البرتغالى فى منتصف القرن الخامس عشر تقريبا ، ثم تغلغل النفوذ البلجيكى فيه تدريجيا عن طريق تشجيع ملك البلجيك ليوبولد الثانى للرحالة وجمعيات الكشف حتى أصبح ليوبولد ملكا لدولة الكونغو الحرة سنة ١٨٨٥ ، ولكن اتباع أساليب وحشية لتحصيل الضرائب من الأهالى اثار الشعور الدولى ضد ليوبولد وحدا ببلجيكا أن تتولى حكمه بنفسها سنة ١٩٠٨ ، وقد ضم البلجيكيون الى الكونغو سنة ١٩١٩ رواندى وأورندى ، ثم أدخلت تغييرات على حدوده من أنجولا سنة ١٩٢٣ ، وقد عنى البلجيكيون بالتعليم الفنى والابتدائى أى بالنواحى المادية ، وظنوا أن رفع مستوى المعيشة كفيل برضاء الكونغوليين ، فلا يثورا طلبا للاستقلال ، ويعد حوض الكونغو من أهم أجزاء الكونغو كما يعد نهر الكونغو عامل الوحدة بين أرجاء هذه البلاد الواسعة المتنوعة .

منذ انفصلت كتلة القارة الافريقية القديمة عن بقية قارة جندوانا فى أول الزمن الثانى ، تكون حوض الكونغو كأحد المنخفضات التى انتشرت على سطح هذه القارة ، شأن حوض بحر الغزال وحوض تشاد والنيجر فى الشمال وحوض كلهارى فى الجنوب . وقد أحاطت بهذه الاحواض أو المنخفضات مرتفعات أو هضاب تمثل مناطق تقسيم المياه كهضاب تبيستى والاحجار فى الشمال ومرتفعات كاتانجا وهضبة بيا Bié التى تضرب نطاقا مرتفعا حول حوض الكونغو فى الجنوب ، وفى آخر الزمن الأول أو فى

العصر البرمي أخذت تتعرض الهضاب المحيطة بمنخفض الكونغو لتأثير الجليد ، فالقطب الجنوبي كان يقع حينئذ في المحيط الاطلنطي الجنوبي غير بعيد عن حوض الكونغو وقد امتدت من غطائه الجليدي أنهار جليدية ، كانت تزحف فوق الهضاب حتى تشرف على البحيرة التي كانت تشغل منطقة الحوض المنخفضة ، وهكذا تجمع الركام الجليدي بجلاميده ومجمعاته طوال الفترة بين العصر البرمي والعصر الترياسي ، وقد بلغت هذه المجمعات التي تعد أقدم الصخور الرسوبية في أفريقية الوسطى سمكا كبيرا في الهضاب المختلفة ، ويطلق عليها اسم تكوينات كونديلونجو Koundeloungor

ولكن تعرضت هذه الجهات بعد العصر الجليدي العتيق لطغيان المياه فتكونت رواسب مياه عميقة وضحلة متعاقبة من الحجر الجيري والشست والحجر الرملي تغطيها مجمعات من ركام جليدي يعرض طغيان جليدي آخر ، تعلوها رواسب من الشست والحجر الرملي بالتبادل تنتمي للعصر الجوراسي تعرف باسم رواسب لوالا بالوبيلاش Loualabo Loubilache ولكن قبل نهاية العصر الجوراسي كانت جميع أنواع الرواسب المعروف حاليا قد أرسبت فيما عدا رواسب كبيرة الكونغو والطمى الحديث انحسرت المياه الا عن قاع منخفض الكونغو أو ما يمكن أن يسمى ببحيرة الكونغو Lac Congolais التي أرسبت في قاعها الطرى الحديث الذي يسمى بطبقات بوسيرا Busira beds ، وقد تعرضت هذه المناطق لحركات تكتونية غيرت من ارتفاعها وانحدارها ، ففي العصر الترياسي أثرت حركات الالتواء في الهضاب المحيطة بمنخفض الكونغو فتأثرت بها تكوينات كوندلنجو ، وقد ظهر أثر هذه الحركات المعاصرة لالتواء سلاسل الكاب - في جبال كاتنجا الجنوبية وفي حوض نهر أوجوى Ogowe في أدنى نهر الكونغو في مناطق مايومبي وأشانجو وشيلو Chaillu, Achango, Mayombe ولا يزال أكثرها يمثل سلاسل جبلية .


وفي العصر الجوراسي بعد أن أرسبت طبقات لوالابا لوبيلاش السالفة الذكر ، تعرض تجويف الكونغو لحركة هبوط كان من أثرها اتساع مساحة المنطقة التي كانت لا تزال تغمرها المياه في قاع الحوض ، وتنشيط تأثير المياه الجارية المنحدرة من جوانب الحوض نحو مركزه في الوسط ، وازدياد الاختلاف في المنسوب بين مركز الحوض ومرتفعات الجوانب المحيطة به ،

وقد ظهر فى عصر الميوسين ساحل افريقية الوسطى ، لأن خليج الكونغو الحالى ليس الا بداية خليج أعظم امتدادا نحو الغرب لا تزال آثاره تبدو فى قاع المحيط الاطلنطى لمسافة ١٣٠ كيلو مترا ، ثم أثرت حركات انكسارية والثوران البركانى سواء فى شرق القارة أو فى منطقة الكمرون فى الشمال فى اطراف هذه المنطقة وقد امتدت حركات تكوين الاخايد بين الكريتاسى والميوسين ثم آخر الزمن الثجالت والرابع ، ففى شمال غربى المنطقة انتشرت خطوط الانكسار التى تأثرت بها مجارى نهر وورى Wuri ومجرى مبومو Mbomo الأوسط ، وفى منطقة الكرون البركانية ، أما فى الجنوب الشرقى فى كاتنجا الشمالية فقد نشأ أخدود ينحصر بين قمى ميثومبا وهاكانسوى Hakannoon ويبلغ عرضه ٤٠ - ٥٠ كيلو متر يتجه من الجنوب الغربى نحو الشمال الشرقى ، وتنتشر فى قاعة مستنقعات وبحيرات مثل بحيرة أوبمبا Oupemba وبحيرة كيزالى Kisalé التى تمثل مجرى النهر لوالابا ، ولم تستقر الظروف فى هذه المنطقة بعد فلا زالت عرضة للثوران البركانى والزلازل ، كما يعد حوض نهر لوفيرا Loufira الاوسط أخدودا صغيرا ، كما أن بحيرتى مويرو وبنجويلو تشغلان منخفضين والواقع ان هذه الحركات التكتونية مرتبطة ومشابهة لما حدث فى الشرق فى منطقة الاخدود الافريقى التى تجاور اقليم كاتنجا .

ولكن أحدث هذه التكوينات الرسوبية رواسب بحيرية تسمى تكوينات بوصيرا خلفتها بحيرة الكونغو الكبيرة بعد أن جفت ولم يبق منها سوى حيرة ايوبولد الثانى وبحيرة تومبا ( انظر خريطة رقم ٥٢ ) .

السطح : وقد تأثر سطح هذه المنطقة بما امتاز به تطورها الجيولوجى من هدوء فيما عدا مناطق الاطراف ، فالقاع مسطح متسع يمتد على وتيرة واحدة تغطيه تكوينات مستوية سميكة ، يتدرج نحو الجوانب فى شكل مدرج الى هضاب مرتفعة لا يعوزها التجانس والتشابه ، فقلما تتخللها سلاسل جبلية أو يقطع أطرافها منخفض صغير ، ويعد نهر الكونغو بمجاريه العديدة ولم يبق من آثارها سوى بحيرة ليوبولد الثانى وتومبا ومستنقعات تنتشر التى تنتشر فى شكل مروحة لتلتقى نحو الغرب أهم ظاهرة فى هذه المنطقة ويشق طريقه عبر حافة الهضبة ليهو الى السهل الساحلى الضيق ويفرغ الكونغو وروافده الى منخفضين : أحدهما ويتخذ شكلا بيضيا يتجه من

الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي ليساير مجرى الكونغو بين ستانلى فولز حتى قرب ستانلى بول Stanley Pool ، كما يضم المجارى الدنياى والوسطى من الروافد الشمالية والجنوبية مثل لومامى وكساي وأوبانجى وسنجا ، ولا يربو متوسط منسوب هذا الحوض عن ٥٠٠ متر ، تشق فيه الانهار بمجاريها المتسعة الناضجة البطيئة ديانا عميقة فى الرواسب البحرية التى تطمر قلب الحوض الذى ليس الا قاع البحيرة التى جفت ، مياهه فى المحيط ، ويمكن أن نقسم المنخفض الاوسط ، الذى يشغله نهر



- خريطة جيولوجية لأفريقيا الوسطى
- ١ - كتلة الأوزيم (الجزء الأكبر من إفريقيا)
  - ٢ - أراضي براتة حديثة
  - ٣ - تكوينات كوتونجور والديا
  - ٤ - لوبيدش
  - ٥ - تكوينات ساحل إفريقيا المتدقات
  - ٦ - قبة قديم (برسيل)
  - ٧ - فطرط الأوكساي

( خريطة رقم ٥٢ )

عند ملتقى الكونغو برفنديه منجالا ولولوتجا ، أما المنخفض الاخر الذى يتخذ شكلا شبه دائرى ، فيمتد فى الجنوب والشرق من الحوض السالف الذكر بين كاساي وولى ، ويتراوح ارتفاعه بين ٥٠٠ و ١٠٠٠ متر ، وهى تمتاز بمجاريها المائية العميقة النشيطة التى تعترضها عند اتصالها فجأة بالحوض

الداخلى الجنادل التى تمثل الخط الذى تمتد على طولها بانتظام بين كآساي وولى منطقة الانتقال بين الحوضين ، والواقع أن المنطقة الخارجية قد تأثرت منذ العصر الجوراسى بحركات الارتفاع مما طبعها بطابع يختلف عن الحوض الداخلى ، وان كان يسودها التجانس والتشابه من حيث أن نظام السطح فى كل منهما يسير على وتيرة واحدة ٠ ويبدو أن المنطقة الجنوبية أقل تباينا فى مظاهر سطحها من سائر الهضاب الخارجية المحيطة بالحوض ، فيمتد من هضبة بيا Bie نجد مرتفع الى اعلى روافد كساي العديدة يتجه شرقا حتى يصل الى قمم ميتومبا Mitoumba التى تشرف على بحيرة تنجانيقا ، أما اذا اتجهنا نحو الشرق فان مظاهر السطح يبدو عليها التباين فمنطقة كاتنجا الواقعة فى الجنوب الشرق تنقسم الى كاتنجا الشمالية التى تتكون من التواءات كانت تغطيها طبقات كوندانجو ، ولكنها تعرضت للتعرية العنيفة حتى أصبحت فى مجموعها تمثل سس—سهلا تحتاتيا تتخلله بعض الانكسارات والاخاديد الهابطة ، كذلك التى تقع فيها بحيرتا امويرا وبيكاسى كمنخفض بحيرة موترو ، وذلك الذى يمتد فيه اعلى ودئى لولجولا ، أما كاتنجا الجنوبية فان التباين فى سطحها يبدو فى وجود سلسلة من آثار الالتواءات فى العصر الترياسى تمتد بين أعمالى لوالابا وبحيرة بنجويلو ٠ وتمتد سلسلة متصلة من الهضاب المرتفعة فى الشمال تفصل بين حوض بحر الغزال وحوض الوبانجى ، ولا يقطع هذا الاتصال سوى منخفض يسير فيه وتتابع سلسلة من الهضاب من الكمرون Sango اعلى نهر سانجو جنوبا حتى هضبة لواندا ، فتظهر حافات الهضاب التى تبدو من السهول الساحلى الضيق المنخفض كحافات جبال يطلق عليها اسماء مثل Mayombe, Chaillu, Achango, Cristal وقد سبق أن ذكرنا وجود منخفض يجرى فيه اعلى نهر Ogowe وروافده لزندو Livindo وهكدا لا نجد فى هذا النطاق المتصل الذى يدور حول حوض الكنغو المنخفض من الهضاب الا منخفضات كاتنجا الشمالية فى الجنوب الشرقى ، ومنخفضا سانجو وأوبجوين Ogowe, Sango فى الشمال الغربى ٠

ويمتد بين حافة الهضاب وبين ساحل المحيط الاطلنطى سهل ساحلى ضيق لا يتجاوز عرضه ١٠٠ كيلو متر فى الشمال والجنوب ، على حين يصل الى ٣٠٠ كيلو متر فى الجزء الأوسط حيث يتسع بفضل رواسب الكنغو وأجوى التى يحملها تيار بنجويلا ليرسبها عند حافة الكتلة

الافريقية شمالا حتى رأس لوبيز Lopez ويمتاز ساحل افريقية الوسطى بالبساطة لما يسود السطح من تشابه كبير ، ولانتشار الكتل المتصلة التي قلما يبدو فيها التباين ، حتى أنه يقدر أن المرافئ الطبيعية لا تتجاوز ستة على طول الساحل الذي يناهز طوله ١٨٠٠ كيلو متر ، ففي الجزء الشمالي من جبل الكمرون ورأس ليمبو Limbo لا يزيد ارتفاع السهل الساحلى عن ٥٠ متر فوق منسوب البحر ، الذى ينحدر اليه فى بطء شديد حتى الرصيف القارى المغمور حديثا والذى لا يتجاوز عمقه ١٠٠ متر حتى مسافة ٥٥ كيلو مترا من الساحل ، ثم يليه أعماق المحيط السحيقة المفاجئة ، أما فى الجزء الاوسط عند مصب الكنغو فتمتد بقية الدلتا مغمورة اتخذت شكل مثلث قاعدته تتجه نحو المحيط ، ويوجد على طول مصب الكنغو مجرى قديم عميق محفور فى قاع المحيط ، ولا يزال التيار المائى يحمل ما يعترضه من رواسب فيلقى بها فى المنطقة التى تتجه من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى من مصب الكنغو حتى رأس لوبيز ، وهكذا يبدو هذا الجزء من الساحل مستقيما مستويا تغطيه الرمال ، ويقع خلف الكثبان الرملية التى تمتد على الشاطئ مجموعة من البحيرات مقفلة ، ويشبه الساحل فى جنوب مصب الكنغو - ما كان عليه الى شمال هذا المصب سواء فى اتجاهه أو صفاته المميزة - فهو مستو مستقيم رملى ، ونهر كواتزا بما يلقىه من رواسب - تعد أقل مقدارا مما يحمله الكنغو قد أدى بفضل نشاط تيار بنجويلا الى تكوين رأس امبو التى تبدو صورة مكررة رأس لوبيز .

ويمتاز الساحل الذى يمتد من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى بين رأس لوبيز ورأس لوبو بأنه مستقيم قليل التعاريج والمرافئ ، فليس من السهل افتتاحه أو إقامة الموانئ الطبيعية فيه ، أما فى امتداده نحو الشمال بين لوبيز وخليج دوالا فان الساحل يتجه من الجنوب الى الشمال ولا يتعرض لتراكم الرواسب .

وإذا كان للبنية تأثير واضح ينعكس على السطح ومظاهره ، فان لها أيضا أثرها فى تمييز المناطق المختلفة على أساس اقليمي من جانب وعلى التباين فى الثروة المعدنية والاقتصادية من جانب آخر ، فمناطق الاطراف بصخورها المتبلورة القديمة تعد مصدر الثروة المعدنية ، فصخور العصر السابق للكمبرى الأسفل غنية بالمنجنيز والذهب ، أما الاوسط فيعد مصدرا للمصدير والتنجستن والتانتينوم وبخاصة فى الجزء الاوسط الشرقى ، أما

الأعلى فى جنوب شرق كاتنجا فصخوره غنية بالنحاس والكوبالت والزنك  
ورالصااص والفضة والنيكل .

## المناخ :

يخترق خط الاستواء هذه المنطقة فيمر بحوض الكنغو فى أكثر بقاء .  
انخفاضها عند التقاء النهر بأوبانجى وسانجا ، ولكن خط الاستواء الحرارى  
يقع عند عرض ٥° شمالا ، ولذلك فان المناطق التى يسودها المناخ  
الاستوائى بحرارته المرتفعة التى تمضى على وثيرة واحدة دون اختلاف  
فصلى يذكر وبأمطاره الغزيرة التى تبلغ قمته فى فصلين أثناء العمام  
تقتصر على المنطقة بين نهر الكنغو والأوبانجى . ولكن لظروف السطح  
تأثيرها الواضح فى المناخ ، فقلب الاقليم الذى يحتله حوض الكونغو يتكون  
من منخفض مستوى يبلغ متوسط ارتفاعه ٣٠٠ متر فوق منسوب البحر ،  
ويرتفع المنخفض على جوانبه الى سطح الهضبة الافريقية ، ففى الشرق  
يبلغ ارتفاعها الى ١٠٠٠ متر بل تصل نحو ٢٠٠٠ متر فى كتلة رونزورى ،  
ولكن الفرع الغربى من الاخدود الذى يمثل الظاهرة الرئيسية فى تضاريس  
تلك المنطقة يقل ارتفاعه جنوبا نحو بحيرة تنجانيقا وشمالا نحو بحيرة  
البرت ، ولذلك ترتفع هذه المنطقة الشرقية الى المناخ البارد ، أما فى الغرب  
فتمتد سلسلة جبلية هى فى الواقع حافة الهضبة لتحبب تأثير المحيط عن  
التغلغل فى الداخل ، فالمحيط يؤثر فى المناخ فى المنطقة الساحلية عن  
طريقين ، الأول هو تعرض الجزء الشمالى من المنطقة الساحلية بين رأس  
لوبينز وخليج دوالا وخليج غانة للرياح الغربية والجنوبية الغربية التى  
تسبب سقوط المطر الغزير فى هذه الشقة من الساحل ، أما الثانى فهو مرور  
تيار بنجويلا البارد الذى تزداد مياهه كلما أوغل متجها نحو الشمال ،  
فأثاره التى تتلخص فى هبوط الرطوبة والميل للجفاف وانخفاض درجة  
الحرارة أكثر وضوحا فى أنجولا منها عند مصب نهر كوانزا ، كما تصبح  
أقل ظهورا عند مصب نهر الكنغو . وتتأثر الحرارة التى تمتاز بارتفاعها  
وقلة الفرق الحرارى الفصلى بمرور تيار بنجويلا ، فيبلغ متوسطها ٢٦ م  
فى بنانا عند مصب نهر الكنغو ، وترتفع هنا المتوسط كلما توغلنا نحو  
الداخل فيصل الى ٢٧° و ٢٨° درجة فى وسط منخفض الكونغو ، ويزداد  
ارتفاعا كلما بعدنا شمالا فى منطقة الأوبانجى ، حيث يصل متوسط الحرارة

الى ٣٠° م ، أما فى الهضاب المرتفعة المحيطة بالمنخفض فتنخفض الحرارة التى لا تزيد على ٢٣° م فى اقليم كاتنجا . وقد قدر متوسط المدى الحرارى الفصلى بنحو ٢٥° م فى نحو ٢٥° محطة فى الكونغو ، وهى اقل كثيرا من الفرق الحرارى اليومى الذى يبلغ أدناه على الساحل ( لوأده ٣° م وبنانا ٣° م ) ، واقصاه فى الجهات الداخلية حيث يصل الى ٧° فى كيموينزا Kimouenza . وان كان يصل هذا المدى فى فصل الجفاف الى ٨٥° م فى بنانا و ٧° و ١٠° م فى كيموينزا .

يتعرض الكونغو فى أجزائه الجنوبية والغربية فى الشتاء للتيار الهوائى البحرى الجنوبى الغربى القادم من المحيط الاطلنطى ولكنه لا يتوغل فى الداخل أكثر من خط طول ١٨ شرقا تاركا الاجزاء الوسطى والشرقية من المنطقة الواقعة جنوبى خط يمتد من جوبا حتى بورت فرانكى لتهب عليها الرياح المدارية الرطبة من المحيط الهندى ، أما التيار القارى الشمالى فلا يظهر فى ذلك الفصل فى حوض الكونغو .

ويسقط المطر الغزير فى حوض الكونغو ، ويتأثر فى مقداره وموسم سقوطه بعوامل متعددة أهمها : موقع المنطقة بالنسبة للبحر وللتيارات الهوائية وخط العرض ونظام الضغط ونوع الرياح وطبيعة التضاريس ، فيسقط نحو متر ونصف من المطر فى العام فى منخفض حوض الكونغو والجبال الساحلية ، وقد تصل هذه الامطار الى نحو مترين فى الشقة الساحلية الشمالية بين رأس لوبيز وخليج بيافرا وجبال الكمرون ، أما الهضاب الشمالية والشرقية والجنوبية فيتراوح المطر فيها بين متر ومتر ونصف ، أما جنوب مصب الكونغو فيسوده المناخ شبه الجاف ، فلا يزيد متوسط المطر عن نصف متر على الساحل وان كان يزيد الى متر فى الداخل ، بل قد يصل الى متر ونصف فى بعض الجهات المرتفعة كهضبة لوأندا . ويختلف نظام سقوط المطر فى حوض الكونغو الداخلى حيث يسود المناخ الاستوائى بأقطاره الغزيرة طول العام التى يمكن أن نميز فيها فصلين للمطر الغزير فى الربيع والخريف ، يفصلان بين موسمين للجفاف النسبى ، ويختلف ذلك عن نظام سقوط المطر فى الهضاب الواقعة الى جنوب الحوض ، أو الشمالية حيث يسقط المطر فى الصيف غزيرا . وفى نورو Negro فى حوض الايبانجى نلاحظ فصلا للمطر الغزير بين مايو ونوفمبر ، وفصلا يسقط فيه بعض الامطار




لقرب المحطة من خط الاستواء بين ديسمبر وأبريل ، أما فى هضبة كاتنجا التى تبعد عن خط الاستواء فيظهر فصل الجفاف التام بين مايو وأكتوبر ، على حين يسقط المطر بين نوفمبر وأبريل . كما يوجد شمال مصب الكونغو نخلام لسقوط المطر يشبه النظام الذى يسود فى منخفض الكونغو ، قد يصل المطر الساقط الى مترين بل الى ثلاثة أمتار ولكن يغزر المطر فى الاعتدالين وبخاصة فى نوفمبر حيث يبلغ ثلاثة أمثال ما يسقط فى الجهات الداخلية الواقعة على نفس العرض . ولكن فصلى الجفاف أكثر وضوحا هنا عنهما فى داخل الحوض ، فأحد الفصلين وهو الصيف جاف تماما تقريبا ، كما يقل المطر فى الشتاء أما الى جنوب رأس لوبيز فيؤدى مرور تيار بنجويلا البارد الى ندرة الامطار وبخاصة على الساحل كلما توغلنا بعيدا من نهر الكونغو نحو الجنوب ( انظر خريطة رقم ٥٣ ) .

### النوع المناخ :

ويمكن أن نقسم هذه المنطقة الى أقاليم مناخية تختلف تبعا لنظام سقوط المطر وأهم الاقاليم هى :

١ - مناخ حوض الكونغو الاستوائى : يسود فى الحوض الاوسط مستوى السطح ، وينحصر بين الحدود الشمالية لزائير عند أوبانجى - بومو وخط عرض ٥ جنوبا ، ويقدر متوسط الحرارة بنحو ٢٥ر٥ م ، ولا يربو متوسط الفرق الحرارى السنوى عن ٥رام ، ويعد مارس وأبريل أقل شهور السنة حرارة ، على حين تقل الحرارة فى يوليو وأغسطس نسبيا ، ولكن المدى اليومى للحرارة مرتفع إذ يصل الى نحو ١٠م ، وان كانت حرارة النهار ليست مرتفعة كثيرا فان الليل يظل حارا رطبا فلا تقل حرارته عن ١٩م ، ويقدر متوسط المطر بنحو مترين على الجوانب ونحو ٢٢متر فى قلب المنخفض ، ويقل المطر هنا عن حوض الامازون مثلا لاسباب متعددة أهمها ارتفاع الحوض ومرور التيار البارد ، وامتداد حاجز بين الجبال يحجب رياح الساحل المطيرة عن التوغل فى الداخل فى سهولة ويسر ، ويسقط أكثر المطر على امتداد خط الاستواء فى فصلين ، الأول يمتد بين سبتمبر ونوفمبر، والثانى بين مارس ويونيو ، ولكن الفصل الاول أغزر مطرا .

أما الى شمال خط الاستواء فيمتد فصل المطر بين مارس ونوفمبر ويقل



الكنغورون قبيل وجابونك (أفضارية)

( خريطة رقم ٥٣ )

المطر فى يونيو ويوليو ، أما الى الجنوب فينحصر فصل المطر بين ديسمبر  
ومايو وان كان يقل فى ديسمبر ويناير ، وتشهد رطوبة الهواء كما يكثر  
السحاب والضباب ويسقط أكثر المطر بخاصة فى فصل المطر اثناء  
الليل والصباح المبكر ، وان كان يسقط كذلك بعد الظهر ، وبخاصة  
فى فصل الجفاف .

٢ - اقليم شمال الكنغو ، واطليم أويانجى : تضم هذه المنطقة الهضاب  
التي يخترقها نهر الاويانجى التي تمثل منطقة تقسيم المياه بين الكنغو  
والنيل . ويمتاز المناخ هنا بأنه مدارى اذ يقتصر فصل المطر على الصيف  
بين مايو واکتوبر ، بينما يظهر موسم جاف بوضوح ، وبخاصة فى يناير  
وديسمبر ، ولكن لقرب هذا الاقليم من خط الاستواء الحرارى نجد أن فصل  
الجفاف ، لا يخلو من المطر كما أنه رغم ارتفاعه لا تهبط فيه الحرارة كثيرا  
ولذلك فهو أشبه بالاقليم دون الاستوائى منه بالاقليم المدارى البحت .

٣ - إقليم الجوانب الغربية ( إقليم جابون ) يضم هذا الاقليم الجزء الشمالى من السهل الساحلى الذى يطل على المحيط الاطلنطى ، كما يشمل الهضاب والجبال الداخلية التى تفصل السهل الساحلى عن منخفض الكنغو فى الداخل ، ويمتاز بغزارة مطره الذى يشبه الاقليم الداخلى فى وجود موسمين للمطر ، وان كان يختلف عنه فى أن موسمى الجفاف فى يشهد فيهما الجفاف حقا ، فيكاد يعتبر شهرى يونيو ويوليو جافين تماما تقريبا فى بعض جهات هذا الاقليم ، والواقع أن المطر الذى يبلغ متوسطه مترين يعد موزعا توزيعا متناسبا على مدار السنة .

٤ - اقاليم الجنوب الغربى ( إقليم بنجويلا ) ويمتد هذا الاقليم الذى يعزى جفافه - وهو أهم خصائصه - الى مرور تيار بنجويلا - فى منطقة ساحلية ضيقة فى الجنوب الغربى ، ويقل المطر فيه عن نصف متر ، كما تنخفض فيه الحرارة من حيث متوسطها ومداهما السنوى .

٥ - اقليم الحافة الجنوبية ( إقليم كاتنجا ) وهو يمثل المناخ المدارى ، وهو يمتد من هضبة لوانده عبر اقليم كاتنجا حتى حافة الفرع الغربى من الاخدود الافريقى ، ويعد بفضل ارتفاعه وانخفاض حرارته التى تعتبر أقل مناطق الكنغو فى هذه الناحية أكثر الجهات صلاحية لسكنى الاوربيين ، كما تهبط الحرارة بين يونيو وأغسطس حتى يقدر متوسطها فى اليزابثيل ( لوبمباشى ) فى يوليو بنحو ١٦° م ، كما أن أكتوبر وهو أكثر الشهور حرارة لا يتجاوز ٢٤ م ، ويسقط به نحو متر من الامطار فى خلال سبعة أشهر ، فيظهر فصل الشتاء الجاف بين مايو وأغسطس ، وقد كان هذا الاقليم بفضل مناخه وملاءمته لسكنى الاوربيين وغناه وبخاصة فى الثروة المعدنية من أكثر الاقاليم اجتذابا للعمران والسكان .

تغطى الغابات الاستوائية المتنوعة الاشجار والنباتات نصف مساحة الكنغو ، وهى تختلف بين غابات الدهاليز وغابات الهضبة وغابات الجهات المنخفضة وغابات المستنقعات ، ولا يستغل منها الا ١٠٪ ولا يصلح منها للاستغلال ٥٪ ، ويستهلك الخشب محليا ، واشجار الغابات لا تمثل الغطاء الأول للنبات ، كما تنتشر الادغال حيث تختلط الاشجار بحشائش السفانا وتندرج على المرتفعات كروتزورى حيث تنمو الحشائش بين ٥٠٠ - ٥٠٠ م

٨٠٠٠ قدم ، والخيزران الى منسوب ٨٧٥٠ قدم ، والخليج الى ١٢٣٥٠ قدم حتى النباتات الالبية والانهار الثلجية .

### نظام صرف المياه :

تكونت مظاهر التضاريس الرئيسية فى افريقية الوسطى منذ وقت مبكر من الناحية الجيولوجية ، فأخذت المجارى المائية قبل ظهور الجليد فى العصر البرمى تنحدر من جوانب المنخفض الى قاعه الذى كانت تنتشر فيه البحيرات العديدة أو بحيرة واحدة كبيرة ، وقد انفسح المجال أمام هذه الوديان لتبلغ مرحلة النضوج ، ولكن فى منتصف الزمن الثانى تعرضت هذه المنطقة لحركات تكتونية رافعة أدت الى ظهور تلال فى مناطق مختلفة ، فبدلا من وجود منخفض تنحدر اليه الجوانب تدريجيا ، ظهر هناك نطاق من الهضاب المرتفعة يحف بالمنخفض الذى انقسم بدوره الى منطقة متوسطة تحيط بالمنخفض نفسه ، وعلى اثر ذلك أخذت المجارى المائية تنقسم الى قسمين يجرى جزء منها فى الهضاب المرتفعة بينما يجرى الاخر فى الهضبة الوسطى يفصلهما منطقة تكثر فيها الجنادل والشلالات ، ومنذ ذلك الحين أخذت هذه العقبات تتراجع حتى أصبحت أقل وضوحا مما كانت عليه ، ولكن المنخفض الاوسط كانت تشغله بحيرة . وحين تكون المحيط الاطلسى الجنوبى وانفصلت كتلة البرازيل عن بقية الكتلة الافريقية ، وظهرت حافة الهضبة التى تطل على ساحل المحيط أخذت الانهار تنحدر من هذه الجبال نحو المحيط على حين أخذت تنحدر متراجعة نحو منابعها فوصل أحداها الى منخفض الكونغو ، وانصرفت مياه البحيرة اليه ، وتكون الكونغو الاوسط والادنى بارتباط البحيرات الباقية بمجرى مائى كان يشق طريقه عبر دلتا متسعة هبطت أجزاء واسعة منها بعد عصر الميوسين حين تعرضت المنطقة الساحلية لحركة الهبوط ، ثم اتصلت اعلى المجارى المائية التى كانت تشق طريقها بين الهضاب والمنطقة الوسطى ، وقد خفت حدة الانحدار بمضى الزمن على حين لا تزال المجموعة الثانية التى تمتد بين المنطقة الوسطى والحوض الداخلى قوية نشيطة .

وهكذا يعزى الى طبيعة تكوين حوض الكونغو وما حدث فيه من حركات تكتونية لاحقة انقسام المجارى المائية الى أجزاء متميزة أحدها يجرى على


الهضبة والثاني فى المنطقة أو المدرج الاوسط والثالث فى قاع المنخفض فتعرضها مجموعتان من الجنادل والشلالات ، ولكن ترك هناك مجموعة ثالثة من الجنادل تعرض طريقه نحو المصب ، كما ان تطور القاع المنخفض الذى كان مصبا للمجارى المائية التى اصبحت فيما بعد روافد الكنغو - حين كانت تحتله بحيرة جفت لتجرى مكانها هذه الروافد - هو الذى ادى الى التقاء هذه الروافد فى شكل مروحي ، ويعد الكنغو أجسد الانهار الكبرى فى العالم ان يبلغ طوله نحو ٦٤٠ كيلومترًا ومساحة حوضه ٢٠٠٠٠٠٠٠ كم<sup>٢</sup> ، كما يتراوح تصريفه فى الدقيقة بين ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ كم<sup>٣</sup> ، الى اساقط والجنادل تعزى الى سببين رئيسيين هما انتقال النهر من تكوينات جيولوجية الى تكوينات أخرى أحدث منها عند الحافات ، التى نشأت نتيجة للتعرية ، ثم حركات رفع الجوانب .

ينبع النهر فى منطقة كاتنجا ويعبر باسم لاولابا Loualaba حتى تعرضه شلالات استانلى Stanley Falls ، ويشق النهر طريقه وسط أخدود انكسارى تحف به جبال ميتومبا Mitoumba ويسمى هنا الخائق باسم نزولى Nzoli الذى ينتهى عند شلالات كوندى Konde ، ويتصل بالنهر بعد ذلك روافده كولشاو الذى يقترب من اعلى الزمبىزى ، ثم يتسع مجراه حتى تتحول بعض أجزاء هذا المجرى الى بحيرات مثل Kisalé وبحيرة أوبيميا Oupemba ويلتقى بالنهر بعد ذلك روافده Louroua الذى يتصل ببحيرة تنجانيقا ، وهو صالح للملاحة من بوكاما Boukama عند نهاية شلالات كوندى Kondé حتى ينتقل المجرى من طبقات لوبيلاش من الحجر الرملى اللين الى الصخور النارية الصلبة عند مساقط بوابة الحديد Pore de Fer ، وينتقل النهر من هذه الصخور الاركية الى صخور الحجر الرملى الصلبة من تكوينات كوندلنجو ، ولذلك يظل خانقا ضيقا غير صالح للملاحة حتى شلالات شامبو Chambo ليعود فيجرى على طبقات لوبيلاش اللينة من الحجر الرملى ويصبح عند كندو Kindou متسعًا صالحًا للملاحة حتى أوبندو بونثيرفيل Ponthierville ، ولكنه سرعان ما يجرى فى منطقة الانتقال بين الهضبة المتوسطة وقاع المنخفض لتعرضه شلالات ستانلى ، فتبدو تكوينات الجرانيت والحجر الرملى من طبقات كوندلنجو ، ولكن من مدينة كيسانجان ستانلى فيل يبدأ نهر الكنغو الذى يصبح جديرا

بهذا الاسم فى السير فى قاع المنخفض ، فيفيض مجراه بمياهه و  
تنتشر فيه الجزائر والمستنقعات ويتسع حتى يبلغ عرضه نحو ٢٠  
كليو مترا لتتصل به روافد عديدة على جانبيه ، ويظل يشق طريقه بطيئا  
حتى يبلغ مجراه أقصى اتساعه فى ستانلى بول Stanley Pool ، ثم يقترب  
من حافة الهضبة الغربية حيث تعترضه تكوينات سميكة من الحجر  
الرملى من طبقات كودلنجو ، ثم يخترق خانقا يبلغ اتساعه ٤٠٠ متر لمسافة  
٣٦٠ كيلو مترا حيث تهبط ٢٢٠ مترا ويجتاز نحو ٢٢ من المساقط ومن  
الجنادل تسمى شلالات لفنجستون ، ثم يعود متسعا عند متادى ، وان كان  
يظل عميقا ولكنه يصبح صالحا للملاحة حتى يبلغ رأس خليجه عند Boma

كان الكنفو كينشاسا المستعمرة الاوربية الوحيدة التى يقع أكثرها فى  
وسط القارة وفى شطرها الاستوائى . وتقدر مساحته بنحو ٥٩٠٩ر٤٥٣٤٢كم<sup>٢</sup>  
ويسكن زائير ٣٤ مليون نسمة ، على حين كان عددهم لا يتجاوز  
١٠٣٥٣٩٠٩ نسمة سنة ١٩٤٠ ، ويبدو أن ظروف الاستعمار لم تساعد  
على نمو السكان ، بل على النقيض يرى البعض أن السكان قد قلوا عما  
كانوا عليه فى أول عهد هذه البلاد بالاستعمار ، فلا غرو أن واجهت البلاد  
مشكلة قلة الايدى العاملة وبخاصة فى مناطق التعدين فى كاتنجا . وقد  
يظن البعض أن الكنفو أصبح لزيادة عدد سكانه من الاوروبيين مستعمرة  
صالحة لاستيطانهم ، فقد قدر عدد الاوروبيين سنة ١٩٣٦ بـ ١٨٦٨٣  
نسمة منهم ١٢٦٥٤ من البلجيكيين الذين يضمون الموظفين ورجال الشركات  
والبوليس والفرق العسكرية ويعمل كثيرون فى المواصلات وشركات التعدين  
فى كاتنجا ، ولكن بلغ عدد الاوروبيين سنة ١٩٤٠ - ٢٣٧٣٥ نسمة ثم  
٥٩١٥٧ سنة ١٩٥٠ . وقد فكر الكثيرون من البلجيكيين فى انشاء مزارع  
للبيض فى بعض جهات الكنفو وبخاصة فى الفترة ١٩٠٨ - ١٩١٤ حين  
أوقفت هذه التجربة خشية مزاحمة الوطنيين ، واقترح أن يكون ذلك مقصورا  
على الجهات الشرقية القليلة السكان ، ولكن ثروة هذه الجهات المعدنية لم  
تتح الفرصة لاستغلال هذه المناطق على هذا النحو ( انظر خريطة رقم ٥٥ ) .

تضاربت الاشاعات عن ثروة هذه البلاد المعدنية ، فعلى حين ظن  
البعض مما كان يحمله الوطنيون للساحل من كتل النحاس والحديد ، بل  
والذهب أنها بلاد غنية بمعادنها ، رسم الرحالة صورة غير مشجعة للبلاد



قطع طولی للکنو - اوساخی - ساخا - بچو کو

( خريطة رقم ۵۴ )


التي تجشموا المتاعب في سبيل اختراقها ، فظلت هذه المنطقة مصدرا للرقيق وللايدي العاملة الرخيصة فحسب حتى الربع الاخير من القرن الماضي ، حين اكتشفت مناجم الذهب والنحاس من وتوتز زراند Witwatersrand في الترنسفال شمالا الى روديسيا ، حتى بلغت كاتنجا ، اثار هذا النشاط التعدينى ، فكشفت الذهب ومعه النحاس ، والقصدير ، والماس ، والحديد ، والفحم ، والبترول . فاستغلت مناجم النحاس سنة ١٩٠٦ ، وبلغ انتاجها ١٠٠٠ طن سنة ١٩١١ ، ثم اطرقت زيادته حتى تجاوز ١٥٠ الف طن الان . ثم اكتشف في كاتنجا الشمالية ، وبالقرب من بحيرات كيفو وأدورد مناجم القصدير ، ثم استخرج الذهب في اعلى ويلي في الشمال الشرقى عند Moto Kilo .

تقدر ثروة زائير المعدنية بنحو ١٤٠ مليون جنيه في العالم ، يمثل النحاس نصف القيمة ، ويوجد بها نحو ٣٠٠ منجم ، ٣٠٠ محجر ، ١٠٠ مصنع للتكرير المعدنى تملكها ستون شركة ، ولكنها تستخدم نحو ١٢٠ر٠٠٠ من الكنغوليين ، ٣٥٠٠ من الاوربيين عادة للتوسع في استخدام الطرق الآلية .

ورغم أن هذه المنطقة الشرقية ظلت أهم مناطق التعدين ، فقد اكتشفت النحاس في أقصى الغرب عند مصب الكنغو بين متسادى وكنشاسا ، ثم استخراج الماس من مناجمه عند كسئاي ، وللتعدين أهمية كبرى في حياة زائير الاقتصادية فلزال في دور التعدين ، وتنقسم التكوينات الجيولوجية التي تحتوى على المعادن الى قسمين ، الاول : التكوينات الرسوبية التي لم تتعرض للالتواء ، وتعد أحدث نسبيا من التكوينات التي تعرضت للالتواء ، والتي تتصل بها التكوينات الاركية . وتشمل التكوينات الاولى الفحم والماس ، وذلك انها تنتمى الى الفترة بين البرمي واول الجوراسى ، وهى من طبقات اللوبيلاش التي تراكمت في البحيرات العميقة . ومن ثم أصبحت غنية بطبقات الفحم ، فتوجد حقول الفحم عند مخرج لوكاجا من بحيرة تنجانيقا الى الجنوب من مدينة البرت فيل .

ويوجد حقل أقل غنى ، وأن كان لا يقل أهمية عن الحقل السالف لقربه من مناطق استخراج النحاس في Kambove ومصانعه ومصاهره





مناطق الاقتصاد الكنفوالبلجيك

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| ١٠ - مناطق التصدير الرئيسية | ٥ - مناطق تربية الماشية |
| ٩ - مزارع تخفيف التربة      | ٦ - " " الفسيل          |
| ٨ - مزارع المطاط            | ٧ - السلك الحديدية      |
| ٧ - " " القطن               | ٨ - الطرق الرئيسية      |
|                             | ٩ - مجاري ملاحيية       |
|                             | ١٠ - حدود سيانسيه       |

( خريطة رقم ٥٥ )

Ladotville ويسمى هذا الحقل الثانى لونا Luena . ويقع بالقرب من بوكاما على أعالى نهر لوالابا وقد كانت مناجم القصدير التى تمتد على الجانبين شمالا وجنوبا على طول السكة الحديدية بين بوكاما ولوبمباشى ( اليزابث فيل ) ، عاصمة كاتنجا تحصل هى ومناجم النحاس فى هذه المنطقة نفسها والى الجنوب منها فى كاتنجا على الفحم من مناجم وانكى على بعد ١٢٠٠ كيلو متر من اليزابث فيل ، وينقل الفحم من لوكوجا ولونا الى كاتنجا بالسكك الحديدية والطريق النهري ، ولكن الان يولد الكهرباء الذى كان ينقل جانب منها من كاتنجا الى نطاق النحاس فى روديسثيا قبل توليد الكهرباء من كاريبا .

وقد عثر على بعض الماس فى تكوينات لوبيسلاش من الحجر الرملى وقد وجد أكثره فى الغرين ، وقد يعثر عليه فى الطبقات العليا لهذه التكوينات التى تمتد فى شكل نطاق يحيط بمنخفض الكنغو ، ولذلك فهى أهم معدن فى الكنغو المنخفض ، ويستخرج من منطقتى تشيكايا Tshikapa على نهر كساي لكوانجا Lakwanga ، وتقدر قيمة الماس بثلاثة أرباع قيمة ماس غانة فقط .

أما المعادن الفلزية فتوجد فى التكوينات القديمة التى تعرضت للتواءات ثم نحتتها التعرية ، وفى الصخور الاركية القديمة ورواسب أوائل الزمن الأول عثر على القصدير والذهب ، ولذلك تظهر هذه المعادن فى الشرق ، والشمال الشرقى حتى كاتنجا الجنوبية حيث تسود طبقات كودلنوجو التى تعرضت فى حركة معاصرة للهرسينية للتواءات عنيفة فى كاتنجا . فلا غرو أن انتشرت فيها العروق المعدنية لاعماق كبيرة ، على حين تقل أهمية هذه العروق فى الكنغو الأدنى حيث لم تتعرض طبقات كودلنوجو لمثل هذه الحركات العنيفة ، وليس الفحم على جانب كبير من الأهمية الاقتصادية إذ أن المسافة الطويلة التى يقطعها فى طريقه الى الساحل الغربى للتصدير ومنافسة الاخشاب له فى استخدامه كوقود للبواخر فى نهر الكنغو ، يقصر أهميته على ما يستخدم منه فى سلك حديد الجنوب ، ومناجم هذه المنطقة أيضا ، وتعد مناجم أعالى كاساي الغنية بالماس الثانية فى أفريقية بعد كمبرلى ، ويستخرج الذهب من مناجم تمتد من الشمال عند ولى Wella الى لوكوجا فى الجنوب ، وكله يستخرج من الرواسب ، ولو أن مناجم

الشمال الشرقى فى Kilo-Moto يستخرج منها نحو ١/٢ انتاجها من العروق المعدنية .

ورغم ضالة ما يستخرج من الذهب بالنسبة للانتاج العالمى ، فانه يأتى فى مقدمة صادرات زائير من حيث القيمة ، أما القصدير فيستخرج فى منطقة ممتدة من بحيرة كيفو الى اعالي نهر لوالابا ، ويعد النحاس من أهم المعادن التى عثر عليها فى كاتنجا الجنوبية ، اذ يعد العثور عليه من أهم الأحداث الاقتصادية التى أثرت فى تطور زائير فى فجر حياتها الاقتصادية ويوجد النحاس فى شكل سلفات تقدر نسبة النحاس فيه بـ ٤٪ ، ويستخرج على عمق ٥٠٠ متر من كيبوشى Kipushi غربى اليزابيث فيل ، وقد يصل النحاس والكوبلت والزنك والرصاص والكاديوم والجيرمانيوم ، ويصهر النحاس لصناعة خام (٩٩٪) فيه من معدن النحاس ويستخدم طريق الذكرير الكهربائى لفصله عن العناصر السابقة ، أو يوجد فى صورة أكاسيد حيث يستخرج من سطح الأرض .

والواقع أن ضم كاتنجا التى تقع خارج النطاق الاستوائى الى الكونغو وهو أمر فطن له ليوبولد ملك بلجيكا قد خلق مجالا واسعا للاستثمار والاستغلال الاقتصادى ، فهذا الاقليم الذى يقع على حافة الهضبة الافريقية الجنوبية ، والذى يعد هامش الكونغو أصبح مركز الجذب فى هذه البلاد الضخمة لا من الناحية الاقتصادية والتجارية والتعدنية فحسب ، بل من الناحية العمرانية أيضا ، فأصبح به أكبر جالية من البيض داخل المدارين ، اذا استثنينا منطقة كينيا المرتفعة ، فحين انتقلت ملكية الكونغو البلجيكى الى الحكومة البلجيكية سنة ١٩٠٨ ، ورثت الحكومة عن الشركات التى حصلت من قبل على الامتيازات الضخمة تلك السياسة التى سار عليها الملك ليوبولد ، فمُنح Comité Spécial du Katanga امتياز نحو ١٠٠ مليون فدان ، أو أكثر أراضى اقليم كاتنجا وقد تولى استخراج النحاس شركة تدعى Union du Haut Katanga التى تحتكر انتاج النحاس الذى ينتج الكونغو منه مقدارا يرشحه لاحتلال المرتبة الخامسة بين الدول المنتجة ، ويمتد نطاق النحاس فى كاتنجا فى تكوينات ما قبل الكامبرى العلوى ، فى نطاق يمتد شمال نطاق النحاس فى زامبيا ، ويقدر طوله بـ ٤٥٠ كم من

٠/٤ فى كاتنجا ، ويستخرج الكوبلت الذى يمثل نفث انتاج العالم منه هنا ، ورغم هذه الاهمية التى اصابها كاتنجا كاقليم من اقاليم الكنفو ، فانها بارتفاعها الذى يبلغ ٠ متوسطه ١٠٠٠ متر وامتداد التكوينات الجيولوجية بينها وبين جارتها فى روديسيا وأنجولا تعد جزءا من الناحية الطبيعية من المنطقة الجنوبية التى تتجه اليها بطبيعتها ، والواقع أن الحدود بين الكنفو وزامبيا تتبع خط تقسيم المياه غير الواضح بين الزمبيزى والكنفو واوالابا . وقد سبق أن اشرنا الى أن مناخ كاتنجا بمطره الصيفى ومداه الحرارى الكبير ، وانفاض حرارته بوجه عام لارتفاعه أكثر ملاءمة لسكنى الاوربيين ، وعلى حين كان المطاط البرى يمثل ٨٠٪ من قيمة صادرات الكنفو سنة ١٩٠٠ أصبح النحاس يحتل مركز الصدارة الى جانب عدد كبير من المعادن سبقت الاشارة اليها ، كالتصدير والذهب والماس . والواقع أن مراكز التعدين قد تأثرت بتوافر وسائل النقل ، فعلى حين نشأت عند حقول Etoile عند لومباشى ، امتدت على خط سكة حديد كاتنجا - الكنفو الادنى عند Kambove ، ثم امتد النشاط الى بوكاما ، كما انتشر جنوب شرق اليزابث فيل عبر الحدود الى روديسيا .

وقد قامت مصانع صهر النحاس فى لومباشى ( اليزابث فيل ) وليكاسى (Jadotville) بعد استخراجها من سطح الارض عند كلويزى حيث يتراوح نسبته بين ٨٦/١ ، ويمثل النحاس ثلث صادرات الكنفو والكوبالت ١٠٪ منها ، وأصبح يصدر النحاس بعد طحنه واعداده ، وبعد أن كانت هذه المنطقة تحتاج الى الكثير من المواد الخام اللازمة لتعدين النحاس فتستوردها من خارج المنطقة ، اكتشفت الفحم سنة ١٩٢٥ وأصبحت حقول لونا عند بوكاما توفر الوقود فضلا عن استغلال الكهرباء من جنرال كورنيه الواقعة على أعلى نهر لوفيرا ، اذ يولد منها نحو ٤٥ الف حصان ، وقد عانت هذه المنطقة من هذا الموقع الداخلى فكان النحاس ينقل عن طريق سكة حديد زامبيا ليصدر جانب كبير منه عن طريق ميناء بيرا حتى انشئت سكة حديد بنجويلا سنة ١٩٣١ فأصبحت لوبيتو المنفذ الرئيسى للنحاس ، والواقع أن هذا الميناء الذى أصبح يربح الكثير من وراء نقل معادن كاتنجا أكثر ملاءمة من ميناء بيرا ، سواء من ناحية قربها من زائير أو من أوربا معا التى تصدر اليها أكثر المعادن . وقد انصرف المسئولون الى التعدين ، فلم تتسع مساحة الاراضى الزراعية رغم ملاءمة التربة والمناخ للزراعة على نطاق صغير أو فى المزارع

الكبيرة ، ورغم ما تبين من امكانيات البلاد الزراعية فلا تزال هذه المنطقة تستورد من جيرانها مقادير كبيرة من الحبوب واللحوم والألبان التى تستهلكها وقد سبق أن ذكرنا وجود جالية أوروبية كبيرة فى كاتنجا ، ولو أن العمل هنا يعتمد على الزنوج من البانتو الذين يبلغ نسبة من يعمل منهم فى مصانع الاوربيين نحو ٢٥% ، وقد أدى انخفاض نسبة كثافة السكان التى لا تتجاوز عشرة فى الكم المربع الى انتقال كثير من هؤلاء العمال مسافات طويلة بعيدا عن ديارهم .

وإعقب هذه المرحلة التعدينية مرحلة الاستغلال الزراعى ، وقد سارت زائير على نظام منح امتيازات كبيرة أو احتكارات لشركات ضخمة ، فقد منحت الشركة التى مدت سكة حديد ( كنشاسا - متادى ) نحو مليون فدان فى أراضي الغابات فى حوض بوبيرا أحد روافد الكونغو ، ولا تزال هذه الشركة تحتكر هذه المساحة التى تسمى Bus-Block دون أن تعنى كثيرا باستغلال امكانياتها الزراعية بل ثروتها الغابية . وفى سنة ١٩١١ منحت شركة Levers Brothers البريطانية خمس مناطق دائرية الشكل منفصلة يبلغ قطر كل منها ١٢٠ كم ، تقع فى أكثر جهات حوض الكونغو غنى وصلاحية لزراعة نخيل الزيت ، ولم تحصل الشركة على كل الاراضى الواقعة داخل نطاق هذه الدائرة ، إذ لا تزيد هذه المساحة مجتمعة عن ١٨ مليون فدان ، انكمشت الى ٣٠٠.٠٠٠ فدان فقط سنة ١٩٤٥ حين انتهى عقد الامتياز لتصبح ملكا خالصا للشركة ، ولا تزيد مساحة أى قطعة داخل نطاق دائرة واحدة عن ٨.٠٠٠ فدان ، وتقع كل هذه المناطق فيما عدا واحدة بين خطى عرض ٣ شمال خط الاستواء وجنوبه . وتستخدم هذه الشركة نحو ٣٠.٠٠٠ من الوطنيين فى مزارعها ومعاصرهما التى تقوم باستخراج وتكوير الزيت فى نحو ثمانية مصانع نشأ أكثرها بالقرب من مناطق احتكار الشركة وقد ظلت مدة طويلة تعتمد على ما يقدمه الوطنيون من ثمار نخيل الزيت البرى ، وان كانت قد كادت تسد حاجتها بما تنتجه مزارعها ، وكان يعتبر ما تدفعه الشركة ثمنا لهذه الثمار مصدرا مهما من مصادر دخل الزراع الذى يسدد منه الضرائب المفروضة عليهم . واذا كان زيت النخيل من أهم المحاصيل التجارية فالقطن يعتبر من الغلات النقدية المهمة ، ويزرع فى المنطقة الشرقية ، ورغم صلاحية المناخ والتربة لزراعته فان الادارة البلجيكية كانت لا تشجع السكان على زراعته لتوفير الايدي العاملة

للمشروعات الاوربية ، كما انها كانت تتبع سياسة اقناع السكان بالانصراف عن انتاج المحاصيل التجارية التى تخصصت مزارع الاوربيين الكبيرة فى انتاجها .

ادخل نظام انشاء نطاقات داخل مناطق السافانا أو الغابات تظهر من النباتات لتزرع زراعة شبه كثيفة ، ثم تترك فترة ١٨ - ٢٠ سنة بورا قبل استئناف زراعتها ، وقد وطن نحو ١٧٠٠٠ أسرة على أساس هذا النظام الذى عرف باسم Paysanants فى هذه النطاقات ، ويوجد نظام آخر للزراعة القليدية يقوم على أساس الزراعة المتنقلة يمارسه نحو ١٧ مليون من أسر الزراع ، ويزرع الكسافا والذرة والموز فى مناطق الغابات والأرز فى الوديان ، على حين يزرع الذرة الرفيعة والذرة الرفيعة السودانية فى مناطق السافانا ، ويقدر أن نحو ربع هذه الغلات يستهلك فى الاسواق المحلية على حين يصدر أربعة محاصيل تجارية هى زيت النخيل والقطن والبن والمطاط ، ينتج الكنغو نحو ١/٢ انتاج العالم من زيت النخيل ، ولكن صادراته من مشتقات نخيل الزيت وتشمل النوى وزيت النوى والثمار وزيتها والكسب لا يربو عن ربع صادرات نيجيريا منها ، واذا كان النخيل البرى وموطنه الكنغو كان يمثل جانبا مهما من الصادرات ، الا انه يساهم بسدس الانتاج ، ويزرع الان فى نصف مليون فدان فى غرب الكنغو ووسطه ، ثلثه فى مزارع صغيرة يملكها الوطنيون والباقي فى مزارع كبيرة تملكها الشركات والافراد من الاجانب . وقد بدأت ثمر الاشجار المغروسة من نخيل الزيت فى الثلاثينات ، ويقدر الان أن نحو ثلاثة أرباعها مثمر . وتنتشر معاصره التى تقدر بنحو ٥٠٠ معصرة تنتج نحو ربع مليون طن من الزيت الجيد فى طول البلاد وعرضها ، وقد أدى تقدم صناعة العصر والتكرير الى تصدير الزيت سواء زيت النوى أو زيت الثمار بنسبة تفوق النوى ، فضلا عن صعوبة النقل الذى يمر فى عدة مراحل مستخدما طرقا للنقل مختلفة الى جانب أن انوا نخيل الزيت الكنغولى تمتاز بصغر النوى .

أما البن الذى يعد من أهم الصادرات فيشمل نوعين : نوع « روبستا » الوطنى الذى يزرع حتى منسوب ١٥٠٠ متر فى مزارع الوطنيين والاجانب فى وسط وشمال الكنغو ، والنوع العربى الذى يتراوح منسوب مزارعه بين ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ متر الذى يزرعه الاوربيون فحسب فى مزارعهم المركزة

فى المرتفعات الشرقية ، أما القطن الذى أدخلت زراعته كمحصول تجارى للوطنيين سنة ١٩١٧ لسد حاجة السوق المحلية ، فقد أصبح يزرع فى ٨٣٥٠٠٠ فدان يملكها ٧٠٠٠٠٠ من المزارعين الوطنيين فى شمال وجنوب الكنفو ، وبعض مناطق من وسطه على السواء ، ويسد سدس الناتج حاجة السوق المحلية على حين كان يسد المصادر منه للسوق البلجيكية نحو سمس حاجتها فقط ، وهو يجنى على مدار السنة لاختلاف فصل الجفاف وهو موسم الجنى ، أما المطاط البرى الذى كان أهم مصادر الثروة فى الكنفو القديمة فلم يعد يستخرج الا فى وقت الحرب ، على حين انتشرت مزارع مطاط « الهيفيا » البرازيلى فى وسط وغرب البلاد الى جانب الكاكاو ونخيل الزيت ، ويزرع الكاكاو فى المناطق القليلة التى تتوافر فيه ظروف التربة الجيدة والمناخ الاستوائى الملائم فى غربى بحيرة تومبا وفى شمال بوما فى الغرب على طول خط عرض ٢ شمالا ، ولصعوبة المواصلات فان كثيرا من غلات المصادرات التى لا تشمل النقل كالموز والكاكاو بل والسكر تتركز قرب مصب الكنفو فى الغرب ٠ والى جانب البن العربى فى المرتفعات الشرقية أدخل الاوربيون فى مزارعهم المنتشرة هناك الطباق والسكونا والشاى والبيرثروم ٠

لا تسمح ظروف المناخ والنبات - وبخاصة حيث ينتشر ذباب التسى تسى - بتربية الحيوان فى جهات الكنفو المنخفضة ، وكن حاجة سكان المدن وعمال المناجم للالبان ومستخرجاتها قد حدث بالاوربيين الى انشاء حظائر لتربية المواشى رغم كثرة نفقاتها فى الجزء المنخفض من الكنفو واقليم كوانجو ، أما الجهات المرتفعة المحيطة بالحوض المنخفض فى الشرق والجنوب والشمال الشرقى فتنتشر بها ماشية الزيبو ، والى جانب استيراد أسماك محفوظة من أنجولا قبل الزائريون على صيد الأسماك النهرية والبحرية ، فيصاد نحو ١٠٠٠٠٠ طن سنويا من أسماك المياه العذبة ( تقابل إنتاج ٣٠٠٠٠٠ من الماشية دن اللحوم ) ، كما يصاد نحو ٣٠٠٠ طن من الاسماك البحرية ، بل يحاول السكان بصيد الحيوانات البرية توفير ما يقابل ١٧٠٠٠ رأس من الماشية من اللحوم ٠

ويشتغل عدد كبير من الوطنيين من البانتو فى مناجم الذهب المعروفة

باسم Kilmoto الواقعة شمال غرب بحيرة البرت ، وقد أدى التوسع فى استخدام الهولنديين سواء فى الادارات الاوربية أو المزارع أو المناجم أو المشروعات الاقتصادية الاخرى الى تفكك المجتمع ، مما حدا بالبعض الى القول بأن السكان قد قلوا عما كانوا عليه عند بدء الاستعمار الاوربى لأسباب منها انتشار مرض النوم - لكثرة الانتقال بعد توفر طرق المواصلات - بعد أن كان مقصورا عند مقدم الاوربيين على الساحل الغربى \* ولم يعن البلجيكيون كثيرا بالحكم غير المباشر ، فقد قسموا الكنفو اولا سنة ١٩١٤ الى أربع مقاطعات هى Congo-Kasai وخط الاستواء وكاتنجا ، والشرقية Oriental ثم أضيفت اليها رواندا أورندى سنة ١٩٢٥ ، ولكن فى سنة ١٩٣٣ أعيد تقسيم البلاد الى سبع مقاطعات لتثبيد قبضة الحكومة المركزية فأصبحت السياسة المتبعة فى كل هذه المقاطعات ووسائل الحكم والادارة موحدة ، ولكن منطقة كاتنجا ظلت محتفظة بفضل بقضاء شركة كاتنجا Comité Spécial du Katanga بوحدتها ، وقد اضمحلت بل واختفت تدريجيا بعض الامارات الوطنية التى كانت قائمة حتى الربع الاخير من القرن الماضى بسبب سياسة العسف والضغط التى أتبعها الملك ليوبولد والمعارك بين هؤلاء الحكام ، ولم يق منهم سوى ملك بورندى ، وربما كان جهل الادارة التى مزقت وحدة كثير من القبائل من أهم أسباب ضعف هذه الجماعات ، وان كانت قد أولت الحكومة هذا الأمر عنايتها سنة ١٩٢١ فأخذت تعيد الى مثل هذه الجماعات وحدتها ، ولم يفرض البلجيكيون لغتهم على السكان بل اعترفوا بأربع لغات محلية اتخذوا أحداها وتسمى لوبا Loba لغة عامة ، ورغم أن البلجيكيين قد أبقوا على رؤساء القبائل والحكام المحليين الوطنيين فقد أصبح ينظر اليهم كمواطنين يستمدون سلطاتهم من هذا الوضع ، لاعتبارهم الزعماء الذين يستمدون احترامهم من رجال قبائلهم \*

تعانى زائير من اتساعها وقلة سكانها وصعوبة ترابطها ، ولذلك فقد ظهرت فيها حاكات انفصالية كثيرة ، كذلك فان تيسير المواصلات ، والعناية بالقطاع الوطنى من الانتاج بدلا من أن تصبح مجالا لنشاط شركات التعدين وزراعة المحاصيل المدارية للتصدير ، يمكن أن تقوم البلاد الى الوحدة ، لأن موارد كاتنجا المعدنية وغللات الكنفو المنخفض الزراعية متكاملة ، تلك




الوحدة التي تعد ضرورية لتنفيذ مشروع ضخم لتوليد الكهرباء وتصنيع المعادن عند أنجا . Inga

### رواندى وبوروندى

ترجع نشأة هاتين الدولتين فى القرن الرابع عشر الميلادى الى هجرة قبيلة التوتسى من الرعاة الحاميين ، فارين من الحبشة ، فعبروا النيل بين نيل فكتوريا وبحيرة ألبرت حيث انتهى بهم المطاف شأن غيرهم من القبائل الحامية للاستقرار بين جماعات زنوج البانتو من الزراع الذين لا ينالون يؤلفون السواد الأعظم من شعبى البلدين ( ٨٤٪ ويسمون الهوتو على حين لا تزيد نسبة التوتسى من الرعاة عن ٢٤٪ الى جانب ١٪ من الاقزام من جماعة توا (Twa)

ربما يتبادر الى الذهن أن وجود هاتين الجماعتين وهما التوتسى من الحاميين والهوتو من الزنوج يؤدى الى التكامل الزراعى والرعى بتبادل المنتجات بينهما ، ولكن سيطرة التوتسى وهى اقلية حامية ، وانفراد كل جماعة رغم ذلك بمناطق تقطنها كما تستغل خيراتها وحدها باعد بينهما .  
( يسكن الهوتو منطقة Pukiga فى شمال رواندا الأوسط ، على حين يسكن التوتسى أقاليم بوجسيرا وبوجنزه ومطاره ) وانتشار الطبيعة الجبلية فى هذه المنطقة الداخلية الصعبة المحدودة الاتصال بالخارج قد ضاعف من الضغط على موارد البلاد الاقتصادية المحدوة لضيق مساحتها ( رواندى ١٠٦٦٦ ميلا مربعا وبوروندى ١٠٧٤٤ ميلا مربعا ) .

حكم الالمان هاتين المنطقتين كجزء من شرق أفريقية الالمانية ( تنجانيقا ) فى الفترة بين سنة ١٨٩٧ وسنة ١٩١٦ ، ثم ضمتهما بجيكا الى الكنگو بعد أن وضعتهما تحت انتدابها سنة ١٩١٩ طبقا لقرار الأمم لتخضعا لنظام الوصاية سنة ١٩٤٥ تبعا لميثاق الامم المتحدة ، ثم استقلتا باسمى رواندى وبوروندى سنة ١٩٦٢ ، ولكن لما كانت تلقاه جماعة الهوتو من زنوج البانتو من قسر وخسف شديدين فى رواندا بصفة خاصة قامت ثورة ١٩٥٩



خريطة رقم ( ۵۶ ) رواندا وبوروندي

فيها ، مما أطاح بحكم التوتسى الذين لاذ كثير منهم بالفرار فأعلنت نظام الحكم الجمهورى ، وان كانت طبقة التوتسى لا تزال تحكم مملكة بوروندى .

تقع أراضى الدولتين شرقى الفسرع الغربى من الاخودود الافريقى الكبير ، فتضم جانبا كبيرا من هذا الاخودود وحافته الشرقية التى تمثل خط تقسيم مياه الكنغو - النيل ، ويقدر عرض هذه الحافة الانكسارية بـ ١٢ - ٢٥ ميلا كما يبلغ ارتفاعها ٢٠٠٠ متر ، وهى تزداد ارتفاعا واتساعا فى منطقة جبال فيرونجا فى الشمال ، وتشمل مجموعة من الهضاب تمثل أجزاء من هضبة شرق أفريقية تزداد انخفاضا نحو الشرق ، ولذلك فان الانهار القصيرة التى تنبع من خط تقسيم المياه الكنغو - النيل فى الغرب التى تشق وديانا عميقة فى أعاليها وأوسطها تنتهى شرقا فى وديان ضحلة قليلة الانحدار تفرغ مياهها فى مستنقعات . ويمكن أن نميز ثلاثة أنظمة مناخية تسود فى الاخودود وحافته الانكسارية فى منطقة خط تقسيم المياه ، وفى الهضاب الشرقية على النحو الآتى : فالاخودود أشدها حرارة وأقلها مطرا ( ٢٢٥ م ، ٣/٤ متر من المطر ) ومنطقة خط تقسيم المياه أقلها حرارة وأغزرها مطرا ( ٢٠٥ م ، ١٦٥ متر ) ، ولكن المطر شديد التذبذب فى كل هذه الأقاليم وموقع البلاد الداخلى ، وتختلف الحافة المرتفعة عن الهضبة المستوية سواء من حيث التربة أو النبات الطبيعى ، فتربة الحافة ركانية خصيبة معرضة للانحراف تنموها الادغال المدارية المطيرة ، أما الهضبة فتربتها التى تكونت على أثر تفتت الصخور البلورية القديمة أقل خصوبة ، ولكنها فى الوقت نفسه أقل عرضة للاكتساح لاستوائها تنمو بها حشائش المناطق المسدارية الرطبة المرتفعة .

ورغم ضيق الاراضى فان المناطق التى أقبل السكان على استغلالها وتعميرها مقصورة على الجزء الشمالى الغربى والجزء الجنوبى الاوسط بعيدا عن الاخودود بحرارته وجفافه ، وعن منطقة خط تقسيم المياه بانحدار سطحها وفقدان تربتها ، كما أن مستنقعات الجزء الاوسط الشرقى منفرة ، فأثروا استغلال المنحدرات التى يتراوح منسوبها بين ١٦٠٠ و ٢٢٠٠ متر

حيث بلغت كثافتهم أكثر من ١٠٠٠ نسمة فى الكم المربع ، وينتشر السكان فى مساكن متفرقة أو قرى صغيرة ، فلا غرو أن كثرت هجرات السكان من رواندا الى أوغنده ومن بوروندى الى زائير وتانزانيا ، فيقدر عدد العاملين منهم فى بـ ٢٠٠,٠٠٠ نسمة يمثلون ١٥٪ من السكان المشتغلين ، كما أن التفاوت بين كثافة السكان فى الكنفو وهاتين البلدين حدا بليجيكا الى العمل على استقرار عدد كبير من العمال الموسمييين المهاجرين فى الفترة بين ١٩٤٠ و ١٩٤٥ فى مقاطعة كيفو فى الكنفو ( زائير ) .

يزرع الهوتو محاصيل تختلف بالارتفاع ، ففي المنحدرات السفلى حتى بنسوب ١٤٠٠ متر تزرع الكسافا والذرة والارز والبن من نوع الروبستا والقطن ونخيل الزيت ، وفى المنحدرات الوسطى ( بين ١٤٠٠ و ٢٠٠٠ متر ) يحل نوع من الذرة الرفيعة يدعى ذرة غينيا Guinea Corn محل الأرز ، كما يستبدل بنوع الروبستا من البن النوع العربى منه ، أما المحاصيل المعتدلة فتزرع فى المنحدرات المرتفعة التى تحتاج الى موسم قصير للنمو كالقمح والشعير والطباق وبعض الخضروات ، أما الشئى ونوع من النباتات ( يستخدم فى صناعة المواد القاتلة للحشرات ) يدعى البير ثروم فيزرعها الاوربيون القلائل بمقادير محدودة .

ويعد صنف البن العربى الذى يمثل ٧٥٪ من قيمة الصادرات أكثر انتشارا من صنف روبستا من البن الذى يقتصر زراعته على المناطق القريبة من بحيرة تنجانيقا ، وتعد زراعة البن من أهم الوسائل لتثبيت التربة والحيلولة دون جرفها ، ويعد القصدير والمعادن التى توجد معه كالولفرم من أهم الصادرات ( ٢٠٪ منها ) ، وتستغل من عدة مناطق واسعة تركز فى رواندا حول كيجالى عاصمتها ، كما يستخرج الولفرم من شرق جبال فيرونجا البركانية ونهر روسيزى الذى يصب فى بحيرة تنجانيقا .

وتقع كيجالى عاصمة رواندا فى مركز متوسط ، وهى مدينة صغيرة شأن كيتيجا مقر ملوك بوروندى ، وان كانت كبرى مدن هذه المنطقة أوزومبورا الواقعة على بحيرة تنجانيقا ( سكانها ٤٦,٠٠٠ نسمة ) والتى كانت عاصمة للبلدين فى عهدى الانتداب والوصاية فقد اتخذتها مملكة بوروندى عاصمة

لها ، وميناء هما الرئيسى ، ان تنقل منها السلع الى كيجوما بواسطة سكة حديدية ومنها لمدار السلام فى تانزانيا ، أو الى ميناء كاليمار ( ألبرت فيل ) فى زائير لتصدر عن طريق متادى ميناء الكنفو ، أو لتنقل شرقا الى أنجولا ، فتصدر عن طريق لوبيتو ، أو تتجه شرقا عن طسريق موزمبيق لتصدر من ميناء بيرا .

هذا الموقع الداخلى فضلا عن الظروف الطبيعية السيئة من مطر قليل متغير وتربة فقيرة وطبيعة جبلية وعرة تخلق صعوبات اقتصادية وسياسية ليست دون ما يولده ازدواج النظام الاجتماعى الاقتصادى ، من انقسام اراضى البلاد ومواردها بين الهوتو من الزراع والتوتسى من الرعاة ، فضلا عن أن احتقار التوتسى لمهنة الزراعة ، وتوسع الهوتو فى الاراضى الزراعية على حساب المراعى يؤدى الى اصطدام مصالح الجانبين ، ويضيق الخناق على الزراعة والرعى معا ، ويدمر موارد البلاد الطبيعية ، فهل تستطيع هاتان الدولتان الصغيرتان أن تجدا حلا سياسيا فى انضمامهما لجارتيهما أوغندا وتانزانيا ؟ أو أن تجدا حلا اجتماعيا فى اقبال الهوتو الزراع على الرعى - طالما كانوا سادة رواندا ويمثلون أغلبية سكان مملكة بوروندى ، وبخاصة أن الرعاة من التوتسى يزدرون الزراعة حتى لا يطلقون قطعانهم لتأتى على الاخضر واليابس فى هاتين الدولتين الصغيرتين ؟

## الفصل الثانى

### أفريقية الاستوائية

#### حدود الاقليم وتطوره السياسى :

تتألف أفريقية الاستوائية الفرنسية سابقا من أقاليم متعددة ، وان كانت قد نظمت ووضعت لها ادارة واحدة لأول مرة سنة ١٩٠٨ ، قد تمثل أرضا متصلة من الناحية السياسية ، وأن تكون اقتصادياتها متكاملة من النواحي الاقتصادية ، الا أنها بمساحتها التى تقدر بنحو ٢٠٠٠ر٨٠٠ر٢ كم<sup>٢</sup> وبامتدادها من الشمال الى الجنوب لمسافة ٢٧ درجة من درجات العرض أى نحو ٢٩٨٥ كيلو مترا وباتساعها الذى يبلغ ٢٠٠٠ كيلو متر من الشرق الى الغرب - تفتقد الوحدة الجغرافية .

فمنطقة الكمرون التى وضعت تحت الانتداب الفرنسى والحقت بأفريقية الاستوائية الفرنسية سابقا ليست من النواحي الطبيعية والبشرية كالمعادن وعناصر السكان والموارد الطبيعية وطرق المعيشة الا جزءا من ساحل غانة والسودان الغربى ، ولا يمكن اعتبار أى جزء من الكمرون جزءا من أفريقية الاستوائية سوى الجزء الجنوبى الشرقى الذى تسكنه جماعة الفان . والواقع أن اتحاد هذه المناطق المتباعدة الاطراف ينطوى على انكار وجود اقاليم أو مستعمرات أربعة منفصلة هى تشاد وأوينجى شارى والكنغو الاوسط وجابون يقتضى وجودها اتباع نظام الادارة اللامركزى ، ولكن حين اشتدت الأزمة الاقتصادية لجأت فرنسا الى اتباع نظام مركزى للحكم واتخذت برازافيل عاصمة مركزية ، وان كانت قد احتفظت بالمستعمرات القديمة بمثابة أقاليم قسمت الى مقاطعات صغيرة على أساس جغرافى أو اثنولوجى ، ولكن بقيت الكمرون محتفظة بوحدتها بحكم وضعها الخاص كمنطقة تقع تحت الانتداب ، وقد تطور وضع الكمرون السياسى ، فبعد أن كانت مستعمرة ألمانية منذ سنة ١٨٨٤ أضيف اليها سنة ١٩١١ بعض اطراف المستعمرات الفرنسية ، ولكن بعد هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية

الأولى ، استردت فرنسا هذه الاطراف ، كما حصلت على ٦/٥ مساحة مستعمرة الكمرون التى وضعت تحت الانتداب الفرنسى ثم تحت الوصاية الفرنسية أما الكمرون البريطانى فقد انضم جزؤه الجنوبى باسم الكمرون الغربية الى جمهورية الكمرون التى تكونت سنة ١٩٦٠ ، وبذلك سنة ١٩٦١ انضم شمال الكمرون البريطانى الى نيجيريا الشمالية ، أما الجنوبى فقد أصبح يطلق عليه الكمرون الغربية ( مساحته ١٦ر٨٥٠ ميلا مربعا يسكنها ٧٤٣ر٠٠٠ نسمة ) يمثل هو والكمرون الشرقية ( الفرنسى سابقا مساحته ١٦٦ر٧٩٠ ميلا مربعا وسكانه ٣ر٢١٣ر٥٠٠ نسمة ) شطرى جمهورية الكمرون الفدرالية . وعلى أثر تفكك أفريقية الاستوائية الفرنسية سنة ١٩٥٩ ، ظهرت جمهورية تشاد ، وجمهورية أفريقية الوسطى التى كانت تعرف بأوبانجى - شارى ، وجابون وكنغو برازفيل .

#### الإقليم والوحدات السياسية :

إقليم جابون - وهو نواة أفريقية الاستوائية الفرنسية وأقدم أجزائها - يمثل تقريبا حوض نهر أوجوى Ogowe ، ويتجه نحو المحيط الاطلنطى ، كما يبلغ طول ساحله الذى يطل على هذا المحيط ٣٠ كيلو مترا ، أما إقليم الكنغو الاوسط فيقع الى الشرق ، ويمتد جنوبا من برازفيل الى محطة بانجى Bangui النهرية الواقعة على الكنغو ، ويتجه هذا الاقليم نحو نهر الكنغو ، وقد كانت بانجى عاصمة للإقليم الثالث الذى سمي بأوبانجى شارى Ubangi Shari وهو الذى يمثل حافة الهضبة التى يقدر ارتفاعها بنحو ٦٠٠ - ٨٠٠ متر فوق سطح البحر ، أما إقليم تشاد فكان توجيهه دائما نحو الشمال والشرق فلم يتجه نحو الجنوب ، فهو بمناخه شبه الصحراوى وقلة موارده وسكانه الذين يمثلون خليطا من الحاميين والعرب والزنج ، وتاريخه الذى شهد قيام سلطنات وامارات منظمة تشبه الدويلات التى قامت على طول نطاق السافانا القصيرة فى السودان ينتسب الى الاقليم السودانى ، فلا غرو أن كانت تجارته قبل الاستعمار تتجه شمالا نحو طرابلس بواسطة القوافل ، ولم يجتذبها نحو الجنوب الى ميناء نواالا الا الاستعمار الذى جعلها تدخل ضمن أفريقية الاستوائية .

## مناطق الصدود :

يتراوح ارتفاع معظم أنحاء أفريقية الاستوائية الفرنسية سابقا بين ٥٠٠ و ١٠٠٠ متر ، وتقع أكثر الجهات المرتفعة بالقرب من الحدود ، فترتفع منطقة الحدود الغربية فى الكمرون الفرنسى سابقا بالقرب من الحدود عند ساحل المحيط الاطلنطى ، فتسير الحدود الفاصلة بين الكمرون الفرنسى والكمرون البريطانى على طول قمم الجبال المرتفعة التى يقل ارتفاعها كلما بعدنا نحو الشمال ، فعلى حين يبلغ ارتفاعها ٢٢٥٠ مترا شمال غربى نكونجرامبيا N°Kongsamba لا يتجاوز ارتفاعها بعد أن تعبر المنخفض الذى يجرى نهر بنوى فى ماندارا Mandara ١٠٠٠ متر الا قليلا ، حتى تطل فجأة على منخفض بحيرة تشاد ، وتأخذ مرتفعات الكمرون فى منطقة أوبانجى الغربية فى الانخفاض تدريجيا نحو الكنغو ، أما هضبة باتيكى Baléké فتتمتد نحو الجنوب الشرقى حيث تعترض نهر الكنغو عند شلالات لفنجستون، ولا تضم أفريقية الاستوائية الفرنسية سابقا من منخفض الكنغو الا شطرا محدودا من منطقتة الغربية ، ويفصل منخفض الكنغو عن حوض تشاد هضاب أهمها هضبة أوبانجى الوسطى التى تتسع وترتفع تدريجيا نحو الشرق حتى تشرف على حوض بحر الغزال ويسود منطقة الحدود الشرقية الاراضى المرتفعة ، وتظل منطقة الحدود مرتفعة حتى كتلة تبستى التى تحف بمنخفض تشاد من الشمال حيث يبلغ ارتفاعها ٢٠٠٠ - ٣٠٠٠ متر ، ، والواقع أن منخفض شاد لا يخلو نفسه من مرتفعات مثل الكتل الجبلية وبعض الكثبان الرملية فى منطقة بورقو ، وقد يكون أقرب الى الذهن أن نتصور أن هناك هضابا يتروح ارتفاعها بين ٦٠٩٥٠٠ مترا تنتهى بمرتفعات اذا اتجهنا خارج الحدود ، على حين تشرف الهضاب بحواف شاهقة أو متدرجة على منخفضين : منخفض الكنغو فى الجنوب ومنخفض تشاد فى الشمال ، وهكذا تبدو المرتفعات على شكل أقواس ، وقد احتوت منخفض تشاد فى الشمال ومنخفض الكنغو فى الجنوب .

## المناخ :

يتفاوت المناخ تفاوتا كبيرا من مناطق الجفاف شبه الصحراوية فى الشمال الى الجهات التى يسودها المناخ الاستوائى بكل خصائصه فى



الجنوب ، فالفرق الحرارى السنوى يبلغ  $3^{\circ}\text{C}$  فى ليبرفيل Libreville عند عرض  $27^{\circ}$  شمالا على حين يصل الى  $26^{\circ}\text{C}$  ، عند خط عرض  $18^{\circ}$  شمالا فى Faya-Largean ، ويبلغ الفرق الفصلى اقصاه فى شهور الحرارة المرتفعة ، كما يبلغ ادناه فى الشهور التى يهبط متوسط الحرارة ليصل الى نهايته الصغرى ، وتهبط درجة الحرارة فى الشمال فى موسم سقوط المطر بين يوليو وسبتمبر ، ولكنها تعود فترتفع بعد انقضاء فصل المطر ، ولكن قل ان تصل الى ما كانت عليه فى نهاية فصل الجفاف قبل سقوط المطر ، ويظهر فى الجنوب قمتان للمطر فى الاعتدالين وان كان المطر فى الخريف اغزر منه فى الربيع بوجه عام ، ويبدو الارتباط واضحا بين خط العرض وتعامد الشمس الظاهرى وبين موسم المطر الغزير ، وفى ليبرفيل على خط عرض  $27 - 30^{\circ}$  شمالا يبلغ المطر اقصاه فى ابريل ونوفمبر ، على حين تحدث القمتان فى بوان نوار Point Noir الواقعة على خط  $47^{\circ}$  جنوبا فى مارس ونوفمبر ، ولكن مع ذلك لا تخلو هذه المناطق الجنوبية التى يستمر فيها سقوط المطر اكثر العام من جفاف واضح فى يوليو وأغسطس حين يسقط فى ليبرفيل مثلا ستة مليمترات فقط فى شهر أغسطس ، والواقع ان خط الاستواء الحرارى يبتعد الى الشمال قليلا عن خط الاستواء الفعلى ، فلا غرو ان كانت مدينة مثل كامبو Campo تقع على خط عرض  $22^{\circ}$  اكثر مطرا فى موسم الجفاف من بلدة ليبرفيل الواقعة على خط عرض  $27^{\circ}$  ، وتعرض الامطار لذبذبة واسعة المدى وبخاصة فى الجهات الشمالية ، حيث تؤدى غزارة الامطار فى بعض السنوات كما حدث سنة ١٩٥٠ الى فيضان الانهار ، ويعزى ذلك الى الاضطراب فى انتقال جبهة ما بين المدارين Interropical front ، ويتأثر توزيع المطر الذى يتبع خط العرض بنظام توزيع المرتفعات ان يغزر فى منطقة الكمرن والمرتفعات الشرقية الوسطى ، ويمكن تقسيم افريقية الاستوائية الفرنسية سابقا الى الاقاليم المناخية الاتية:

١ - الاقليم الصحراوى الذى يمتد شمال خط  $20^{\circ}$  مليمتر للمطر المتساوى فى السنة ، وممتاز بندرة المطر وتذبذبه وقصر موسمه وانخفاض نسبة الرطوبة التى تتراوح بين  $20$  و  $30\%$  ، وارتفاع الحرارة وعظم المدى الحرارى اليومى والفصلى ، اذ يعتبر شهر يوليو شهر الحرارة العظمى .

٢ - إقليم الكنفو الأدنى : ويشمل جنوب إقليم الكنفو الاوسط بين هضاب باتيكي وبين ساحل الاطلنطى ، وتمتد حدوده شمالا حتى حدود اقليم جابون الجغرافية ، ويمتاز هذا الاقليم بوجود فصل جفاف طويل يمتد من يونيو حتى سبتمبر لفترة اربعة اشهر تنخفض اثنائها الرطوبة ، ويتعرض المطر الذى يقدر متوسطه بـ ١٥٠٠ ملليمتر ، بل غالبا ما يكون دون ذلك الى تغير واسع المدى ، ان قديهط الى دون النصف فى بعض الاحيان ويقدر متوسط الحرارة السنوى بـ ٢١° - ٢٧° م ، ويتضح التفاوت الكبير بين اقصى درجات الحرارة وادناها ، ولو أن حدة التفاوت تخف فى المنطقة القريبة من المحيط .

٢ - إقليم الجابون : يمتد الى شمال الاقليم السابق حتى يصل الى خط عرض ٤°م شمالا على طول الساحل ، ويمتاز بغزارة مطره ان يصيبه نحو ٢٥٠٠ ملليمترا من الامطار ، ولكن مع ذلك يوجد به فصل جاف يتراوح طوله بين ٣ و ٥ اشهر ويبلغ المطر اقصاه فى مارس و ابريل ، وتشتد الرطوبة ان يبلغ متوسطها السنوى ٦٨ - ٧٠٪ وان كانت قد تبلغ أحيانا ٩٥٪ ، ويتراوح متوسط الحرارة السنوى ٢٥ م و ٢٨ م ، والمدى الحرارى محدود للغاية ان لا يعدو ٥٦ م .

٣ - إقليم الكنفو الاوسط : يمتد فى منطقة الكنفو الاوسط ، ويبلغ متوسط المطر نحو ٦٠٠ - ١٨٠٠ ملليمترا ، ويمتد فصل الجفاف النسبى فى يونيو ويوليو و أغسطس وبخاصة شهر يوليو ويظل متوسط الحرارة السنوى نحو ٢٥ م ، وان كان يتراوح متوسط النهاية الكبرى والصغرى بين ١٨° و ٢٢° م ، ويعتبر هذا المناخ فى الواقع نوعا انتقاليا من المناخ بين مناخ الكنفو الاستوائى ومناخ الكنفو الأدنى .

٤ - إقليم الكنفو الاستوائى : ويمتد بين خط عرض ٣ م شمالا وملتقى الكنفو بالاوبنجى فى الجنوب ، ويمتاز المطر بسقوطه غزيرا بصفة تكاد تكون دائمة ، ويهبط المطر بين ديسمبر وفبراير وفى فترة أخرى بين يونيو ويوليو ولكنه هبوط ضئيل غير محسوس ، ويبلغ متوسط المطر ١٦٠٠ ملليمتر فى العام ، وينحصر متوسط الحرارة السنوى بين ٢٤ر٥ و ٢٦ م

ولا يتجاوز المدى الحرارى السنوى  $٢٥^{\circ}$  م ، ويقدر متوسط نسبة الرطوبة بنحو  $٨٥\%$  ويتراوح بين  $٧٠$  و  $٩٧\%$  .

٥ - اقليم الأوبانجى : وينحصر بين خطى عرض  $٦$  و  $٢$  شمالا ، ويصبيه نحو  $١٥٠٠$  -  $١٦٠٠$  ملليمتر فى العام فى الفترة بين يوليو وأكتوبر ، ويقل المطر الذى يتراوح كثيرا بين  $١٢٠٠$  -  $٢٠٠٠$  ملليمتر من عام لآخر فى ديسمبر ويناير بصفة خاصة . ويبدو على نظام المطر الذى يسقط فى عواصف تنهمر على أثرها سهول جارفة خصائص المناخ المدارى ، وتتراوح الحرارة بين  $٢٥^{\circ}$  و  $٢٧^{\circ}$  م فى متوسطها السنوى كما أن مداها يتذبذب بين  $١٥^{\circ}$  و  $٢٥^{\circ}$  م ، ولكن المدى اليومى للحرارة يبدو واضحا إذ ينحصر بين  $٩^{\circ}$  ،  $١٣$  و  $١٦$  م .

ويأخذ الاختلاف بين نسبة الرطوبة فى موسم المطر وموسم الجفاف فى الهبوط بوضوح ، فعلى حين تهبط نسبتها فى فصل الجفاف الى  $٢٠\%$  لا تصل الا قليلا الى  $٦٥\%$  فى فصل المطر بل قد تصل أحيانا الى  $٩٠\%$  .

٦ - اقليم غانة السودانى : يمتد هذا الاقليم بين خطى عرض  $٥^{\circ}$  و  $٧^{\circ}$  شمالا ، ويبلغ متوسط المطر  $١٢٥٠$  ملليمتر فى العام ، ويبلغ فصل الجفاف أربعة أشهر قد تصل الى خمسة بل ستة أشهر ، ويصل المطر أقصاه فى يوليو وأغسطس وسبتمبر التى يسقط أثناءها نحو  $٧٠\%$  من مقدار المطر السنوى ، ولا تتجاوز الحرارة فى متوسطها السنوى فى الجزء الشمالى  $٢٨^{\circ}$  م ، ولا تهبط فى الجزء الجنوبى عن  $٢٥^{\circ}$  م ، وترتفع المدى الحرارى الفصلى وبخاصة فى الشمال كما تهبط نسبة الرطوبة الى  $٤٠\%$  بل  $٢٥\%$  فى فصل الجفاف .

٧ - اقليم الساحل السودانى : وهو مناخ قارى تمثله نجامينا (Fort Lamy) أتم تمثيل ، إذ تنقسم السنة الى فترة حارة مطيرة بين أبريل وأكتوبر ، وأخرى جافة دفيئة بين نوفمبر ومارس ، ويسقط المطر فى زوابع رابعة حين ينهمر غزيرا ويتراوح متوسط المطر السنوى بين  $٥٠٠$  ،  $٨٠٠$  ملليمتر ، وتصبح دلالة المتوسط السنوى للحرارة على المناخ محدودة

فعلى حين: يبلغ هذا المتوسط  $27^{\circ}$  -  $29^{\circ}$  م يصل المتوسط الشهري الى  $23^{\circ}$  -  $23^{\circ}$  ، بل قد يهبط الى  $14^{\circ}$  م ، أو يرتفع الى  $42^{\circ}$  م .

أما مدى الحرارة اليومي ، فهو ينم عن التطرف الشديد ، إذ قد يبلغ  $30^{\circ}$  م فقد ترتفع الحرارة في مايو وأول يونيو إلى  $45^{\circ}$  م ، كما أنها قد تصل في صباح أيام الشتاء في يناير الى  $10^{\circ}$  م . وترتفع الحرارة عقب تعاملد الشمس الظاهري على المنطقة في أبريل وأكتوبر ، ولكن سقوط المطر في أغسطس في منخفض. تشاد جنوب خط عرض أبيشي Abèche مما يجعل من هذه المنطقة مسطحا مائيا ضخما ، يخفف من المدى الحرارى الذى قد يصل إلى  $10^{\circ}$  م، بل  $5^{\circ}$  م .

٨ - إقليم شبه الصحراء « الساحل » : ويمثل اقليما انتقاليا بين اقليم تشاد واقليم الصحراء بمعنى الكلمة ، ويتراوح المطر الذى يسقطا بين يوليو وأغسطس - إذ يصيبها نحو ٩٠٪ من المطر السنوى - بين ٢٠٠ - ٤٠٠ ملليمتر ، ويتراوح متوسط الحرارة الشهري بين  $26^{\circ}$  و  $34^{\circ}$  م ، وتبلغ الحرارة أقصاها في أبريل حين يصل متوسطها الى  $44^{\circ}$  م ، على حين يهبط هذا المتوسط الى أدناه في يناير وفبراير فيبلغ  $15^{\circ}$  م ، وتتطرف الحرارة في أثناء اليوم ، فقد تصل في الصباح المبكر الى  $18^{\circ}$  لترتفع ظهرا حتى تبلغ  $50^{\circ}$  م في شهر مايو ، وتنخفض نسبة الرطوبة التي تراوح بين ٢٠ و ٤٠٪ في فصل الجفاف .

٩ - الإقليم الصحراوى : تبدو فيه خصائص المناخ الصحراوى من ارتفاع في متوسط الحرارة السنوى ، وعظم مدى الحرارة الفصلى واليومي ، وندرة المطر وتذبذبه وسقوطه في شكل سيول جارفة مرات نادرة في العام ، دون أن يكون له موسم واضح محدود ، ويعتبر خط ٢٠٠ ملليمتر للمطر المتساوى سنويا الحدود الجنوبية لهذا الإقليم .

ربما كان من الأيسر التمييز بين أجزاء البلاد المختلفة على ضوء ما يسودها من أقاليم نباتية .

الأقاليم النباتية : تغطى نحو ١٠ أفريقيا الاستوائية الفرنسية سابقا في الكنفو الأوسط وجابون بوجه خاص الغابات الاستوائية الكثيفة ، التي

لا تمثل الا جزءا من نطاق هذه الغابات الذى يمتد من الكمرون غربا الى الكنفو كينشاسا شرقا ، وتفوق قيمة منتجات هذه الغابات قيمة الغلات الزراعية ، فلازال المطاط البرى وثمار نخيل الزيت تؤلف أهم صادرات هذه المنطقة التى تقدر مساحتها بنحو ٣٠٠.٠٠٠ كم<sup>٢</sup> .

ثم يلي ذلك فى منطقة الأوبانجى شارى هضبة تغطيها حشائش السافانا التى تختلط بها اشجار الغابات ، وتكثف فى الجنوب على حين تخف فى الشمال حتى تندرج فى شرق منخفض تشاد الى اقليم شبه صحراوى ، ويسقط المطر هنا صيفا كما تصلح التربة والمناخ لانتاج الحبوب كالذرة والبنور الزيتية كالمسمم والفول السودانى والمحاصيل التجارية الأخرى كالقطن ، ولم تحقق آمال الحكومة العريضة فى هذا المجال ، إذ شرعت سنة ١٩٢٩ فى وضع سياسة ترمى لجعل هذا المحصول الغلة التجارية الرئيسية ، ولم يتجاوز الانتاج رغم ذلك ١٤٠.٠٠٠ بالة سنة ١٩٤٧ ( وزن البالة ٤٠٠ رطل ) ، ولكن تعد هذه المنطقة التى تصلح للسكنى والنشاط لما يسودها من ظروف صحية نسبيا من أهم مناطق العمران والانتاج فى أفريقية الاستوائية الفرنسية سابقا .

وتمتد حشائش السافانا جنوب اقليم تشاد ، ولكنها تتضاءل ويبدو عليها مظاهر الفقر كلما أوغلنا شمالا ، وقد سبقت الإشارة الى أنه كان يربط هذا الاقليم الرعوى شبه الجاف باقليم كجايون الاستوائى من الناحية الادارية غير مستساغ ، فتوجيه هذا الاقليم الشمالى يبرر ربطه باقليم النيجر الملاصق له فى الغرب ، ولم تجتذب امكانيات هذه المنطقة من الناحية الاقتصادية الشركات والمؤسسات الاستغلالية الفرنسية فبقيت اقتصادياتها دون تغيير كبير .

### الاقاليم الطبيعية :

أكدنا من قبل التقابل والاختلاف بين منطقة تشاد الشمالية ومنطقة الكنفو الجنوبية ، فالأولى تمثل منطقة الصحراء وشبه الصحراء والسفانا ، على حين تمثل الثانية المنطقة الاستوائية وشبه الاستوائية ، فمنخفض تشاد لا يختلف عن منطقة النيجر الواقعة غربية أو بحر الغزال الواقع الى الشرق منه ، إذ أنه يؤلف جزءا من المنطقة السودانية التى

يسكنها خليط من الحاميين والساميين وزنوج اقحاح اى سوادنيين على صلة بالحضارات الشمالية ، وتعتبر الذرة الرفيعة وتربية الابقار اهم حرف السكان \*

يمكن ان نتخذ جبال ادمادو التى تمتد شرقا ومرتفعات خط تقسيم المياه بين النيل والكنغو التى توجد فى الغرب الحدود الفاصلة بين المنطقتين، والواقع ان التكوينات الجيولوجية فى المنطقتين : منطقة تشاد ومنطقة الكنگو ظلت متشابهة حتى عصر الميوسين ، ولكن منخفض تشاد الذى لم يتعرض بعد ذلك لنشاط تكتونى يذكر قد اخذ يختلف فى تطوره عن منطقة الكنگو \*

والواقع ان المناخ وما يرتبط به من آثار واضحة فى الحياة النباتية وظروف الانتاج الزراعى يعد من العناصر المهمة التى تعين فى التمييز بين هاتين المنطقتين ، ولكن يمكن ذلك على أساس المناخ وبخاصة المطر تقسيم منطقة الشمال الى منخفض تشاد والهضاب المحيطة به ، أو الى المنطقة الصحراوية فى الشمال ومنطقة السفانا الرطبة فى الجنوب حيث تزرع الذرة الرفيعة وتربى الماشية \*

وتتجى منطقة الاوبانجى نحو الكنگو ، ولا يمثل هذا الاقليم الجنوبى وحدة فى البنية أو التضاريس ، اذ تشارك افريقية الاستوائية زائير وأنجولا فى حوض الكنگو ، كما توجد عدة أنهار مستقلة عن الكنگو فى هذه المنطقة الجنوبية من افريقية الاستوائية الفرنسية ، والمناخ حار رطب لا يخلو من اختلافات بين الاقليم الاستوائى فى الجنوبى حيث لا يوجد فصل جفاف وبين الاقليم دون الاستوائى فى الشمال منه ، فالجزء الجنوبى بين خطى عرض ٤ شمالا ، ٢ جنوبا يخلو من فصول الجفاف على حين تتعرض منطقة الاوبانجى للجفاف بين نوفمبر وفبراير ، وهكذا يمكن ان تقسم المنطقة الجنوبية الى منخفض الكنگو والمنطقة الساحلية والمنطقة الجبلية التى تحيط بتجويف الكنگو \*

#### الظروف الاقتصادية :

أثرت سلطات الاستعمار الفرنسى أن تمنح الشركات الكبيرة حقوق

استغلال الموارد الطبيعية ، بل اسندت الى هذه الشركات القيام بأعباء الادارة واحتكار النشاط التجارى فى المناطق التى تحصل على امتازها ، فما أن تم مد سكة حديد كينشاسا Kinshassa ليصبح أداة للتغلغل فى داخل البلاد حتى بادرت الحكومة الفرنسية سنة ١٨٩٩ الى منح أربعين شركة بلجيكية وفرنسية حق استغلال منطقة واسعة فى جابون والكنغو الأوسط بل وفى شطر أوبانجى - شارى • وقد كان عقد الامتياز يمتد ثلاثين عاما ولم تترك هذه الشركات من الجهات التى تغطيها الغابات الا مناطق محدودة حول برازافيل ولبرفيل •

وقد سح للشركات بمقتضى شروط الامتياز استغلال كل الموارد بما فيها الثروة المعدنية ، فوجهت الشركات عنايتها الى جمع محاصيل الغابات كالمطاط الذى فرض جمعه على الوطنيين كنوع من الضريبة العينية ، وكان للشركات بعد انقضاء أجل الامتياز الحق فى أن تملك الاراضى التى استصلحتها لزراعة ، أو كانت تجمع منها المطاط بصفة منتظمة ، وذلك ملكا حرا دون منازع •

ولكن اذا ادركنا أن الفرنسيين لم يأخذوا بنظام المعازل فيما عدا منطقة جابون الساحلية لحماية الوطنيين من تدخل الشركات فى حياتهم تبين لنا ما انطوت عليه هذه السياسة الخرقاء الظالمة من أجحاف بالسكان حتى ارتفعت أصوات الاحتجاج عليها مما حدا بالحكومة الفرنسية الى تعديل عقود الامتياز ، فأعلنت هذه الحكومة قبل الحرب العالمية الاولى أن الامتيازات سوف تنتهى سنة ١٩٢٩ ، كما حددت المنطفة التى يمكن أن تملكها الشركة بنسبة صغيرة من مناطق امتيازها ، ولكن فى الواقع ظل هذا النظام قائما ، ويكفى أن نذكر أن شركة غابات أوبانجى - سانجا Compagnie Forestière Sangha Ubangi قد ظلت تحنكر جمع انتاج المطاط فى أكثر أجزاء منطقة جابون والكنغو الاوسط ، وقد منحت هذا الحق الذى يتجدد من تلقاء نفسه على أن تنتج مقادير معينة من المطاط بدون انقطاع ، كما يمارس الزراعة حفنة من أصحاب المزارع الكبيرة من الاوربيين فى مساحة ٤٠ر٠٠٠ فدان فى اقليم جابون لانتاج الكاكاو وزيت النخيل ، ولو أن منطقة امتيازهم تقدر بخمسة أضعاف المساحة التى قامت فيها مزارعهم • ورغم ما قدمته الحكومة الفرنسية من قروض أو ما أعلنته من مشروعات لاستثمار

موارد هذه البلاد ، فالزراعة الوطنية لم تلق التشجيع الكافى ، ولازال الوطنيون يقاتلون العسف والظلم على يد أصحاب المزارع الكبيرة والشركات الاحتكارية ، ورغم ما تبين للمسؤولين من أن تقدم هذه المنطقة من الناحية الاقتصادية لن يتحقق الا باضافة مزارع صغيرة يملكها الوطنيون . فلا زالت اقتصاديات تلك المنطقة تعتمد على ما تغله الغابات من محاصيل طبيعية من زيت النخيل والمطاط والاششاب والعاج ، فضلا عن الكاكاو الذى يزرعه أصحاب المزارع الكبيرة فى جابون .

وربما كان تأخر طرق المواصلات التى ظلت حتى عهد قريب تعتمد على سكة حديد متاوى - كينشاسا البلجيكية من أسباب التخلف الاقتصادى ، ولكن نفقات مد السكك الحديدية قد جعل المسؤولين يؤثرون مد الطرق فوضع برنامج كبير. لمد طرق متعددة لتغذية طريق رئيسى يسير من فورت لامى فى الشمال الى برازافيل. فى الجنوب ، كما تم انشاء طريق يربط بين ميناء دوالا فى الكونغو وميناء بانجى على الاويانجى .

### الكونغو ( برازافيل )

كانت تمثل - حتى تفككت أفريقية الاستوائية الفرنسية سنة ١٩٥٩ - قلب هذه البلاد الاقتصادى والسياسى ، فلا غزو أن أصبحت بعد ظهورها كجمهورية مستقلة أكثر الجمهوريات الأخرى تمتعا بالمرافق العامة من طرق وموانى انشئت لتخدم المناطق الأخرى ، فبرازافيل عاصمة البلاد الحالية كانت عاصمة لأفريقية الاستوائية الفرنسية وبوانت نوار Pointe Noire الميناء الرئيسى بها كان منفذا لأفريقية الاستوائية الفرنسية سابقا ، ورغم صعوبة ظروفها المناخية أو قلة مواردها وضيق مساحتها ( ١٣٩٠٠٠ ميل مربع ) وقلة سكانها ( ١٢٠٠٠٠٠ نسمة ) ، فان تمتعها بموقع ومرافق يجعل منها منفذا لمنطقة واسعة خلفية يعد من أهم مميزاتا .

يمتاز سهلها الساحلى القصير بجفافه وانخفاض حرارته وكثرة مستنقعاته وشطوطه الرملية وألسنته لمرور تيار بنجويلا البارد ، ولذلك تنمو بها حشائش فقيرة. نسيبا ، ويمتد خلف هذا السهل الساحلى سلسلة من الحافات المرتفعة أهمها مايومبا Mayoumba تفصل بين حوض الكونغو والساحل ، وتنمو بها الغابات الاستوائية الكثيفة ، شأن وادى نهر كويو



Koubou أو أدنى نهر نيارى Niari ثم يلى ذلك حوض نيارى بتربته الخصيبة وأمطاره الغزيرة ومواصلاته الميسورة ، وتنمو به أدغال السافانا يلى ذلك نحو الداخل منطقة ستانلى بول التى تنتشر بها القلال الجرداء ، كما توجد هضاب باتيكي التى تغطيها السافانا الجافة ، وهى هضاب مستوية فقيرة تقطعها وديان مثل سنغا Sangha ، وهى وديان تنتشر على جوانبها المستنقعات والغابات الاستوائية الكثيفة ، ولما كانت هذه البلاد تمتد بين ٤° شمالا ، ٥° جنوبا ، فان هضاب باتيكي الشمالية يبدو عليها صفات المناخ القارى ، ولكن حوض الكنغو يمثل المناخ الاستوائى فى أصدق صورته .

وعدد السكان قليل وكثافتهم منخفضة الا فى الجنوب حيث ينتشر ١٤٪ منهم فى برازافيل ، وفى نقطة لتغيير وسائل شحن السلع من النهر الى السكة الحديدية ، أما بوانت نوار فتصدر منجنيز جابون وخشب زائير وجمهورية افريقية الوسطى وقطن تشاد ومحصولاتها من الفول السوداني ، ويصدر الخشب من اقاليم ما يومبى وسنغا وبخاصة من أويو .

لا يزرع الا محاصيل قليلة مثل نخيل الزيت بمزارع كبنسيرة يملكها الاوروبيون لتصدير منتجاتها ، ولذلك تعد الصادرات الطبيعية من الغلات الاستوائية مثل الاخشاب ، ويعد حوض نيارى بمزارعه وتجاربه الزراعية على يد الوطنيين والاجانب على النظم التقليدية أو الالية الحديثة للانتاج الزراعى مجالا واسعا للتوسع فى الانتاج ، كما أن انشاء سد على نهر نيارى الادنى عند خانق سوندا Sounda على بعد ١٥ ميلا من الساحل سوف يصنع بحيرة كبيرة تستخدم لتصدير خشب جابون ، كما أن مصانع بوان نوار الحالية يمكن أن تستمد القوة الكهربائية المزمع توليدها عند السد ، كما أن منجنيز جابون يمكن تصنيعه قبل تصديره ، وتقتصر المعادن على بترول قليل يستخرج شمال بوانت نوار ، وعلى بعض الرصاص الذى يستخرج عند مفوتى M. Vouti فى منتصف المسافة بين بوازافيل ودوليزى Dolisie (٥) .

ويستخرج منها القصدير والبتترول والنحاس والرصاص والزنك فضلا عن الذهب ، وصناعاتها محدودة أهمها زيت النخيل وسكر القصب والبييرة والصابون والطباقي .

أهم المدن :

برازافيل :

قامت هذه المدينة التي كانت عاصمة لافريقيا الاستوائية الفرنسية سابقا عند مخرج نهر الكنغو من ستانلى بول الصالح للملاحة ، ومن ثم كان خط الملاحة من الكنغو للاويانجى يبدأ عندها ، كما أنها تعتبر نهاية السكة الحديد الفرنسية التي تصلها بالمحيط حيث تصل الى ميناء بوانت نوار ولذلك اكتسبت أهمية كمنطقة تتغير عندها طرق النقل من النهر للسكك الحديدية وكمركز للتجارة فضلا عن أهميتها الادارية والسياسية ، وهى تقوم على حافة هضبة باتيكى ، وقد اجتذبت عددا كبيرا من السكان الوطنيين فضلا عن الاوربيين ، اذ يسكنها نحو ١٣٣.٠٠٠ نسمة ، لأنها بفضل موقعها الجغرافى - ان تتجمع عندها صادرات هذه البلاد كما تنقل اليها وارداتها قبل توزيعها - أصبحت مركز جذب كبير للسكان .

ميناء بوانت نوار Pointe Noire : تقع عند نهاية الخط الحديدى الرئيسى فى افريقية الاستوائية الفرنسية ، على بعد ١٥٠ كم شمالى مصب الكنغو وقد قامت هذه المدينة - التي أخذت تتضخم سريعا بعد الحرب العالمية لتصبح مركزا تجاريا ومنفذا بحريا مهما فبلغ عدد سكانها ١٩٨٥ ، ١٠٥ر١٨٥ نسمة من بينهم ١٥٢٠ من الأوربيين - فى بقعة تمتاز بأنها أقرب نقطة من الساحل الى برازافيل عاصمة افريقية الاستوائية الفرنسية سابقا ، كما أن ساحلها البحرى يمثل منطقة صخرية يمكن الارصفة عليه واقامة مرفأ أمين عميق المياه ، حقا أن المنطقة التي نشأت فيها المدينة كانت ولا تزال منخفضة تكتنفها المستنقعات الا أنه أمكن اختيار ثلاثة أماكن مرتفعة لاقامة منشآت الميناء وحى لسكنى الاوربيين واخر للوطنيين بعيدة عن المسطحات المائية التي تفصل بينها ، وقد اقترح فى التنظيم الجديد للمدينة أن تتلاقى وتتقاطع أحياء السكنى التي تمتد أفقيا ورأسيا على السواء حتى يمكن توفير التهوية فى المدينة الاستوائية ، كما أثر المسئولون أن يقيموا الحى الصناعى الجديد بعيدا عن المدينة ، ولكن على مقربة منها نحو الشمال ، وهو الاتجاه المنتظر لامتداد المدينة فى نموها الحديث حيث يتوافر أسباب الوقاية من الرياح الرطبة البحرية .

## جابون

تمتاز رغم أنها أصغر مستعمرات فرنسا الاستوائية السابقة فى أفريقية مساحة وأقلها سكانا ، بأنها أكثرها امكانيات من الناحية الاقتصادية ، كما أن أراضيها متصلة منتظمة الشكل ، ولكنها رغم أن سكانها فى المنطقة الساحلية وعاصمتها ليبرفيل قد اتصلوا بالغرب ، منذ زمن مبكر ، فأصبح سكان الساحل متقدمين من الناحية الثقافية - فالكثير منهم من نسل من اعتقوا من الارقاء - فقد فقدت تدريجيا هذه المكانة ، وتقدر مساحتها بـ ١٦٧.٠٠٠ كم<sup>٢</sup> يقطنها ٩٥٠.٠٠٠ نسمة .

استقلت جابون ١٩٦٠ ، وتقسم الى أقاليم طبيعية تمثل فى جملتها امنداها لما يسود جنوبا فى الكنغو ، فالساحل الرملى الضحل بشطوطه الرملية ومستنقعاته الساحلية يسود حتى رأس لوبيز ، أما شمالى هذا الرأس فالساحل كثير التعاريج هادىء صالمح لقيام الموانى ، يليه نحو الداخل حافة الهضبة المكونة من صخور القاعدة القديمة وتعرف هذه الحافة باسم جبال كريستال فى الشمال وامتدادها مايومبا فى الجنوب ، وتنتشر الخوانق والجنادل عند اجتياز نهر أوجوا لهذه الحافة فى طريقه نحو المحيط ، ويليهما نحو الداخل جبال ولى نتم "Woleu Nytem" التى تقع شرق حافة كريستال ، وهضبة الحجر الرملى من طبقات الكاور التى يشقها يليها نحو الداخل جبال شيلو Chailu نهر نجوتى ونهر نيوجا Nyonga المرتفعة ، أما فى جنوب شرق البلاد فيوجد امتداد هضاب باتيكي التى تغطيها السافانا ، وتنمو السافانا أيضا على طول الأنهار التى قطعت غاباتها الاستوائية التى تمثل نوع النبات السائد فى كل أرجاء جابون الاخرى وتنخفض كثافة السكان ( ٤ نسمة فى الميل المربع ) الذين تكاد تخلو منهم الغابات والجبال والمستنقعات ، بينما يتجمعون فى مراكز التعدين وقطع الاخشاب وحول طرق المواصلات وفى المدن ، وأهم هذه المدن ليبرفيل العاصمة التى تصدر الاخشاب التى تشاركها فى تصديرها ميناء بورت جنتيل Port Gentil التى تقوم بها مناشر الاخشاب فى غابات نهر أوجوى الذى تقع عند مصبه ، كما يوجد بالقرب منها حقل صغير للبتترول والغاز الطبيعى استغل سنة ١٩٥٧ ، ويستخدم الغاز لتوليد الكهرباء ويصدر البترول الجيد النوع القريب من السحل عن طريق الميناء ، ولا تقتصر

الثروة المعدنية على البترول ، فان اكبر مناجم المنجنيز فى العالم الواقعة فى مواندا Moanda بالقرب من فرانسفيل ( النسبة ٤٨٪ فى الخام ) تصدر خامها من المنجنيز عن طريق ميناء بون نوار الكونغولى ، كما يستخرج اليورانيوم من منطقة تقع على بعد ١٥ ميلا من فرانسفيل ، ويوجد منطقتان أخريان لاستغلال الحديد فى ميكامبو Mekambo فى الشمال الشرقى وهى نائية نسبيا ، ولكن المنطقة الثانية التى تقع على بعد ثلاثين ميلا من الساحل فقط عند تشيبانجا Tchibanga أيسر استغلالا ، وبخاصة أن مواردها من خام الحديد تقدر بنحو مليون طن .

تعد هذه البلاد فريدة بين دول أفريقية الاستوائية الفرنسية السابقة باستطاعتها موازنة ميزانيتها ، وهى تعتمد على صناعات الأخشاب الثمينة المتعددة الانواع حتى سنة ١٩٦٢ حين أخذت الموارد المعدنية كالبترول والمنجنيز والاورانيوم تنافس الخشب الذى تقدر صادراته السنوية بنحو ٧٠٠ ألف طن ، ويؤثر الوطنيون الذين لا ينتجون من المحاصيل التجارية الزراعية الا بعض الكاكاو والبن فى أقصى الشمال - أن يعملوا فى قطع الأخشاب أو المناجم ، ولذلك فان جابون فريدة أيضا فى أنها لم تخصص شأن دول أفريقية الاستوائية والمدارية الأخرى فى إنتاج سلعة أو عدة سلع زراعية تجارية معينة ، وقد ظلت البلاد فى مواصلاتها تعتمد على الطرق النهرية ، همها طريق دولييزى Dolisie - لمبارينى Lambaréné ليبرفيل الذى ينتهى عند دوالا فى الكمرون .

### جمهورية أفريقية الوسطى:

تمتد هذه البلاد الفقيرة التى لا يفوقها فى فقرها سوى تشاد بين خطى عرض ٣ ، ١١ شمالا ، وقد كانت تعرف من قبل باسم أوبانجى شارى ، وهى تضم ثلاث مناطق : منطقة تنصرف مياهها شمالا الى تشاد ونهر شارى ومنطقة تقسيم المياه بين الكنغو وشارى وهى هضبة شبه مستوية يقدر منسوبها بنحو ٦٥٠ مترا، تغطيها تربة اللاتريت ، التى جرفت بها السيول على أثر قطع الغابات لانتشار المزارع ، أما المنطقة الثالثة وهى أهمها فتضم حوض الأوبانجى أحد روافد الكنغو المهمة ، وقد تتابع غارات النحاسين

ونظام الاحتكار والسخررة حتى تضاعل عدد السكان ، فأصبحت تشبه فى استنزاف مواردها البشرية والطبيعية النطاق الاوسط الفقير فى غرب افريقية ، ويقل المطر الذى يقتصر على فصل الصيف نحو الشمال والشمال الشرقى ، فنمو السافانا ماعدا المنطقة الجنوبية الغربية التى تنمو بها الغابات الاستوائية الى جانب غابات الدهاليز على طول وديان الانهار ، فلا غرو أن يصبح عدد سكان المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية التى تقدر مساحتها بـ ٧٠٠ ميلا مربعا لا يربو على ٧١٠٠٠ نسمة .

وتعد الكسافا الغذاء الرئيسى ، أما غلات الصادرات فتشمل القطن وهو أهم الصادرات ، وقد أدخلت زراعته التى انتشرت فى وديان الانهار شمالى بانجى العاصمة مثل وديان كيمو Kemo وجريبنجى Gribingui وتعد منطقة القطن هنا امتدادا نحو الجنوب الشرقى لمنطقة زراعته فى تشاد ، ولكن لم يقبل السكان على زراعته لأنه أدخل قسرا لشدة اقبالهم على الفول السودانى الذى يزرع مختلطا بالقطن ، ويعد البن الذى يزرع فى المنطقة الجنوبية الغربية ثانى الصادرات ، ويصدر الخشب الى البلاد المجاورة ولكن الماس الذى يستخرج من منطقة نولا Nola يعتبر ثالث الصادرات .

وقد أدى بعدها نحو الداخل الى طول خطوط النقل فيها ، فمن بانجى العاصمة الى بوانت نوار تبلغ المسافة ١٤٠٠ كم ، ونهر أوبانجى غير صالح للملاحة على مدار السنة لاختلاف تصريفه ومستواه من ناحية وانتشار السدود الصخرية فى قاعه من ناحية أخرى .

وتعد طرق النقل أكثر تقدما فى هذه الجمهورية عن شقيقاتها ، فمن بوار Bouar الى ياوندا ، ومنها السكك الحديدية الى دوالا بالكمرن يوجد طريق قصير للنقل ، ولكن أكثر نفقة من طريق أوبانجى الى بوانت نوار أو يرازافيل .

## تشاد


تعد أربعة أربعة تمثل الجمهوريات التي نشأت على أثر تفكك الوحدات التي كانت تتألف منها أفريقية الاستوائية الفرنسية سابقا ، وعد تشاد بمساحتها الضخمة التي تربو على مساحة الدول الثلاث الأخرى والتي تقدر بـ ١٢٤٨٠٠٠ كم مربعا - أشبه في طبيعة المشكلات التي تواجهها موريتانيا ومالي والنيجر ، لأن موقعها الداخلى وطول المسافات التي لابد أن تقطعها السلع الى المنافذ الخارجية يعرقل التطور الاقتصادى ، كما أن شطرا كبيرا يسود فيه الجفاف ، ففي شمال خط ١٤° شمالا فى رقعة تقدر مساحتها بـ ٢٣١٠٠٠ ميلا مربعا يعيش ٥٠٠٠٠ من البدو الرعاة حيث يسقط أقل من ربع متر من المطر أثناء ثلاثة أشهر تمثل موسم المطر ، ويعد هذا القدر من المطر الحد الأدنى للزراعة المطرية ، ومن ثم يقتصر العمران على الواحات ، وقبل المضى فى الحديث عن توزيع العمران يجمل بنا أن نقسم البلاد الى إقليمها الطبيعية .

تتكون تشاد من سهل تحاتى تشقه وديان أنهار لوجون وشارى وبحر الغزال ، وتمثل بحيرة تشاد حوض للتصريف الداخلى يتألف من صخور رسوبية من الزمن الرابع ، ويرجح أن بحيرة بوديلى التي تمثل أكثر جهات الحوض انخفاضا كانت على اتصال بهذه البحيرة ، ولكن تكوين منطقة خط تقسيم المياه بين تشاد والكنغو أثناء نشأة الاخود الإفريقى فى شرق أفريقية قد قطع أعالى نهر شارى الأوبانجى الذى أصبح أحد روافد الكونغو ، وبذلك أخذ يجف منخفض تشاد ( أنظر خريطة رقم ٥٦ ) .

ويحيط بهذا المنخفض مجموعة من المرتفعات ، ففي الشمال توجد جبال تيبستى وفى الشمال الشرقى نجد هضبة انيدى Ennedi التى تتألف من صخور الزمن الأول من الحجر الرملى ، أما فى الشرق فتقع هضبة واداي بين النيل وتشاد ، ويعرف امتدادها صوب الجنوب الغربى باسم جبال جيرا Guera ، وتنمو أدغال جافة جنوبى خط ١٤° شمالا ، تزداد ازدهارا صوب الجنوب ، على حين يسقط نحو نصف الى ثلاثة أرباع متر مدة أربعة أو خمسة أشهر حول نجامبينا وبونجور

Bongor يبلغ المطر الساقط في نصف السنة نحو متر بالقرب من الحدود الجنوبية عند سار

يزرع القطن الذي فرضت زراعته سنة ١٩٢٨ في مساحة نصف مليون فدان في جنوب غربى البلاد في منطقة لوجونى - شارى ، أما الغلات الاخرى فهى جميعها غذائية ، وتشمل الذرة الرفيعة وذرّة غينيا ، وقد ادخلت زراعة



( خريطة رقم ٥٦ )

لغول السودانى. مع القطن فى الشمال الشرقى حول أبيشى Abéché  
كما يزرع فى الجنوب الغربى على طول مجرى باتا Batha ندى الجريان  
وفصلى ، وفى كاتم شرق بحيرة تشاد وقد أدخلت زراعة الارز قبل الحرب  
العالمية الثانية فى وديان الانهار وبخاصة فى منطقة لوجونى ، ويقدر عدد  
الماشية التى تربي فى الشمال والشرق بأربعة ملايين رأس ، فضلا عن عدد  
أكبر من الاغنام والماعز ، ولكن ما يصدر من اللحم بالجو قدر ضئيل لما  
يكلفه نقلها من نفقات كبيرة ، وان كان نحو ربع مليون رأس من الماشية  
ومثلها من الاغنام يساق الى نيجيريا لتسويقها كل عام ، ويعد صيد الاسماك  
أكثر الحرف ربحا ، ويصدر جزء ضئيل مما يصاد كل عام ويقدر بنحو  
٧٠ر٠٠٠ طن الى نيجيريا والكمرون ، ومن الطريف أن يصدر بطريق الجو  
للحوم الثلجة الى برازافيل ودوالا وياوندى فضلا عن القطن وذلك من  
مطارى نجامينا ثانى المطارات بعد أودلى نشاطا داخل نطاق النفوذ  
الفرنسى .

وترتبط تشاد بالخارج عن طريق بوانت نوار ويشتمل هذا الطريق عدة  
مراحل تستخدم فيها عدة وسائل للنقل ، فهو بالسيارات بين نجامينا  
سار وبنجى لمسافة ٧٠٠ - ٨٠٠ ميلا ، ثم بالبواخر فى نهر الكنغو وروافده  
الابوانجى لمسافة ٧٤٠ ميلا حتى برازافيل ، ثم بالسكك الحديدية حتى  
بوان نوار لمسافة ٣١٩ ميلا ، ويستخدم طريق قصير مباشر لنقل السلع  
الخفيفة بين فورت لامى ودوالا ولا يربو طوله على ٩٧٣ ميلا ، وقد أخذت  
تشاد تتبع طرق نيجيريا بعد الحرب العالمية الثانية ، فنقل السلع من فورت  
لامى الى كانو أو لاجوس بالسيارات ثم تنقل الى لاجوس أو غيرها من  
الموانى بواسطة السكك الحديدية ، ويقدر طول هذا المنفذ بنحو ١٩٠٠٠ -  
٢٢٠٠ كم ، وعلى حين يصلح نهر شارى بين يوليو وفبراير للملاحة بين فورت  
أرشميو ونجامينا نجد أن مجرى شارى أدنى نجامينا يصلح للملاحة  
على مدار السنة .

وهكذا نجد أن هذه الجمهوريات الجديدة تعاني من قلة السكان وندرة  
الموارد وصعوبة المواصلات والظروف التى تكتنف الاستغلال ، بل أن طول  
المسافات وبعد مراكز الانتاج عن أسواق الاستهلاك الخارجية والداخلية



يعد من أكبر العقبات التي تقف دون تنمية الموارد القليلة ذات القيمة الاقتصادية .

### الكمرون :

سنتناول بالدراسة هنا الكمرون كجزء من أفريقية الوسطى لا للعلاقات الوثيقة السياسية والادارية التي كانت تربطه بأفريقية الاستوائية الفرنسية سابقا ، رغم أن له كيان مستقل فحسب بل للتشابه في النواحي الطبيعية والثقافية بينه وبين أفريقيا الوسطى أيضا . إذ كان يتولى الحكم فيه قوميسير يتمتع بالسلطات التي تمنح عادة لحاكم المستعمرة الفرنسية ، ولكنه مع ذلك فكان عضوا في المجلس الذي يتولى الحكم في أفريقية الاستوائية الفرنسية في برازافيل فضلا عن أن التشريعات التي كانت تطبق في أفريقية الاستوائية الفرنسية كانت تتبع كذلك في حكم الكمرون .

ظفرت فرنسا بخمسة أمداس مساحة الكمرون الالمانى الذى وضع بقيته تحت الانتداب البريطانى ، ولكن بعد أو وضع كل منهما تحت الوصاية بعد الحرب العالمية الثانية ، أستقل الكمرون الفرنسى بعد أن انضم شمال الكمرون البريطانى الى شمال نيجيريا تاركا جنوبى هذا القسم البريطانى الذى ألف مع الكمرون الفرنسى دولة الكمرون المستقلة باسم اتحاد الكمرون . وتماعى الكمرون من امتدادها الكبير وساحلها القصير وطول مواصلاتها .

كانت قد ظفرت فرنسا بالكمرون الذى وضع تحت انتدابها بعد هزيمة المانيا فى الحرب العالمية الاولى ، وقد كانت تنطلع منذ فترة طويلة لضم هذه المنطقة اليها ، فدارت مفاوضات بينها وبين انجلترا سنة ١٩١٦ للاتفاق على تقسيمه ، فحصلت على نحو ١٦٦ الف ميل مربع من الجزء الرقى المتاخم لمستعمراتها فى أفريقية الاستوائية ، تاركة جزءا غنيا بموارده يقع بالقرب من نيجيريا الجنوبية والوسطى لانجلترا . كما حصلت فرنسا على منطقتين كانتا تمتدان فى أفريقية الاستوائية الفرنسية من جنوب ريو مونى الاسبانية شمالى لبرفيل بنحو عشرة أميال فقط لتصل احدهما الى الأوبانجى وتتبع الأخرى نهر سئنجا حتى التقائه بنهر الكنفو ، مما فرق وحدة مستعمرات فرنسا فى هذه المنطقة وهدد مركزها الاستراتيجى ، وقد تنازلت فرنسا عن

هذه سنة ١٩١١ عن هاتين المنطقتين لالمانيا استرضاءا لها لتطلق يدها فى  
مراكش ، ولكن استردت فرنسا سنة ١٩١٦ ما سبق أن فقده من هذه  
البقاع .

يمكن أن نميز أولا فى الغرب مرتفعات الحدود الغربية المؤلفة من جبل  
الكمرون ومرتفعات الكمرون وبامندا Bamanda جبال مندرا Mandara  
وثانيا فى الوسط حيث توجد منطقة تقسيم المياه التى تشمل الجزء الاوسط  
الشمالى من هضبة نجواندرا Nagoundéré ، أما فى الجزء الاوسط  
الجنوبى فتوجد هضبة ياوندا Yooundé ، وتنتشر صخور الحجر الجيرى  
من العصرين الكريتاسى والايوسين فى السهل الساحلى ، وثالثا توجد  
الاحواض الساحلية التى تشمل حوض بنوى وحوض الكنفو وحوض تشاد  
الداخلى .

يمثل الكمرون من الناحية المناخية قطاعا كاملا للاقاليم المناخية فى  
هذه المنطقة من أفريقية ، فعلى حين يسقط المطر طول العام تقريبا عند الحدود  
الجنوبية فيبلغ ١٧٥ متر فى العام ، يصل فى يواندى Yooundé  
الى نحو ١٥٠ متر ، ولكنه يقل تدريجيا نحو الشمال الشرقى بالقرب من  
بحيرة تشاد حتى لا يعدو مقداره ٣٠ - ٤٠ سم يقتصر سقوطها على ثلاثة  
أشهر فى العام وان كان المطر يتراوح بين عشرة أمتار وثلاثة أمتار كما هو  
الحال فى ديبونشا Debundscha فى جبال الكمرون وفى بيا Bua  
على التوالى .


وتتابع الاقاليم النباتية فى نفس الاتجاه من الغابات الاستوائية الكثيفة  
فى أقصى الجنوب حتى خط عرض ٤م شمالا تقريبا ، يليها إقليم السفانا  
البستانية فالسافانا الغنية فالسافانا القصيرة التى تضمحل تدريجيا الى  
نباتات الصحراء الجافة . وتمتد الحدود السياسية بين شطرى الكمرون  
الفرنسى والبريطانى من الشمال الشرقى نحو الجنوب الغربى على طول منطقة  
المرتفعات التى تؤدى الى جبل الكمرون الذى يقع داخل منطقة الانتداب  
البريطانى ، وتمتاز هذه المنطقة بأمتارها الغزيرة التى تتجاوز ٢٥ متر  
فى بعض القمم العالية بفضل هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية

مباشرة من المحيط على هذه المرتفعات وبخصوبة تربتها البركانية وبكثافة ما ينمو فيها من أغابات كانت ولا تزال مصدرا لبعض الغلات البرية كزيت النخيل والمطاط الاخشاب بارتفاعها الذي يجعل منها منطقة صالحة لسكنى الاوربيين تناظر هضبة شرق افريقية - كل تلك الظروف قد أضفت عليها أهمية بالغة ، وبخاصة اذا اتجهت سياسة الدولتين الى استثمار موارد هذه المناطق استثمارا يتسم ببعد النظر والطموح ، ولكن سوء حظ الكمرون أن مناطق الغرب ذات التربة البركانية والمطر الغزير جبلية وعرة صعبة المواصلات ( انظر خريطة رقم ٥٧ ) .

وقد فطن الالمان الى أهمية منطقة المرتفعات فنقلوا عاصمة الكمرون من Douala الى بيا فى السفوح الجنوبية الشرقية لجبل الكمرون كما مدت سكة حديدية من ميناء بوناىوى Bonabui لمسافة ١٠٠ ميل حتى مدينة بارى Bare فى الداخل ، لربط المنطقة الجبلية التى ظلت منتجاتها من المطاط البرى تمثل طوال عهد الاستعمار الالمانى أولى الغلات الصادرة من حيث القيمة ، ظل واحتفظ بأهميته حتى قريب للغاية ، ولما كان المستعمرون من الالمان يتوقعون أن يقبل البيض على استيطان منطقة المرتفعات التى تعد من أشد جهات الكمرون كثافة فى سكانها من الوطنيين ، ووجدوا أن المنطقة التى نزعوا ملكيتها لصالح الشركات والاوربيين لا تتجاوز مساحتها ٢٩٠٠٠٠ فدان فى جنوب غرب مرتفعات الكمرون فأنشأوا معازل للسكان الوطنيين بلغ عددها أربعة عشر فى منطقة دشانج Descang وقد منعت شركتان فى آخر القرن الماضى امتياز استغلال موارد مناطق تقع كلها خارج هذه المرتفعات ، ولذلك ظل الوطنيون آمنين فيها من التشريد .

وقد اتبع الالمان سياسة تنطوى على تقدير للظروف المحلية السائدة ، فمنطقة الغابات الجنوبية تتخللها مساحات محدودة من الاراضى الزراعية التى تقوم فيها القرى التى يعيش سكانها فى شبه عزلة لصعوبة الاتصال بينها ، ولذلك أبقى الالمان على هدية ونفوذ زعماء القرى على حين تقبل السياسة الفرنسية التقليدية على اختيار أكثر العناصر تقديرا لما أتوا به من مظاهر للتقدم ، وأكثرهم كفاية فى تفسير القوانين والتشريعات الفرنسية





الكمبوديا

( خريطة رقم ٥٧ )

المستوردة ، وقد ادعوا انه لا يمكن الاحتفاظ بزعامة حكام هذه القرى من الوطنيين لتفكك وفساد الروابط الاجتماعية فى مجتمعات القرى .

أما فى منطقة السفانا التى تمتد من منطقة نجواند يرى نحو الشمال حتى الصحراء فقد وجد الالمان سكانا أكثر تقدما وحياة اجتماعية أعظم ازدهارا ، فالسكان هنا خليط من عناصر زنجية وحامية يحكمها اقلية من العناصر التى تدين بالدين الاسلامى ، فأبقوا على سلطات الامراء الوطنيين الذين يدعون لاميدوس Lamidos ، على حين سلبتهم السلطات الفرنسية نفوذهم وأصبحوا تحت الادارة الفرنسية التى تسير على أسس المركزية الواضحة ليسوا سوى موظفين صغارا يخضعون للادارة الفرنسية .

منح الالمان سنة ١٨٩٨ لاحدى الشركات اتيامن استغلال موارد منطقة تقع فى الجنوب تبلغ ساحتها ١٨ مليون فدان اقتصرت بعد ذلك سنة ١٩٠٥ على ربع هذه المساحة فحسب ، كما أن شركة أخرى منحت ١٨٩٩ امتياز استغلال منطقة تمتد بين نهر سنجا والمرتفعات الغربية .

وإذا كان تقدير الظروف المحلية حين وضعت مشروعات الاستثمار والحفاظ على مصالح الوطنيين الى حد كبير من مميزات سياسية المانية الاستعمارية فى الكمرن ، فقد كان استغلالهم لموارد البلاد يقوم على أسس علمية منظمة أيضا ، فانشئت المزارع الكبيرة التى يملكها الوطنيون لانتاج المحاصيل التجارية للتصدير كالكاكاو ونخيل الزيت وبخاصة فى منطقة باوندى . كما أقيمت محطات التجارب لدراسة ظروف الانتاج الزراعى وصعوباته ومشاكله فى الجهات المدارية ، حقا لقد أخطأ الالمان حين منحوا الشركات امتيازات واسعة النطاق فى أول عهدهم بسنعمر تلك الجهات . ولكن الفرنسيين الذين أفادوا من تجارب الالمان فى ميدان الزراعة - وبخاصة المزارع الكبيرة - ومن السكك الحديدية التى مدت فى عهد الاستعمار الالمانى ، قد توسعوا فى منح الامتيازات للشركات ، فالحاكم المحلى والقوميسير كان له الحق فى منح امتيازات للشركات بحيث لا تروبو المساحة على ٢٥٠٠ فدان ، أما اذا تجاوزت مناطق الامتياز هذه المساحة فان وزير المستعمرات الفرنسى هو وحده الذى يملك حق منحها ، وهكذا لم

يات عام ١٩٢٤ حتى حصلت احدى الشركات على مساحة ١٠ر٠٠٠ فدان واخرى على مساحة ١٦ر٠٠٠ فدان ، وتتابعت الشركات التي اخذت تستخدم « السخرة » فى ممارسة اعمالها ، ويعتبر ارغام كل رجل على أن يعمل دون أجر عشرة أيام فى العام احياء لنظام السخرة أو نوعا من الرق السائد فى المستعمرات الفرنسية ، ولم يقتصر هذا النظام من نظم العمل على المزارع الكبيرة بل أن رصف الطرق وانشاء طرق السكك الحديدية والعمل فى مزارع الوطنيين والعمل فى المرافق العامة كان يتم جميعه باستخدام الصخرة . وقد مدت سكة حديدية بين ميناء دوالا ياوندى فى الداخل حيث انتقلت الى هذه المنطقة الجبلية التى تعد أكثر ملاءمة لسكنى البيض من الحكومة المركزية للكمرون ، ولا يتجاوز عدد الاوربيين ٢٥٠٠ يسكن من نصفهم فى ميناء دوالا ، ولم تنجح مزارع الاوربيين كثيرا فى المساهمة فى النهوض الاقتصادى بالمستعمرة ، وقد عنيت فرنسا بمد طرق لتربط أجزاء افريقية الاستوائية الفرنسية السابقة برباط وثيق ، وهكذا ارتبطت اقاليم تشاد وجابون والكمرون وجمهورية افريقية الوسطى والكنغو برازافيل بشبكة من الطرق شرع فى مدها منذ سنة ١٩١٨ ، ولكن أهمها طريق الكمرون الشمالى الذى يصل ياوندى بأعلى بنو ونجامينا عاصمة تشاد .

ويمثل الكاكاو ثلث صادرات الكمرون والبن خمس هذه الصادرات ، ويعد بن روبستا النوع السائد فى السهول على حين يمثل النوع العربى من البن فى المرتفعات أكبر النوعين قيمة ، ويمثل الالومنيوم ٦/١ قيمة الصادرات ويتسع المجال للتوسع فى قطع الاخشاب وزراعة محاصيل الاشجار وبخاصة القطن والكاكاو والبن حيث يكفل لها السوق المشتركة الاوربية سوقا كبيرة .

وتنتشر المزارع الكبيرة للموز أولا ثم لمنخيل الزيت والكاكاو والمطاط التى انشأها الالمان أفرادا وشركات واستأجرها منهم بعد الحرب العالمية الثانية اتحاد التنمية الكمرونى Cameroon Development Corporation الذى يملك ٦٠ر٠٠٠ فدان ، ورغم خصوبة التربة البركانية فان وعورة الأرض وتعرض الموز للافات والعواصف فقد أدى الى التحول عنه للغلات الأخرى وفتح مناطق جديدة للمزارع الكبرى ، وتوجد هنا عاصمة الكمرون الالمانى سابقا وعاصمة الكمرون الغربية حاليا وهى بيا Buea ، كما توجد

ميناء فيكتوريا وميناء تيكو ميناء شحن الموز ، وتمتاز مرتفعات بامندا Bamenda بحشائش المرتفعات التي تسودها ولذلك فان تربية الماشية وزراعة البن في السفوح المنخفضة وتحسين طرق النقل سوف يساعد على استغلالها .

أما الهضاب الوسطى « ياوندى وبافانج ونجو نديرا » فتغطيها الغابات جنوبا والحشائش شمالا ، وتزرع أشجار الكاكاو والبن ونخيل الزيت في الجنوب حول العاصمة الاتحادية ياوندى ، أما هضبة نجونديرا فتربى بها الماشية ، وتزرع الغلات الشجرية في أحواض الانهار في منطقة الساحل حول دوالا الواقعة على بعد ٢٠ كم من مصب نهر وري ، وتتصل دوالا شمالا بالسكك الحديدية فترتبط بنكو نجسامبا N'Kong Samba وبيواندى ومبالميو M'Balmayo في الجنوب الشرقى ، أما اديا الواقعة المقرب من محطة توليد الكهرباء عند جبال ساناجا فقد أقيم بها أول مصهر للألومنيوم القادم من فريا بغينيا الى جانب مصنع للمطاط .

أما حوض الكنفو الذى تصرف مياهه عن طريق ساناجا فتنتشر به مزارع البن والكاكاو وتحتاج الى تيسير المواصلات لاستغلال ثروته الخشبية ، أما منطقة خط تقسيم المياه بين بنوى وتشاد ومركز جاروا Garoua ، فتستخدم نهرا بنوى ووجونى لنقل البترول من نيجيريا ومحاصيل جنوب تشاد وهى الفول السوداني والقطن والجلود والارز وذلك فى الفترة بين يولية وسبتمبر تسود زراعة هذه المحاصيل والذرة الرفيعة بصفة خاصة ، وتنتشر تربية الماشية فى هذه الجهات .



## الفصل الثالث

### مدغشقر

#### أو جمهورية ملجاشى

تعد مدغشقر أو « الجزيرة الكبيرة » كما يسميها الفرنسيون أو « شبه القارة » كما تعد بحكم مساحتها الضخمة احدى أربعة جزر كبيرة فى العالم تزيد مساحة كل منها على ٦٠٠ر٠٠٠ كيلو متر مربع ، فتصل مساحة مدغشقر الى ٦١٦٠٠٠ كم<sup>٢</sup> ، ويقدر عدد سكانها بنحو ٩ر٩٠٠ر٠٠٠ مليون نسمة ، أو بمعدل ١١ فى الكيلومتر المربع ، ولكنها بحكم موقعها بعيدا عن طرق الملاحة الذى كان يفيد من الرياح الموسمية الصيفية فى المحيط الهندى لم تسترع الانتباه ، فلم تكتشف الا عن طريق الصدفة البحتة حين دفعت الرياح والامواج سفينة ضاللة التجات اليها ، فلا غرو أن بقيت طوال عهود الاستعمار الهولندى والبرتغالى وما نشب بين الاستعمارين من منافسات ومنازعات بعيدة متوارية عن هذا المسرح ، ولم تفلح فى اجتذاب التجار والمستعمرين الا بعد أن كشفت مواردها وقدرت امكانيات استغلالها الاقتصاى ، وصلاحياتها للاستعمار الاستيطانى ، وقد تم ذلك فى ببطء وفى وقت متأخر اثناء الربع الاخير من القرن الماضى وبخاصة ١٨٦٥ - ١٨٧٠ .

أخذ الفرنسيون يبدون اهتمامهم منذ عهد بعيد بهذه الجزيرة فى عهد لويس الثالث عشر كما يدعون ، ولكن لم يفرض عليها الحماية الفرنسية التى اقتصر على ضم ميناء Diégo-Suarez الا سنة ١٨٨٥ ، ليعلن رسميا انها محمية سنة ١٨٩٦ حين عين أول حاكم عام فرنسى للجزيرة ، وقد حصلت على استقلالها الذاتى ضمن الجماعة الفرنسية ١٩٥٨ ، لتظفر باستقلالها التام ١٩٦١ .

وتتخذ هذه الجزيرة الضخمة شكلا يضاويا تقريبا ، يمتد من الشمال الى الجنوب لمسافة ١٦٠٠ كم ، ولكن عرضها فى أكثر جهاتها اتساعا لا يتجاوز ٥٧٠ كم من الشرق الى الغرب مما أدى الى تغلغل تأثير البحر ،


وبخاصة من الناحية الشرقية التى تتعرض لهبوب الرياح الجنوبية الشرقية ، فلا تبعد أية بقعة فى داخل الجزيرة عن البحر بأكثر من ٣٠٠ كيلو متر ، كما أن منطقتها الغربية التى تقع فى منصرف الرياح لا تعاني الجفاف الشديد بفضل قربها من مضيق موزمبيق الذى لا يتجاوز اتساعه ٤٠٠ كيلو متر وأن كان عمقه يزيد فى بعض جهاته على ٣٠٠ متر وبذلك فرض نوعا من العزلة عن أفريقية ، فأصبحت مدغشقر جزيرة تمثل عالما قائما بذاته ربما كان أكثر اتصالا ببقية المحيط الهندى فى الشرق منه بالمقارة الافريقية القريبة نسبيًا فى الغرب ( أنظر خريطة رقم ٥٨ ) .

تمخضت البنية عن وضوح اقاليم التضاريس التى تنقسم اليها الجزيرة : فهناك الهضبة الوسطى الى جانب المناطق الساحلية فى الشرق والغرب ، وتنحدر الانهار التى تعترضها الجنادل من الهضبة الى السهل الساحلى ، والواقع أن الانتقال يحدث فجأة من الداخل للساحل وبخاصة فى المنطقة الشرقية « والهضبة التى تعرضت للتعرية العنيفة فترة طويلة ليست سهلا نحائيا ذا سطح مستو كما يتبادر الى الذهن ، ولكن تتخللها المناطق المنخفضة أو الاحواض وأودية الانهار العميقة ، وبقايا الجبال الألتوائية القديمة التى تتأكل بواسطة التعرية فضلا عن مناطق اللابة والصخور البركانية ، وهكذا تظهر كتلة مرتفعة عن المنسوب المتوسط للهضبة فى الشمال فى منطقة تساراتانانا "Tsaratana" وفى الوسط فى منطقة انكاراتارا "Ankaratra" ، وفى الجنوب الشرقى فى كل من منطقتى Andringitra و Vohimainty اذا يعلو السطح عن ١٠٠٠ متر فى كل منها عن منسوب سطح البحر ، ومما يئأى بهذه الهضبة عن صفة الاستواء فى سطحها - فلا يمضى على وقيرة واحدة فى مساحات كبيرة شأن الهضاب القديمة - أن الانكسارات قد أدت الى هبوط مناطق كثيرة بعضها كانت تغمرها مياه البحيرات التى جفت تماما فأصبحت سهولا رسوبية خصبة، أو جف جانب منها على حين لا يزال البعض الآخر تغمره مياه البحيرات ، ومن الطبيعى أن تكثر هذه الاحواض حيث تنتشر الانكسارات فى المنطقة الشرقية ، فالى شمال شرق كتلة انكاراترا يوجد منخفضان الشمالى و يبلغ طوله ٤٠ كيلو مترا وعرضه ١٢ كيلو مترا لا تزال تشغل بحيرة الووترا Alaotra جانبا منه ويفصله عن المنخفض الجنوبى الذى يسمى حوض Ankay نجد مرتفع يدعى فوهديريانا "Vohidryana" ، ويمتد هذان

المنخفضان بين كتلة بيرانونزانو التى تقع الى الشرق وبين بقية الهضبة الى الغرب ، كما يقع فى الشمال الشرقى منخفض آخر يشغل جزء منه خليج انتونجيل Antongil يمتد أيضا بين كتلة ماسالا Massala من جانب وبقية الهضبة من جانب آخر . أما فى داخل الهضبة فنجد منخفضات أخرى أقل اتساعا وعمقا : منها منخفض يقع بالقرب من العاصمة تناناريف يستخدم لزراعة الارز لتغذية العاصمة وغيره كثير .

وبينما تمثل بعض المنخفضات سهولا رسوبية خصبة استخدمت منذ زمن بعيد حقولا لانتاج الأرز لتموين مدن الداخل التى ازدهرت ونمت ، تمثل المنخفضات الأخرى أودية الانهار التى تنحدر حيننا نحو الشرق وحيننا آخر نحو الغرب ، وقد استخدمت مسالك للتجارة بين الساحلين ، فقد ربط منخفض أندرونا فى الشمال السهول الساحلية على الجانبين التى تظل على المحيط الهندى شرقا من جانب وتلك التى تقع على خليج موزمبيق من جانب آخر ، والواقع أن طبيعة الهضبة لا تبدو الا فى الشمال الغربى حيث تتسع المنطقة المستوية ويسمى Tampoketsa ( تعنى Ketsa هضبة ) وهى تفصل الهضبة الداخلية عن سهول ما جونجا Majunga الساحلية ، وسطح الهضبة الذى يشبه « الديجا » فى الحبشة يقدر متوسط ارتفاعه بنحو ٨٠٠ متر ، وهو يختلف عن الوديان المنخفضة الحارة الرطبة التى تكتنفها المستنقعات والغابات الكثيفة والتى ينفر السكان منها والتي تشبه « القلة » فى الحبشة ويسميتها السكان هنا بيبو Baibo .

وقد أشرنا من قبل الى ضيق السهل الساحلى الشرقى الذى لا يتجاوز عرضه ٥٠ كيلو مترا فى أكثر جهاته اتساعا ، ان تهبط الارض مرتين على طول خطين من الانكسار تفصل بين مدرجين ينتهى كل منها بحافة انكسارية واضحة وبخاصة بين منخفض أدورنا وبتروكا ، فتتصدر الحافة الاولى وتسمى انجافو Angavo من ١٢٠٠ الى ٨٠٠ متر ، أما الثانية فتدعى بتسميزاركا Betsimisaraka التى تهبط من منسوب ٨٠٠ الى منسوب ١٠٠ متر فوق سطح البحر . ويقم الانحدار فى كل حافة فجائيا ، ولذلك فالانهار تجرى فى خنادق تعترضها الشلالات والجنادل ، ثم تهبط الى السهل الساحلى التى تقطعه حتى تصل الى منسوب ١٠٠ متر وينتظم الساحل بين عرض ١٦ ، ٢٥ جنوبا اذا يخلو من العيوب الانكسارية ، على حين نجد أن



ملجاش  
البنه والنصارين

( خريطة رقم ٥٨ )

كل من الطرفين الصمالي والجنوبى قد تعرض للهبوط والانكسار وينتشر على الساحل الشرقى المستقيم خلجان قديمة. من العصر الكريتاسى قد اعترضتها شعاب المرجان ، وقد أدى تراكم الرمال التى يخمىها التيار الاستوائى الى ضحولة المنطقة وصعوبة الوصول اليها ، اذ أدت الرياح الى تراكم الكثبان الرملية التى تمتد خلفها مستنقعات لا يفصلها عن بعضها البعض سوى جسور قليلة الارتفاع ، وقد مدت على طولها قناة موازية للساحل ، ولكن هذا الساحل الذى لا يصلح كثيرا لقيام الموانى ، والذى لا يبدو بتعارجه القليلة ذا أهمية ، قد اجتذب جزؤه الشمالى العرب والهنود والفرس الذين حملتهم الرياح الموسمية من آسيا ، كما أن ساحله الجنوبى قد تلقى موجات من عناصر الملايو والهنود الذين عمروا الجزيرة ، كما كانت موانى الجنوب قاعدة تجارية لتموين السفن المارة بين أوروبا والهند عن طريق الكاب ، ويخلو الساحل الجنوبى الشرقى الصخرى من الخلجان عدا خليج فورت دوڤين Fort Dauphin ، أما فى الشمال ، فنجد ساحلا صخرىا مكشوفاً ، ولكن تكثر الخلجان الى الشمال من ذلك فوهيمار وديجو سوريز Vohemar, Suarez Diego ، فقد قامت فى الاخير ميناء انتسيران Antsirane الحديث ، وقد تعرض الجزء الشمالى الغربى الى هبوط واضطرابات بركانية وانكسارات وحركات عنيفة أدت الى تنوع مظاهره ، فكثرت به الخلجان المحمية والرؤوس والجزائر ، فلا غرو أن لعب دورا مهما بفضل امتداد أرخبيل كومو ليصل بينه وبين الساحل الافريقى المقابل فى اجتذاب العرب من شرقى افريقية الذين رحلوا عن هذا الطريق ، بل أن وصول العناصر الزنجية من افريقية الى جزيرة مدغشقر لتعميرها إنما تم عن هذا الطريق أيضا .

أما على الساحل الغربى فتتوالى السهول التى تتسع هنا عنها فى الشرق ، كما تظهر حدائتها كلما انتقلنا نحو الغرب أى نحو مضيق موزمبيق وعند الحدود الفاصلة بين احد التكوينات والذى يليه نجد خطا من القيم المتخلفة ، وتقوم حافة صخرية مرتفعة ، تدعى لابة بونجو Bongo Lava بين عرضى ١٧ و ٢٠ جنوبا ، والواقع أن المياه الجارية قد حفرت التكوينات اللينة عند التقائها بالتكوينات الصلبة فتخلف من جراء ذلك حافات تنحدر ثلاثة منها نحو الداخل ، وتنتشر فى المناطق المرتفعة الداخلية المستوية التى

تأثرت تأثرا عنيقا بالتعرية الخوانق العميقة التي حفرتها الانهار فى الصخور الجيرية ، وظهرت فيها مظاهر تحات الكارست .

وتشرف هذه المرتفعات فى المنطقة الجنوبية الغربية على السهول المنخفضة مثل ماها فالى وتوليير Tuléar Mahafaly ، السهول البحرية فهى أكثر اتساعا سهل تسيرمبيهيينا Tsiribihina وتحمل الانهار الرواسب التى تلقى بها عند حافة المنخفض . ويتسع السهل الساحلى هنا ، وتنتشر دالات الانهار التى تلقى بغرينها عنى مصابيتها فى مضيق موزمبيق ، حيث يحمل اليها تيار موزمبيق الرمال التى تتكون منها الكثبان الرملية على طول الساحل ، وقد ساعده قلة عمق مضيق موزمبيق وشدة دفع مياهه اذا قورن بشرق الجزيرة على ظهور الشعاب المرجانية بوضوح ، وبخاصة حول رأس سنت أندريه ، وهكذا يبدو ، أن التشابه بين شرقى الجزيرة وغربها قليل ، فعلى حين تنتقل من سهل ساحلى ضيق فى الشرق لترقى بسرعة مدرجين تحفهما حافات مرتفعة صخرية الى الهضبة التى تشكل فى الجزيرة فى الداخل تتدرج السهول التى تزداد اتساعا كما تنخفض تدريجيا نحو الغرب ، ولا يعوق انحدارها نحو الغرب سوى بعض القمم عند الانتقال بين نوع من التكوينات وأخر ، حتى نصل الى سهل بحرى متسع يعوز ساحله أسباب الحماية ، وهكذا تنتهى الى بحر قليل العمق .

## المناخ :

يتأثر مناخ الجزيرة كثيرا بامتدادها من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى ، وبتضاريسها المتماثلة ذات الحافات الشرقية الحادة وبمرور تيار موزمبيق الدافىء ، فتهب عليها الرياح الجنوبية الشرقية القوية من مايو الى سبتمبر ، فتسقط أمطارا وفيرة على الساحل الشرقى وعلى سفوح الحافات الشرقية . أما وراء ذلك فتصبح جافة على الهضبة . وعلى العكس من ذلك تجلب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية أعاصير عنيقة وأمطارا غزيرة ، وتصبح عاتية مدمرة فى نهاية موسمها ما بين شهرى ديسمبر ومارس . والأمطار أكثر غزارة فى الشمال الغربى والشمال والشمال والشمال الشرقى والشرق ، وتقل كلما اتجهنا غربا وجنوبا بغرب .

والسواحل الشرقية والشمالية الغربية هائما دقيقة • بينما السواحل الشرقية رطبة دائما ، ذات مناخ مدارى بحرى • أما السواحل الغربية فأكثر جفافا وتتعرض لتقلبات حرارية شديدة وبذلك فهو أميل الى المناخ المدارى القارى ، أو السافانا الرطبة السائد على نفس خطوط العرض فى القارة • والجنوب الغربى شديد الحرارة والجفاف مثل السافانا الاشد جفافا فى القارة • ويقلل الارتفاع من درجات الحرارة فهى فى تاناناريف تتراوح بين ٢٤م° فى الفصل الرطب و ١٨م° فى الفصل الجاف وليس الصقيع بنادر فوق القمم العالية فمناخ المرتفعات أشبه بمناخ رواندا وبورندى •

وليس بمستغرب اذن أن تجرى الانهار بانحدار سريع ، نظرا لغزارة الأمطار الموسمية التى تسقط على كتل جرانيتية شديدة التضرس ، كما انها شديدة التذبذب ، قد تهب عنيفة تحمل أمطارا غزيرة تسبب فيضانات مدمرة وحيث انها تستخدم فى زراعة الأرز ، فكان لابد من اقامة السدود والخزانات مثل قناطر مارتا سواء على نهر ايكوبا بالقرب من تاناناريف وذلك لحماية قصعة الأرز أو سهل تبسيमितاتارا ، الذى يغذى العاصمة •

وقد أدى ازالة الغابات من أجل الزراعة الى انصراف التربة انحرافا خطرا • ولكن الغابات لا تزال تغطى المناطق النائية •

تمتد جزيرة مدغشقر لمسافة ١٢° من درجات العرض ، ولا تبعد بأكثر من درجتين الى الجنوب من مدار الجدى ، فلا غرو أن سادها المناخ المدارى الحار طول العام فى الجهات المنخفضة بوجه خاص ، بل لم تفلح الرياح الرطبة الجنوبية الشرقية على الساحل ، أو ارتفاع المنطقة الداخلية فى التخفيف من وطأة الحرارة فى الداخل كثيرا ، فتتراوح الحرارة بين ٢٩م° و ٣٢م° فى منتصف فصل الصيف عند منسوب سطح البحر ، ويؤدى ارتفاع المنطقة الداخلية الى هبوط الحرارة حتى تصبح ملائمة لسكنى الاوربيين ، والواقع أن الحرارة لا تجدى كثيرا فى تقسيم المناخ ، فالطر بتوزيعه ومقدار غزارته هو العنصر الحاسم فى هذا الصدد •

ففى الصيف الجنوبى تهب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية - التى حملت الهجرات من آسيا الى الجزيرة - على الطرف الشمالى للجزيرة ،

ولكن انخفاض الضغط فى السهول الغربية والجنوبية الغربية يجذب الرياح الموسمية ، ولكنها قليلة الامطار لهبوبها على أرض حارة ، أما فى الشمال الغربى فالرياح مضطربة غير منتظمة ، أما السواحل الشرقية فتعرض للرياح التجارية الجنوبية الشرقية التى تكون أكثر ايغالا فى الجنوب فى الصيف الجنوبي عنها فى الشتاء ، وهى رياح منتظمة مطيرة ، بل يوشك أن يكون توزيع الأمطار مرتبط بهبوبها على حد كبير ، وتعرض الجزء الشمالى الغربى للجزيرة الذى يقع فى ظل الرياح التجارية الرطبة لهبوب رياح شمالية غربية ، أما فى الشتاء فتبتعد الرياح التجارية نحو الشمال ، وتتحول الرياح الموسمية فى الطرف الشمالى الى رياح موسمية جنوبية غربية ويرتبط نظام المطر بنظام الرياح : فالشرق غزير المطر شديد الرطوبة وبخاصة فى الصيف وأن كانت بعض أجزائه يصيبها مطر الشتاء .

ويقدر متوسط المطر بنحو ٢٥٥ متر ، أما فى الهضبة الوسطى فيتراوح بين ١ ، ٢ متر وهو مقصور على فصل الصيف .

أما فى الطرف الغربى والجنوب الغربى فيقل المطر حتى لا يتجاوز نصف متر ، أما الطرف الشمالى الشرقى فيسقط به نحو متر فى الصيف فقط ، على حين يتعرض الطرف الشمالى الغربى للرياح الشمالية الغربية التى ينهمر منها نحو متر من الامطار تسقط فى الصيف بصفة خاصة ، وبخاصة أن الرياح هنا تصطدم بالساحل الصخرى .

أما الحرارة فتبلغ فى الغرب نحو ٢٧° م ، على حين نجد الساحل الشرقى أكثر رطوبة وأقل حرارة ولو أن متوسطه يزيد على ٢٦° م أما الجهات المرتفعة الداخلية فتصل الحرارة فيها ٣١° م ، وتبدو الاختلافات الاقليمية فى توزيع الحرارة بوضوح فى الشتاء عنها فى الصيف ، فيبلغ متوسط حرارة شهر يوليو أكثر من ٢٤° م فى الاقليم الشمالى الغربى وهو أكثر جهات مدغشقر دفئا ، على حين أنها لا تربو ١٥° م فى الجهات الشرقية ، التى لا تختلف كثيرا عن الجهات الجنوبية الغربية ، أما الهضبة الداخلية فتهبط الحرارة فيها الى ١٦° م ، وهكذا نجد أن المدى الحرارى السنوى أدناه فى الجزء المدارى الرطب فى الشمال الغربى إذ يبلغ نحو ٣° م على حين يصل الى ٥° م فى الهضبة الداخلية ، أما الجنوب الغربى الجاف فيصل الى ٨٥° م .



وتتعرض جزيرة مدغشقر شأن كثير من جزائر المحيط الهندي كموريشيوس وريونيون للاعاصير المدارية العنيفة التي تتكون غالبا بين خطى عرض ١٥° جنوبا وخطى طول ٦٠° ، ٩٠° شرقا فى المحيط الهندي لمتجه بعد ذلك نحو الجنوب الغربى فتصل الى مدغشقر بين ديسمبر وأبريل ، وتجبر وراءها اذيال تدمير واسع النطاق .

على ضوء ما تقدم يمكن أن نميز عدة اقاليم مناخية الاول فى الجهات الساحلية الشرقية المنخفضة وهو حار رطب والثانى فى داخل الهضبة ويقتصر المطر فيه على فصل الصيف وهو أقل غزارة وأكثر صلاحية لسكنى الانسان ، أما منطقة الساحل الجنوبي الغربى فهو جاف حار يقتصر فصل المطر على الصيف ، على حين نجد اقليم الشمال الغربى ( اقليم سامبرينو Sambrino ) غزير المطر ولكن يوجد به فصل جاف نسبيا يجعله أكثر صلاحية لسكنى الانسان من منطقة الساحل الشرقى ، وتعد منطقة السهول الساحلية الغربية والهضاب الغربية والمنطقة الشمالية أكثر ملائمة لنشاط الانسان ، لوجود فصل جاف أقل رطوبة وحرارة يخفف من وطأة المناخ المدارى الرطب المرهق ولكن الدراسة التفصيلية تساعد على تمييز الاقاليم المناخية الآتية :

١ - اقليم الساحلى الشرقى وهو حار رطب مزهق يسقط المطر فيه غزيرا طول العام ، ولا تجدى رياح البحر فى أن تجعل منه بيئة صالحة للسكان ، الذين تجنبوا الإقامة فيه ، فلا تهبط الحرارة دون ٢٠° م فى وسط الشتاء ، كما أن المطر لا يقل عن ٢٥ متر ، وتمثل متناف Tamatave الاقليم خير تمثيل .

٢ - اقليم الهضبة الوسطى وهو أكثر جاذبية للسكان اذا قورن بالساحل الشرقى ، كما يبدو من ازسحام السكان وتقدم العمران ، ففى منطقة العاصمة تانااريف ( على ارتفاع نحو ١١٠٠ متر فوق سطح البحر ) تهبط الحرارة الى ١٢ر٨° فى يوليو ولا يزيد متوسط أى شهر من شهور السنة على ٢٠° م ، أما من ناحية المطر فيسقط أكثره فى فترة الصيف بين ديسمبر وفبراير ، ولا يقل المتوسط الشهرى عن ٢٥ سم ، أما فى فترة الشتاء بين مايو وأكتوبر فلا يزيد متوسط المطر الشهرى عن ٢٣ر٥ سم ، ولا يعدو المطر الساقط فى الجهات الداخلية فى الهضبة نصف ما يسقط فى المنطقة


الشرقية الساحلية ، أما عن الايام الممطرة فيبلغ عددها فى الساحل ضعف الداخلى ( ٩٠ يوما فقط فى الداخلى ) .

٣ - اقليم شمال غرب مدغشقر وهو لا يختلف فى رطوبته وحرارته عن الاقليم الشرقى ، ولكن أمطاره الغزيرة التى قد تصل الى ٢٥ متر والتى تتراوح عادة فى متوسطها بين ١٥ - ٢ متر تسقط فى الصيف بوجه خاص حين تحل رياح الشمال الغربى محل التجارية الجنوبية الشرقية ، وبذلك فان الفرق الواضح بين هذا الاقليم واطليم الساحل الشرقى هو وجود فصل الشتاء الجاف ، وان كانت الرطوبة والحرارة متوفرتين فى المنطقة الساحلية كسهل ماجونجا Majuncea فمدينة ماجونجا الواقعة فى هذا السهل يصيبها ١٣ متر من المطر بين اكتوبر وأبريل ولا تهبط حرارة شهر الشتاء فيها دون ٢٢° م .

٤ - الاقليم الجنوبى والجنوبى الغربى ، وهو اقليم جاف لا يتجاوز عدد الايام الممطرة طول العام ٢٥ - ٣٠ يوما ، كما ان متوسط المطر لا يعدو ٣٧ سم ، هذا الاقليم الذى يشكو الجفاف ازاء هذه الحرارة والبخر الشديدين يقع فى ظل المطر .

### الاقاليم النباتية :

تعرضت الحياة النباتية فى الجزيرة لتاثير الانسان الذى لا يقل عن تاثير عوامل المناخ وبخاصة المطر . فحين انتشرت الزراعة فى الجهات الغربية والشمالية الغربية اختلفت الغابات عن طريق اضرار النيران التى يلجأ اليها السكان للقضاء على الغطاء الطبيعى فى مساحة كبيرة ، فيقدر ان ٤/٥ ما ينمو الان فى الجزيرة من النباتات انما يمثل الغطاء النباتى الذى ظهر بعد اختفاء نباتات الطبيعىة الاولى ، فهذه النباتات التى نمت على اثر اختفاء الغطاء الاول للنبات اقل تنوعا وكثافة مما كانت عليه . ويمكن ان نميز نوعين من النباتات الاول ويضم الاقاليم النباتية التى تنمو فى الجهات التى تواجه الرياح أى تقع فى مهبها والاخرى تقع فى منصرفها ( انظر خريطة رقم ٥٩ ) ، فتنمو الغابات الاستوائية الكثيفة فى المنطقة الساحلية الشرقية والسفوح الشرقية للهضبة بدرجيتها حتى منسوب ٨٠٠ متر فوق سطح البحر ، وتعدد انواع النباتات هنا ، ولذلك فان الاخشاب الثمينة



الأقاليم النباتية في مدنتنصر

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| ١ - غابات نصفية           | ١ - الحدود الفاصلة بين نباتات الشرق الأهم |
| ٢ - مراعي يجرقها النيران  | المحصرة والغرب الشمالية                   |
| ٣ - مزارع أشجار شجرية     | ٢ - حدود نباتات الجنوب الغربي المعاصرة    |
| ٤ - مزارع الزيتون الغربية | ٣ - غابات ذات الأوراق الأهم               |
| ٥ - غابات المنجد          | ٤ - مزارع                                 |

( خريطة رقم ٥٩ )

من اشجار الابنوس وخشب الورد Rosewood لم تستغل على نطاق يذكر وكما تنمو غابات المانجروف فى المستنقعات الساحلية فى الشرق تفصل مجموعة المستنقعات التى تقع خلف منطقة الساحل بين شريط الغابات الضيق فى الشرق ، وبين بقية الغابات التى تتلقى امطار السفوح الشرقية للمهضبة الوسطى الغزيرة فى الداخل ، والواقع أن هذه الغابات كانت تمتد الى المنطقة الغربية ، ولكن انتشار الزراعة هنا قد أدى الى انكماش مساحة الغابات ، أما فى الشمال الغربى فالغابات اقل كثافة والاشجار اقل ارتفاعا ، ولذلك كان من الأيسر استغلالها ، وتقل كثافة الغابات التى تنمو على منسوب يعلى عن ٨٠٠ متر فوق سطح البحر ، فلا يتجاوز ارتفاع اشجارها عشرة أمتار ، والواقع أن وجود فصل جاف يبلغ طوله ٤ - ٥ أشهر يجعل من جهات المهضبة الداخلية اقل ملاءمة لنمو السافانا القصيرة التى قد تتخللها اشجار فى بعض الاحيان ، والسافانا أشبه هنا بالفلد العالى فى جنوب أفريقيا ، أما فى جهات الجنوب والجنوب الغربى التى تقاسى الجفاف ، فان الغابات هناك من الانواع الشوكية التى تتحمل الجفاف والتى تشبه كثيرا ما ينمو فى إقليم الكارو .

#### الاقليم الطبيعية :

١ - المهضبة الوسطى : تمثل الاقليم الرئيسى فى الجزيرة سواء بسكانها أو اقتصادياتها ، بل أن حرارتها القليلة القسوة اذا قورنت بالمناطق الرطبة فى الشرق أو الحارة الجافة فى الغرب تجعل منها خير مكان لسكنى البيض فى الجزيرة . قد تبدو هذه المهضبة لاول وهلة كوحدة من حيث سكانها ونظامها الاقتصادى فضلا عن ظروفها الطبيعية ، ولكن الواقع أنه يمكن أن نميز شطرين منها : الشرقى حيث تنتشر الكتل المتخلفة من النواة الاركية والاحواض الانكسارية المنخفضة والمرتفعات المكونة من الطفوح البركانية وحيث يغزر المطر وتنمو الغابات الكثيفة التى نمت بعد احراقها شجيرات شبه جافة وحشائش السافانا الخشنة التى لا تصلح كثيرا لتربية الماشية ، ولكن حيث حلت الزراعة محلها انتشرت حقول الارز فى الاحواض المنخفضة الرسوبية ، وزرع البن والذرة فضلا عن المانيوك والطباق ، فلا غرو أن كانت مقر حضارة الهوفا التى امتدت بين منخفض ايهوسى Ihoosy فى الجنوب وكتلة تساراتانانا Tsaratanana فى الشمال ، فقامت المدن

وانتشرت بالقرب من الاحواض التى يغطيها الغرين الخصيب ، وزرعت محاصيل الذرة والمانيق والطباق وغيره الى جانب تربية الحيوان ، ولم تقتصر الزراعة المتقدمة على عنصر الهوقا أو الميرينا بل شارك فيها جماعات اليارا البتسيليو Betsiléo ، وهكذا بلغ متوسط كثافة السكان هنا ثلاثة اضعاف متوسطها فى الجزيرة ، وقامت صناعات زراعية يحتكر أكثرها المستعمرون الان كصناعة دباغة الجلود وضرب الأرز وتجفيف اللحوم وحفظ الخضروات واعداد المانيق للاستهلاك . وبعد أن كانت زراعة هذه المحاصيل مقصورة الى حد كبير على مملكة الهوقا أخذت تنتشر فى أنحاء الجزيرة ، والواقع أن تأثير الاستعمار الفرنسى هنا محدود لأنه وجد حضارة متقدمة \*

أما فى الجانب الغربى من الهضبة الوسطى التى تقع فى ظل المطر ، فهى أقل رطوبة وأكثر تجانساً من حيث السطح إذ يقترب سطح الهضبة هنا من الاستواء الى حد كبير ، ونمو حشائش الغلد التى ترعاها جماعات السكلافا التى تمثل العنصر الرئيسى من سكان هذه الجهات قبل الاستعمار ، إذا كانت هذه الجهات الغربية قد حرمت من الامطار والاحواض الرسوبية الخصيبة التى تسود فى شرق الهضبة ، فإنها تختلف عن السهول الغربية التى تشبهها فيما تعانیه من جفاف فى أنها خلو من وديان الانهار ذات التربة الخصيبة ، فلا عجب أن كانت أقليم عزلة إذ ظلت قائمة كمنطقة تخوم قليلة العمران فى غرب امبراطورية الهوقا ( انظر خريطة رقم ٦٠ ) \*

## ٢ - السهول الشرقية :

تعد المنحدرات السفلى للهضبة الوسطى والسهل الساحلى الشرقى الضيق أكثر جهات الجزيرة تأخرًا فى اقتصادياتها ، فمناخها الحار الرطب المرهق ، ومطرها الذى يطرد سقوطه طول العام تقريباً يبعث الملالة ويثبط نشاط السكان من الوطنيين ، كما يجعل من هذه المنطقة « مقبرة للاوروبيين ، ومن العريب أن هذا الساحل الشرقى قد اجتذب إليه المستعمرين من الغرب والفرس والهنود أولاً ومن البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين بعد ذلك ، وربما يعزى ذلك الى صلاحية المناخ لانتاج المحاصيل الزراعية المجزية رغم عدم ملاءمته للسكنى والنشاط \*



وإذا استثنينا جماعتين هما Antainmorona, Anjoaty اللاتينمورونا والانجونى فى الشمال والجنوب حيث اخلتط دماؤهم بدماء الفرس والعرب، فقد كان الوطنيون من السكان يمارسون زراعة متنقلة باحراق الغابات لزراعة الأرز والمانيوق بضع سنوات . حتى يدعوا الأرض أحيانا وهى جدياء عارية من النباتات ويطلق عليها تافى Tavy . أو ينمو مكانها الخيزران وادغال من الشجيرات الجافة يطلق عليها Savoka ولكن جماعات من سكان جزيرة موريشيوس تسكن كتلة أمبر Ambre ، وهى منطقة جبلية تقع فى أقصى الطرف الشمالى للجزيرة ، فالى جانب الكتلة الاركية توجد تكوينات رسوبية تنتمى لعصور مختلفة تعرضت كلها لحركات عنيفة للقشرة الأرضية ، حركات بركانية وحركات هبوط ، مما أدى الى تنوع التضاريس ، ومناخها يشبه الهضبة الوسطى فالمطر غزير يسقط أكثره فى الصيف ولا يقل عن متر وان كانت تنمو فى قممها المرتفعة الغابات الكثيفة ذات الأوراق الدائمة الخضرة التى تشبه غابات اقليم سامبرينو فى الغرب ، ولم تجتذب هذه المنطقة التى تتجه نحو الشرق بعيدا عن أفريقيا ولا تصلح لانتاج البهارات العنصر العربى . وكذلك ظل سكانها من العنصر المدغشقرى قليل الاختلاط من قبيلة الانتانكرانا Antankarana يمارس حرفة الرعى فقط، حتى اقبل الاستعمار الفرنسى ، ولا زالت اللحوم والجلود من أهم صادرات هذه المنطقة التى استطاعت بفضل مينائها الطبيعى ريجو سوريز أن تجتذب جانبا من تجارة اقليم السمبارينو فى الغرب ، وتعتبر صناعة تجفيف اللحوم من أهم صناعات هذا الميناء ، ويحتكر الفرنسيون والهنود التجارة الخارجية لهذا الاقليم .

### الغرب :

يقع الى الغرب من الحافة الغربية للكتلة الوسطى من الهضبة تلك الحافة التى يطلق عليها لابة بونجو Bongo وبذلك فهو يضم التلال والهضاب الصغيرة والمحدرات السفلى والسهول الساحلية التى يصيبها فى الشمال بعض الأمطار فتتمو بها حشائش السافانا وبعض الشجيرات وبخاصة فى سهل ماجونجا وهضبة أمبونجو Ambavoro ، ولكن الظاهرة الواضحة هنا أن الحياة النباتية والمناخية بل والموارد الطبيعية تزداد فقرا كلما اتجهنا نحو الجنوب من مانامبوا Manambao فتتدرج السافانا الغنية الى السافانا القصيرة الى النباتات الشوكية فالصحراء ، بل أن الساحل

نفسه يصبح أكثر استقامة وأقل جانبيه للسكنى ، أما السهول الساحلية فينتشر فى شمالها سهول الانهار الفيضية بترتبتها الغربية الخصيبة التى تتوافر فيها المياه الباطنية على عمق قليل ، على حين تحمل الانهار فى جنوبها الحصى والحصباء وتخفى المياه الباطنية ، كما تبدو مظاهر الجذب فى الحياة النباتية ، وقد ترك الفرنسيون السواد الاعظم من سكان هذه الجهات من السكافا الذين اثروا رعى الماشية فى الشمال والماعز والاغنام فى الجنوب دون أن يبدو اهتماما يذكر بالزراعة لممارسة حرفتهم التقليدية ، واستقدموا عناصر الهضبة من جماعات البتسليو Elbeteslio ، والمرينسا Merina فضلا عن زنوج البانتو لتحويل هذه المنطقة الى اقليم زراعى يتخصص فى انتاج المواد الغذائية كالأرز والسكر واللحوم ، ويزرع الآن الأرز وبعض المايونيق وقصب السكر فى الشمال .

#### إقليم الجنوب الغربى :

يمتد فى السهول الواقعة بين نهر مانجوكى Mangoky ورأس سنت مارى ، ولا يزيد المطر هنا على ٥٠ سم ، ويمكن توفير مياه الرى من الانهار ولكن السكان - وهم قليلون فى هذه الجهات التى تشبه نباتاتها ما يسود الصحراء - من السكافا الذين لا يرفضون غير رعى الابقار والماعز والاغنام حرفة أخرى ، ويوجد الى جانبهم جماعتان أحدهما تدعى Vezo وهم من الصيادين يصيدون السمك واللؤلؤ والاسفنج بل والسلاحف البحرية وأخرى تدعى Mahafly تشتغل بالزراعة ، والواقع أنه لو عنى بتوفير الرى لتمكن التوسع فى انتاج الارز ، وبخاصة أن الهنود الذين استقروا فى ميناء Tuléar أخذو يوثقون علاقتهم التجارية بالهنود فى دريان أن ينتجها هذا الاقليم سوقا رائجة فى جنوب أفريقيا ، ويتجه بعد ذلك الاقليم نحو الشرق الى كتلة فوهيمنتى Fohimenty التى تطل على خليج قورت دوفين حيث يسكن السكلافا وعناصر الباربا والانتاندروى Antàndroy الذين يبديون نشاطا أكبر ، وهذا الجزء من الاقليم أغزر مطرا ، إذ يسقط به قدر متوسط من المطر طول العام تقريبا ، وقد عرف هذا الساحل - وبخاصة ميناء فورت دوفين - طلائع المستعمرين من الأوربيين فى القرنين السابع عشر والثامن عشر أى فى وقت مبكر عن بقية شعب شبه الجزيرة لوقوعه على الطريق بين غرب أفريقية والهند أو قريبا من هذا الطريق .



تعانى الجزيرة من صعوبة الانتقال داخل أراضيها الوعرة ، كما أن مرور التيارات المائية العنيفة بسواحلها أضف الى بعدها عن الاسواق صعوبة قيام الموانئ التى انصرف الكثير منها الى استقبال سلع الاقاليم المنعزلة المتباعدة من الجزيرة ، فاصبحت التجارة الداخلية تنقل عن طريق الملاحة الساحلية الى حد كبير ، كما نشطت طرق النقل الجوى الداخلية ، فمن بين ١٨ ميناء لم يزود سوى اربعة منها بمعدات حديثة هى تاماتاف التى تستأثر بنصف التجارة الخارجية وماجونجا التى تنافسها فضلا عن دييجو سواريز وتولير ، ويوجد خطان للمسكك الحديدية كان من الصعب مدهما لوعورة الحافة الشرقية التى تعبرها المسكك الحديدية ، كما أن استخدامهما كثير النفقات ، وقد شجعت هذه الظروف على نقل كثير من السلع نسيبيا بطريق الجو ، فبلدة أندابا "Andapà" فى الشمال الشرقى تصدر البن والفانيليا ، وتستورد السلع من الخارج بالطائرة ، بل ان تسويق الدخان داخليا يتم بصريق الجو ، والبن يمثل نصف قيمة الصادرات التى تتنوع وربما كان لاستقامة الساحل وكثرة ما يكتنفه من كثرة النفقات لتشمل الأرز والطباق والفانيليا والقرنفل وتمثل الباقي من الصادرات وصعوبة النقل والبعد عن الاسواق والتضخم المالى بالجزيرة مما رفع تكاليف الانتاج وغض عن أهمية الجزيرة التجارية .

لقد تساءل الكثيرون عن كنه هذه الجزيرة التى تنتمى الى عالم المحيط الهندى تجمع بين مظاهر افريقية مثل صخور كتلتها القديمة وتربتها من اللازريت وسكانها الذى ينتمى كثير منهم لافريقية وأنها وسواحلها غير الملائمة للملاحة وزراعتها التى تقوم فى مناطق متفرقة تعتمد على الرعى والزراعة المنقلة ، وبين مظاهر آسيوية حملها حفنة من المهاجرين طبعوا السكان بطابعهم فزراعة الأرز واستخدام الحيوان الزراعى وانتشار الثقافة جعلت من السكان شعبا أكثر منه مجموعة من القبائل شأن افريقية ، شعبا له حضارته الاصلية هيات له أسباب التقدم الثقافى والمادى .



## الباب السابع

### شرق أفريقيا

#### الفصل الأول

##### حدود المنطقة :


يقع شرق أفريقية فى خطوط العرض الاستوائية فى جزئه الاوسط الى حد كبير ، ولكن ارتفاعه وتعقيد ظروف السطح فيه وتباينها قد جعلت منه اقليما ذا مناخ استوائى مرتفع أو شبه موسمى ، واذا كانت الانهار الكبرى كالنيل والنيجر والكنغو تمثل عاملا من عوامل الوحسدة فى بعض الاقليم الافريقية ، فان شرقى أفريقية يمثل هضبة مرتفعة تمتد لمسافة كبيرة يعلوها منخفض عظيم تشغله بحيرة فكتوريا ، ومن أهم الظواهر المميزة لهذه المنطقة التفاوت فى الظروف الطبيعية والبشرية بين الجهات الساحلية فى الشرق سواء كانت حارة جافة كما هو الحال فى شرق كينيا أو حارة رطبة كما فى شرق تنجانيقا وبين الجهات المرتفعة الداخلية التى يغطى قمم جبالها الثلج الدائم عند خط الاستواء أو قريبا منه . واذا كانت أفريقية الوسطى التى تقع الى الغرب من أفريقية الشرقية تسمى أحيانا بأفريقية الاستوائية لأهمية المناخ وما يتصل به من ظروف طبيعية وبشرية ، فان هذه المنطقة من أفريقية سميت « أفريقية الشرقية » لأن الطابع الذى يميزها تستمده من موقعها هذا فى شرقى القارة . ذلك الموقع الذى أدى الى امتداد الاخدود الافريقى بشقيه الغربى والشرقى كظاهرة واضحة للغاية فى بنية الاقليم ومظاهر السطح فيه ، فقد صحب هذا التصدع حركات اندفاع وهبوط وخروج اللابة من باطن الأرض وتكوين الجبال البركانية الشاهقة وتراكم مياه البحيرات فى قاع الاخدود فى كثير من جهاته ، كما تبع هذا التعقيد والتنوع الواضح والتباين بين ظاهرات السطح تأثير فى توزيع الحياة النباتية من غابات استوائية كثيفة فى السفوح السفلى للجبال الى المراعى الالبية فى أعلى قمم هذه الجبال وتباين الظروف المناخية وحرف السكان وطرق معيشتهم ، وعلاقاتهم البشرية ، فاتصلوا بالمحيط الهندى والحضارات

الآسيوية وبخاصة العربية منذ زمن بعيد ، اذ كان من اليسير اختراق هذه القارة من الشرق والساحل الشرقى فى هذه المنطقة التى لم تكن تطل شرقا على المحيط الهندى فحسب ، بل كانت تتجه نحوه ، فتلقت المهاجرين الذين استقروا فى جزائر الساحل وموانيه وتوغلوا الى منطقة البحيرات ، والواقع أن لشرق افريقية جبهتين مائيتين الاولى فى الشرق هى جبهة المحيط الهندى البحرية والثانية جبهة مياه البحيرات ، وخاصة بحيرة فكتوريا فى الغرب ، فلا غرو أن الف بعض سكان هذه المناطق الذين كانت لديهم حضارات متفوقة الاتجار والاختلاط بالعناصر الوافدة من وراء المحيط منذ عهد مبكر ، فقد وصل اليها البرتغاليون فى القرن الخامس عشر ولكن ما لبث العرب ان طردوهم فى القرن السابع عشر ، وقد عنى الاوربيون من الهولنديين والفرنسيين والبريطانيين بهذه المناطق لانها تقع على الطريق حول رأس الرجاء الى الشرق ، لأن طريق الشمال عبر البحر المتوسط كان يعترض برزخ السويس وصعوبات الملاحه فى البحر الاحمر ، كما أن الشعوب التى تقع فى شرق البحر المتوسط كانت ترتطم مجهوداتها بالمهضبة الحبشية اذ تجتذبها بما يبدو عليها من غنى اذا قورنت بالمناطق الجافة أو شبيهة الجافة التى تحيط بها ، ومن ثم لم يبلغ نفوذها الا اطراف هذه المنطقة الشمالية .

وخلاصة القول أن التباين فى الظروف الطبيعية الذى يعد أهم نتائج التفاوت فى السطح ومظاهره ، وارتباط ما يسود حياة السكان ونشاطهم بموقع هذه المنطقة المرتفعة فى شرقى القارة قريبا من جنوب غربى آسيا بصفة خاصة قد أضفى على هذه الجهات طابعا مميزا ووحدة اقليمية جغرافية عامة ( خريطة رقم ٦٢ ) .

وتمتد حدود هذه المنطقة شمالا حتى تصل الى بقاع منخفضة لا يربو ارتفاعها على ٦٠٠ متر ، فلا يعود يربط هضبة شرق افريقية بهضبة الحبشة سوى منطقة ضيقة ذات اتساع محدود تفصل بين منخفض بحر الغزال الذى يمثل الجانب الشرقى منه جزءا من منطقة الحدود وبين المنخفض الذى تمثل بحيرة توركانا ( رودلف ) أكثر بقاعه انخفاضا ، واذا كان بقية منخفض بحر الغزال ليس الا جزءا من حوض بحر الغزال فى السودان ، فان منخفض توركانا الشرقى بقلة سكانه وجفافه وانخفاضه يتجه نحو القرن الافريقى

والجهات الواقعة الى شمالية وشرقية ٠ أما الحدود الغربية التي تسير  
 متتبعه الفرع الغربي من الأخدود فهي حدود طبيعية تفصل بين الهضبة  
 الشرقية وحوض الكنفو في الغرب بما بينهما من اختلاف واضح ، كما انها  
 حدود اثنوغرافية يقطن شرقها جماعات قد اختلطت بها الدماء الحامية  
 بدرجات متفاوتة ، فضلا عن أن جماعات البانتو هنا يسمون الشرقيين ،  
 وهم يختلفون عن البانتو الغربيين الذين ينتشرون في حوض الكنفو في  
 وضوح التأثير الحامى فيهم ، ولكن منطقة رواندا وبورندي تقع الى شرق  
 هذه الحدود الطبيعية داخل هضبة شرق أفريقية ٠ أما منطقة ملاوى التي  
 تمتد الى غرب بحيرة نياسا وجنوبيها فهي تشبه جنوب غرب تنجانيقا فيما  
 يسودها من ظروف اقتصادية وطبيعية وبشرية ، على حين نجد أن زامبيا  
 تضم منطقتين مختلفتين الأولى ، تعد امتدادا لهضبة شرق أفريقية تقع الى  
 غرب بحيرة نياسا ملاصقة لتنجانيقا وملاوى ، والثانية لا تختلف كثيرا عن



جيولوجية شرق أفريقيا

- ١ - حدود بحرية من المحيط الهندي الى الشرق
- ٢ - حدود زامبيانية
- ٣ - حدود تنجانيقية

- ١ - التلال القديمة
- ٢ - البحيرات المتبقية
- ٣ - حدود موزمبيق الى الشرق
- ٤ - حدود تنجانيقية

( خريطة رقم ٦٢ )

حوض الكنفو وبخاصة اقليم كاتنجا فى ظروفها الاقتصادية والبشرية بوجه عام ، وأما فى الشرق فنجد أن حدود المنطقة تمتد الى السواحل التى تعد رغم اختلافها عن الهضبة الداخلية مرتبطة ارتباطا وثيقا من النواحي السياسية والاقتصادية والتاريخية كما تعتبر بمنافذها وبموانئها حلقة الاتصال بين هذه الجهات الداخلية والعالم الخارجى .

### البيئة ومظاهر السطح :

كانت هذه المنطقة من أفريقيا شان جهات القارة التى تقع الى غربها مكونة من الصخور الاركية المتحولة والنارية التى تعرضت للالتواءات فى العصر السابق للكمبرى ، ولكن ما لبثت عوامل التعرية أن تضافت على نحتها حتى أصبحت سهلا تحاتيا ، حتى أنه لم يأت العصران البرمى والترياسى حتى كانت هذه المنطقة قد انتشرت فى أرجائها المنخفضات التى تمتلأ بالرواسب من الرمال والطين التى تشبه رواسب كوند لنجو التى سلفت الاشارة اليها فى الكنفو . ولكن هذا التشابه بين شرقى أفريقية ووسطها قد انتهى فى العصر الجوراسى حين تفككت قارة جندوانا فى الناحية الشرقية ، فغمر ما يعرف بالبحر المتوسط الاثيوبى المنطقة الساحلية الواقعة شرقى حافة الهضبة التى تبدو الآن فى شكل سلاسل جبلية تمتد من الجنوب الى الشمال باسم أونجورو - أو ساجرا - أو هيهى .  
Oungorou, Ousagara - Ouhéhe. وهكذا لم يكن ساحل القارة

الأفريقية فى هذا الجزء يتفق مع ساحلها الحالى حتى آخر العصر الكريتاسى أو أول الزمن الثالث حين تم تفكك القارة وظهر المحيط الهندى وتراجع هذا البحر المتوسط الاثيوبى ، وظهرت تكوينات المنطقة الساحلية الشرقية من صخور الحجر الجيرى والرمل والصلصال التى تعرف باسم تكوينات ماكوندى Makondé ولكن منذ العصر الكريتاسى أخذت ظاهرة تكوين الاخدود تلك الظاهرة الضخمة تطبع الظروف الطبيعية هنا بطابعها المميز .

ولا يعيننا هنا ترجيح بعض الاراء التى تفسر هذه الحركة التكتونية الكبيرة على البعض الآخر ، إذ يعيننا الآثار الخطيرة التى تمخضت عنها هذه الحركة من مظاهر عدم الاستقرار التى تتمثل حيننا فى كثرة الثورات البركانية والزلازل ، وحيننا آخر فى الحركات الرأسية التى نجم عنها تكوين

حافات الاخدود القافزة وما تحصره من منخفضات سحيقة ، ورغم هذه الحركة نسبيا فانها لم تنته بعد ، حقا لا زالت الخطوط الرئيسية التي اتضحت فى تكوين هذه المنطقة من افريقية منذ آخر الزمن الثانى وأول القرن الثالث قائمة الا انها لم تنقطع بعد ، فهناك من الأدلة ما يشير الى استمرار حركات الانزلاق والاندفاع فى بعض جهات الاخدود حتى الان .

هذا ويمكن ان نميز ثلاثة أقسام للبنية : الهضبة بما تحمله من كتل الجبال البركانية وما يتخللها من الهبوط والاخاديد وان كان يغلب عليها استواء السطح بوجه عام ، وتتنوع فيها والصخور التكوينية الجيولوجية ولكن التكوينات من الصخور البللورية لا زالت هى السائدة ، وثانيا المناطق المنخفضة والجهات التي تعرضت للهبوط وثالثا الاقليم الساحلى بما ينتشر فيه من صخور رسوبية قديمة .

### الهضبة :

يبلغ متوسط سطح الهضبة التي تنحدر ببطء من الجنوب والشرق نحو الشمال والغرب نحو ١٢٠٠ متر فوق سطح البحر ، وتظهر الصخور البللورية القديمة فى كثير من الجهات . وتنتهى حافة هذه الهضبة من جهة الشرق بجملة مدرجات تنحدر بسرعة الى السهل الساحلى ، وتبدو هذه الحافة كسلسلة من الجبال تتجه من الجنوب الى الشمال فى جنوبها ، ثم تنحرف بعد ذلك لتسير من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى ، وهى تظهر بين نياسا فى الجنوب والصومال فى الشمال بأسماء مختلفة هى Oukambo, Ousambara Ousgara, Ouihehè ، وتنحدر منها بعض الانهار نحو الشرق ، مثل روفوما ، وفيجى ، وتانا .

هذه الصخور القديمة الاركية ، وتلك التي تنتمى للزمن الأول قد تعرضت لحركة الالتواء الهرسينية . ومن أهم الصخور الجرانيت الذى يغطى مساحة واسعة فى جنوب شرق بحيرة فكتوريا ، وحول الطسرف الجنوبى لبحيرة تنجانيقا ، وتنتشر الهضاب المسطحة التي تمثل بقايا سطورح التعرية القديمة « سطح افريقية ، وسطح جندوانا » وبخاصة بين فرعى الاخدود ، مثل هضاب أو كمبر وأونيا موزى وأوسبمر جنوب





### مناطق الهبوط والكتل البركانية :

تعرضت هذه الهضبة لتكوين الاخدود وهو ذلك التصدع العظيم البعيد المدى الذى أسفر عن اندفاع بعض المناطق الجانبية ، وقد تظهر حافة الاخدود مكونة من عدة مدرجات ، وقد تبدو بسيطة تهبط فجأة ، وقد تظهر واضحة يمكن مشاهدتها ، وقد تغطيها بعض ما لفظته المنطقة من اللابة او ما تراكم من الرواسب التى حملتها عوامل التعرية ، ويرجع ذلك الى اختلاف بنية وطبيعة سطح الأرض قبل حدوث الانكسار ، ثم أن هذا الحدث الجيولوجى لم يتم دفعة واحدة فى عصر واحد ، بل تم على مراحل فى عصور متعاقبة ، امتدت من آخر الزمن الثانى خلال الزمن الثالث حتى الزمن الرابع ، بل العصر الحالى ، ولما صاحب هذه الحركات التكتونية من ظهور اللابة التى تغطى مساحات واسعة فى تنجانيقا وكينيا ، كما تكونت الجبال البركانية التى تمثل أكثر الجبال ارتفاعا فى هضبة شرق أفريقية كجبال كينية والنجون وكلمينارو ، وغيرها كثير .

### المنطقة الساحلية :

تنبع من حافة الهضبة الداخلية أنهار عنيفة ، سريعة الجريان حفرت خنادق عميقة ليست شائعة فى الهضبة الا فى بعض المناطق المحدودة ، والواقع أن الاستواء والانبساط الذى يسود سطح الهضبة بعيدا عن تأثير الأخاديد والبراكين - يميز حافات الهضبة الوعرة ، لأن ارتفاع هذه المنطقة فى آخر الزمن الثانى ، وأوائل الزمن الثالث قد ضاعف من نشاط هذه الأنهار وجدد حيويتها ، ويضيق السهل الساحلى فى منطقة تانجا الواقعة عند خليج زنجبار قريبا من جزيرتى بمبا وزنجبار حيث لا يزيد اتساعه عن ١٦٠ كم ، وهنا تنحدر حافة الهضبة من منسوب الف متر سريعا نحو الساحل ، وتنتشر هنا التكوينات الرسوبية من الرمال والحجر الجيبرى التى أرسبت فى المياه الضحلة فى البحر المتوسط الاثيوبى الذى كانت منطقة جزيرة زنجبار تمثل طرفه الشمالى ، أما فى الجنوب فنجد سهلا واسعا بين البحر وساحل بحيرة نياسا ، وحافة الهضبة فى الشمال وهو يتخذ شكلا مثلثا ويبلغ مستواه نحو ٥٠٠ متر فى الداخل . ولكن المنطقة التى تتكون من رواسب البحر القديم هنا لا يربو اتساعها على ٦٠ - ١٠٠ كيلو متر ،

جغرافيا العالم

على حين قد أخذت عوامل التعرية تكشف عن سطح الهضبة الاركية ، فتبدو الكتل الجبلية أو الاعلام المنعزلة المنفرقة ، وقد غطى بعضها الصخر الرسوبية بعد أن تعرض سطحها لطغيان البحر .

أما فى الشمال فيتسع السهل الساحلى كما توجد بعض الكتل الجبلية التى تتقد الهضبة نحو الساحل مثل تلال تيتا Teta فى كينيا ، والساحل هنا وبخاصة فى الجزء الأوسط كثير الجزائر والخلجان ، كما ينحدر الى اعماق سحيقة فى المحيط المجاور وبخاصة فى الجنوب .

أما فى الوسط - وبخاصة حول جزيرة زنجبار - فان عمق المياه لا يعدو ٣٠ - ٤٠ مترا فى مضيق زنجبار بين الجزيرة والساحل ، ولدفع المياه السطحية تكثر الشعاب المرجانية التى قد تعترض الملاحه ، ولكنها توفر المياه الهادئة .

### المناخ :

يتأثر المناخ هنا بخط العرض كثيرا لأن شرق أفريقيا وحده يمتد من عرض ٥° شمالا الى ١٢° جنوبا ، ويتباين كثيرا فى ظروف سطحه ، فمن سهل ساحلى يسوده المناخ الاستوائى فى جزء منه الى هضبة مرتفعة يزيد ارتفاعها على ١٢٠٠ متر تصلح لسكنى البيض ، وتنمو فى كثير من جهاتها المراعى ذات الحشائش الدائمة الخضرة ، الى الكتل الجبلية البركانية التى يصل ارتفاعها الى ٥ كيلو متر فوق سطح البحر حيث يكسو قممها الجليد الدائم ، كما يتأثر المناخ بمرور التيارات المائية الدفيئة بجزء من الساحل ، ويجب ألا نغفل أثر مظاهر التضاريس السابقة من أخاديد يصيبها لارتفاع حافات قليل من المطر فى كثير من الجهات ، والمنخفضات التى تشغلها البحيرات الكبيرة كبحيرة فكتوريا التى تمثل فى تأثيرها على الرياح والحرارة والرطوبة ونظام سقوط المطر بحرا داخليا . فلا غرو أننا نلاحظ التفاوت الواضح بين مناطق حارة رطبة غزيرة المطر شمالى بحيرة فكتوريا وغربها وبين قمم رونزورى وكلمنيارى وكينيا التى يغطيها الجليد وتنتشر بها الانهار الجليدية التى تهبط الى منسوب ٤٠٠٠ متر على منسدرات الجبال ، فضلا عن انتشار ظروف المناخ الصحراوى فى شمال شرق كينيا .

وهكذا تضافرت عوامل خط العرض وطبيعة السطح واختلاف الارتفاع عن سطح البحر بين الجهات المختلفة الى وضوح التباين بين عناصر المناخ وأقاليمه .

### الضغط والرياح :

فى فصل الشتاء تهب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية من الضغط المرتفع دون المدارى موازية للساحل متجهة الى منطقة الضغط المنخفض الاستوائى ، ولكن هذه الرياح التى تهب بين نوفمبر ومازس تنحرف لتصبح شمالية غربية جنوبى خط الاستواء ، أما فى الصيف الشمالى فان الرياح التجارية ذات الهواء المدارى الرطب تهب من الجنوب الشرقى من منطقة الضغط المرتفع دون المدارى متجهة نحو الضغط المنخفض فى جنوب غرب آسيا وشمال افريقية لتتحرف الى الجنوب الغربى بعد أن تعبر خط الاستواء ، وهذه الرياح التى يطرد هبوبها بقوة بين مايو وسبتمبر توازى الساحل أيضا ، وتضعف الرياح وتصبح كيرة التغير فى شهرى أبريل- وأكتوبر وهما شهران انتقاليان ، ويلاحظ أن اتجاه الرياح فى الجهات القريبة من خط الاستواء وبخاصة قرب الساحل تتعرض لتأثير نسيم البحر والبر ، ولذلك فهى تهب من الشرق نهارا سواء الشمال الشرقى أو الجنوب الشرقى ومن الغرب ليلا سواء من الجنوب الغربى أو الشمال الغربى ، ويصحب هبوب الرياح التجارية الجنوبية الشرقية بعض الاعاصير التى تسببها هذه الرياح من الرياح الغربية فى المحيط الهندى بالمقرب من جزيرة موريشيوس ، وهى تزيد من غزارة الامطار وكثرة الغيوم ، وتتعرض هذه المنطقة من شرق افريقية لهبوب تيار الرياح الشمالية الذى يهب عادة داخل القارة متوغلا فى فصل الشتاء كما أن الرياح الغربية العليا كثيرا ما تسبب سقوط الامطار فى الجهات المرتفعة من هضبة شرق افريقية أيضا ، لأن سطح الهضبة الذى يصل الى ١٢٠٠ متر لا تسوده الرياح التى تهب على المحيط والمنطقة الساحلية بل يتأثر بتيارات الهواء العليا الى حد كبير ، ويلاحظ أن انتشار الجبال والهضبات والاختديد والبحيسرات من شأنه أن يجعل اتجاه الرياح محلى الى حد كبير ، كما أن كثيرا مما تهبه الرمال الباردة فى الوديان المنخفضة ليلا .

## الحرارة :

يمتاز الساحل برطوبته وحرارته الشديديتين اللتين تميزان الاقاليم الاستوائية ، ان يبلغ متوسط الحرارة نحو ٢٦° م ، ولو أن المدى الحرارى محدود ، فيتراوح متوسط الحرارة اليومى بين ٢٢ر٢م فى أشد شهور السنة حرارة و ٢٧ر٨م فى أقلها حرارة ، ويخفف من وطأة الرطوبة الشديدة اثناء الليل الساكن الشديده الرطوبة فى الرياح ، وبخاصة فى اثناء فصل الشتاء ، أما الهضبة الداخلية فيقل فيها متوسط الحرارة عن السهل الساحلى ، ولكن يظل المدى الحرارى محدودا فمتوسط درجة الحرارة على ارتفاع ١٨٣٠ متر مثلا فى كايتهه Kabete يتراوح بين ١٩ر٤م فى فبراير أو ١٥ر٦م فى يوليو ويشند أثر الانشعاع الشمسى فى الجهات المرتفعة ، ويبدو الفرق كبيرا بين درجة حرارة سطح الأرض وبين درجة حرارة الهواء شان الجهات المرتفعة ، ولكن الغيوم تخفف من أثر هذه الحرارة ، ولكن مع ذلك فالمدى الحرارى اليومى كبير فى الهضبة ، كما أن هذا التفاوت فى متوسط الحرارة اثناء النهار وحين يجن الليل يجعل هذا المناخ ملائما لسكنى البيض ، وان كان يؤدي انخفاض متوسط منسوب سطح الأرض فى أوغنده مع ارتفاع نسبة الرطوبة الى أن مناخها أكثر شبةا بالمناخ الاستوائى ، من حيث قلة المدى الحرارى وبخاصة بالقرب من بحيرة فكتوريا ورطوبة الجو ، وتوافر الامطار على مدار السنة ، أما تنجانيقا فانها أكثر حرارة من أوغنده ، كما أن مداها الحرارى السنوى واليومى كبير ، والواقع أن المطر هو العنصر المهم الذى يساعد على تقسيم السنة الى فصول متميزة فى مناخها .

## المطر :

لا يصيب هذه المنطقة الأمطار التى يؤدي اليها وقوعها فى خطوط العرض الدنيا ، وذلك لأن الرياح الموسمية الشمالية الشرقية تمر لمسافة طويلة على اليابس قبل أن تصل الى هذه المنطقة ، فضلا عن أنها تهب على مرتفعات مدغشقر قبل وصولها الى شرق أفريقية الى جانب أن اتجاهها يوازى الساحل أيضا .

وتتعدد أنواع الأمطار هنا بتعدد أسباب سقوطها ، أكثر الامطار فى

أوغندا يسقط بسبب مرور العواصف الراجعة التي كثيرا ما يصحبها سقوط البرد ، ويهب أكثرها ليلا على التساوىء الشمالية والغربية لبحيرة فكتوريا ، والنوع الثانى ويسقط عند ملتقى الكتل الهوائية المتباينة ( الرياح التجارية الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية أو الموسمية الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية ) ويمتاز المطر باطراد السقوط لفترة طويلة ، أما النوع الثالث فيسقط فيه المطر رذاذا على سطح الهضبة من السحب المنخفضة فى فصل الشتاء ، ويساعد على سقوط المطر هنا وصول الرياح الشمالية التى تأتى من شمال أفريقية والرياح الغربية العليا .

أما توزيع المطر فيتفاوت كثيرا لتعدد مظاهر السطح وتعاقبها ، فلا يصيب شمال كينيا الا قدر ضئيل من المطر لا يتجاوز ٢٥ سم فى العام . ويمتد أثر هذه المنطقة شبه الجافة نحو الجنوب الغربى الى شمال شرق أوغندا ، بل تتوغل فى تنجانيقا بين كلهنيارو والبحر ، كما أن الفرع الشرقى من الاخدود يقع فى ظل المطر فلا يصيبه أكثر من ٢٥ سم فى الشمال حول بحيرة رودلف ، ولا يتجاوز نصف متر فى الجنوب عند بحيرة مجادى ، أما الفرع الغربى فهو أكثر مطرا إذ يسقط به نحو متر .

أما الجهات ذات المطر الغزير فأهمها :

١ - منطقة الساحل الغربى والشمالى الغربى لبحيرة فكتوريا حول بيوكوبا ( ١٩٠٥ ملليمتر ) لأن الرياح الجنوبية الشرقية التى تمر على سطح البحيرة تصطدم متعامدة على ساحل البحيرة الجبلى .

٢ - اقليم منحدرات رونزورى الشرقية الى الغرب من فورت بورتال إذ يصيبها نحو ١٤٠٠ ملليمتر .

٣ - منطقة شرق بحيرة البرت كميسة المطر نحو ١٢٠٠ - ١٥٠٠ ملليمتر .

٤ - اقليم جولى ويقع فى شمال أوغندا بين نهر أسوا وجنادل كروما . كما تنتشر مناطق غزيرة الامطار حول الكتل الجبلية البركانية كالجون وكينيا وغيرهما .

## الأقاليم المناخية :

١ - اقليم المناخ الاستوائى الساحلى ويمتد فى الساحل حتى خط عرض ٥° جنوبا والى ٣° فقط فى الداخل كما يقل المطر نحو الشمال حتى مصب نهر جوبا .

٢ - الاقليم الساحلى المدارى ، ويقدر متوسط الحرارة السنوى بـ ٢٤ر٤ م ، وتهبط الحرارة فى الفترة بين أكتوبر ومايو حين يسقط المطر ، أما المطر الذى يبلغ متوسط نحو متر فلا يسقط أثناء فترة الشتاء الجنوبى الجاف بين يونيو وسبتمبر .

٢ - المنطقة المنخفضة الداخلية حيث يتراوح المطر بين ١ - ١٥ متر ، وتمثل الحافة الشرقية للهضبة حدود هذا الاقليم من الناحية الغربية ، ويسقط المطر فى الصيف الجنوبى .

٤ - المناخ الجاف فى شمال شرق كينيا وشمال شرق أوغندا ، وتقل الامطار سواء فى الجهات المنخفضة فى الشرق أو فى الهضبة الداخلية ، ولكن يبلغ الجفاف فى المنطقة المنخفضة حول بحيرة توركانا ( رودلف ) .

٥ - مرتفعات شرق كينيا ويمكن أن نقسمها الى شطرين : الشرقى وهو منخفض حار جاف ، والغربى وهو مرتفع لطيف ممطر ، حيث تنتشر التربة الخصبة والعمران ، ورغم أن المطر الذى يبلغ متوسطه فى الهضبة الداخلية متر فى العام قد يصل الى ١٢٠ متر الا أنه يتعرض لنذبذة كبيرة بين عام واخر ، فقد يمر عام بل عامين ، تقل أثناءها كمية المطر الى حد كبير مما يؤدى الى اخفاق الزراعة ، وتعد أوغندا أحسن حظا فى هذا الصدد من كل من كينيا وتنجانيقا كما يبدو من الجدول الآتى :

متوسط المطر وأكبر المقادير وأدناها فى شرق أفريقيا ( ملليمتر )

المحطات	المتوسط	أغزر السنوات مطرا	أدنى السنوات مطرا
عنتبة	١٥٠٠	٢٢٢٥	١٠٠٠
فورت بورتال	١٤٥٠	١٩٢٥	١٠٦٦
نيروبي	٨٧٢	١٥٧٤	٤٨٢
طابورة	٨٩٠	١٣٠٠	٣٩٠
دار السلام	١١٠٠	١٣٥٠	٤٣٥

٦ - اقيم المرتفعات الغربية غربى الاخضود الشرقى ، ويعد امتدادا للاقليم السابق فى شطره الغربى ولكن يسقط المطر هنا فى فصل طويل وليس فى موسمين كالاقليم السابق .

٧ - الاقليم الواقع على سواحل بحيرة فكتوريا الشمالية والغربية وهو غزير الامطار كثيف العمران ، ويتراوح المطر بين ٢٢٩ متر على السواحل ويبين متر فى الجهات الداخلية بعيدا عن سواحل البحيرة ، ويقل الفرق الحرارى الفصلى ، ويتراوح المدى اليومى للحرارة بين ٧ م على الساحل ونحو ١٠ م فى الداخل .

٨ - اقليم شمال أوغنده وشرقيها ، وتحدث أول قمة للمطر فى أبريل والثانية فى أكتوبر ، ويتفاوت المطر كثيرا بسبب طبيعة الأرض فيصل المطر أقصاه فى رونزورى وأدناه فى الجهات المنخفضة بمنطقة بحيرة كيوجا .

٩ - المنطقة الجبلية فى جنوب غرب أوغنده وشمال غرب تنجانيقا حيث يسقط من الامطار نحو متر موزعة توزيعا حسنا على مدار السنة .

١٠ - هضبة تنجانيقا ويتراوح ارتفاعها فى هذه الجهات الداخلية بين ٦٠٠ - ١٢٠٠ متر ، وتنخفض الرطوبة ويقل المطر ويتعرض للتغير الشديد بين عام وآخر ، وترتفع الحرارة وبخاصة فى الصيف ، كما يتضح المدى الفصلى واليومى للحرارة ، ولولا الجفاف لاصبحت هذه المناطقة صالحة للسكنى .

١١ - الحافة الشرقية للهضبة الى الشرق والجنوب من الاقليم السابق وتضم مناطق مرتفعة كجبل كلمنجارو وجبل ميرو ومرتفعات أوزمبارا Qusambara فى الشمال الشرقى ، وتمتد جنوبا الى المرتفعات شى شمال وشمال شرق بحيرة نياسا وتنخفض الحرارة حتى تصبح شبيهة بحرارة الاقليم المعتدلة بل يسقط الصقيع فى الجهات المرتفعة ، وتعتبر هذه المنطقة من أكثر الجهات فى تنجانيقا ملائمة لاستقرار البيض اذا توافرت طرق المواصلات .

### الإقليم النباتية :

تتأثر الحياة النباتية هنا بظروف السطح التى تمتاز بالتنوع ، وان كان يغلب عليها الطبيعية الجبلية ، كما تتأثر بالتفاوت الكبير فى المطر تفاوتا محليا فضلا عن موضع هذه المنطقة من العروض المدارية والاستوائية ، فحشائش السافانا التى تكون غنية فى بعض الاحيان تتخللها الاشجار وان كان وجود فصل جاف كثيرا ما يجعل هذه الاشجار من الانواع التى تتحمل الجفاف ، وقد تنمو الادغال الشوكية حيث يقل المطر بل كثيرا ما تنتهى حشائش السافانا الى مناطق صحراوية أو شبه صحراوية حول بحيرة رودلف فى منطقة توركانا وپوراننا فى شمال كينيا .

والواقع أن السافانا على تباين أنواعها وهذه الادغال تمثل الاقليم النباتية السائدة . وتنمو الغابات الاستوائية حيث تتوافر الامطار الغزيرة سواء على السفوح السفلى للجبال البركانية فى كينيا وپيرو أو على السفوح الشرقية لحافة الهضبة التى تتلقى الامطار الغزيرة كما فى أوهيهها Ouhéhé وواساجارا Oasagara وأوسمبارا Usambara عند اتصالها بالسهل الساحلى ، كما تنمو هذه الغابات عند حافة الاخدود الشرقى وتتابع النباتات على جوانب الجبال من اقليم الغابات الاستوائية الكثيفة حتى ارتفاع ١٠٠٠ - ١٢٠٠ متر تبعا لموقع الجبال وطبيعة المنحدرات ، يعلوها حتى مستوى ١٦٠٠ - ١٧٠٠ متر غابات خفيفة تقصر فيها الاشجار وتقل كثافتها ولكن على ارتفاع ٢٠٠٠ متر تظهر حشائش السافانا الطويلة الغنية ، والواقع أن المنطقة المحصورة بين ١٢٠٠ و ٢٠٠ متر هى منطقة الزراعة



والعمران ، ثم تظهر حتى ارتفاع ٢٠٠٠ بل ٣٠٠٠ متر وأحيانا غابات معتدلة: تختلط أشجارها تدريجيا بالحشائش ، ولكن فوق ارتفاع ٤٠٠٠ متر تسود المراعى الالبية تماما ، حتى اذا قاربنا القمة عند ٤٨٠٠ متر مثلا تظهر الانهار الجليدية .

تختلف التربة بين النزبة الطميية أو الجيرية أو الرملية فى المنطقة الساحلية ، والتربة الرملية الفقيرة فى منطقة نيكا "Nyika" ، والتربة الحمراء تشبه اللاتريت التى نشأت من الصخور البركانية ، وتنمو بها مزارع البن كما هو الحال فى مرتفعات كينيا ، أو الحمراء التى لا تشبه اللاتريت والتى ظهرت فوق صخور القاعدة القديمة كما فى وسط كافييرندو ، وتربة القطن السوداء المتوسطة الخصوبة .

### السكان :

تتعدد عناصر السكان هنا ، فقرب هذه المنطقة من مداخل أفريقية عند القرن الافريقى ، وسهولة الحركة وبخاصة للرعاة فى ربوعها التى تغطيها السفانا الخفيفة ، ومواجهتها لآسيا التى كانت موطننا خرجت منه الكثير من الهجرات من العناصر المختلفة التى أثبتت فى أرجاء أفريقيا ، قد ادى الى وجود سسلالات مختلفة تكاد تمثل أكثر السسلالات فى أفريقية ، فمن بقايا الالتزام الى الزنوج من البانتو أو السودانيين أو النيليين ، الى الحاميين وانصاف الحاميين والنيليين الحاميين هم يمثلون جميعا امتزاجا بين العنصرين الرئيسيين الزنوج من جانب والحاميين من جانب آخر ، فقد تابعت هجرات الحاميين فى أثر الزنوج من الزراع يدفونهم أمام سيولهم نحو الجنوب ، فتزاوجوا معهم وفرضوا عليهم ثقافتهم الرعوية ، بل لا زال بعضهم يحتفظ بنقاوة دمائه ويعيش كطبقة أرستقراطية حاكمة كالباهيما Bahima فى أوغنده .

ويمثل الافريقيون ٩٨٪ من سكان شرق أفريقية الذين يتألفون من ٢٢٠ قبيلة يتفاوت عدد أفرادها من حفنة كما هو الحال فى قبيلة الوانديرابو Wandrabo الذين يعيشون فى غابات تلال ماو فى كينيا على القنص ،

ويدين قبائل أشبه بالشعوب مثل الكيكويو ( ١٥ مليون ) اللو ( ١٢ مليون ) ، وألو كوما ( ١٣ مليون ) والباجنده ( ٢ مليون نسمة ) ، الى جانب ٤٠٠٠ من الاسيويين العرب والهنود بصفة خاصة و ١٠٠٠٠٠ من الاوربيين .

### الوضع السياسية :

ولكن مواجهة السواحل الشرقية لجنوب بلاد العرب قد اجتذب اليها العرب من العصور السابقة للاسلام ، فانسوا المراكز التجارية بل والسلطنات المختلفة ، وكانت جهودهم متفرقة ولو انها استطاعت التغلغل على الداخل الا أن تعرضهم لمنافسة البرتغاليين الذين طردوا من ممبسة معقلهم الكبير في آخر القرن السابع عشر ، قد بين لهم أهمية اتحادهم ، سنقل سلطان مسقط عاصمته الى زنجبار سنة ١٨٢٢ ، واستقل خلفه برنجبار ، ونطقة الساحل الشرقي عن عمان نفسها والواقع أن آثار العرب تظهر في الجهات الساحلية وفي المدن التجارية القديمة في المناطق الداخلية ، وقد بلغت قوة العرب أوجها حين اتحدوا تحت حكم سيد سعيد ( ١٨٠٦ - ١٨٥٦ ) ، وقد فتح العرب الطريق أمام رحلات برتن وسبيك من الشرق . تم امتد الحكم المصري الى السودان والى أوغنده على أثر كشف هذه المناطق حين أقام غوردون وبيكر وأمين باشا سلسلة من الحصون والمعازل الحربية في شمال أوغنده سنة ١٨٧٠ تقريبا ، وقد قام صراع بين النفوذ الأوربي والعربي في هذه الاصقاع كل يريد السيطرة على مقاليد الحكم في سلطنة او مملكة بوغنده ، ولكن الألماني كارل بيترز Karl Peters أخذ يتصل بالحكام الوطنيين ليحقد معهم الاتفاقات التي افضت سنة ١٨٨٥ الى اعلان ألمانيا الحماية على هذه المناطق ، وقد اتفق البريطانيون والألمان من جانب وسلطان زنجبار من جانب آخر على توزيع مناطق النفوذ بين الألمان والبريطانيين ، وقد ترك لسلطان زنجبار مساحة يقدر عرضها بنحو ١٠ اميال ، ومنح عقد الامتياز الى شركة Imperial British East Africa التي تولت مقاليد الحكم والتجارة في منطقة النفوذ البريطاني سنة ١٨٥٠ ، ولكن نفقات الحكم كانت باهظة وأصبح الحكم على هذا النحو غير مجز ، الى ان اجاراد اقناع الحكومة البريطانية بتولى حكم هذه الجهات مباشرة سنة

١٨٩٣ ، وفى سنة ١٨٩٤ غزيت بونيورو الى جانب ضم بعض الجهسات الأخرى حتى أنه لم يأت عام ١٨٩٦ حتى كانت المحمية التى تعرف باوغنده قد تكونت ، فضلا عن كينيا ، ولما كانت أوغنده تقع نائية فى الداخل فقد مدت سكة حديدية تصل بين ممبسة وكيسومو مارة بنيروبى سنة ١٩٠١ .

عادت المانيا للضغط على سلطان زنجبار فمئحته حق جمع الضرائب من منطقتة الصغيرة على طول الساحل سنة ١٨٨٨ ، ثم وضع الالمان يدهم عليها نظير دفع ٢٠٠.٠٠٠ جنيهها سنويا للسلطان ، وحين نشبت الحرب العالمية الأولى وضعت أفريقية الشرقية الالمانية التى عرفت بتنجانيقا تحت الانتداب البريطانى سنة ١٩١٩ . وهكذا أصبح شرق أفريقية البريطانية يضم مستعمرة كينيا ومحمية كينيا ومحمية أوغنده وتنجانيقا التى وضعت تحت الوصاية ومحمية زنجبار ، وقد حاولت بريطانيا توثيق العلاقات بين هذه الجهات فأنشأت هيئة تدعى هيئة شرق أفريقية East Africa High Commisisoner للنظر فى الامور العامة التى تعنى بها هذه الوحدات السياسية المتعددة سنة ١٩٤٨ ، كما وضعت الموانى والسكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى تحت ادارة واحدة للتنسيق فيما بينها .

عرفت أكثر جهات شرق افريقيا الالمانية الذى انتقل لبريطانيا سنة ١٩٢٠ باسم تنجانيقا التى أصبحت تحت الانتداب البريطانى ، ثم تحت الوصاية ١٩٤٦ لتستقل بعد ذلك فى ديسمبر سنة ١٩٦١ ، أما كينيا فقد أصبحت مستعمرة بريطانية سنة ١٩٠٥ بعد أن كانت شركة شرق أفريقية البريطانية الامبراطورية تحكمها لتصبح مستقلة سنة ١٩٦٣ ، أما أوغنده التى كانت محمية بريطانية سنة ١٨٩٦ فقد استقلت سنة ١٩٦٢ ، شان رواندا وبورندى اللتين انتقلتا من وضعهما تحت الحماية البلجيكية الى فرض الوصاية البلجيكية عليهما قبل استقلالهما سنة ١٩٦٢ .

واضطرت الادارة المشرفة على مد الخط الحديدى بين ممبسة وكيسومو أن تجلب العمال من الهنود الذين بلغ عددهم ٣٥٠٠٠٠ ومن بقى منهم يعمل فى الوظائف الصغيرة والاعمال التجارية والحرف .

قدر عدد الاوربيين سنة ١٩٧٩ بـ ٤٢٠٠٠ نسمة فى كينيا ، يسكن  
١٠٣٠٠ فى نيروبي وحدها أما فى أوغندا فيقدر عدد الاوربيين بـ ١٠  
الاف يعمل بالزراعة منهم نحو ألف . أما فى تنجانيقا فيبلغ عددهم ١٧٣٠٠  
نسمة يسكنو فى المدن والمرتفعات .

### الاقاليم الطبيعية :

يبدو التباين فى الاقاليم الطبيعية التى تنقسم اليها المنطقة لاختلاف  
عناصر البيئة الطبيعية نفسها من تضاريس وتربة ومناخ وحياء نباتية ،  
واهم الاقاليم الطبيعية فى شرق افريقية البريطانية هى :

١ - النطاق الساحلى : يتراوح اتساع السهل الساحلى بين ١٦ -  
٦٥ كم ويحف بالساحل المرجان كما تنتشر المناطق الرملية الجرداء تتخللها  
دالات الانهار الخصيبية ، تقترب منه الجزائر مثل بمبا وزنجبار ومافيا ،  
وتتناوب هذه المنطقة الرياح الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية التى لعبت  
دورا مهما فى ربط هذه الجهات بالمناطق الموسمية فى المحيط الهندى ، ويغزر  
المطر فى جنوب غرب جزيرة بمبا فتتمو الغابات والادغال الكثيفة ، على حين  
تقل هذه الامطار وبخاصة بعد أن يتجه الساحل نحو الشمال الشرقى .  
فتتمو حشائش السافانا والشجيرات الشوكية ، وينحنى الساحل هنا نحو  
الداخل فيقترب كثيرا من البحيرات بالمقرب من منطقة زنجبار .

٢ - منطقة السهل الساحلى وهى تتكون من سهل متسع فى أطرافه  
الشمالية والجنوبية ، وان كان يضيق فى جزئه الأوسط فى منطقة تانجا ،  
أما فى الشمال فتقل الامطار وبخاصة فى منطقة أوكمبا ، حيث يتراوح المطر  
بين ١٢ - ٥٠ سم فى العام ، ولا يصيب أغزر هذه الجهات مطرا أكثر من  
نصف متر فى منطقة كينيا وشمال تنجانيقا ، بل أنها تهبط دون ذلك المتوسط .  
مدة سنة فى كل ثلاث سنوات ، بل أن الانهار هنا كنهرو تانا وجراسو نييرو  
Guasso Nyiro لا تشجع السكان كثيرا على الاستقرار ، فالزراع هنا  
اقل عددا وثروة من المنطقة الجنوبية ، أما الجزء الجنوبى فهو يمتد فى شكل  
أرض منخفضة ذات شكل مثلث ، وينمو هنا الادغال الكثيفة والسافانا  
البدائية بل قد تنمو غابات الدهاليز حول مجارى الانهار مثل روفوما  
ورويجى ويمكن استخدامها فى الرى ، والواقع أن المطر هنا لا يقل عن

خصف متر وان كان يتعرض للتذبذب . ويقوم السكان بزراعة المناطق ذات التربة السوداء التى تتخلل هى والتربة الغرينية فى دالات الانهار نوعا من التربة الرملية قليلة الخصوبة ، كما يوجد منطقة أخرى كثيفة السكان نسبيا تمتد على حافة هضبة أفريقية الشرقية إذ تتوافر فيها الامطار والحرارة المعتدلة والحياة النباتية الغنية . ويعوق استغلال منطقة الساحل فى الري انتشار ذباب تسي تسي ، وقد يتطلب القضاء عليه تدمير الغطاء النباتى على حين لم تظهر بعد الامكانيات الزراعية لهذه المنطقة ، وقد تظهر بعض الجبال البركانية كمقدمة للهضبة الداخلية مثل تلال Teila فى كينيا التى اجتذبت عددا كبيرا من السكان المستقرين لثربتها البركانية الخصبة .

٣ - هضبة شرق أفريقية التى يشقها الاخدودان ، وفى هذه الهضبة يمضى السطح لمسافات كبيرة على وتيرة واحدة ، كما توجد تربة فقيرة فى قاع الفرع الشرقى من الاخدود الذى تصيبه مطر قليل ، ولو أنه يضم بعض الجهات التى تصلح لتربية الحيوان فى كينيا بل ويمكن زرعها بتوفير المياه فيها ، أما الفرع الغربى من الاخدود وهو أكثر انخفاضاً من الفرع الشرقى. فحار جاف ، والظروف المناخية والنباتية متباينة ، فنمو سفانا البساتين. المدارية فى بعض الجهات كما تسود السفانا الجافة فى بعض الجهات الأخرى كما فى ماساي ووسط تنجانيقا ، ولذلك فالسكان يمارسون حرفا متعددة فالكيكيو مثلا يحترفون الزراعة والمساي الرعى . ويتراوح المطر بين ٢٥ متر فى المرتفعات و ٢٥ سم فى الجهات السهلية ، وفى شرق الهضبة يوجد كتل صلبة بركانية ، أهمها فى كينيا المرتفعة وفى تنجانيقا كما يوجد مرتفعات كيبى فيرى ورونزورى فى أقصى الغرب ، وقد اجتذبت خصوبة التربة السميكة والمطر الغزير المضمون السكان ، الذين ازدحمت بهم كما أنها يمكن أن تصبح متنفسا للسكان اذا كانت مسرحا فى المستقبل لمشروعات زراعية .

٤ - منخفض بحيرة فكتوريا : يسقط المطر الغزير فى شمال وشمال شرق البحيرة وغربها ، وتنمو بها حشائش السفانا ، ويسود جنوب أوغنده وشرقها حشائش ، مثل elephant grass وقد قامت الحضارة الافريقية فى بوغنده على شواطئ البحيرة ، كما قامت المرائى ونشطت التجارة وصيد الاسماك بل كان لملكة بوغنده أسطول نهري فى هذه الجهات .

## ٥ - إقليم ما بين البحيرات :

يمتد هذا الإقليم بين بحيرات الاخدود فى الغرب كتنجانيقا والبرت وادوارد وكيفو وبحيرة فكتوريا فى الشرق ، يسود هنا نظام المطر الاستوائى، وتتدرج النباتات على منحدرات جبال رونزورى وفيرونجو ، كما تنمو حشائش الهضبة دائمة الخضرة بين بحيرة فكتوريا وسفوح هذه الجبال ، وتعتبر المنطقة التى تمتد من بروندى الى اوراندا وأوغندا أكثر هذه الجهات غنى وسكانا .

### أوغندا :

تقدر مساحتها ٣٣٩٦٠٠ كم مربعا اذا استبعدنا المسطحات المائية التى تقدر بنحو ١٣٦٨٩ ميلا مربعا ، وتقع على بعد يتراوح بين ٥٠٠ - ٨٠٠ ميل من البحر ، ويقع معظم اراضى أوغنده على سطح الهضبة الافريقية على ارتفاع يتراوح بين ١٠٠٠ - ١٣٠٠ متر فوق مستوى البحر ، ويدخل أكثر جهاتها فى حوض النيل أن تصرف مياهها عن طريق النيل وروافده الى بحيرة البرت ، وتتفق حدود أوغندا فى الجانب الشرقى مع خط تقسيم المياه بين نهر النيل وبحيرة رودلف ، أما فى الجانب الغربى فتنتهى بهضبة بونجورو التى تحل على بحيرة البرت التى يخترقها خط الحدود ، ومن م فان الهضبة يسودها مناخ استوائى قد عدل الارتفاع من شدته :

ويقدر عدد سكان أوغندا بـ ١٣٩٩٠٠٠٠ نسمة ، ويزدحم السكان الذين يبلغ متوسط كثافتهم نحو ١٠٠ فى الكم المربع فى الجهات الخصيبة المحيطة بسواحل فكتوريا وعلى سفوح جبل الجن ، والواقع أنه لخصوبة التربة وتوافر الأمطار فى كثير من الجهات ، وصلاحية المنطقة لانشاء المزارع الكبيرة بلغ عدد الاوربيين ١٠٣٠٠ سنة ١٩٦٨ ، يعمل أكثرهم فى الادارة والأعمال العامة إذ لم يتجاوز الزراع المستقرين ألف نسمة ، لأن رطوبة الجو هنا وارتفاع الحرارة طول العام وعدم وضوح الفرق الفصلى يبعث الملل فى نفوس الاوربيين ، فيلجأون الى سفوح الجون أونزورى .

ورغم تعرض المطار الذى يتراوح بين متر ومتر ونصف للتغير من عام لآخر شأن جهات افريقية المدارية ، فهو أشد استقرارا وانتظاما فى سقوطه

إذا قورن بالمجھات الأخرى ، ويبلغ المطر أقصاه فى فترتين الأولى بين أبريل ومايو والثانية بين أكتوبر وديسمبر ، وتخفف الرياح الجنوبية الشرقى من وطأة الحرارة على سواحل بحيرة فكتوريا الغربية والشمالية الغربية بعد مرورها على سطح البحيرة .

وتنمو الغابات الخفية فى الجھات التى يكفى المطر لنموها ، ولكن حيث يقل المطر تسود حشائش السافانا البستانية التى تزداد فقرا كلما اتجهنا نحو الشمال الشرقى ، ولكن هذه النباتات قد دمرت واختفت فى كثير من الأجزاء منذ أجيال طويلة على يد الوطنيين ممن يمارسون الزراعة المتنقلة ، وعلى حين تنتشر الزراعة المتنقلة للاكتفاء الذاتى بين الجماعات البعيدة عن طرق المواصلات ، فتزرع الذرة الرفيعة والكسافا والموز ، نجد أن إقليم برغنده وإقليم بوسوغا إلى الشمال من بحيرة فكتوريا كان موطناً لمملكة وطنية متقدمة قبل مقدم الاستعمار الأوروبى ، ورغم أن الطبقة الحاكمة نرى دوشنة تنتمى إلى قبيلة الباهيما الحامية ، فإن سكان الجھات الساحلية الغنية بتربتها الخصبة وأمطارها الغزيرة من الزوج الذين يمثلون في سكان أوغنده كلها ويتقنون الزراعة وبخاصة زراعة الموز والكسافا والذرة الشامية والبطاطا والقطن ، ولذلك فمزارع القطن هنا صغيرة تتراوح بين ١ فدان وخمسة أفدنة عادة ، والقطن الذى يزرع من النوع الأمريكى المتوسط الثقل . وتقدر أقصى مساحة زرعت قطناً فى أوغنده بنحو ١ مليون فدان ، ويزرع أكثر المحصول للتصدير وبخاصة فى مقاطعة شرق أوغنده ، وقد كان من أهم العوامل التى شجعت على التوسع فى زراعته مد سكة حديد أوغنده ، حتى كيسومو لنقل القطن إلى ممبسة على بعد ٦٥٠ ميلاً ، وقد أقيمت قنطرة على نيل فكتوريا قبالة جنجا لربط كمبالا بكيسومو ، ولكن لا زالت السفن تسير فى بحيرة فكتوريا حتى كيسومو بدلاً من اتباع طريق السكة الحديدية الذى يعد أكثر نفقة . وإلى جانب منطقة شرق بوجنده والأجزاء الوسطى والجنوبية من المقاطعة الشرقية فى أوغنده يزرع القطن فى منطقة تقع شرق بحيرة كيوجا تسود بها تربة طفلية عميقة ، ويكاد يحتكر الهنود حلاج القطن .

ويزرع الوطنيون الطباق الذى يصدر جزء منه ، كما يحضى الهنود زراعة قصب السكر الذى أدى إلى إنشاء مصانع السكر فى كمبالا وجنجا وموانى بحيرة فكتوريا ويفيض السكر عن حاجة البلاد ، أما البن فقد انتشرت

زراعته ببطء عن القطن بين الوطنيين من الزراع لأنه يقتضى انتظار الزراع فترة طويلة حتى يجنوا ثمار عملهم . ويزرع البن سواء من Robusta « الروبستا الذى يصلح للجهات المنخفضة الحارة أو من النوع العربى فى الجهات الغربية من البلاد ، فالنوع الأول يزرع فى مناطق توررو Toro وانكولى Ankole على حين يزرع النوع الثانى على منحدرات جبال رونزورى الجون ، ولا زلل الوطنيون وقليل من الاوربيين يزرعون البن ولكنه لم يبلغ أهمية القطن .

و يضار الحيوان الذى يغلب عليه أن يكون من نوع غير جيد لانتشار ذباب تسمى تسمى فى كثير من الجهات وبخاصة المنخفضة ، وأحسن انواع الماشية يربى فى الجهات الغربية المرتفعة لدى جماعات البانينكولى ، وتعد الجلود من أهم صادرات الاقليم ، وقد أعقب مد السكك الحديدية وبخاصة من كيسومو الى جنجا وكمببالا استغلال الثروة المعدنية القليلة وأهمها النحاس من Kilemce الى جانب بعض القصدير والولفرام والبريل ، وقد قدرت قيمة الصادرات بسبعة ملايين جنيهه سنة ١٩٦٨ .

#### كينيا :

تضم كينيا التى تمتد بين خطى عرض ٥٢ شمالا ، ٤ جنوبا مستعمرة كينيا التى أصبحت سنة ١٩٢٠ احدى مستعمرات التاج البريطانى ، وشقة من الأرض يدفع ايجارها لسلطان زنجبار التى كانت تعد من أملاكه مقابل ١٦٠٠٠ جنيهه سنويا ، وقد وضعت حدود كينيا فى الشمال الشرقى سنة ١٩٠٨ بالاتفاق بينها وبين الحبشة ، ولكن سنة ١٩٢٤ أعيد تخطيط الحدود مع ايطاليا التى اقتطعت من أملاك سلطان زنجبار التى كانت تقع داخل كينيا من قبل منطقة جوبا وجزءا من أراضى شمال كينيا فضلا عن الصومال ( الذى كان يطلق عليه الصومال الايطالى ) ، ولكن أضيف الى أراضى كينيا منطقة بحيرة توركانا ( رودلف ) الواقعة فى الشمال الغربى بعد اقتطاعها من أوغندة .

وتقدر مساحة كينيا بـ ٥٨٢٦٠٠ كم<sup>٢</sup> يسكنها ١٥٣ مليون نسمة ويتحدث سكان المناطق الساحلية والغربية منها اللغة السواحلية وهى خليط من البانتو والاربية ، على حين تنتشر لغات متعددة فى الجهات الداخلية



تحدثها القبائل وأهمها لغات البانتو ، وقد تغلغل النفوذ العربى فى شرق كينيا منذ عصر قديم ولذلك فان تعداد العرب بين السكان يقدر بنحو ٣٩٠٠٠ ، أما الهنود ومهاجرو جوا البرتغالية على ساحل الهند الغربى فقد قدموا للاستفادة منهم فى مد السكك الحديدية ولا زال عدد كبير منهم يصل الى نحو ١٩٢٠٠٠ يعملون فى كينيا . ولكن أهم ما يميز كينيا من الناحية البشرية صلاحية مناطقها المرتفعة لسكنى الاوربيين الذين يملكون مزارع كبيرة ، إذ يقدر عددهم بنحو ٤٢٠٠٠ نسمة .

### وتنقسم كينيا من الناحية الطبيعية الى :

١ - إقليم السهل الساحلى ولا يصيبه القدر الكافى من الامطار الا فى جزئه الجنوبى حول ممبسة ويقدر متوسط الحرارة السنوى بـ ٢١٦ م .


٢ - منحدرات نيكا Nyika التى تعد مقدمة للهضبة الداخلية .

٣ - الهضبة الشرقية فى افريقية التى تنحدر غربا نحو بحيرة فكتوريا وقد ظهرت بها البراكين التى تمثل جبالا مرتفعة مثل الجون وكينيا .

٤ - الاخدود الشرقى وما يحفه من مرتفعات مثل سلسلة جبال ابردير Aberdare ، ويتراوح عرض الاخدود هنا بين ٤٥ و ٦٥ كم ويهبط دون سطح الهضبة بنحو ٦٠٠ - ٧٠٠ متر .

ولتوزيع المطر أهمية كبرى فى تعمير كينيا ، فنحو  $\frac{1}{3}$  مساحة كينيا فى الشمال والشمال الشرقى يقل فيه المطر من  $\frac{3}{4}$  متر ويقل فيه السكان كثيرا إذ يحدث  $\frac{3}{4}$  هؤلاء السكان فى نحو الربع الباقى من مساحة البلاد لأن شطرا كبيرا منها يقل ما يسقط من المطر فيه عن  $\frac{1}{4}$  متر ، ويقع أكثر هذا الجزء المعمور فى المناطق المرتفعة التى يسقط بها المطر الكافى ويتقاسمها الاوربيون بمزارعهم الكبيرة التى تقدر بنحو ١١٠٠٠ ميل مربع وقد صفت هذه المزارع واستلمها الوطنيون بعد استقلال كينيا .

وتمتاز الظروف الطبيعية فى كينيا بالتباين الكبيرة فالسهول الساحلية مثلا التى تحفها غابات المانجروف فى الجنوب تسود بها الشجيرات وأشجار السنط والأشجار الشوكية فى جهاتها شبه الجافة ، وقد تنمو بعض النباتات جغرافيا العالم



الكثيفة نسبيا حول مجارى الانهار ، أما الهضبة الداخلية فتعدد فيها مظاهر الحياة النباتية ، فعلى حين تتدرج بعض المرتفعات والنباتات من الغابات الى السافانا الى المراعى الألبية والغابات المعتدلة ، تبدو الاقاليم النباتية بوضوح من النباتات المدارية الى السافانا والغابات المعتدلة والمراعى الألبية حتى خط الثلج الدائم على جوانب الجبال البركانية كالمجون ، وتنمو حشائش السافانا على سطح الهضبة فى الجهات الجنوبية والجنوبية الغربية الغنية على حين تجف هذه الحشائش فى الجهات الشمالية وتظهر نباتات الصحراء وشبه الصحراء الجافة من السنط وغيره ، ويتراوح المطر بين ١/٢ متر شرقى الجهات المنخفضة الجافة وبين متر فى الجهات المرتفعة التى قد يصل نصيبها من المطر الى ١٣/٢ متر . وقد استأثر بهذه الجهات المطيرة حيث تصبح مراعى السافانا غنية - القبائل الرعوية مثل المساي والكيكويو ، ولكن بعد قدوم الاوربيين ومد سكة حديد كينيا الذى أدى الى تشجيع استغلال موارد كينيا وأوغندا ، أقيمت المزارع فى الجهات الغنية حيث التربة البركانية الخصيبة وبحيث تنخفض الحرارة ليلا كثيرا مما يجعل المناخ صالحا لسكنى الاوربيين وتهبط درجة الحرارة فى نيروبي الى ١٤°م كمتوسط للنهاية الصغرى ، أما متوسط النهاية الكبرى فيقدر بـ ٢٥°م على حين يقدر متوسط الحرارة السنوى بـ ١٩.٥ م ، وقد تهبط الحرارة أثناء الليل فى نيروبي الى ٧°م . وهذا الفرق الحرارى الكبير وبخاصة بين الليل والنهار وهو الذى اجتذب الاوربيين الى مناطق مزارعهم الكبيرة فى ناكورو Nakuru والدوريت Eldoret التى تخرقها السسكك الحديدية ، على حين توجد اراضى الوطنيين فى المقاطعات الوسطى ونيانزا .

وتتعدد أنواع المحاصيل الزراعية لا لتباين الظروف الطبيعية فحسب بل كذلك لتنوع طرق الانتاج ونظمه ، فالبن والسيزال والشاي تعد من أهم منتجات المزارع الكبيرة التى يملكها الاوربيون ، وان كانت بعض هذه المزارع تنتج الحبوب كالقمح والشعير والذرة ، وتكاد تحتكر كينيا انتاج نبات يستخد فى مقاومة الحشرات يدعى بيريثروم "Pyrethrum"

ويزرع البن فى شرق الاخدود فى مزارع الاوربيين بوجه خاص ، ولكن عدم ضمان القدر الكافى من المطر فى منطقة نيروبي ذات التربة البركانية الخصيبة لم يسمح بالتوسع فى زراعته فى هذه المنطقة . وقد وضع مشروع

سونرتون Swynnerton plan لتشجيع الافريقيين من الزراع على زراعة البن وغيره من المحاصيل التجارية وهو يستهدف مضاعفة دخل ٦٠٠٠٠٠ أسرة من الزراع الوطنيين فى مناطق المطر الغزيرة نحو عشرة اضعاف . فبلغ عدد زراع البن نحو ٧٥٠٠٠ سنة ١٩٥٨ ، وبكث مساحة ما يزرع منه محدودة ، ويزرع السيزال فى مزارع الاوربيين لحاجته للملات لاعاداه للتصدير وان كان الافريقيون قد اقبلوا على زراعته ، ويعتبر الذرة المحصول الغذائى الرئيسى للافريقيين الذين يزرعون فى منطقة نيانزا وفى مزارع الاوربيين حين يعملون فيها ، ولكن المزارع الاوربية تنتج محصولا كبيرا منه لاستخدامه علفا للماشية بوجه خاص . واما الشاي فيزرع فى الجهات المرتفعة التى تصل الى ٢٠٠٠ متر فى منطقة ليمورو Limuru الواقعة غربى نيروبي بنحو ١٧ ميلا ومنطقة كيريشو Kerichu ، وتقدر قيمه الانتاج باكثر من ١٥ مليون جنيه . اما اشجار الواثل Wattle الذى يصدر لحاؤه فيقدر مقدار ما يستخرج من لحائه فى العام بنحو ٢٥٠٠٠ طن .

يمكن أن نميز نوعين من مزارع الاوربيين : المزارع الكبيرة التى تزيد مساحة كل منها ٢٠٠٠٠ فدان ، والمزارع الصغيرة حيث تقوم زراعة مختلطة وتبلغ مساحة المزرعة ١٥٠٠ فدان أو أقل ، وتنتج البانا ولحوما واصوافا وجلودا بمقادير كبيرة جيدة ، فينتج مصنع لتعليب اللحم بالقرب من نيروبي ٣٠٠٠٠ علبة يوميا ، كما يقوم مصنع لنجبن فى Nero-Moru ويوجد مصنع لتعليب لحم الخنزير فى ليمورو Limuru ، ومصانع الالبان فى نيفاشا ، ويزرع القمح والبيرثروم والشوفان وشعير لخداء الحيوانات ولصناعة الجعة .

ويرتكز العمران الزراعى حول السكة الحديدية الوسطى فى المرتفعات بعيدا عن الساحل ذى التربة الجذباء وعن الجفاف فى الشمال والجنوب .

ولم يستقر الزراع من الاوربيين فترة طويلة اى بضعة اجيال حتى يمكن اعتبارهم من المستوطنين المستقرين ، لأن كثيرا منهم يستغلون مزارعهم فترة معينة لتباع لغيرهم من المهاجرين الجدد قبل أن يعودوا لمبلادهم ، وان كانت توجد هناك جماعات قد قضت جيلين بل ثلاثة فى كينيا .

وقد ألف الزراع من الوطنيين للاكتفاء الذاتى فى مزارعهم الصغيرة ،

مقانتاج الذرة ، والذرة الرفيعة ، والموز والفول والكسافا تمثل أهم محاصيلهم الغذائية ، وقد شجعت السلطات الاوربية على زراعة البن والشاي كمحاصيل تجارية ، وقد انتشرت زراعتهما بالقرب من جبال كينيا ومنطقة جبال أبير داري ، ولكن تربية الحيوان وبخاصة حيث تقيم قبائل من الرعاة فى مناطق فقيرة تشبث فيها بممارسة الرعى كمنطقة المساي قد جعلت لتوفير العلف وتحسين سلالات الحيوانات واقامة الاسيجة حول المراعى ، واتباع دورة للرعى تقى التربة شر الدمار ، وتوفير مياه الشرب ونقل السكان من مناطق فقيرة الى بقاع أكثر غنى على جانب كبير من الأهمية ، ولكن ضيق الأرض الخصبة بسكانها بعد أن احتجز الاوربيين أجود الاراضى تاركين أكثر البقاع جديا للوطنيين ، قد ضاعف من آثار تعرية التربة وأنهاكها ، وضيق الملكيات وتفتتها لم يفسح المجال أمام ضغط السكان لاتباع طرق صيانتها من تسميد واتباع دورة زراعية للمحاصيل وبخاصة بعد أن اتضح التوسع فى زراعة المحاصيل التجارية ، ويظهر ذلك فى معزل الكيكويو بصفة خاصة .

ويزرع البن فى مزارع الاوربيين حول Kiambu بصفة خاصة ، والشاي تتركز زراعته فى منطقتي كيرتشو Kersckho ، ليورو Limuru أما البيريثروم فيزرع فى المناطق المرتفعة فى منطقة الأخدود الانكسارى ونيانزا والاقليم الأوسط ، وتتفرق مزارع السيزال فى الساحل ونيانزا والأخدود وأقليمي ثيكا Thika وماتشاكوس Machakou أما لحاء شجر الوائل فتنتج المنطقة الوسطى منطقة واسين جيشو Uasin Gishu وتعد تربية الحيوان وزراعة الحبوب أكثر انتشارا فى منطقة نيانزا والأخدود ، وهكذا تتعدد المحاصيل الزراعية بفضل تعدد البيئات ونظم الزراعة .

فلا غرو أن اشتدت الهجرة من المناطق المزدهمة والفقيرة التى اكره على سكنها الوطنيون ، وقد عانت البلاد من حالة الطوارئ التى سادت اثناء ثورة الكيكوكيو الوطنية ( الماو ماو ) فى الفترة بين ١٩٥٢ - ١٩٥٩ ، ولذلك فان توفير رعوس الأموال لتنفيذ مشروعات الرى فى المناطق الجافة ، وتوفير طرق النقل ووسائله ، واعادة توزيع السكان مع استرجاع جانب مما اغتصبه منهم المستوطنون الاوربيون ، وتحسين الظروف الصحية وبخاصة فى مناطق الريف الفقيرة ، والاحياء الوطنية الفقيرة التى تمثل ظاهرة واضحة فى مدن كينيا ، كل هذه المشكلات تمثل تحديا لكينيا المستقلة .

وتعد نيروبى فى وسط منطقة زراعية غنية وعلى اتصال سهل بالساحل والداخل وتعتبر أكبر مدن شرق أفريقية على الإطلاق ، وموطننا لصناعات مثل الصناعات الهندسية الخفيفة ، وطحن الغلال ، والطباق والملابس والأثاث ، أما ناكورو Nakuru فهى مركز مهم لاستخراج المادة الكيماوية من نبات البيرثروم ولطحن الغلال ، أما ممبسة الميناء الرئيسى فهى مركز لتكرير البترول ولصناعة الاسمنت بصفة خاصة ، وازاء مشكلات التنمية فى كينيا اتجهت الادارة البريطانية قبل الاستقلال الى القيام بمشروعات محدودة ، مثل مشروع رى ٥٠٠٠ فدان فى منطقة Mwea-Tebre

ويعد انشاء « منظمة تنمية اراضى الافريقيين African Land Development Organization » محاولة غير مجدية كثيرا للتنمية لأنها تستهدف تشجيع الوطنيين من الزراع على تحسين طرق الزراعة مع الاقبال على تخصيص مساحة كبيرة لزراعة المحاصيل التجارية ، رغم أن المشكلة الكبرى هى مشكلة ضيق وتفتت الملكيات الزراعية وحرمان الزراع الافريقيين من جانب كبير من اراضى وطنهم \*

وقد انتشرت الطرق التى عاون فى مدها الأسرى الايطاليون اثناء الحرب العالمية الثانية ، وذلك الى جانب السكك الحديدية بخطها الرئيسى بين ممبسة وكيسومو وكمبالا وفروعها الى منطقة مجادى حيث تستخرج الصودا التى يناهز انتاجها مائة ألف طن سنويا ، والى منطقة جبل كينيا بمحاصيلها ، ولا تزيد قيمة الصادرات من المعادن عن ٥٥% وتشمل كربونات الصوديوم والذهب والفضة وغاز ثانى أوكسيد الكربون الدياتوميت والجرافيت والحجر الجيرى والملح والجبس Graphite, asbestos, Kyantle, diatomite

وتعد نيروبى التى كانت محطة للسكك الحديدية فحسب والتى تقع فى وسط منطقة الزراعة الاوربية أكبر مدن كينيا وعاصمتها وكانت مقر المندوب السامى لشرق انريقية East African High Commissioner ، ويلىها ممبسة التى تقع على جزيرة خصبة عند مصب خليجى يجعل من مرفئها كلينديسى Klindini الواقع فى الطرف الغربى للجزيرة للميناء الطبيعى الأول فى الساحل الشرقى لافريقية وقد كانت توجد بالجزيرة حيث تقوم ميناء ممبسة التى تبدأ منها السكة الحديدية الرئيسية حيث تحمل تجارة أوغندا.

فضلا عن كينيا قلعة عربية ، ولا زالت الجالية العربية التي تبلغ نحو ١٣,٠٠٠ الى جانب نحو ضعفهم من الهنود يمثلون ١/٣ سكان ممبسة .

**تنزانيا** : تشمل جمهورية تنزانيا المتحدة تنجانيقا وزنجبار وبمبا وقد أُنشئت سنة ١٩٦٤ فكانت تنجانيقا تمثل جزءا من شرق أفريقية الالمانية قبل الحرب العالمية الأولى ، وهي تفرق في مساحتها كينيا وأوغندا معا ، فمساحتها تقدر بـ ٩٣٩٧٠٠ مربع ، وهي تنقسم الى :

١ - السهل الساحلى الذى يتراوح عرضه بين ١٥ ، ٩٠ كم والذى يرتفع تدريجيا الى سطح الهضبة الافريقية .

٢ - الهضبة التى يقدر متوسط ارتفاعها بـ ١٠٠٠ متر ويقدر عرضها بنحو ٦٠٠ ميل ، وقد يتخلل الهضبة جهات منخفضة يحتل بعضها الاخدود الافريقى ، كما تنتشر بعض الجبال القليلة الارتفاع التى يبلغ ارتفاعها نحو ٦٠٠٠ متر فوق سطح البحر كجبل كلمنيارو الذى تكسو قمته الثلوج الدائمة، ولكن الطابع السائد هنا هو سطح الهضبة المتموج القليل الثبان ، فلا توجد مثلا مناطق سهلية رسوبية متسعة كما فى كينيا .

ولما كانت تنجنيقا تنحصر بين دائرتى عرض ٩١ ، ١٢° م جنوبا فان مناخها المدارى فى معظمه لم يعدله الارتفاع ، فلا غرو أن أصبحت ندره موارد المياه وبخاصة فى فصل الجفاف تعد مشكلة شائكة فضلا عن أن أصبحت المطر يتعرض لتذبذب واسع المدى . والواقع أن ظروفها المناخية لم تفسح المجال لاستيطان العناصر الاوروبية كما حدث فى كينيا ، فقد تبين من دراسة مواردها وامكانياتها الاقتصادية أنها لا تستطيع استيعاب عدد كبير من المهاجرين ، الى جانب أنها تبدو بمشاكلها الكثيرة تمثل منطقة تكتنفوها المتاعب والصعاب التى تعترض طلائع المهاجرين فى المناطق الحديثة العهد بالسكنى والعمران . ويمكن ان نميز أربعة أقاليم فى تنجانيقا هى : -

١ - سهل ساحلى ضيق يتراوح عرضه بين ١٥ و ٦٠ كم ويقل عرضه فى الشمال عنه فى الجنوب ، يصيبه نحو متر أو اكثر قليلا من المطر فتتمز غابات المانجروف حول مستنقعات الساحل بصفة خاصة يليها نحو الداخل غابات جوز الهند فالادغال الشوكية ، وهو شديد الرطوبة فى فصل المطر

غير صحى بين أكتوبر ومايو لا تهبط الحرارة دون ٢٦° م ، ونشأت وموانى تنجا ودار السلام كلوه على فروع مغمورة للانهار ، وتكثر دالات الانهار ، مثل بنجائى وروفيجى وروفوما .

٢ - نطاق ما وراء الساحل : هو يمثل المنحدرات السفلى للهضبة التى تنحصر بين السهل الساحلى والهضبة الداخلية ، وهو أقل مطرا من الاقليم السابق كما يشبه اقليم نيقا Neyika فى كينيا حيث تنمو الادغال والنباتات الشوكية والشجيرات التى تتحمل الجفاف .

الهضبة الوسطى والغربية : تتألف من هضاب مستوية أو قليلة التموج ، وإذا كان يصيبها نحو ٣٣ متر فى المتوسط ، فالطر مفصوور على فصل المطر فحسب كما أنه شديد التعرض للتذبذب البعيد المدى بين عام وآخر ، وتنمو الغابات الخفيفة التى يبدو عليها الجفاف فضلا عن السافانا ، ويتطرف المناخ هنا فمتوسط الحرارة السنوى يزيد على ٢١ م ، كما أن الفرق الحرارى اليومى يصل الى ١٥ م ولكن لما كانت الحرارة مصحوبة بجو جاف ، فالمناخ أكثر احتمالا من السهل الساحلى الرطب .

٤ - المناطق المرتفعة حيث يسقط المطر الغزير الذى يربو على ١٢٥ متر ، وتقل الحرارة حتى يسقط الصقيع فى الشتاء ، ويصبح المناخ ملائما للسكنى كما يصبح المدى الحرارى كبيرا ، وقد أدت غزارة الامطار الى غنى الحياة النباتية حيث تنمو الغابات المدارية الغنية التى تتحول الى مناطق للمراعى على سفوح الجبال وأهم هذه الجهات المرتفعة كلمنيارو وميرو فى الشمال ومرتفعات كريتير Crater High Lands فى الغرب ، ومرتفعات Usambora High Lands فى الشمال الشرقى Crater High Lafeau فى الجنوب الغربى ، والى جانب المناطق المرتفعة التى تحف ببحيرة نياسا ومرتفعات فوهات البراكين التى تمتد شمالا الى أرنجا Iringer .

وتمتاز مرتفعات الشمال الشرقى فى كلمنيارو واوزمبورا بوجود التربة الخصبة والامطار الغزيرة التى تتراوح بين متر ومترين ، ولذلك تنمو الغابات الكثيفة على منحدرات الجبال والمرتفعات ، فلا غرو ان اجتذبت الزراع من الوطنيين والاوربيين من ناحية ، ومن ثم أفضت الى ظهور مشاكل



المنافسة بين العنصرين ، واجتذبت اليها طرق السكك الحديدية من ناحية أخرى ، فقد شرع الألمان فى مد سكة حديدية تمتد من ناتجا نحو الشمال الغربى ، وفى سنة ١٩١١ بلغت هذه السكة الحديدية موشى Moshi ولكن سكة حديد كينيا قد صرفت الألمان عن اتمام السكة الحديدية فتحولوا بعيدا عن الشمال الى منطقة دار السلام ، وقد جرب الألمان زراعة المطاط فى منطقة أوزرپورا ولكن هبوط أسعاره قد أدى الى الانصراف عن إنتاجه ، فآثر السكان زراعة السيزال لأن ثمنيه أكثر استقرارا ، وليس هناك دليلا يساق على أهمية هذه المنطقة كمنطقة إنتاج زراعى سوى إقامة محطة التجارب فى Amant لتجربة المحاصيل المدارية ، فنجحت زراعة البن من النوع العربى فى اقليم موشى جنوب جبل كلمنيارو لتربته البركانية وحسن الصرف وغزارة المطر الذى يقدر بنحو ١٢٥ متر ، وهكذا أصبحت موشى التى كانت تمثل نهاية سكة حديد ناتجا بدلا من أوشا Ausha الآن مركزا مهما لجمع المحاصيل الزراعية لنقلها للساحل .

امكن السكان فى سفوح وبل ميرو سنة ١٩٢٩ من أن يتصلوا بالخارج بعد أن وصلت السكة الحديدية الى أروشا ، وقد أقبل الأوربيون والهنود بصفة خاصة على اقتناء الأراضى التى انتزعت من قبائل البيانتو ، مما أدى الى حظر ذلك فيما بعد . ويقدر عدد الهنود هنا بنحو ٢٤٠٠٠ من الملاك ، ولكنهم لا يعتبرون مشكلة كما فى كينيا ، ويشكو المستعمرون من الأوربيون الاسيويين من ندرة الأيدى العاملة ، ولذلك حاولوا دفع السلطات الرسمية عن الامسك عن تشجيع الوطنيين على زراعة المحاصيل التجارية وبخاصة البن منذ سنة ١٩٢٥ بوجه خاص بل طالب بعضها بضم هذه المنطقة الى كينيا المجاورة حيث ينعمون بالمميزات يتمتع بها المستعمرون من البيض هناك .

أما منطقة المرتفعات الجنوبية الغربية فى أرينجاونجومبى وسونجيا Songea, Njombe, Iringa بسكانها من الوطنيين أقل كثافة فان تشجيع الهجرة اليها قد لا يثير مشاكل أو يولد ضغائن كما حدث فى مرتفعات الشمال الشرقى ، والمطر هنا أقل منه فى الاقليم السابق ، ولكنه لا يزال كافيا كما أن توفر المواصلات بعد مد سكة حديد ماكيندانى سونجيا Mikindani-Songea قد أتاح الفرصة للهجرة اليها .

أما بقية الهضبة التي يتراوح ارتفاعها بين ٦٥٠ و ١٢٠٠ متر فوق سطح البحر فلا تعد صالحة كثيرا لسكن البيض ، إذ أن حرارتها مرتفعة وانخفاض منسوبها كما أن أمطارها القليلة شديدة التغير ، فمثلا طابورة التي تعد من مراكز العمران الوسطى فى تنجانيقا الوسطى يصيبها نحو ٣ متر بل تهبط الى نصف متر فى دودوما ، ولذلك فإنها لا تصلح الا لزراعة النباتات التي تتحمل الجفاف كالقول السودانى التي كانت هذه المنطقة مسرحا لتجربته التي أصابها الاخفاق ، إذ بعد أن خرجت بريطانيا من الحرب تشكو النقص فى زيوت الطعام وبخاصة المرجرين ، تبنى وزير الطعام فى انجلترا مشروعاً تقدمت به شركة United African Company لزراعة الفول السودانى على نطاق واسع ، ويرمى هذا المشروع لتطهير ٣٢٠٠٠٠٠٠ فدان سنة ١٩٥٢ وتقسيمها الى وحدات كل منها نحو ٣٠٠٠٠ فدان لانتاج ٦٠٠٠٠٠ طن من الفول السودانى فى اخر السنوات الخمس بين ١٩٤٨ - ١٩٥٢ ، وتتوزع مناطق الزراعة بين كينيا ( ٣٠٠٠٠٠ فدان ) زامبيا ( ٥١٠٠٠٠ فدان ) وتنجانيقا ( المقاطعة الوسطى ٤٥٠٠٠٠ فدان ) والمقاطعة الغربية ( ٣٠٠٠٠٠ فدان ) والمقاطعة الجنوبية ( ٦٥٠٠٠٠ فدان ) ولكن لعدم توافر قطع الخيار واضراب العمال وندرة العمال الفنيين ، وعدم ادراك الظروف الطبيعية السائدة ، إذ أن الآلات أصيبت بالعطب ولم تغلح فى أداء عملها ، كما أنها كثيرا ما كان تجعل التربة غير مسامية جدياً ، كذلك لم تكن الامطار مضمونة - اقترح سنة ١٩٥٤ الاقتصار على زراعة ٦٠٠٠٠٠ فدان تدخل زراعة الفول السودانى ضمن دورة زراعية تشمل الذرة الرفيعة والشامية ، وتحولت مساحات قد طهرت الى حقول للتجارب ، وقد أفادت تنجانيقا من هذه التجربة فى مد خطوط اضافية للسكك الحديدية ، وينتشر فى كثير من أنحاء الهضبة بل فى تنجانيقا كلها ذباب تسي تسي ، وأن كان فى الجهات الوسطى أقل انتشاراً ، ولكنه يوجد فى المنطقة بين طابوره ودودوما بالقرب من خط السكة الحديد الاوسط .

وتعد منطقة الشمال الغربى من أكثر جهات تنجانيقا سكانا ، والواقع أن المنطقة المحيطة ببحيرة فتكوريا تمثل وحدة طبيعية ، ولكنها قسمت بين كينيا وتنجانيقا وأوغنده ، فالزراعة الوطنية تجد التربة والامطار الملائمة ولذلك تزرع الحاصلات الغذائية .

وقد اكتشف الماس فى منطقة شينيانجا Shinyanga كما عثر على الرصاص فى مباندا Mpanda جنوب غرب طابوره ، وذلك الى جانب الذهب والقصدير والميكا ، وقد عثر على الماس فى نحو خمسين تكويننا ، أما الذهب فيستخرج عند جيتا "Geita" فى مقاطعة بحيرة فكتوريا وبخاصة من منجم لوبا Lupa أما النحاس والرصاص فيستخرج من سباندا ، وهكذا تتعدد ولكن تنفوق مراكز التعدين ، ويوجد الفحم فى وادى روهو هى "Ruhuhy" بالقرب من سونجيا ، ويولد الكهرباء من نهر بالجاني وينقل إلى دار السلام وموجورو Mogoroo

وكانت دار السلام وطابوره من أهم مراكز طريق القوافل الرئيسى الذى يجلب حاصلات الداخلى قبل وصول الاوربيين ، وقد اقيمت السكة الحديدية الوسطى على هذا الطريق الذى تغذيه طرق جانبية تسير فيها السسيارات وبخاصة طريق الشمال الكبير الذى يمر بطابوره . ولا تزال دار السلام تقوم بدور عاصمة البلاد ومينائها الرئيسى تتمتع بحماية اليابس لها مثل الشمال والشمال الغربى ويستحسن اختيار طابوره ذات الموقع المتوسط عاصمة للبلاد الا أنه صدر قرار عام ١٩٨٢ باتخاذ دودوما عاصمة للبلاد ومن أهم الموانى الساحلية كليندينى Kilindini

وتعانى تنجانيقا من قلة الطرق والسكك الحديدية الفرعية ، والهجرة إلى المدن لا زالت أقل وموحا عضنها فى كل من كينيا وأوغنده ، وتجتذت دار السلام بعض تجارة زائير .

## زنجبار :

على اثر قيام الحزب الافريقى الشيرازى سنة ١٩٦٤ بثورة ومطالبته بانضمام زنجبار الى تنجانيقا تكونت جمهورية تنزانيا الاتحادية التى تشمل مدينة زنجبار وبمبا السابقة الواقعة فى شمالها الشرقى .

وقد نشأت ميناء زنجبار التى كانت مركزا تجاريا قديما للعرب هنا فى غرب الجزيرة ولا زال العرب يمثلون ٧٪ من السكان من التجار وأصحاب

المزارع الكبيرة ( ٢٥٠٠٠٠٠ من العرب من بين ٣٥٥٠٠٠٠ نسمة يمثون كل السكان ) ، وقبل انشاء الموانئ الجديدة على سواحل تنجانيقا كانت صادرات تلك البلاد تنقل الى زنجبار أولا لاعادة تصديرها ولكنها الآن فقدت أهميتها فى هذا الصدد ، ولو أنها لا تزال تمثل محطة لرسو السفن وتموينها على طول طرق الملاحة المحلية والعالمية ، ويسقط بها من الامطار ما يزيد عن المتر ، وتتوافر الحرارة المرتفعة التى يلف البحر من قسوتها ، فالمدى الحرارى الفعلى قليل .

اجتذبت عددا من التجار الهنود الذين تبلغ نسبتهم بين ٥ و ٦٪ ، وتنتج جوز الهند كما تقوم الصناعات العديدة المتصلة بالافادة منه ، ولكن القرنفل الذى يزرع فى مزارع العرب الكبيرة بصفة خاصة يعد المحصول الرئيسى ، وتتكون زنجبار من جزائر مرجانية تنتشر حولها الشواطئ الرملية ، وتغطى بعض جهاتها صخور الحجر الجيري . وتعتمد التربة الجيرية والطفلية الرملية صالحة لزراعة القرنفل الذى تنتشر زراعته فى غرب جزيرة ممبا ويزرع بها ٥/٤ مساحة القرنفل او بـ ٨٠٠٠٠ فدان ينمو بها اربعة ملايين شجرة تنتج ١٠٠٠٠ طن ، يصدر ٦٠٪ نحو الشرق ، أما التربة الرملية فتصلح لزراعة جوزالهند الذى يقدر متوسط محصوله بنحو ١٣٠٠٠ طن . ولا زالت السفن السراعية تفد مع هبوب رياح الشمال الشرقى ، ليعمل ركبها فى الزراعة ثم يعودون فى السفن مع رياح الجنوب الغربى مع انتهاء موسم العمل فى مزارع القرنفل . والواقع ان مناخ زنجبار الاستوائى البحرى اللطيف ، وتربتها الخصيبة ، وغناها النباتى ، وموقعها التجارى المهم ، قد أضفى عليها أهمية خاصة ، كما أدى الى ارتفاع كثافة السكان فيها ، فقد تجاوزت هذه الكثافة ٢٥٠ نسمة الى الميل المربع ، وتعد تربية الماشية فى الجهات الغربية الفقيرة ، والتوسع فى زراعة وتصدير الأرز والكاكاو والخضر والفواكه وسائل لتخفيف أخطار الاعتماد على القرنفل .

### موزمبيق :

تطلق كلمة « موزمبيق » بمعناها العام على منطقة موزمبيق التى كانت تديرها شركة احتكارية حتى سنة ١٩٤١ ، كما يقصد بها مستعمرة موزمبيق.

التي كان يحكمها حاكم برتغالي كما تطلق على ميناء موزمبيق والمدينة التي تسمى بهذا الاسم ، وينقسم السطح الى الاقسام الاتية :

١ - النظام الساحلى وهو من أكبر سهول افريقية الساحلية ويمثل ٤٢٪ من مساحة البلاد ، ويتسع فى الجنوب وبخاصة جنوب ميناء بيرا ، كما يتسع فى وادى الزمبىزى ، ويمتد هنا الاخدود الافريقى فى وادى نهر شير حتى الساحل .

٢ - منطقة التلال والهضاب المنخفضة التي تمثل اقليما انتقاليا يشمل ٢٩٪ من مساحة البلاد .

٣ - الهضاب والمرتفعات التي يزيد منسوبها عن ٦٥٠ مترا ، وتتكون من الجرانيت والنيس ، وترتفع شرق بحيرة نياسا وعند الحدود مع زيمبابوى .

### المناخ :

تمتاز المناطق الساحلية والسهول المجاورة بدفئها لمُرور تيار موزمبيق الدفئ بها وشدة رطوبتها المرهقة ، ويسقط بها المطر فى فصل الصيف الجنوبي بين ديسمبر ومايو . ويقل المطر نحو الداخل كما يتضح المدى الحرارى الفصلى ، اذ ينما لا يتجاوز ٤°م فى الساحل لا يقل عن ١٥°م فى الجهات الداخلية ، ولكن يعود فيعزز مرة ثانية على المرتفعات الداخلية ، ويقتصر نمو الغابات الاستوائية على وديان الأنهار مثل الزمبىزى ولورىو Lurio وساف Seve ولبوبو النبات الطبيعى تنمو السفانا الرطبة الطويلة فى الجهات الغزيرة المطر المرتفعة الواقعة جنوب شرق بحيرة نياسا الى الشمال الغربى من المستعمرة ، وفى جزئها الغربى الأوسط ، أى فى مناطق الاطراف المرتفعة ، وهذا النوع من السفانا أكثر غنى من سفانا المناطق الساحلية حول موزمبيق وبيرا Bcira ، وأما النوع السائد من النباتات فهى الادغال من الحشائش والشجيرات الشوكية .

وتعد هذه المستعمرة من البقايا التي احتفظت بهما البرتغال منذ

أن كانت تحاول السيطرة على تجارة المحيط الهندي بإنشاء مجموعة من المحطات والمراكز التجارية في غرب الهند وجنوب شبه جزيرة العرب وساحل موزمبيق في شرق أفريقية ولكن آمالها العريضة لم تتحقق ، ولم تستطع الا الاحتفاظ بموزمبيق . وسياسة البرتغال الصغيرة تتسم بالتشبث بالمعزلة وعدم تشجيع الاتجار بين مستعمراتها والدول الأخرى خشية أن تفقد تجارتها أو مستعمراتها . وربما كان اهتمامها بالموانئ وتجارها كان لا يزال مسيطرا على سياسة البرتغال أزاء مستعمراتها حتى عهد قريب ، فسقطت حكومة البرتغال حتى الحرب العالمية الأولى تفرض قيودا كبيرة على تجارة هذه البلاد الخارجية واستغلال رءوس الأموال الأجنبية فيها ، فضلا عن اعدادها للحكم الذاتي ، ويبدو أن النظام الجمهوري في البرتغال قد وجد أنه لا سبيل الى النهوض باقتصاديات المستعمرات دون الافادة من جهود الدول الأجنبية وأموالها ، فميناء بيرا الذي تأسس ٨٠٪ من تجارته من وراء الحدود سواء من زيمبابوي أو ملاوي أو كاتنجا بزائير قد اتصل بحدود زامبيا بواسطة سكة حديدية تديرها سكة حديد زامبيا التي تدير السكة والميناء ، كما أن شركات بريطانيا قد قامت بمد خط سكة حديد تعبر الزمبيوي عند سيناء ، أما ميناء اورنزو ماركيز الذي يصدر حاصلات موزمبيق ، فيعد منفذا مهما للترنسفال وبخاصة إقليم الراند ، وقد أنفق في تحسينه وربطه بالداخل نحو خمسة ملايين من الدولارات دفعتها الشركات البريطانية ، وقد أدى مد هذه السكة الحديدية الى تنشيط حركة تجارة المرور في موانئ موزمبيق كما ساعد على النهوض باقتصاديات المناطق المحيطة بهذه الموانئ، فزرعت بهذه المناطق المحاصيل التجارية كقصب السكر والقطن والموز وغيرها ( خريطة رقم ٦٥ ) .


وكانت سياسة البرتغال الاستعمارية ترمى الى تخفيف نفقات الإدارة فمنحت شركة نياسا المنطقة الواقعة شمال الزمبيزي الأدنى والمحصورة بين بحيرة نياسا وبين ساحل المحيط الهندي لإدارتها واستغلال مواردها حتى انتقلت سلطات كمها الى الحاكم العام البرتغالي بعد سنة ١٩٢٩ حين انتهت الاتفاقية بين الحكومة والشركة ، كما أن المنطقة الواقعة بين وادي الزمبيزي الأدنى وخط عرض ٢٢°م جنوبا كانت تحت إدارة شركة موزمبيق البرتغالية البريطانية التي احتكرت الحكم والتجارة حتى سنة ١٩٤٢ حين تولت

الحكومة البرتغالية الحكم فيها ، على حين كانت المنطقة الجنوبية من موزمبيق اى الواقعة جنوب خط ٢٢م° جنوبا والتي يوجد بها ميناء لورنز وباركيز يحكمها الحاكم العام البرتغالى مباشرا .

قد لا يكون فريدا أن قلجاً البرتغال فى موزمبيق الى شركات لاستغلال وادارة املاكها ، فشركة جنوب افريقية البريطانية ، وشركة النيجر الملكية البريطانية ، شاركت كل استغلال البلاد التى قامت فيها ، الأولى فى مديسيا والثانى فى شمال نيجيريا - ولكن الامتيازات الاحتكارية سيطرت على موزمبيق تماما ، فارتبط تطورها واستغلالها بالتطور فى زمبابوى بواقليم الراند فى جنوب افريقية الى حد كبير .

وتقوم زراعة المحاصيل التجارية فى نطاق ضيق حول المدن والموانى . وكن زراعة الاكتفاء الذاتى التى تعتمد على انتاج الذرة بصفة خاصة هى الحرفة السائدة بين الوطنيين الذين يمثلون السواد الأعظم من السكان والجالية الأوربية هنا محدودة ، وقد استقر بعضهم بعد تزواجهم مع الوطنيين أو المهاجرين من الاسيويين ، وهم يشبهون سكان الكاب من الملونين فى جنوب افريقية ، وقد انهكت البيئة المدارية الاوربيين الذين يحتشد اكثرهم فى لورنزوماركيز العاصمة حيث يقم نحو ١٤٠٠٠ ر مستوطن والباقى فى الموانى الأخرى وخاصة بيرا ، ويقدر عدد السكان فى موزمبيق كلها بـ ٦٥٩٢٩٩٤ نسمة ( ١٩٦٠ ) يمثل الافريقيون نحو ٩٩٪ منهم ، اى بنسبة ٢٢ نسمة فى الميل المربع فمساحتها تقدر بـ ٧٩٩٢٨٠ كيلو مترا مربعا .


تتوافر الظروف المناخية المدارية الرطبة والتربة الطميية الخصيبة لانتاج القصب فى منطقة واسعة تقع فى وادى الزمبيزى الأدنى وادى نهر كومانى باقرب من لورنزوماركيز وعلى مقربة من انهامبين Inhambane ولكنه يزرع الآن حول لورنزوماركيز وانهامبين وفى وادى الزمبيزى حول سينا Sina وفى المنطقة الخلفية من كيليمين Kilimane ، ولما كان تشجيع زراعة قصب السكر يقصد من ورائه سد حاجة سوق البرتغال بهذه السلعة التى لا يتجاوز استهلاكها منها فى المتوسط ٤٠٠٠ ر طن سنويا ،



(خريطة رقم ٦٥)

ملحوظة : تقرا روديسيا في الخريطة زيمبابوى





ملحوظة : تقرأ روديسيا فى الخريطة زيمبابوى

جغرافيا العالم

فقد عقدت اتفاقية لتبادل المعدنة بين موزمبيق والترنسفال ، تستورد  
الترنسفال منها السكر دون تفریق فی المعاملة بينه وبين السكر من ناتال فی  
مقابل أن تسمح موزمبيق للوطنیین فیها للانتقال للعمل فی مناجم الترنسفال  
سنة ١٩٢٣ ، ولكن البرتغال أبت تجديدها الا بعد تعديلها ، لأنها وجدت أن  
السماح للعمال بالانتقال هناك يعطل من تقدم هذه المنطقة الاقتصادی ، فحدد  
العدد بنحو ٩٠,٠٠٠ عامل .

وقد زرعت بعض المحاصيل التجارية الأخرى مثل جوز الهند والسیزال،  
والموز والاناناس ، وبخاصة حول ورنز وماركيز ، وان لم تلق نجاحا يذكر ،  
والواقع أن أهم صادرات لورنز وماركيز فیما عدا السكر كلها تأتي من وراء  
الحدود من الفحم والنحاس والذرة من الترنسفال ( خريطة رقم ٦٦ ) .

وصفوة القول أن موزمبيق قد عانت من سياسة البرتغال الجامدة  
القصيرة النظر ، فتخلت حتى عن الدول الأفريقية المجاورة وأصبحت تنحصر  
فی أنها بلد ينتج السكر ويتخذ من موانئها منافذ لتجارة المرور للمناطق  
الداخلية من مستعمرات بريطانيا بل وبلجيكا السابقة .

وقد حصلت موزمبيق على استقلالها عام ١٩٨٤ .

## الفصل الثالث

### أفريقية الوسطى الجنوبية

يعد تقسيم أفريقية جنوب خط الاستواء الى اقاليم جغرافية من المسائل الشائكة التي تتضارب فيها وجهات النظر . فاذا كنا من قبل قد وضعنا الحدود الشمالية لجنوب أفريقية بحيث تمر في جنوب وادي الزمبيزي لتضم زيمبابوى ويتجه غربا الى اعالي الزمبيزي ثم الى ساحل المحيط الاطلنطى شمال صحراء كلهارى وجنوب غرب أفريقية . قد فصلنا بين زيمبابوى وزامبيا وملاوى التى تتشابه فى الظروف الطبيعية والبشرية بوجه عام ، فهى منطقة انتقال بين حوض الكنغو الاستوائى المنخفض فى الشمال الغربى وهضبة شرق أفريقية المدارية فى الشرق وبين شمال منطقة جنوب أفريقية بمناطقه دون المدارية وصلابحيته لسكنى الاوربيين وتطوره الاقتصادى الكبير ، فضلا عن موقعه الداخلى وسيطرة النفوذ البريطانى عليه رحا من الزمن . وقد وضعت بريطانيا نظاما جديدا يربط هذه المناطق فى شكل اتحاد فيدرالى فى الفترة سنة ١٩٥٣ - سنة ١٩٦٣ . ويمكن أن نضيف الى تلك الوحدات السياسية أنجولا التى يغطى جزء منها حشائش السافانا التى تمتد جنوبا الى اطراف الاقليم شبه الصحراوى ، ولكن موقعها الساحلى وارتباط أجزاءها الشمالية بحوض الكنغو جعلنا نؤثر أن تضم الى أفريقية الوسطى . أما موزمبيق فقد ذكرنا أن جزءها الذى يمتد وراء الزمبيزي شمالا يعتبر من شرق أفريقية فحسب أما البقية فى الجنوب حيث يغلب على السطح السهولة التى لا تميز شرق فريقية الذى يغلب عليها الطبيعة الهضبية فيمكن أن يدخل ضمن مناطق السافانا الجنوبية . ولكن توخيا لعدم تمزيق وحدة البلاد السياسية ، فقد درست موزمبيق جنبا الى جنب مع بقية شرق أفريقية البريطانية سابقا ، أما أنجولا فقد وضعت ضمن أفريقية الوسطى . وقد أثر البعض أن يضم كل المناطق الداخلية فى أفريقية الوسطى وهى زامبيا وزيمبابوى وملاوى الى اتحاد جنوب أفريقية رغم ما بينها من اختلاف فى التطور التاريخى وظروف الجغرافية الطبيعية والبشرية . ولذلك قد أفرنا لهذه المناطق الداخلية دراسة خاصة بها .


## زيمبابوى :

تصلح زيمبابوى ( روديسيا الجنوبية ) لاستيطان البيض ، لأنها بحكم موقعها الجنوبى بالمقارنة بينها وبين زامبيا ( روديسيا الشمالية ) أو نياسالاند ، وارتفاع الجزء الاوسط منها الذى يزيد منسوبه على ٩٠٠ متر لوفرة ، أمطارها ، قد ظهر فيها نشاط الاوربيين الاقتصادى واضحا فى نواحي الحياة المختلفة ، فاستغلت مناجم فحم Waukie وصناعات الحديد فى Que Que التى تقع القرب من موارد الحديد الجيد ، كما قامت فيها المدن ذات الطابع الاوربى مثل بولاوايو Bulawayo وسلسبرى Salesbury وجويلو Gwelo . ومما يميز اقتصاد روديسيا الجنوبية انتاج المحاصيل التجارية فى المزارع الكبيرة الاوربية التى يعمل فيها الوطنون من الاجراء .

يغضى معظم زيمبابوى صخور القاعدة القديمة التى يستخرج منها الذهب والكروم ، ولكن توجد بها تكوينات الكارو الغنية بالفحم حيث توجد انكسارات فى الزمببىزى الأدنى ، كما توجد رمال كلاهارى فى منطقة الجنوب الغربى .

ولكن هذه الهضبة الوسطى التى قد يربو ارتفاع بعض أجزائها على ١٠٠٠ متر ، والتى تمتد من الجنوب الغربى نحو الشمال الشرقى بوجه عام لا تشغل الا جزءا يسيرا من المنطقة التى تنحدر نحو الجوانب : الليمبوبو جنوبا والزمببىزى شمالا وموزمبيق شرقا ، وتمتد هذه الهضبة الوسطى والقلد المرتفع فى شكل نطاق متصل لا يزيد عرضه عن ٤٥ كم بين بولاوايو وسلسبرى ، ويخرج منها لسانان من المرتفعات الأول يتجه نحو الشمال الشرقى الى القلد المنخفض ، على حين يتجه الاخر نحو الشرق الى حدود موزمبيق حيث يصل ارتفاعه الى أكثر من ٢٥٠٠ متر ، وتعد هذه المنطقة بفضل ما يسقط من أمطار غزيرة من أهم الاقاليم الزراعية ، ويقبل المطر نحو الغرب والجنوب حيث تحتاج الزراعة لتوفير مياه الرى وتعد الذرة أهم المحاصيل ان يزرع كعلف للماشية فى كل المزارع الاوربية ، ورغم ظهور بعض أمراض الحيوانات ، فقد أمكن مكافحتها حتى أصبحت المدن الكبرى الواقعة على السكة الحديدية وهى سلسبرى وبولاوايو وجوينو مراكز كبرى لانتاج الالبان كما تربي الحيوانات للحومها التى أصبحت من أهم الصادرات

تالى الاقاليم التعدينية فى كاتنجا ، واذا كانت الذرة تمثل ٥/٤ انتاج  
الوطنيين ، فقد انتجت زيمبابوى محاصيل تجارية مهمة كالقطن والطباق  
والموالح ، ولكن لا زالت الاقاليم التى تقع دون ٨٥٠ متر والتى تعرف باسم  
الفلد المنخفض موبوءة بذباب تسمى تسى وبخاصة فى الجهات القربية من  
الزيمبىزى ( خريطة رقم ٦٧ ) .



ويستخرج الفحم من حقلى وانكى Wankie ليصدر الى كاتنجا  
غربا او يرسل الى مصانع الحديد والصلب فى كيكى Que Que  
التي تستغل الحديد المحلى بها . ويوجد بعض الذهب ولكنه يستخرج من مناجم  
متفرقة شأن النحاس والكروم ، وتسير السكك الحديدية هنا على طول خط  
تقسيم المياه بين الانهار لكى تتفادى عبور مجارى المياه .

ويشتغل جزء من السكان البيض الذين يقدرون بنحو ١٠٠ ألف فى الأعمال الادارية والخدمات العامة وادارة المرافق ، كما يتجه بعضهم بممارسة الأعمال الصناعية فى المدن ، وقد تبدو لأول وهلة أن زيمبابوى الجنوبية بفضل تعدد مواردها الطبيعية وقلة ضغط السكان على الارض لم تواجه مشكلة التعارض الصارخ بين مصالح الوطنيين من السكان والمهاجرين من البيض ، وقد استطاع الوطنيون الحصول على استقلالهم والتخلص من حكم الأقلية البيضاء عام ١٩٨٤ .

وقد اتجهت زيمبابوى نحو انشاء بعض الصناعات كمصانع النسيج فى Gatooma وصناعات الادوات فى سلسبرى .

#### زامبيا أو ( رويديسيا الشمالية سابقا ) :

لا تعد منطقة صالحة لاستيطان المهاجرين من البيض لانخفاض أرضها ولموقعها القريب الى خط الاستواء ، وهى غنية بالنحاس الذى يمتد نطاقه عبر الحدود من كاتنجا ، الى جانب عدد كبير من المعادن الأخرى ، ولذلك فان زامبيا قد ظهرت كدولة يقوم اقتصادها على أساس الثروة المعدنية .

ويستخرج الرصاص والفضة منذ زمن بعيد من بروكن هل Broken Hill ولذلك مدت من لفنجستون السكة الحديدية لنقلها ، أما مناجم النحاس فهى تمتد فى شكل نطاق عند حدود زائير ، ويقدر الانتاج بنحو ٤٠٠ مليون طن تبلغ فيه نسبة المعدن فى الخام نحو ٤ - ٥ ٪ .

ورغم ما يقال من صلاحية أجزاء زامبيا لسكنى الاوربيين لقد ظهر أنهم يصابون بالمalaria حتى لو لجأوا الى سكنى الجهات المرتفعة ، وقد نقلت العاصمة وهى لفنجستون من مكانها الاول لانخفاضه الى بقعة تقع على منسوب أكثر ارتفاعا لتفشى الامراض ، كما أصبحت مدينة لوزاكا منذ سنة ١٩٣٥ العاصمة ، وتقتصر مناطق الزراعة الاوربية على بقع متفرقة أهمها منطقة بالقرب من أبركورن Abercorn فى مرتفعات تنجانيقا حيث تنتشر مزارع الحكومة ، أما المنطقة الأخرى فهى فورت جيمس فورث Fort Jameson الواقعة عند حدود أوغندا وتعد منطقة مهمة لزراعة البخار .

## ملاوى :

تمتد ملاوى أو محمية نياسا سابقا لمسافة ٢٥٠ ميلا بين خطى عرض ٤٥ ٩م و ١٦ ١٧م الى الغرب من بحيرة نياسا ، التى تمثل بما يحقها من مرتفعات انكسارية يصل ارتفاعها الى أكثر من ٢٥٠٠ متر فوق سطح البحر ظاهرة فسيوجرافية كبرى فى منطقة شرق أفريقية ، وتقدر مساحة ملاوى الذى يتراوح عرضها بين ٥٠ و ١٠٠ ميل بنحو ٢٧٠٠٠ ميل مربع من اليابس . كما تبعد عن البحرى طرفها الجنوبى بنحو ١٣٠ ميلا ، والواقع أن شكها غير المنتظم قد نشأ نتيجة لضغط الدول الاستعمارية المتنافسة ، فقد وصل البريطانيون من التجار والمبشرين الى شرق نهر شيرى الأعلى منذ ١٨٧٦ ، ثم انتقل مسرح هذا النشاط الى منطقة جنوب غرب بحيرة نياسا فى جهات Biontyre, Linbe فى السنوات الاخيرة من القرن الماضى ، ثم أخذ هذا النفوذ يمتد نحو الشمال على سواحل بحيرة نياسا فأصطدم بالنفوذ الالمانى فى تنجانيقا فى الشرق والبرتغالى فى الجنوب .

وقد استقر المستعمرون من البيض فى المرتفعات الجنوبية الغربية فارتفعت نسبة كثافة السكان بها ، والواقع أنه اذا كانت نسبة كثافة السكان هنا لا تعد مرتفعة كيرة فهى أعلى بالنسبة للوطنيين عنها فى الجهات المجاورة ، كزمبابيا ، كما أن عدد المستوطنين من البيض المهاجرين يعد مرتفعا اذا قورن بمساحة البلاد ، أو ببعض البلاد المجاورة لا تخضع للبريطانيين كموزمبيق أو حتى تنجانيقا ، وتصلح مرتفعات شيرى Shire المجاورة لسكنى البيض ، ولذلك فالمنطقة الجنوبية ، ومدينة زومبا العاصمة التجارية بها تعد من أكثف هذه الجهات سكانا وعمرانا ، فقد اجتذبت خصوبة التربة وغزارة الامطار البيض والوطنين على السواء ، وقد استطاع الوطنيون - الذين يعتبرون من أكثر الزراع من الافريقيين براعة وإتقانا للزراعة وتفرغا لها - انتاج القدر الاكبر من المحاصيل الغذائية والتجارية على السواء من القطن والطباق والارز والذرة والموز وغيرها ، وقد أدت كثافة الوطنيين من سكان ملاوى الى هجرة الأيدى العاملة منهم للمشاركة فى تعمير واستغلال كثير من المناطق المجاورة كجنوب افريقية وتنجانيقا وزيمبابوى .

ويميل الوطنيون الى الاستقرار فى السهول الفيضية التى تراكم فيها الغرين ، واذا كان يبلغ عرض هذه السهول الساحلية نحو ١٠ - ٤ كم على البحيرة فجأة فى بعض الجهات ، فقد تتسع هذه السهول حتى يقدر عرضها بنحو ستة أميال فى الشمال حيث تنتشر التربة الطفلية التى تصلح لزراعة الطباق ، وقد أوضحت دراسة توزيع كثافة السكان أهمية خصوبة التربة ، فالجهات المرتفعة الشمالية والغربية تسود فيها التربة المحلية التى قد تكون خصبة حين تغطى تكوينات من النيس والحجر الجيري المتطور ، وحينئذ يكشف السكان ، أو تكون ضحلة رملية مجذبة كما فى الجهات التى تنتشر بها صخور الجرانيت والصخور الرسوبية التى تنتمى للزمن الاول .

وتمتاز ملاوى رغم صغر مساحتها بتباين ظروفها الطبيعية وبخاصة المطر فيتراوح المطر الذى يسقط بين نوفمبر وأبريل بين ١٢ متر فى الجهات المنخفضة و ١٣٦ متر فى المرتفعات ، ويعد مضمونا وكافيا فى أكثر الاحيان ، وتضم ملاوى أنواعا متعددة من المناخ المدارى ودون المدارى ، واذا كانت الجهات المنخفضة المحيطة بسواحل البحيرة ووديان ملاوى وبخاصة وادى شيرى لا تصلح لسكنى الأوربيين فقد أثرها الوطنيون الذين استقروا فيها لانتاج القطن والذرة وغيرهما . ولم تتح الفرصة لهذه البلاد أن تساهم بنصيب كبير فى تجارة شرق أفريقية لصعوبة اتصالها بالأسواق الخارجية ، ولكن قد نالت هذه الصعوبة بعد أن اتصلت بميناء بيرا بالسكك الحديدية ، وقد ساعد مد خط حديدى من بلانثير الى شيبوكا Chipoka على الساحل الجنوبى لبحيرة نياسا وشمالا حتى ساليمى Salima على النهوض باقتصاد هذه المنطقة الجنوبية المزدهمة ، حيث يعيش كثير من البانتو فى مزارع الأوربيين فى مقابل أن يعملوا جزءا من العام ، وقد أصاب الحياة القبلية فى ملاوى الكثير من الضعف والانحلال ، لأن أكثر من ٧/١ مساحة البلاد أى نحو ٦٠٠٠ ميل مربع قد أصبح ملكا للأوربيين ، الى جانب نحو ٢٧٠٠٠٠٠ فدان فى ملاوى قد منحت لشركة بريطانية British South Africa Comp. ولنشاط تجار الرقيق بينهم ، مما أضرم نار الخصومة والتآمر بين القبائل ، فضلا عما نجم عنه من ضيق سبيل الرزق أمامهم واضطرابهم للهجرة .



## الباب الثامن

### القسم الأول

#### جنوب أفريقية

يسود النفوذ البريطانى شبه جزيرة جنوب أفريقية ( اذا استثنينا موزمبيق الواقعة الى جنوب نهر الزمبىزى والذى يرتبط مستقبلها وتطورها ارتباطا وثيقا بما يسود جنوب أفريقية البريطانية ويمكن اتخاذ نهـر الزمبىزى حـسدا شماليا لهذا الاقليم حتى منابعه ) ، وهكذا تصبح هضبة زمبابوى جزءا من هذا الاقليم ، ثم يخترق خط الحدود بتسوانالاند فى شمالها ويستمر فى اتجاهه غربا حتى ساحل المحيط الاطلنطى ، ومن ثم يضم هذا الاقليم صحراء كلهارى فى جنوب غرب أفريقية . وتعد هذه المنطقة بفضل وقوعها فى خطوط العرض دون المدارية وارتفاعها وقربها من البحار المجاورة من أكثر جهات أفريقية صلاحية لسكنى الاوروبيين الذين توافدوا بكثرة اليها رغم بعدها عن القارة الاوربية ، وهنا نجد أقلية أوربية نشيطة قوية قد اقتطعت جزءا مهما كبيرا من القارة الافريقية ، واتخذت منه موطنها دائما غير مكتثرة بل ومعارضة لصالح الاغلبية من الوطنيين من الزوج البانتو ، فلا غرو أن امتاز هذا الاقليم فى اقتصادياته بأنه أكثر جهات أفريقية ارتباطا بالتجارة العالمية من جانب ، كما أن المعادن تمثل جانبا مهما – قل أو يكون له نظير فى جهات أفريقية الأخرى فى نظام البلاد الاقصادى – من جانب اخر .

ومن أهم الاسانيد التى اعتمدنا عليها فى وضع الحدود الشمالية للاقليم أنها تخترق جهات قليلة السكان ، ويضم هذا الاقليم من الناحية السياسية جنوب أفريقية الذى كان يعتبر احدى دول الكومنولث البريطانى . وتقدر مساحته مربعا . ويشمل أربعة اقسام أو ولايات ، هى : الرجاء الصالح ، والترنسفال ، وولاية الاورنج الحرة ، وناتال ، فضلا عن اقليم أفريقية الجنوبية الغربية ، ومساحته ٨٢٣٠٠٠ كم

مربعاً وقد منحت جنوب أفريقية حق الانتداب عليه بعد أن انتزع من المانيا عقب الحرب العالمية الاولى ، ولا زالت تحت وصاية الاتحاد وسيحصل على استقلاله هذا العام ١٩٨٩ كما تشمل زيمبابوى التى تقدر مساحتها بـ ٣٨٩٤٠٠ كم مربعاً ، على حين توجد ثلاثة أقاليم تعد تحت الحماية البريطانية ، وبتسوانالاند ( مساحتها ٢٧٥٠٠٠ ميل ، وباسوتولاند ( لوسوتو الآن ) ( ١١٧٠٠ ميل مربع ) ، وسوازيلاند Suaziland ( ٦٧٠٠ ميل مربع ) ، فضلاً عن ذلك الجزء من موزمبيق ، الواقع فى العروض دون المدارية ، الى جنوب نهر الزمبىزى حتى حدود ناتال فى الجنوب ، ومساحتها ١٢٠٠٠٠ متر مربع .


ويمكن أن نميز ثلاثة أقاليم طبيعية كبرى فى أفريقية الجنوبية : هضبة جمهورية جنوب أفريقية وسهول الساحلية بعد استبعاد الأجزاء المنخفضة الجافة من ولاية رأس الرجاء الصالح التى تعد فى الواقع جزءاً من المناطق الجافة فى الجنوب الغربى ، وأقاليم الجنوب الغربى بأحواضه وهضابه شبه الحافة والجافة وهضبة روديسيا الجنوبية .

ويمكن أن نميز بنيتين رئيسيتين الأولى ، وتشمل هضبة زيمبابوى ، وترنسفال الوسطى والشمالية ، وبتسوانالاند ، وبعض جهات ولاية رأس الرجاء الصالح ، وشطراً كبيراً من جنوب غرب أفريقية ، والصخور هنا من النوع الأركى ، ويمكن أن نطلق عليها الهضبة الشمالية وهى تخلق من السلاسل الالتوائية .

أما الهضبة الجنوبية التى يسودها النوع الثانى من البنية فيرتفع منسوبها كثيراً عن الهضبة الشمالية وتتكون من رواسب الزمن الأولى بوجه خاص ، وهى تضم الى جانب هذه الهضبة السلاسل الالتوائية فى الترنسفال الجنوبية ، وناتال ، ولوسوتو ، وولاية الأورنج الحرة .

ولم تتعرض هاتان الهضبتان لطغيان البحر منذ الأزل الا فى مناطق السواحل الضيقة ، ولكنهما مع ذلك قد تأثرتا بحركات رافعة رأسية ، وبخاصة فى الزمن الثانى والأزمة التالية ، اليها يعزى ارتفاع منسوب سطح الأرض الحالى فى جنوب القارة .

وتتكون الهضبة أو اقليم البنية الشمالية من صخور أركية من الكوارتزيت ، والشست ، والحجر الرملى ، والطفل ، ولكن اقليم البنية الجنوبي تعرض لارساب بعض تكوينات الزمن الأول من الحجر الرملى وطبقات الفحم التى يقل سمكها شمالا ، وقد تختفى فى بعض الجهات فى جنوب روديسيا مثلا حيث كشفت عوامل التعرية عن التكوينات الأركية ، هذه الرواسب التى تسمى نظام الكارو Karroo System قد أرسبت فى فترة طويلة ، تمتد فى آخر العصر الديفونى حتى العصر الترياسى ، ويقل سمك رواسب الكارو نحو الشمال ، وتزداد سمكا نحو الشرق والجنوب ، حيث تمتد فى شكل مطرد تقريبا بين غربى ولاية الرأس و جنوب الترنسفال ، ومن كمبرلى شمالا حتى جنوب شرق ولاية الرأس فى الجنوب ، وتكوينات الكارو يتخلو من الحفريات ، ويصل سمكها فى المتوسط الى أكثر من ٥٠٠٠ متر ، ولما تغطيها رواسب أحدث منها فى الجهات الداخلية ماعدا بعض تكوينات سطحية قليلة ( أنظر خريطة رقم ٦٨ ، ٦٩ ) .




### قطاع عبر سلاسل الكاب الإترائية والكارو الأصلى

( خريطة رقم ٦٨ )

ولم يكن الارساب مطردا طول فترة تكوينات طبقات الكارو ، فقد كفت حركة الارساب فى بعض الجهات ، ونشطت التعرية ، ولكن قبيل نهاية ارساب تكوينات الكارو فى العصر الترياسى تعرض الجزء الجنوبى لحركة دفع من الجنوب فى أكثر الأحيان ، وان كانت قد تقدمت من الغرب حركة مماثلة فى جنوب غرب ولاية الكاب ، تكونت على أثرها سلاسل ولاية الكاب التى تعلق تسفار تبرجن، ولانجرجن Langebergen, Zwartebergen من أهم مايقى

منها ، وقد أخذ الجفاف يظهر وتحمل الرياح الرواسب من الرمال لالقائها فى الشمال ، ومنها تكونت طبقات ستورمبيرج Stormberg المنخفضة . والواقع أن الجفاف قد ازداد وضوحا وقسوة فى هذه الجهات واستمر ارساب البحر من الرمال فى الجهات الصحراوية فى أنحاء جنوب أفريقية و جنوب غرب أفريقية وزيمبابوى ، وهكذا يمكن تصور أنه فى العصر الجوارسى كانت هذه البقاع تشبه صحراء كلهارى فى انتشار الرمال فى أرجائها حتى خرجت اللابة غزيرة من فوهات البراكين ثم على طول شقوق حتى أصبح جنوب أفريقية وقد غمرته اللابة فى كثير من انحاءه ، فخرجت من شقوق فى منطقتى اللمبوبو والدراكنزبرج حمم من صخور البازلت ، والاندسيت والريوليت حتى احتجبت طبقات الكارو وقد تراكت عليها اللابة لعمق يقدر بمئات الأمتار ولم تقتصر على الشرق ، بل ظهر هذا النشاط البركانى فى الترنسفال الوسطى وجنوب غرب أفريقية ، كما كانت تغطى اللابة مساحة كبيرة فى جريكالاند الغربية Griqualand West ولكن طغى البحر على التسوئات الجنوب فى العصر الكريتاسى مما طمس معالم الالتواءات فى جبال الكاب .

ومن الطريف أن الانكسارات التى حدثت فى آخر العصر الكريتاسى من الشرق الى الغرب جنوب سلاسل الكاب ، وأسفرت عن هبوط المنطقة الواقعة الى جنوبها قد ضاعفت من اثار التواء العصر الترياسى ، فكانت أخاديد انكسارية على طول الالتواءات المقصرة السابقة ، ولكن رواسب العصر الكريتاسى فى الجنوب قد أدت الى تكوين مجموعة نهريّة تتألف من مجارى مائية متوازية تنجى نحو الجنوب الغربى التى أصبحت تجرى فوق التواءات الكاب التى نحتتها عوامل التعرية العنيفة ، فحين أرتفعت هذه السلاسل وهبطت المنطقة التى تجرى فيها هذه الانهار ، تضاعف نشاطها ، وأخذت تخترق بقايا سلاسل الكاب ، فنهر جوريتز Gouritz مثلا الذى يصب فى البحر غرب خليج موصل Mossel قد سابر بحفره العنيف ارتفاع جبال لانجبرجن ، وتسافر تيرجن ، مخلفا فتحات تسمى "Poorts" هى المضائق التى يشق فيها النهر طريقه عبر الكتسل القديمة التى اعترضت سبيله .



التكوين الجيولوجي لجنوب أفريقيا

( خريطة رقم ٦٩ )

وتعد الحافة الكبيرة من أهم الظواهرات التي تميز جنوب أفريقيا ، إذ تسير على بعد يتراوح بين ٨٠ كم و ٤٠٠ كم من الساحل لمسافة ١٩٢٠ كم بصفة مطردة ، وهي في الواقع ليست سوى حافة هضبة أفريقية الجنوبية التي تبدو من الساحل مخرسة مرتفعة متصلة كحائط شاهق وتصل أقصى ارتفاعها في ناتال حيث تسمى دار كنزبرج حيث يبلغ ارتفاعها حوالي ٣٠٠٠ متر . وكما تظهر الصخور القديمة الأركية في هذه الحافة تسود تكوينات الكارو الأعلى . وتتجه حافة دراكنزبرج نحو الغرب لمسافة ٧٢٠ كم. حيث تتألف من عدد من السلاسل الجبلية المتتالية هي Komsberg و Stormberg و Sneeberg و Nieuwveld Range ثم تتحول السلسلة نحو الشمال الغربي فتسير موازية لساحل الكاب الغربي ، ويطلق عليها اسم Roggeveld Range وتقترب هذه الحافة في الجنوب

غرب أفريقية وناماكالاند "Namaqualand" من الساحل حتى تمتد على بعد ٨٠ كم من الساحل ، ويقل ارتفاعها فى الغرب بمقدار كيلو متر عن الحافة الشرقية ، ويبدو على السواحل الاستقامة حتى يرجع أنها نشأت نتيجة لانكسارات حرمتها من المرافىء العميقة وحماية الرعوس الباردة . ويعترض أنهار الجزر الشرقى من جنوب أفريقية كثرة الشطوط الرملية فى الأجزاء الدنيا وجنادل والخوانق فى منابعها أما الغربية فهى أنهار موسمية ، فنهر الأورنج والأوليفنتس Olifants ما هى الا وديان تجف تماما بعد انقضاء فصل المطر .

### التضاريس :

تتضح الطبيعة الهضبية فى جنوب أفريقية أكثر من جهات أفريقية الأخرى ، كما تبدو حافة الهضبة هنا فى صورة قلما يكون لها نظير فى جهات أفريقية الأخرى ، هذه الحافة التى تعرف بالحافة الكبرى ، والتى تمتد من زيمبابوى لتطوق بجنوب أفريقية فى الشرق والغرب والجنوب من الزمبيزى حتى أنجولا لانهبط قممها دون ١٦٥٠ متر بل يتراوح ارتفاعها بين ٣٣٠ و ٣٦٠٠ متر فوق منسوب سطح البحر فى منطقة لوسوتو التى تطل على نطاق ناتال من السهول الساحلية ، ويهبط المنسوب بنحو ٦٥٠ متر من الحافة إلى السفوح السفلى ، ويفصل بين هذه الحافة والبحر سلسلة من سطوح التعرية التى تميل قليلا صوب البحر ، تفصلها حافات متتابعة فى مسافة يقدر متوسطها بنحو ١٥٠ كم ، ولا يفسد هذا النظام السلمى للسطح الا اعتراض جبال الكاب فى الجنوب تلك الجبال التى تعلو عن الحافة نفسها . كما يقطع اطراد هذا النظام السلمى وديان أنهار لمبوبو وكونين وأورانج ، ولذلك يمكن أن نميز ثلاث أقسام من السهول الساحلية فى الشرق والغرب والجنوب حيث توجد سلاسل الكاب والكارو الكبير .

وقد سلفت الإشارة الى وجود سطوح تحاتية ينتمى أقدمها ويعرف بجندوانا الى الجوارسى ويتمثل فى قمم الحافة الكبرى فى لوسوتو وجنوب أفريقية والمنطقة الجنوبية الغربية ، أما بقية الهضبة وبعض جهات السهل

الساحلى فى جنوب أفريقية فيتنمى الى سطح أفريقية التحتانى ، وقد أخذت بديان الانهار تتعرض لدورات للتعرية أهمها دورة التعرية المعروفة باسم دورة شلالات فكتوريا والتي بلغت هذه الدورة أثناء ممارسة نحتها التراجعى فى أعلى الزمببوزى حيث بلغت موقع هذه الشلالات ، والى جانب الانهار القصيرة التى لا تسمح الا بقيام موانى صغيرة مثل ايسن لندن التى نشأت عند مصب نهر بفلو ، ويوجد نهران كبيران هما اللمبوجو والاورانج ، وتبدو عليهما خصائص الانهار الافريقية ، اذ ينقسم كل الى ثلاثة أجزاء ، جزء أعلى قليل الانحدار وجزء أوسط سريع الانحدار وثالث أدنى بطيء ، الأول يجرى فوق سطح الهضبة والثانى يوجد حيث ينتقل النهر من الهضبة الى السهل الساحلى على حين يجرى الثالث فى السهل الساحلى الضيق ، فلا عجب أن تكون الانهار قليلة الأهمية الملاحية ، بل إن استغلالها فى الرى أو الملاحة لم يبدأ الا حديثا على نطاق محدود .

### المناسخ:

يمتد جنوب أفريقية لمسافة ١٨ من درجات العرض ، واذ كانت الحرارة تتأثر بخط العرض أو الارتفاع وتوزيع اليايس والماء ، فان المطر هنا ينشأ نتيجة لاضطراب ظروف الضغط وتوزيع الكتل الهوائية السائدة ، لأن الظروف العادية لا تسمح بسقوطه صيفا ، كما يرتبط تفسيره بتوزيع التيارات الهوائية العليا .

واذا كانت الجهات الداخلية أى القارية القريبة من خط الاستواء فى الترنسفال قد أصبحت بفضل ارتفاعها أشبه فى متوسط حرارتها السنوى بالجهات البحرية المنخفضة البعيدة عن خط الاستواء حتى تشابهت هذه المتوسطات فى مساحات كبيرة كما فى مدن كيب تون ، وبورت اليزابث وبلومفنتين وجوهانسبرج المتباعدة الا أن التوزيع الفصلى للحرارة لا زال مختلفا ، ولنضرب مثالا ببلومفنتين ذات الموقع الداخلى المرتفع ودوربان الساحلية المنخفضة ، فكلاهما يبلغ متوسط حرارته صيفا ٢٢.٥°م ولكن ببلومفنتين أشد حرار بالانهار ، كما أن شتاءها بفضل ارتفاعها وموقعها

القارى أشد برودة ( ٨٥°م بلومفنتين ودوربان ١٣٥°م ) كما أن المدى الحرارى اليومى والسنوى يبلغ فى بلومفنتين ضعف دوربان ، وعلى حين ساحل ناميب فى كهارى يحول دون التكاثف ، فان هذا الهواء القريب من منسه .

والسواحل الشرقية التى يمر بها تيار موزمبيق الدفء الذى يتوغل غربا حتى خليج فولس Folse أكثر دفئا من السواحل الغربية الجافة التى يمر بها تيار بنجويلا البارد ، وإذا كان الهواء الجاف البارد المستقر على ساحل فاميب فى كهارى يحول دون التكاثف ، فان هذا الهواء القريب من سطح الأرض قليل السمك بحيث لا يصعد الحافة .

وتبين من دراسة الكتل الهوائية أن مركز الضغط المرتفع دون المدارى داخل اليابس يضعف فى الشتاء ولكن يظل قائما تخرج منه للرياح فى الصيف على منسوب فوق ٢٠٠٠ متر ، ويجتذب انخفاض الضغط صيفا فى الداخل كتلتين هوائيتين الكتلة القارية البحرية والكتلة المدارية البحرية وهما يسببان معا تكون أمطار جبهة كما يقط المطر أحيانا على أثر توغل كتلة هوائية مدارية بحرية من المحيط الهندى والكنغوى فى طريقها الى شرق مركز للضغط المنخفض يتمركز فى الداخل لفترة قصيرة ، فلا غرو أن يسقط المطر لفترات متقطعة ، إذ يتطلب سقوطه لفترة طويلة أن يندفع الهواء الاستوائى الرطب فوق الكتلة الهوائية القطبية البحرية مع هبوب كتلة هوائية ، مدارية بحرية من الجنوب الشرقى ، وهذه الظروف تجعل المنقطة التى يصيبها أكبر قدر من أمطار الصيف هى المنطقة الشرقية وهو أمر ملحوظ ، أما الرياح التجارية الجنوبية الشرقية فهى رياح قليلة الاتساع لا تتوغل كثيرا داخل الهضبة ، فقلة المطر وتذبذبه وسقوطه على فترات قصيرة غير منتظمة يعزى - كما ذكرنا - الى أنه ينشأ نتيجة لأضطراب الظروف العادية التى لا تسمح بطبيعتها بسقوطه .

أما أمطار الشتاء فى الجنوب الغربى فهى تنشأ نتيجة لهبوب أعاصير الرياح العكسية ، ولا تتوغل كثيرا فى الداخل حيث يعترضها مركز الضغط المرتفع ، ويتأثر المطر بتوزيع المرتفعات كثيرا ، فأكثر الجهات مطرا هى



الحافة الشرقية للهضبة ، ولكن المنطقة التي يقل فيها المطر فى الغرب والوسط ، تتسع فى شمال الاقليم حيث تمتد خطوط المطر المتساوى من الشرق الى الغرب ، ويعد نصف متر من المطر الحد الأدنى للزراعة التي تقوم على المطر ، وفيما عدا بعض جهات الجنوب والجنوب الغربى يسقط المطر فى معظم الجهات التي يصيبها نصف متر من المطر سنويا فى نصف السنة الصيفى بين أكتوبر ومارس .

ولذلك فقيمة المطر الفعلية محدودة لشدة البخر فى هذا الفصل ، فضلا عن أن اقتصار المطر على فصل معين يجعل تربية الماشية أو زراعة المحاصيل الدائمة يتطلب توفير مياه الرى ، ويقع كثير من وديان الانهار الكبرى فى شتاتل فى ظل المطر ، كما أن كثيرا من الجهات التي يزيد فيها المطر عن ١٢٥ متر جبلى غير صالح للزراعة كما هو الحال فى الاطراف الغربية لسلاسل جبال الكاب والحافة الكبرى فى شرق الهضبة ، ولذلك فقليل من الجهات السهلية يسقط به مطر غزير ، بل أن بعض وديان الانهار كما ذكرنا يعوزه قدر كاف من المطر ، على نقيض كثير من الجهات الوعرة التي لا تصلح للزراعة والتي يصيبها المطر الغزير ، وتتهدد الزراعة هنا - كما هو الحال فى كثير من الجهات المعتدلة الضيقة فى جهات نصف الكرة الجنوبى فى استراليا وأمريكا الجنوبية - أن المطر كثير التقلب ، ولذلك يتراوح معدل الانحراف بين ١٥٪ على الساحل الجنوبى وبين ٨٠٪ على ساحل ناميب فى الغرب حيث يسقط المطر فى السنة مرات معدودة ، والواقع أن الجهات الوسطى والغربية القليلة المطر تتعرض لتذبذب واسع المدى حيث يبلغ نسبة ما يسقط فى السنوات الغزيرة المطر الى السنوات القليلة المطر نحو ثلاثة الى واحد بل وصفر .

### التربة :

تسود أنواع التربة القليلة الخصوبة الفقيرة فى مواردها العضوية ، وفى الجهات ذات المطر الشتوى تتكون التربة ببطء ، ولذلك فأنواع التربة الناضجة نشأت حيث تسود الصخور الجيرية الطينية فى الاحواض ، أما فى الفلد المنخفض فالتربة من اللاتريت ، على حين تتعرض أنواع التربة شبه المرملية ( البودزولية ) لفقد المواد الغذائية من سطحها بذوبانها ؛ أما فى

جغرافيا العالم

المناطق الجافة فتصعد المواد الجيرية والرملية الى السطح ، ولا يصلح للرعى .  
الا مناطق الرواسب الغرينية المحدودة المساحة .

### الغطاء النباتى الطبيعى :

لما كانت جنوب افريقية مجالا متسعا للرعى واستغلال الثروة الغابية لفترة طويلة منذ وقت مبكر نسبيا ، فان أهمية الغطاء الحالى من الناحية الاقتصادية وبخاصة لأغراض الرعى يفوق بكثير أهميته كدليل على سيادة ظروف طبيعية معينة ، فتنمو حشائش الفلد المعتدلة فى الاطراف الشرقية والحافة الشرقية من الهضبة ، وحيث يسقط المطر الغزير نسبيا تنمو الحشائش الكثيفة التى لا تستسيغها الحيوانات وتعرف باسم "Sour Veld" على حين تصلح الحشائش - حتى فى فصل الشتاء الجاف فى المناطق ذات المطر القليل نسبيا لتغذية الحيوان ويعرف باسم "Sweet Veld" ، وتختلط الحشائش بالاشجار فى سواحل ناتال وشمال الترنسفال التى تعرف باسم فلد الأدغال أو "Bushveld" ، ورغم أن نباتاته غير مستساغة كثيرا فهو يعد مرعى متوسط الجودة .

ويمتد نطاق من الحشائش شبه الصحراوية بين نطاقات الفلد شرقا والصحراء غربا ، ويعرف هذا المرعى الانتقالى باسم مرعى الكارو . ويتألف من شجيرات لا يقبل الحيوان عيها ، ولذلك فهى تنتشر شرقا على حساب حشائش الفلد التى تمهقرت شرقا بمعدل ٢٠٠ ميل فى الـ٣ قرون الثلاثة الأخيرة ، ويوجد نطاق من الاستبس الفقير يتحول من الكارو الى نوع من الشجيرات الفقيرة المدارية نحو الشمال ، ويوجد نوع من المرعى يمتد على الساحل الغربى جنوبى نهر الاورنج يعرف باسم اقليم أستبس الكارو الغضير من أدغال اليوفوريبيا والصابار ، وتقتصر قيمته كمرعى على ما يتخلل هذه الشجيرات التى يعافها الحيوان من حشائش فى فصل المطر ، وتسود الحشائش القصيرة فى شمال ولاية الكاب هضبة جنوب غرب افريقية ، ويمكن أن تمثل مرعى صاحا لتربية الحيوان ولكن لا بد من توفير مياه الشرب ، ولكن سرعان ما ينقرض النبات ويختفى اذا اشتد الضغط على المرعى ، وحينئذ تنمو شجيرات كما يحدث كثيرا فى سنى الجذب ويمتد نطاق من أدغال البحر المتوسط الفقيرة التى تتكون غاباتها من شجيرات دائمة

الخضرة تشبه نوع مرعى الكارو من حيث امتداده شرقا على أثر الضغط على المرعى من الجنوب الغربى حتى يورت اليزابث .

وفيما عدا غابات كنيشنا "Kuysna" التى قطعت فى القرن الماضى دون العناية بزراعة بديلا عنها ، أكثر الغابات المعتدلة ودون المدارية التى تتكون من أنواع بطيئة النمو ذات أخشاب صلبة وقد زرعت أشجارا مخروطية من الصنوبر فى مساحات كبيرة فى جنوب شرق الكاب وسلاسل الكاب ، كما غرست أشجار الكافور الأسترالى على طول الحافة الكبيرة فى ناتال ، وربما كانت حاجة المناجم فى الترنسفال للأخشاب من أهم أسباب الاهتمام بتوفير أخشاب الكافور بغرس غاباته ، بل قامت صناعة الورق والحريير الصناعى فى ناتال بعد ذلك معتمدة على توفير الأخشاب ، كما يزرع أشجار الواتل وهو نوع من السنط الأسترالى لاستخدام خشبه فضلا عن استخلاص مواد للديباغة من لحائه ، وتمتد مزارعه الكبيرة على الحافة بين ترنسفال وناتال على منسوب يتراوح بين ٥٠٠ ر ١٥٠٠ متر .

### الأقاليم الطبيعية :

١ - إقليم سلاسل الكاب : توجد هذه السلاسل فى غرب ولاية الكاب ولا تمتد موازية الساحل ، فعلى حين تتخذ الساحل شكلا محدبا قليلا نجد أن هذه السلاسل تتبع اتجاهها يميل للتقعر ، وتلتقى السلسلتان الجبليتان فى الغرب فى ورستر ( سيريا Worcester-Cerea ) تواصل بعدها احدى السلسلتين سيرها نحو الشمال الغربى ، وتضم سلاسل جبال Olifants Mountains التى تنتهى عند الساحل بالقرب من نهر أوليفانيس Olifants الأدنى ، أما السلسلتان الاخريتان وهما Langebergen, Zwartebergen فيتخذان اتجاهها من الشرق الى الغرب لينتهيا فجأة على الساحل بين كنيشنا Knysna وبورت اليزابث ، ويخرج من جبال Cedarbergen التى تمثل ثنية محدبة متسعة سلاسل جبال تمثل خط تقسيم المياه بين نهري Breede, Great Berg وأهم هذه السلاسل الجبلية Hottentots, Holland Mountains, Drakenstein سبق أن ذكرنا أن السلاسل التى تمتد من الشرق الى الغرب أكثر اتساعا وارتفاعا إذ يصل

مندسوبيها الى ٢٠٠٠ متر ، وهى تنحنى متجهة نحو الجنوب الشرقى لتصل الى البحر بالقرب من بورت اليزابيث . ويتخلل سلاسل جبال الكاب الالتوائية وديان طولية أهمها ما يسمى الكارو الصغير Little Karroo الذى ينحصر بين سلسلتى لانجربرجن وتسفار تسبرجن ، وقد تأثر الالتواء المقعر بالانكسار الذى تعرضت له المنطقة فى اخر العصر الكريتاسى ، وعلى حين يبلغ طوله ٣٥٠ كم لا يزيد اتساعه عن ٦٤٠ كم ، وعلى حين يشتد انحدار جبال لانجربرجن الى البحر اذ تتخذ المنحدرات شكل مصاطب أو مدرجات ، توجد مناطق منخفضة ساحلية الى شمال وغرب رأس Agulhas اجولهاس وبخاصة بالقرب من خلجان فولص وسانت هيلينا وتيبيل False, St. Helena, Table

ويسقط المطر هنا فى الشتاء ويقدر متوسطه بـ ٦٣ - ٢٨ سنتيمترا ، وتعد الجهات الواقعة الى الغرب من خليج موصل ممطرة شتاء فقط الى حد كبير ، ويسقط المطر تدريجيا ودون غزارة تؤثر على التربة ولذلك يتسرب فى التربة ببطء ، ويعتبر الشتاء موسم المطر الرئيسى الى الشرق بين رأس اجولهاس وبورت اليزابيث الا أن مقدار المطر الصيفى يزداد ، وأكثر الجهات مطرا على السفوح الشرقية هى جبال Hottentots, Holand, Drakenatein ومرتفعات شبه جزيرة الكاب . ولكن قلما يتجاوز المطر الساقط مترا ونصف الا فى مناطق جبلية محدودة ، ويعد ٣٨ سم من المطر كافيا لقيام الزراعة دون حاجة للرى ، ولكن بعض الجهات مثل الكارو الصغير Little Karro والمنطقة الواقعة غربى وادى نهر أوليفانتس Olifants الادنى والتى لا يصيبها الا نحو ٢٥ سم غير صالحة الا للرعى وبخاصة تربية الأغنام ، فالكارو الصغير كان يمثل مركزا رعويا لتربية الاغنام بل والنعام حين كان استخدام ريشه شائعا فى عالم الأزياء ، أما الزراعة فقد قامت على اكتاف المستعمرين الأوائل من الهولنديين والفرنسيين فى المناطق السهلية الواقعة فى أقصى الجنوب الغربى ، فقد ظلوا عاكفين على زراعة القمح والكروم قرونا طويلة دون توفير السماد الطبيعى لقله الحيوانات لتجديد خصوبة التربة كما أن التربة فقيرة فى الفوسفور والبوتاس فضلا عن النترات التى يذيبها المطر من الطبقة السطحية ، فلا غرو أن هبط محصول الفدان من القمح ولولا الحماية الجمركية التى فرضتها حكومة الاتحاد لتعذر المضى فى انتاج القمح لكثرة نفقاته وانخفاض محصوله ، وأهم المناطق الزراعية المنتجة هنا

هى أولا المنطقة المنخفضة الواقعة الى الشمال والغرب من جبال دراكنستين Drakenstein . فى منطقة مليمزبرى Malmesbury وتعرف محليا باسم سنوارتلاند Zwartland اما المنطقة الثانية فهى سهول الجنوب فى كالديون وبردسدورب Bredasdorp وتعرف باسم اراضى رونييز Rùiens أو التلال الصغيرة . ومن ثم أطلق عليها اسم اراضى التلال الصغيرة فى الجنوب والوديان فى الغرب ، وتنتشر المزارع الكبيرة التى تقدر مساحة المزرعة بنحو ١٦٠ فدان ولكنها قلما تزرع كلها ، اذ ان نصف الأرض يزرع كل عام على حين يترك النصف الثانى بورا ، ومزارع الكروم صغر مساحة .

٢ - اقليم الكارو الكبير Great Karroo ، يمثل من الناحية الجيولوجية مقدمة للهضبة الداخيلية ، وهى تنحصر بين سوارتبرجن Zwarteborgen من ناحية وبين الحافة الكبرى من ناحية أخرى ، والاقليم هضبة يتراوح ارتفاعها بين ٥٠٠ - ٨٠٠ مترا تحيط بها الجبال ، وتغطيها طبقات الكارو الرسوبية من الحجر الرملى والطفل ، وتعد الطبقات مستوية الى حد كبير وأن كانت قد تأثرت بحركات الالتواء عند اتصالها فى الجنوب بجبال تسفارتبرجن ، وتنتشر فى الجهات الغربية بوجه خاص التلال المستوية القمم والهضاب الصغيرة التحتائية التى تمثل ما تخلف بعد التعرية من السطح القديم لهذه الهضبة ، ويقل المطر حتى لا يعدو فى أكثر الاحيان ١٥ سم فى الغرب رغم ارتفاعه اذا قورن بالجزء الشرقى ، ولكن فى الجزء الشرقى تنمو الشجيرات التى تصلح غذاء لاغنام المورينو التى تنتج الجانب الاكبر من اصواف جنوب افريقية ، ولكن مع ذلك لا تتجاوز هذه الامطار ٣٨ سم ، ولذلك فهى لا تكفى لنمو حشائش غضة للمراعى ، وتتسع مساحة مراعى الاغنام هنا فيقدر متوسطها بنحو ٥٠٠٠ فدان اذا قورنت بـ ١٠٠٠ راي . - ٢٠٠٠ فدان فى الاقليم السابق .

وتقوم الزراعة فى وادى نهر ساندينز Sundays الذى يمثل الحد الشرقى لاقليم الكارو ، وتزرع الموالج بوجه خاص معتمدة على مشروعات الري ، كما توجد مراكز صغيرة أخرى لزراعة البرسيم - وهو العلف الرئيسى ، والقمح فى دالات الانهار الصغيرة التى تنحدر من الحافة الكبرى الى اقليم الكارو ، ويعتبر نهر Gouritz جوريتز برافديه جامكا وجروت

Groote, Gamka من أهم الانهار فى إقليم الكارو ، ولو أنه يجفد .  
أحيانا • والواقع أن الكارو يعد منطقة رعى ، إذ تصلح الشجيرات التى  
تنمو فيه لخصائصها الطبيعية علفا للاغنام من أنواع المرينو وماعن الموهير ،  
ولكن مع ذلك تعد نوعا من المراعى الفقيرة التى لا يستطيع الكيلومتر المربع  
منها أن يستوعب عددا كبيرا من الحيوانات • وتقتصر مناطق الزراعة فيه  
على الاماكن التى قامت فيها مشروعات الرى •

٣ - أراضى مقدمة المرتفعات ذات المدرجات فى ناتال وشرق ولاية .  
الكاب :

تمتد هذه المنطقة فى شرق ولاية الكاب شمالا لتضم ناتال وسوازيلاند ،  
بين الحافة الكبرى والسهول الساحلية ، وبذلك فهى تشمل الاراضى  
المحصورة بين تلك الحافة والسهول الساحلية التى تكاد تنعدم فى شرق ولاية  
الكاب ، ولكن هذا السهل الساحلى يتسع فى شمال شرق ناتال ( فى زولولاند )  
وموزمبيق • وتتدرج الأرض فى الارتفاع من الساحل نحو  
الداخل حتى تصل مدرجاتها الى جبال Quathimba, Stormbergen  
ويمتد فى شرق ولاية الكاب تكوينات الكارو ، ولكن سلاسل الكاب الالتوائية  
غير موجودة فى هذه المنطقة الى حيث تنتهى عند بورت اليزابيث •

أما فى ناتال فتنتشر الصخور الاركية القديمة التى تأثرت باضطرابات  
أرضية حدثت بعد تكوينات الكارو • ويسقط هنا مطر صيفى لا يقل فى أكثر  
الاحيان عن نصف متر بل كثيرا ما يربو على ٦٠ متر ، وينمو على هذه الحافة  
ما يسمى بالحشائش المرة Sourveld يليها نحو الشرق ما يسمى Grass Veld .  
ويتوافر فيها الحشائش الصالحة للرعى ، وبخاصة الاقليم الثانى إذ أن فى  
الاول تعنى كلمة sour حشائش ليست بذات قيمة غذائية كبيرة كعلف  
للحيوان ، وتنتشر الشجيرات الشوكية وبخاصة الاكاشيا السنط وقد  
أدخلت عدة أنواع من نباتات العلف ، كما تجرى الانهار العديدة الدائمة  
التي لا تصلح للملاحة لما يعترضها من سدود الدولويت وأهمها توجيلا  
Tugela فى ناتال ونهرا Great Fish, Kei كاي وجيريت فيش .  
فى شرق ولاية الكاب •

ورغم أن الظروف تصلح للزراعة الكثيفة ، فإن السكان من البانتو الذين ينتشرون بكثرة ، وبخاصة فى شرق ولاية الكاب حيث توجد معازلهم أو الأماكن المخصصة لسكناهم ، يؤثرون ممارسة حرفتهم التقليدية وهى الرعى ، ولذلك فالزراعة هنا مقصورة على الذرة الذى يعرف باسم ذرة الكافير Kaffir Corn وقلما تزرع الذرة الشامية ، وهى زراعة تستهدف الاكتفاء الذاتى كما تتبع طرقا بدائية ، ولكن يجب ألا نغض من أهمية هذا الاقليم فى تربية ماشية الالبان واللحوم ، وقد أدخل أحد التجار من البريطانيين من استراليا شجرة Black Wattle فانتشرت زراعتها فى الجهات التى يتراوح ارتفاعها بين ٧٠٠ - ١٥٠٠ متر فى النطاق الاوسط من ناتال الذى يعرف باسم Middle Veld حيث يقاوم الرياح العاصفة . ويجد ظلوا ملائمة لنموه ، كنوع من الاشجار فى مزارع تنتج محصولات اخرى ، أو فى مزارع كبيرة تملكها شركات ، ويزرع ٧٠٪ من اشجار الواتل التى يستخدم لحاؤها فى الدباغة فى هذه المنطقة ، ورغم أن الزراع لم يقدروا أهمية هذا المحصول الاقتصادى الا بعد سنة ١٨٨٤ ، فقد بلغ الانتاج سنة ١٩٤٠ ١٠٠٠٠٠ طن من المستخرجات التى تستخدم فى الدباغة الى جانب ما يصدر من اللحاء نفسه ، ويملك الاوربيون المزارع التى يستخدمون فيها الوطنيين من العمال .

**السهول الساحلية فى ناتال :** لا يزيد اتساع السهل الساحلى فى ناتال حتى بلدة Stanger عن ١٥ كم ، ولكن يزداد اتساع هذه السهول عند منطقة رولولاند بين هضبة سوازيلاند والساحل اذ تصل الى نحو ٨٠ كم ، ويقسّد عرض هذه المنطقة بـ ٢٤٠ كم يمكن أن تضيف اليها منطقة فى الترنسفال تسمى Low Veld الفلد المنخفض ، وهى من أقل الجهات فى جنوب افريقية ملائمة للسكنى ، وبخاصة فى الصيف وحين تتفشى الملاريا ، ويفصل هذا الاقليم عن موزمبيق الساحلية التواء بسيط حدث فى الميوسين تمخضت عنه جبال Lebombo Range التى تمتد الحدود بين موزمبيق وبين الترنسفال على طولها .

يعد المناخ مداريا حيث يمتد الاقليم فى ناتال حتى جنوب عرض ٢٠ جنوبا ، ويسقط المطر الغزير الذى يكفى حاجة النباتات الطبيعية وأكثرها من السافانا الشوكية Thorn bush savanna وان كانت تنمو غابات المانجروف.

على الساحل وبخاصة عند مصبات الانهار كالزيمبيزي والمبوبو ، ويقل  
المطر وبخاصة فى الجهات الواقعة فى ظل سلسلة لمبوبو Lebombo Range  
والى الغرب منها مباشرة ، وتقل مساحة الجهات التى يبدو عليها الجفاف  
سواء بسبب انخفاضها كما هو الحال فى الجهات الواقعة بالقرب من لورنزو  
ماركينز أو لمربتها الجيرية كهضبة Gazaland ، وتعد اشجار النخيل  
فى سهول ناتال من الأشجار السائدة مثل نخيل الرافيا فضلا عن كثرة  
الأشجار الشوكية . وتكثر زراعة قصب السكر فى جهات ناتال المنخفضة حيث  
يعتبر هذا النبات من أهم المحاصيل وبخاصة فى زولولاند ، حيث يمكن  
التوسع فى زراعة قصب السكر فى المنطقة الغربية من حدود موزمبيق وعند  
خليج سنت لوسيا St. Lucia Bay وتصلح التربة الرسوبية فى نهري  
( فونجولا وأومفولوزى ) Umfolozi Phongola لزراعة هذا المحصول  
أيضا ، والواقع أن رجال المال والصناعة الذين لا يجدون أراضى واسعة  
صالحة لزراعة القصب يواجهون مشكلة معارضة الوطنيين الذين لا يرغبون  
أن يعلو عليهم زراعة محاصيل معينة ، والواقع أنه لا بد من القضاء على  
تفشى ذبابة تسمى تسي والمالريا ومحاولة الوصول الى حل لمشكلة معازل  
الوطنيين قبل أن يتسع المجال للزراعة الحديثة .

### مرتفعات الليسوتو : Lesotho Highlands

كان وطن قبائل الباسوتو فى القرن الماضى يمتد غربا لىضم جزءا كبيرا  
من الفلد المرتفع High Veld ، فقد استطاع البوير فى منتصف القرن الماضى  
بعد أن عبروا نهر الفال أن يستولوا على أحسن الأراضى الزراعية فى اقليم  
جماعة الباسوتو الذين اعتصموا بأكثر الجهات وعورة وارتفاعا ، وهى  
الواقعة غرب جبال دراكنزبرج . ويمتد وطن الباسوتو فى أعلى نهر الأورنج  
ويمثل أكثر جهات الهضبة الافريقية شموخا وعورة ، إذ تتكون هذه الكتلة  
الجبلية من طبقات الكارو الأعلى من الحجر الرملى الذى لا زال محتفظا  
بوضعه الأفقى وقد غطته طبقات من البازلت الصلبة التى يصل ارتفاعها الى  
١٩٠٠ متر والتى قطعتها الوديان العميقة التى تشقها الانهار ، فتتايعت القمم  
والمندرات الشاهقة والخوانق الشديدة العمق ، وعلى حين تصبح التربة  
بركانية سوداء خصبة فى النصف الشرقى يصيبها المطر الغزير فى الصيف  
مما يساعد على زراعة القمح ويتوافر المرعى الجيد فى ذلك الفصل ، نجد  
أن النصف الغربى يصبح شبه جاف بتربته الرملية المسامية ، ورغم أنه لا زال



أكثر شعب الباسوتو يعيش فى الجهات الغربية القليلة الخيرات ، فقد فرضهم على السكان أن يهجروا المنطقة الواقعة غربى نهر كالدون Caledon فأخذوا يعمرن المنطقة الشرقية ذات التربة البركانية الخصيبة التى كانت تكاد تخلو من السكان حتى أوائل القرن الحالى ، ولذلك بعد أن كانت المنطقة الشرقية مراعى صيفية أضحت مواطن للاستقرار الدائم تزرع بها محاصيل الشتاء من القمح والفل على حين تزرع فى الصيف فى الغرب محاصيل مختلطة .

ورغم أن المنطقة الشرقية لا تصلح لوعورتها كثيرا للزراعة كما أن المنطقة الغربية تعد لجفافها وجذب تربتها غير ملائمة الا للرى ، فان شعب الباسوتو بتقاليده الزراعية قد أقبل على زراعة الذرة الشامية وذر الكافير ، والأرض التى تعد ملكا للشعب توزع بين الزراع لزراعتها حتى اذا حصدت المحاصيل المزروعة أصبحت مراعى مشاعة بين الجماعات ، وتصلح الجهات الشرقية المرتفعة لزراعة القمح ، والغربية بين ١٦٠٠ - ١٩٠٠ متر لزراعة الذرة حيث لا يسقط الصقيع ، وأكثر الجهات ملائمة للزراعة تقع فى الشمال الغربى ، ولا تزيد مساحة ما يزرع على ٧٪ ولا بد من توفير مياه الرى وهو أمر كثير النفقات للتوسع فى مساحة الأرض للزراعة ، ويعتبر الرى وتربية الأغنام الحرفة الرئيسية والماشية والماس والصوف والمهوير أهم الصادرات ولما كانت الباسوتو لا تدخل ضمن جمهورية جنوب أفريقيا فقد حافظ الباسوتو على كيانهم ، ولكن كثرت الهجرة من هذه الجهات الفقيرة خارج منطقتهم للعمل فى مناجم الذهب فى الراند أو مزارع ( الأوربيين ١١٧ر٠٠ نسمة ) ، ولذلك اذا كان عدد سكان مملكة الليسوتو نحو مليون نسمة فقد هاجر مؤقثا للعمل فى جمهورية الاتحاد نحو ١١٧ر٠٠٠ نسمة .

ولم تؤد الظروف الاقتصادية الى قيام مدن أو مراكز للعمران كبيرة ، فالعاصمة مدينة صغيرة تسمى ماسيرو Maseru أو المعسكر ، يجتمع فيها البرلمان الوطنى الذى يسمى Piste وقد استقلت باسم مملكة ليسوتو سنة ١٩٦٦ رغم رغبة جنوب افريقية فى ضمها ، فان سكان اقليم الباسوتو كانوا يعارضون بشدة فى هذا الضم الذى يقضى عليهم كشعب له كيانه ووحده الخاصة المستقلة هذا وتقدر مساحتها بـ ٣٠٣٥٠ كم مربعا يسكنها ١٠٥٨٢٠٠

نسمة من الأوربيين ، ٨٥٠ ألف من الأفريقيين ، ٦٠٠ من المولدين ، ٧١٦ من الآسيويين .

إقليم الفلد المرتفع High Veld يطلق على الجزء الشرقى من الهضبة ، وهو يتسع فى ولاية الأورانج بصفة خاصة ، الى جانب جهات الترنسفال الجنوبية وبعض جهات الكاب المجاورة ، ويتراوح ارتفاع الهضبة المستوية أو الموجة قليلا بين ١٢٠٠ - ١٩٠٠ متر حيث تنتشر فى أرجائها التربة الطفلية الخصيبة ، ويسقط المطر الذى يتراوح بين نصف وثلاثة أرباع متر ، ولكن الظروف المناخية تتباين كثيرا لتفاوت الارتفاع ، فقد يسقط الصقيع فى فترة تربو على مائة يوم ، وتقوم زراعة القمح على نطاق ضيق ، ولكن الذرة تعد أهم المحاصيل ، وهنا يقع ما يعرف بمنطقة أو مثلث الذرة ، ولكن تغير المطر فى موعد سقوطه وكميته بين عام وآخر يصيب هذه الجهات بالاضرار ، وليست منطقة الذرة بمنجاة من هذا ، وتنمو المراعى التى تغطى الهضبة بغطاء من الحشائش التى تعد جيدة جدا ، وقد أدت زراعة الذرة فترة طويلة الى اجهاد التربة ، ولذلك فان الزراعة المتنوعة قد حلت تدريجيا محل زراعة المحصول الواحد ، ويقال ان انخفاض قيمة المراعى الغذائية يعزى الى فقر التربة فى الفوسفات ، ولذلك فهى تصلح لتربية اغنام الصوف لا اللحوم ، ويفكر المسئولون فى تربية الماشية والخنازير على العلف من الذرة شأن نطاق الذرة فى الولايات المتحدة . وأهم المدن فى نطاق الذرة التى تقوم بنقله والاتجار فيه هى كرونشتاد Kroonstad وبيت لحم Bethlehem ، أما بلومفونتين Bloemfontein فتقع فى منطقة القمح والأغنام شبه الجافة ، وهى العاصمة الادارية لولاية الأورانج ، كما تعد مركزا مهما للاتجار فى المحاصيل الزراعية التى ينتجها إقليم الفيلد .

إقليم الجوشفلد Bushved يمتد من خط عرض بريتوريا ليضم ثلثى مساحة الترنسفال بين إقليم الراند ووادى نهر اللمبوبو ، وتنمو هنا السفانا التى تتخلل الشجيرات الشوكية فى الصيف .

ويمتاز هذا الاقليم بسطحه المستوى وتفاوت الظروف الطبيعية السائدة فيه فتظهر هنا الصخور القديمة فى الاطراف ، كما تنتشر الصخور النارية المعروفة باسم Bushveld Complex على السطح بعد ازالة الرواسب

الحديثة نسبيا ، وهنا تنحدر الأرض من منسوب الاقليم السابق على ارتفاع نحو ١٩٠٠ متر الى ٦٥٠ مترا بل أقل من ذلك ، ولذلك فان موقع هذه الجهات فى خطوط عرض مدارية وانخفاضها يؤدى الى ظهور مميزات الاقليم المدارى الذى يجتذب الاوربيين كثيرا ، ولكن ثروته المعدنية قد أدت الى طغيان شركات التعدين على معازل الوطنيين المنتشرة هنا ، اذ يستخرج الذهب والقصدير والبلاتنيوم وغيرها .

ولا توجد مزارع يملكها الاوربيون الا نادرا ، لأن الامطار التى تتراوح بين ١٠٠ - ٣٠٠ متر تتعرض كثيرا للتذبذب وتحتاج الزراعة للرى ، ولم ينفذ من مشروعات الرى هنا الا القليل مثل خزان هارتبيستبورت Hartebeestpoort حيث يزرع القطن لطول فترة النمو التى تخلو من الصقيع الى جانب الذرة والطماق ، وتبدو هذه الجهات مكونة من تلال منخفضة يفصلها مناطق متسعة . مستوية تبدو كالسهول .

اقليم الكارو المرتفع "Upper Karroo" يتوسط هذا الاقليم بين الكارو الكبير والفلد المرتفع ، وتحدد جنوبا الحافة الكبيرة ، ويعلو منسوب سطحه عن الكارو الكبير بنحو ١٠٠٠ متر ، ويشبه ما يسود منطقة الفلد الأوسط شمال نهر الاورنج وينحصر بين غربى الفلد المرتفع وصحراء كلهارى ، ويغضى اكثر جهات هذا الاقليم طبقات الكارو الافقية التى تتخللها صخور الدواوريت كما تنكشف الصخور القديمة حول وادى نهر الفال حيث يستخرج الماس من الرواسب ، تتراوح الامطار بين ٢٥ و ٣٥ سم ، وهى تسقط لفترة قصيرة فى شكل سيول ، ويزداد المطر نحو الشمال الشرقى حيث تنمو الحشائش بدلا من الشجيرات الجافة فى الجنوب الغربى ، وقد ضاعف من جفاف التربة احراق النباتات والضغط على المراعى لكثرة عدد الحيوانات حتى لقد خيل للبعض أن المناخ يزداد جفافا بمرضى الزمن ، وتعتمد المزارع على المياه الباطنية التى ترفعها المراوح الهوائية .

ويقوم بالزراعة قليل من الاوربيين والملونين ، ويقتصر عمل الوطنيين على مناجم الماس فى كمبرلى التى يقل عدد سكانها لتدهور حرفة استخراج الماس هنا ، وتمثل كمبرلى المدينة المهمة الوحيدة ، ويعد الصوف والموهر أهم المنتجات ذات الاهمية التجارية .

## اقليم كلهارى :

ليست كلهارى الا حوضا يبلغ متوسط ارتفاعه ٦٥٠ - ٩٠٠ متر تحفه، به جهات مرتفعة من كل الجوانب ما عدا الشمالى ، وهى فى الواقع شبه صحراء لا تغطيها الرمال فى كل جهاتها ، تنمو بها الاعشاب لما يصيبها من مطر نادر يتراوح بين ١٥ - ٢٥ سم ، وهى تتكون من طبقات الكارو الافقية تغطيها تكوينات عظيمة من الرمال فى كثير من جهاتها ، وان كانت تتناثر فى بعض جهاتها تلال تحاتية منعزلة ، وتتوافر المياه الباطنية على عمق قليل، كما ان منخفضاتها الضحلة ذات القاع الذى لا يسمح بتسرب المياه تؤدى الى ظهور الكثير من البحيرات التى تظل فترة حتى تجف ، وتشمل هذه الصحراء شمال غرب ولاية الكاب وجنوب محمية بتشوانالاند التى استقلت باسم بوتسوانا سنة ١٩٦٦ وجنوب شرق منطقة جنوب غرب افريقية .

ورغم انه لا توجد مجارى سطحية للمياه فيما عدا الاوزنج الذى يشق طريقه عميقا دون ان تصيب منطقتة الا امطارا نادرة ، فقد كانت تنتشر فيها المجارى المائية من قبل ، ويعيش سكانها حياة شبه بدوية سواء من الهوتنتوت او الجريكا Griquas ، وهم من الخلاسيين ، الى جانب تردد بعض الهولنديين ممن يربون الأغنام على جنوبى كلهارى ، حيث تحتاج الرأس من الأغنام الى ١٥ - ٢٠ فدان من المراعى .

وكانت تعد بتشوانالاند التى يقع نصفها الجنوبى فى صحراء كلها رى، احدى المناطق التى تسمى British High Commission Territories تمتد من ولاية الكاب شمالا لتشغل مساحة واسعة فى قلب القارة ، ولا يفصلها عن الزمبىزى فى الشمال سوى لسان ضيق Caprivi Strip ضم الى جنوب غرب افريقية ، ويمثل نهر Molopo وهو نهر غير دائم الجريان الحدود الجنوبية لمناطق المندوب السامى البريطانى لمنطقة بتشوانالاند ويمثل شمال هذه المنطقة حوض بحيرة نجامى Ngami ومستنقعات Okavango التى تنصرف مياهها فى بعض المواسم الى نهر الزمبىزى ، ويسكن هذه الدولة ثمانية قبائل الى جانب جماعة البوشمن وبعض جماعات الدمارا Damaraa الذين هربوا لاجئين الى تلك المناطق حين طاردهم الألمان من جنوب غرب افريقية أثناء الحرب العالمية الاولى . ويقطن معظم الوطنيين من السكان

فى معازل تقع فى شرق الدولة ، ويقال أن المرعى جيدة ولا تحتاج لتربية الأغنام الا توفير مياه الشرب بحفر الآبار ، ولكن الجفاف الذى يحدث سنة فى كل ثلاث سنوات فى المتوسط يجعل انتاج نوع من العلف ضرورى لضمان توفير الغذاء للحيوان . أما نهر أو كافانجو الذى ينبع من هضبة أنجولا فينتهى بعد مسيرة ١٢٠٠ كم الى بحيرة نجامى ، التى تنصرف منها المياه فى الفيضان الى أكثر جهات كلهارى انخفاضا فى منخفض ماكريكارى Makarikari وتنتشر هنا ذبابة تسمى تسمى الى جانب عدم الافادة من المياه ، ولذلك قد وضعت عدة مشروعات للرعى تشبه ما نفذه الفرنسيون فى دلتا النيجير الداخلية لضبط تصريف النهر ورى منطقة واسعة صالحة للانتاج .

وتنمو فى الجهات الجنوبية والغربية التى تقع داخل صحراء كلهارى، بعض الحشائش القصيرة التى تصير أكثر كثافة فى الشمال والشرق حيث يسقط نحو ٦٠ سم من المطر السنوى فى المتوسط ، وتربى الماشية التى كانت تساق حية الى جوهانسبرج قبل انشاء مصنع لحفظ لحومها سنة ١٩٥٤ . ويوجد مصنع للالبان فى فرنسيسبتون Francistown وتعتمد البلاد فى اقتصادياتها على تربية الحيوان الذى تبغعه الى جنوب أفريقية التى ترتبط معها باتحاد جمركى ووحدة فى العملة . ولما كانت فرص العمل فى جمهورية بتسوانا « محمية بتسوانا لاند سابقا » محدودة فأكثر من نصف العمال بها يعملون بعقود لمدة ثلاثة أشهر فى جنوب أفريقية ، كما عثر على ثروة كبيرة من الماس على ثروة من النحاس المختلط بالنيكل ، كما عثر على ثروة كبيرة من الماس سنة ١٩٦٨ . وذلك الى جانب ما يستخرج الآن من الاسبستوس والمنجنيز يعلل المسئولون استخراج الماس وعدد كبير من المعادن مثل الفحم والصدوا والملح فضلا عن النحاس والنيكل لزيادة موارد البلاد الاقتصادية وسوف تستثمر رءوس الأموال البريطانية فى هذه المشروعات التى تشملها خطة التنمية القومية سنة ١٩٦٨ والتى تتضمن أيضا التوسع فى مشروعات الرى .

## الفصل الثانى

### اقتصاديات جنوب أفريقية

#### الزراعة فى جنوب أفريقية :

رغم أهمية الزراعة فان مساحة الأراضى الزراعية محدودة ، وفى جمهورية جنوب أفريقية لا تتجاوز نسبة مساحة هذه الأراضى ٤٪ ، وفى زيمبابوى ٥.٠٪ وفى جنوب غرب أفريقية لا تتجاوز ٣.٠٪ ، ولا تختلف نسبة ما يزرع فى ملاوى وموزمبيق وبتشوانالند فى ضالته عن بقية جنوب أفريقية . أما نسبة ما يزرع فى جمهورية جنوب أفريقية من الأراضى الزراعية فلا تعدو ٧٪ منها ، وفى هذه الجمهورية تقدر مساحة ما يزرع بنحو ١٥ مليون فدان ، يزرع ٨ مليون منها ذرة ، ٣ مليون قمحا وشوفانا ، أما ما يخص لزراعة الذرة الرفيعة التى تعرف باسم **Kaffer corn** فيقدر بنحو مليون فدان ، على حين يزرع قصب السكر فى مساحة تقدر بنحو ٤٠٠ ألف فدان ، كما يزرع نحو ٤٠٠ ألف فدان ذرة فى زيمبابوى أما فى موزمبيق فلا تتجاوز مساحتها ٧٠ ألف فدان .

وهكذا تبدو أهمية زراعة الذرة التى استوطنت منطقة اتخذت شكلا مثلثا يعرف باسم مثلث الذرة وذلك يرجع الى توافر ظروف طبيعية أهمها المطر والحرارة والضوء واستواء الأرض وخصوبة التربة ، فمن حيث الحرارة يجب ألا يتجاوز متوسط النهاية الكبرى للحرارة فى يناير ٣٥°م وألا تهبط النهاية الدنيا فى متوسطها دون ٧٥°م ، وبذلك يمكن أن نستبعد الجهات التى تعلق على ١٦٤٠ متر تقريبا لتعرض الحرارة للهبوط ليلا دون هذا الحد الأدنى المذكور .

#### القمح :

يلى هذا المحصول الذرة أهمية ، ولكنه دونه من حيث المقدار بكثير ، فمحصول جمهورية جنوب أفريقية من القمح يتراوح بين ٧ - ٩ مليون جوال ( زنة الجوال ٢٠٠ رطل ) أما جنوب غرب أفريقية فلا يتجاوز انتاجها ٥٠٠٠ - ١٠٠٠٠ جوال .

وقد انتشرت زراعته فى العشر سنوات الاخيرة حين أصبح من الصعب الحصول عليه من الخارج ، كما أخذ الوطنيون من الزنوج فى اتخاذه طعامهم الرئيسى بدلا من الذرة ، بل وأخذت الحكومة تمنح الاعانات للاهلين منذ سنة ١٩٣٠ تشجيعا لزراعته ، وهكذا انتشرت زراعته فى كل الجهات التى تصلح لذلك ، وتنقسم مناطق زراعة القمح الى قسمين : مناطق زراعة القمح الشتوى فى جنوب غرب ولاية الكاب وهى بدورها تضم اقليمين الغربى ويسمى Swartland والجنوبى ويسمى Ruens ، ثم المناطق المرتفعة ذات الشتاء البارد .

### الفواكه :

تعد الفواكه من الغلات الزراعية والصادرات المهمة فى جمهورية جنوب أفريقيا ، فقد بلغ متوسط قيمة الصادرات منها نحو ٣ مليون جنديا قبل الحرب ، كما قدرت قيمتها بنحو ٢٥ مليونا من الجنيهات ، ويزرع الخوخ والمشمش والتفاح والبرقوق فى جنوب غرب وجنوب ولاية الكاب بصفة خاصة لتصدير منتجاتها ، أما الموالح والفواكه دون المدارية فتتم فى الجهات الشرقية من الاتحاد ، فتزرع الفواكه النفضية فى جنوب غرب ولاية الكاب عند سفوح الجبال حيث تتوافر مياه الرى من الانهار صيفا ، وتصلح التربة الطفلية والرملية والصلصالية للزراعة هنا اذا كانت ذات سمك كاف ، ودرجة الحرارة ثلاثم زراعة الفواكه هنا الا أن عدم توفر فترة باردة كافية تسمح بانصراف بعض الأشجار لتكوين الثمار ك بعض أنواع الكمثرى والخبوخ ، وذلك أثناء فصل الشتاء مما يضر محصول هذه الاشجار وقد قدر أنه يجب ألا يزيد متوسط حرارة الشتاء عن ١٢ر٢م° والواقع أن متوسط حرارة الشتاء فى مناطق زراعة الفواكه فى غرب ولاية الكاب يتراوح بين ١٢ر٢م° و ١١ر١م° اذا استثنينا الجهات المرتفعة ، وبعد مدى تأثير الفواكه بالصقيع أو المطر المتأخر العاملان اللذان يحدان الارتفاع الذى يلائم زراعة أشجار معينة من الفواكه ، فالمشمش واللوز يزرعان فى الجهات المنخفضة والخبوخ والكمثرى فى الجهات المرتفعة قليلا على حين يزرع التفاح فى الجهات العالية .

ويؤدى وجود الوديان حيث يعلو الهواء الساخن طبقة باردة من الهواء

أو ما يعرف باسم « انقلاب الحرارة » الى تعقيد وتداخل أنواع الفاكهة .  
فيزرع التفاح في حوض الجون جبال هوتنتوت الواقعة الى شرق Hottentots  
جبال هولاندز وفي « الوادي الطويل » Longkloof الى الشمال  
من جبال تجبرجن ، أما الكمثرى التي تمثل أهم صادرات الفواكه من هذا  
النوع النفضي فتزرع في حوض سيريز Ceres basin على حين تنتشر  
زراعة البرقوق في الاقليم السالف الذكر وترانثس هوك Transch Hock  
وتتركز زراعة الخوخ في حوض سيريز أو الجون Ceres Elgin كما تجود  
زراعة المشمش في منطقة ولينجتون Wellington . وتقوم صناعات العصير  
والحفظ وغيرها على انتاج الفواكه في مدينة الكاب وبورت اليزابيث وغيرها .

أما الكروم فلها مكانتها المرموقة في الاقتصاد القومي لجمهورية  
جنوب أفريقية ، ورغم أنه يمكن زراعة الكروم حيث لا تزيد فترة الصقيع  
عن ١٥٠ يوما ، فإن زراعته على أسس تجارية تكاد تقتصر على جنوب غرب  
ولاية الكاب ، إذ لا تتجاوز مساحة الكروم خارج هذه المنطقة ٨٠٠ فدان في  
الترنسفال من بين ١٦٥٠٠٠ فدان تمثل مساحة الكروم جمعاء ، ولا بد  
من توفير مياه الري إذا هبط متوسط المطر عن نصف متر ، ولذلك يمكن  
تقسيم مناطق زراعة الكروم الى نوعين . مناطق المطر . وهي تشمل المناطق  
الساحلية ووديان سيريز وتلبانج Ceres, Tulbagh والواقع أن أكثر وديان  
الكروم تقع الى شرق مدينة ورسستر Worcester حيث تتوافر مياه الري  
لزراعة الكروم في وادي نهر هكس ووادي بريد الاوسط Middle Breede  
Valley, Hex River Valley وبعض جهات منفردة في الكارو الصغير  
Little Karroo والواقع أن ٥٤ من نبيذ الاتحاد يأتي من منطقة الساحل  
في ولاية الكاب .

وتزرع الكروم في السهول الساحلية بجبالها المنعزلة والوديان الواقعة  
بين هذه السلاسل ، وتوجد زراعة الكروم هنا على منحدرات الجبال حيث  
التربة الخصيبة ، وقد أدى ثبات واستقرار العناصر المناخية من حرارة  
ومطر الى عدم تعرض محصول الكروم للتغير ، وتعد Constantia  
أهم مناطق الساحل التي تنتج النبيذ، وأما مراكز تصدير الصنف الطازج فهي  
Paarl, Hex River Valley, Constantia بارل ووادي هكس وكونساتيا .



وأهم مناطق زراعة الكروم فى الوديان الضيقة التى تقع بين هذه  
السلاسل الجبلية الالتوائية هى وداى جريت برج Great Berg فى الشمال .  
ورغم أن اتحاد جنوب أفريقية لا ينتج أكثر من ٣٪ من محصول النبيذ  
فى العالم فلزراعة الكروم أهمية اقتصادية كبرى ، وتقدر قيمة الانتاج  
السوى بخمسة ملايين من الجنيهات ، أما انتاج العنب فيبلغ نحو ٣٠٠٠٠ طن ،  
ومن أهم المشكلات التى تواجه التوسع فى زراعة الكروم لانتاج النبيذ  
ضرورة رفع القيود على استهلاك النبيذ بالنسبة للباننوتو من السكان .

### الانتاج الحيوانى :

تختلف قيمة المراعى الغذائية تبعاً لنظام المطر السائد ، وفى جهات  
المطر الشتوى تقل أهمية المراعى فى الصيف سواء فى مقدارها أو نوعها ،  
كما أن مراعى مناطق المطر الصيفى تنقسم الى نوعين : مراعى الجهات  
الدهيئة الجافة نسبياً وتسمى Sweet Veld ، وهى تمتاز باحتفاظها  
بخصائصها الغذائية فى فصل الجفاف أو الشتاء ، أما حشائش المراعى  
الأخرى فى مناطق المطر الصيفى فتسمى Sour Veld وهى تفقد قيمتها  
الغذائية سريعاً بعد انقضاء فترة أول الصيف ، ولكنها تصبح أقل أهمية  
فى الخريف والشتاء من حيث صلاحيتها كعلف للماشية ان يعوزها البروتين  
والفوسفور ، أما فى المناطق شبه الجافة فتتمو مراعى الكارو التى لا تفقد  
قيمتها الغذائية طوال العام اذا لم تتأثر بجفاف شديد .

وتربية الماشية تتأثر بتوافر موارد المياه وخسوف المنطقة من أمراض  
الماشية ، وتوافر المرعى الجيد ، فمرض Nagana الذى يصيب الماشية  
يحول دون التوسع فى تربيتها فى مراعى Bush Veld ( السفانا البساتنية  
الجافة فى سواحل ناتال وشمال الترنسفال ) ، ولكن مع ذلك يعد جنوب  
أفريقية صالحاً من الناحية الصحية لتربية الماشية ، وان كانت موارد المياه  
والمراعى تعوز بعض المناطق ، وبخاصة فى جنوب غرب أفريقية حيث لا يزيد  
عددها عن ٣ مليون رأس على حين تبلغ ١٢ مليون تربي فى جمهورية جنوب  
القارة ، وتضم الجمهورية منطقتين من مناطق تربية الماشية ، وتختلفان من  
حيث البيئة أولهما : هى الهضبة والحافة الشرقية للمرتفعات ، وهى تمثل  
مناطق الحشائش المعتدلة ، والثانية : هى البيئة التى تعتبر أكثر انخفاضاً

جغرافيا العالم

فى منسوبها وأكثر دفئا من مراعى البوشفلد حيث يعد ارتفاع الحرارة العامل الذى يحدد تربية الماشية ، وتصلح مراعى High Veld لتربية الانواع الاوربية من الماشية .

والواقع ان اكثر الماشية هى التى تربي فى مراعى الفلد ، حيث يؤدى توفير المراعى فى الخريف والشتاء الى رفع انتاج ماشية اللبن ، فقد انقضى عهد الرعى المنتشر ، وبدأت مرحلة الرعى الكثيف وتربية الماشية ، فيمكن التوسع فى تربية الماشية الجيدة فى المناطق التى تثبت صلاحيتها لتربية الماشية لتوافر الحرارة المنخفضة المناسبة ، والمراعى الجيدة .

أما تربية الاغنام فهى ذات أهمية اقتصادية كبيرة إذ يعد الصوف يعد الذهب ثانى المحاصيل أهمية فى سجل الصادرات .

وقد بلغ عدد رعوس الاغنام فى الجمهورية نحو ٣٨ مليون رأس سنة ١٩٦٢ و ٣ مليون رأس فى جنوب غرب أفريقية (نامبيا) ، وأكثر الانواع من المارينو التى تربي لصوفها ، ولكن أمكن تهجين انواع الاغنام التى تربي لأصوافها بالانواع التى تربي للحومها ، ويمكن أن تميز عدة أنواع من المارينو تختلف باختلاف مراعيها : النوع الاول : ويربى فى الجهات المرتفعة الشرقية الغزيرة المطر حيث كانت - بل لا تزال - تساق الاغنام من مراعى Sour Veld فى منطقة الفلد العليا فى الشتاء لترعى فى مراعى الفلد الوسطى ، ويلبها اقليم الكارو شبه الجاف الذى يتراوح المطر فيه ٢٠ و ٤٠ سم ، تم اراضى الكارو الجاف .

ويحدث ذلك الآن على نطاق ضيق فى جنوب شرق الترنسفال ، ولكن يعترض أتباع هذا النظام صعوبات متزايدة . تتلخص فى تقسيم المزارع وازدياد حجمها صغرا ، لا تجد الماشية فى Sour Veld الفلد المرحاجتها من العلف كما تزداد الاغنام هزالا اثناء الشتاء ، وتنخفض نسبة التكاثر الى ٣٠٪ فى العام بين قطعان الضان التى ترعى الفلد المر وذلك لعدم توفر الغذاء فى اثناء الشتاء ، وهناك انواع مهجنة من المارينو لانتاج اللحوم وهى تربي فى الجهات التى يتوافر فيها العلف طول العام بفضل مشروعات الرى فى بعض الجهات .

ويربى نحو ٥ مليون رأس من الماعز ، أكثرها ينتمى للنوع الذى يسمى « ماعز البوير » . وأما ماعز أنقره ، فلا يتجاوز عدد رؤسها  $\frac{1}{4}$  مليون ، ويربى أكثرها فى شرق الكارو حيث تلائم الظروف فى هذه المنطقة تربية الماعز الذى ينتج أجود أنواع الموهير .

وقد ذكر البعض أن تربية هذا النوع من الماعز فى فلد الكارو كفىل بالقضاء على حشائش هذا المرعى الفقير مما يتبعه اكتساح التربة . ولكن وضع نظام يجمع بين تربية الماعز والأغنام يكفل الإبقاء على هذا النوع من المرعى دون أن تختفى .

أما تربية النعام فقد كانت من الحرف الرئيسية التى عنى بها زراع إقليم الكارو الصغير Little Karoo منذ سنة ١٨٥٠ ، ولكن بعد أن تعرض سوق ريش النعام لأزمات عنيفة متعاقبة على أثر تغيير الأنواع والأزياء ، لم يعد هؤلاء الزراع الذين اهتموا قليلا بتربية النعام بعد أن زاد عليه الطلب مؤقثا سنة ١٩٤٨ يعتمدون على هذه الحرفة وحدها ، فزرعوا الطباق وربوا أبقار اللبن والأغنام ، فلم يتجاوز عدد من يربى منهم النعام ٨٠ مزارعا لديهم نحو ٥٦٠٠٠ من النعام .

### الثروة المعدنية :

للثروة المعدنية بما تدره من ربح وما تجتذبه من أموال تأثير كبير فى تطور جنوب أفريقية الاقتصادية ، وتعد جنوب أفريقية من أهم الأمثلة لتأثير التعدين فى اقتصاديات دول أفريقية ، فقد قيل : أن الزراعة فى جنوب أفريقية بما يكتنفها من صعوبات بعضها من النوع الطبيعى كعدم كفاية الأمطار . وعدم ضمانها ، وتعسرية التربة ، وبعضها من النوع البشرى لعدم توافر الأيدي العاملة من الزراع من البوير الذين يقوم على أكتافهم الانتاج الزراعى مما يتطلب استخدام أيدي عاملة من الزنوج بأجورهم المنخفضة ، وسخطهم وحنقهم على سوء معاملتهم - كل تلك الصعوبات ستجعل من التعدين دعامة رئيسية من دعامات الاقتصاد فى جنوب أفريقية .

ولما كانت الثروة المعدنية لا تعد بما يطرأ عليها من تغير فى الطلب ، وتذبذب فى الأسعار أساسا سليما لاقتصاد قوى متماسك فقد أشفق الكثيرون

من أن يكون الرخاء والتقدم والثروة التي تبدو فى هذا الجزء من القارة لا تنهض على قواعد واسعة قوية .

والواقع أن الذهب كان يمثل ٥٠٪ من قيمة صادرات جنوب إفريقيا فى الفترة بين ١٩٢١ و ١٩٢٥ على حين كان الماس يساهم بنحو ١٠٪ من قيمتها ، ثم زادت قيمة الذهب حتى بلغت فى الفترة بين ١٩٢٣ و ١٩٢٥ ١٦٪ من قيمة الصادرات .

وتتركز أكثر المعادن الفلزية فى جنوب أفريقية ، بل فى أفريقية عامة فى الصخور الأركية القديمة ، أو الصخور التى تكونت منها مباشرة .

أما المعادن الأخرى غير الفلزية ، وفى طبيعتها الفحم فينتشر فى تكوينات العصر البرمى فى طبقات نظام الكارو التى ظلت محتفظة بوضعها الألفى وفق الكتلة القديمة ، وتنتشر فى الحافة الشرقية لهضبة جنوب أفريقية التكوينات التى كشفت عنها الانكسارات التى تعرضت لها هذه المنطقة ، والتى ظلت طبقات الكارو تغطيها وتحميها من تأثير التعرية فترة

والواقع أن المنطقة التى تمتد من حافة حوض الكنغو جنوبا عبر كاتنجا ملاوى والفلد المرتفعة فى أراضى الاتحاد ، تعد من أشهر مناطق المعادن فى العالم ، فقد تجاوزت قيمة ما استخرج منها ٤٠٠ مليون جنيه أختص الاتحاد بنحو ٣٣٪ قيمة هذه الثروة المعدنية ، وبخاصة الذهب الذى بلغت قيمته بين ١٨٨٤ و ١٩٥٢ نحو ٢٢٨٥ مليون جنيه ، والماس وقد قدر بنحو ٤٣٠ مليون جنيه . وقد قدرت قيمة ما بيع من ذهب الاتحاد سنة ١٩٥٦ نحو ٦٩٪ من قيمة الثروة المعدنية فيه ، أو نحو ١٤٧ مليون من بين ٢١٤ مليون جنيه تمثل قيمة المستخرج من المعادن ( يقصد بالاتحاد جمهورية جنوب أفريقية ) .

أما الفحم والماس فيمثنون ١٣٪ منها ، أما المعادن الأخرى وهى النحاس ( ١١٪ مليون ) ، والاسبستوس ( ٧٪ مليون ) ، والمنجنيز ( ١٪ مليون ) ، والحجر الجيرى ( ٢٪ مليون جنيه ) ، وخام الكروم ( ١٣٪ مليون ) وهى تؤلف نحو ١٢٪ من قيمة ما باعه الاتحاد من ثروته المعدنية .

## الذهب :


ظلت أفريقية تنتج جنابا كبيرا من الذهب فى العالم الذى تراوح وزنه بين ٤٦ر٥٪ سنة ١٣٧ و ٨٥ر٩٪ سنة ١٩٤٨ ، أو نحو ٦٠٪ مما يستخرج فى العالم من الذهب ، وقد ظل الاتحاد يختص بنحو ٨٠٪ من انتاج القارة كله ، وقد احتكر الانتاج فى الاتحاد منطقة واحدة فحسب فى الفترة بين ١٨٨٧ و ١٩٤٩ ، وقد قدر انتاج هذا الحقل بنحو ٩٧٪ من انتاج جنوب أفريقية كله ، أو ٤٨٪ من الانتاج العالمى ، وهذا الحقل الذى يسمى Witwatersrand Gold Field أو الذى يعرف باسم Rand يمتد لمسافة خمسين ميلا من راندوفوتين Randfontein شرقا الى سبرنجز Springs ولسافة عشرين ميلا من Springs سبرنجز الى هيدلبرج Heidelberg

ويوجد الذهب هنا فى نوع من مجمعات عصر ما قبل الكمبرى ، تعرف باسم "reefs" تظهر أحيانا على سطح الأرض ، أو تغطيها طبقات حديثة ولا يتجاوز العمق الذى يستخرج عنده المعدن ٤٠٠٠ متر حتى تصبح عملية التعدين اقتصادية ، وتصل درجة حرارة الصخور فى بعض المناجم على عمق ٣٠٠٠ متر نحو ٤٢ م .

والواقع أن استخلاص الذهب من هذه الصخور الرسوبية كان ينطوى على صعوبات من نوع يألفه المعدنون الذين يستخرجون الذهب من عروق الكورائز ، أو من الرواسب الفيضية ، ويعد توزيع المعدن منتظما الى حد كبير ولو أن جزءا كبيرا منه من نوع ردىء ، وقد استخرج المعدن من الطبقات السطحية فى أول الأمر ، ولكن ازداد عمق المناجم بعد ذلك حتى وصل الى ٣٠٠٠ متر ، وظهرت مشاكل تتصل بالتهوية أو ارتفاع الحرارة فقد لجأ المسئولون الى ترطيب الجو فى المناجم لوقاية المعدنين من بعض المراتد السامة ( خريطة رقم ٧٠ ) .

وقد تعاقبت أهمية مصادر الدخل الثلاثة الرئيسية فى أفريقية وهى الزراعة التى ساهمت بالنصيب الاوفر فى الفترة بين ١٩١٨ و ١٩٤٨ ، ثم الذهب الذى أخذ مكانته فى الفترة بين ١٩٣١ و ١٩٤١ ، أما الصناعات التحويلية فقد انتزعت الصدارة منذ ذلك الحين ، فقد كان نصيب الذهب من الدخل القومى بين ١٩٣١ و ١٩٤١ بين ١٦ و ٢٢٪ كل عام وقد وصف

الذهب بأنه دعامة الاقتصاد الكبرى في جنوب افريقية • ( خريطة رقم ٧١ )



خريطة رقم ٧٠

الماس :

بلغت قيمة ما استخرج من الماس في جنوب افريقية ٤٥٠ مليون جنيهها منذ سنة ١٨٦٧ ، وعثر على أولى قطع الماس في رواسب الأورنج والقسال



خريطة رقم ٧١

حتى سنة ١٨٧١ حين عثر عليها فى كمبرلى فى فوهات البراكين ، ولم يأت عام ١٩١٣ حتى كانت صناعة استخراج الماس قد رسخت أقدامها ، ويوجد الماس فى ثلاثة أنواع من التكوينات الجيولوجية : الأولى فى مجتمعات العصر البروتوزوى الراند والثانى هو أهمها فى مداخل البراكين وشقوقها والثالث فى حصى التكوينات الرسوبية وفى تكتينات الجلاميد . وترجع هذه البراكين والسدود التى تعد أهم مصادر الماس الى العصر الترياسى ، وتنتشر هذه البراكين فى منطقة تمتد من الجنوب الغربى فى ولاية الكاب خلال منطفة كمبرلى الى شرق بريتوريا بنحو ثلاثين كم ، أما الماس التى عثر عليه فى الغربين فينتشر فى وديان الانهار الحالية وعلى بعد قد يصل الى ٢٠ كم بعيدا عن مجارى الانهار الحالية ، وعمق قد يبلغ ١٠٠ متر لان انهار منطقة الكارو قد تعرضت لكثير من التحولات من منطقة الى أخرى فى مجاريها ، وتبلغ قيمة ما يستخرج سنويا من الماس فى التكوينات الرسوبية نحو ٤ مليون جنيه ، يقدر نصيب مناجم الحكومة نماكالاند Namagualand منها بنحو ٢ مليون جنيه ، والواقع أن صناعة استخراج الماس فى جنوب أفريقية قد تعرضت للبور من جراء منافسة مناجم نماكالاند لولا أن تدخلت الحكومة فوضعت يدها على منطقة غنية وأوقفت منح امتيازات جديدة وأشرفت على بيع وتقويم الماس المستخرج فقل الإنتاج من هذه المنطقة سنة ١٩٣٠ ، وتعد سنوات ١٩٢٩ - ١٩٣٠ أهم السنوات فى استخراج الماس الذى بلغت زنته ٨ر٤ مليون قيراط وقيمته ١٥ مليون جنيها ، ولكن ما تعرض له الماس من منافسة حادة حتى بلغ الإنتاج ٤ر١ مليون قيراط بل نصف مليون أدى الى تكوين ما عرف باسم اتحاد منتجي الماس Association of Diamond producers ويستخدم فى المتوسط الان نحو ٨٠٪ من الماس من حيث الوزن لأغراض صناعية ، وقد اتسع نطاق استخدامه أثناء الحرب ، ولكن قيمة ما يستخدم منه لأغراض الزينة الذى تنتج أجود أنواعه مناطق طمى نماكالاند ، والذى تعتبر الولايات المتحدة التى تستهلك ٨٠٪ منه سوقه الكبيرة تزيد عن ٨٠٪ من قيمة ما يباع من الماس . وقد أمكن استخدام طرق الحفر الحديثة ليصل عمق المنجم الى ثلاثة كيلو مترات .

وقد عثر على معادن متعددة أخرى من نوع البلاتينوم وبخاصة فى الترنسفال ، ولكن الطلب عليها محدود ، ومن ثم لم يتجاوز المستخرج من

المعدن ٢٠٠٠ر. ٢٠٠٠ أوقية الا فى سنة ١٩٥٣حتى بلغ ٢٩٩ ألف أوقية ، فلم اتسع نطاق استخدامها لتضاعف المستغل منه ، ( انظر خريطة رقم ٧٢ ) .

### الفحم :

بعد غنى جنوب افريقية بالفحم على جساب عظيم من الاهمية الاقتصادية ، لا لان القارة فقيرة فى هذا المعدن ان لا يتجاوز احتياطها منه ١٪ فحسب ، ولكن لأنه دعامة قيام كثير من الصناعات التعدينية الاستخراجية فضلا عن الصناعات التحويلية التى تزداد اهميتها فى الاتحصاد فترة بعد أخرى أيضا ، فيوجد الفحم فى تكوينات الكارو الشمالية فيما يعرف باسم تكوين Dwyhea الذى ينتمى الى الكربونى الاعلى ، ولكن اغنى هذه التكوينات تكوينات

وتوجد فى ولاية الكاب طبقات أخرى اقل أهمية لم يتجاوز المستخرج منها ١٠٠٠ طن على حين يقدرمتوسط الانتاج السنوى من الفحم فى الاتحاد نحو ٣٠ مليون طن وتقع أهم الحقول فى شمال ولاية الاورنج وفى الترنسفال وشمال ولاية ناتال ، كما توجد حقول أخرى تقع فى شمال ناتال بالقرب من نيوكاسل ، وتقل نفقات استخراج الفحم لقللة عمق مناجمه ووضعها الافقى ورخص الأيدى العاملة من الوطنيين ويصدر الفحم الذى يشبهه فى بعض الحقول فحم ويلز الجيد من ناتال عن طريق دريان ، أما من الترنسفال فيصدر عن طريق ميناء لورنزو ماركين وهو طريق أقل نفقة ، وكان يستورد الفحم الصادر من جنوب افريقية فى البلاد الافريقية القريبة كزائير وانجولا وموزمبيق ، أو البعيدة كالسودان ومصر قبل مقاطعتها لسياستها العنصرية ، بل قد يصل أحيانا للنرويج وان كان يجد فى بلاد نصف الكرة الجنوبى كاستراليا والارجنتين وبلاد المحيط الهندى أسواقا رائجة ، وقد أدى تخفيض قيمة العملة فى جنوب أفريقية الى زيادة أجور عمال المناجم وبخاصة مناجم الذهب ، ولما كان ثمن الفحم فى السوق محددًا فلا بد لتوفير هذه الزيادة فى الاجور من بيع الفحم فى الخارج وقد قل المصادر منه، ويستغل نحو مليون طن فى الداخلى لتوليد الكهرباء ، ان تقع من حسن الحظ قرب مناجم الفحم فى وتبانك Witbank الى كراند ، بل يستخرج من حقول سبرنجز Springs الواقعة فى الراند الشرقى East Rand أيضا وقد اقيمت احدى الشركات وتدعى



(S. A. C. O. G. C.). South African Coal, Oil Gas Corporation  
على اقامة مصنع لاستخلاص البترول والغاز من الفحم فى جنوب فرينينج  
Vereeniging مما يساعد الدولة على الاعتماد على نفسها فى الحصول  
على البترول ، يمكنها من الاستفادة من احتياطها الضخم من الفحم الرديء ،  
وتنتج منطقتان نحو ثلثى النحاس هما نامكلاند Namaqaland Mines التى  
تستغلها شركات أمريكية كندية تسمى O. Okiep Copper Com. منذ سنة  
١٩٤٠ بعد أن توقف استخراجه فى العشرينات من هذا القرن رغم أنها عرض  
واستغلت منذ سنة ١٨٥٢ ، ومنطقة مناجم مسينا فى وادى نهر لمبويو ،  
ويقدر إنتاجهما معا بنحو ٤٠ر٠٠٠ طن ، ويستخرج النحاس فى جنوب  
غرب أفريقية تسوميب Tsumeb منذ سنة ١٩٠٨ على يد شركة المانية انتقلت  
أسهمها الى شركة جديدة فى سنة ١٩٤٧ تضع لشركة O. Okiep Cooper  
Company كما تستخرج طائفة من المعادن الأرى كالأسبستوس ( ١٠٠  
الف طن سنويا ) من منطقة نهر أوليفانت Oilfante River فى الترنسفال .

### الصناعات التحويلية :

مرت على الصناعات فى الاتحاد فى فترات ثلاثة الاولى أثناء مرحلة  
الاعتماد على الرعى وعلى الزراعة التى تستهدف توفير حاجة السكان حين  
كان عدد السكان لا يتجاوز ٣١٧ر٠٠٠ نسمة منتشرين بين كيب تون ونهر  
اللمبويو ، وقد امتدت هذه الفترة بين ١٦٥٢ و ١٨٧٠ ، ولكن العثور على  
أول منطقة من الماس سنة ١٨٦٧ والشروع فى استخراج الذهب سنة ١٨٧٣  
كان بشيرا ببداية مرحلة جديدة ، إذ زاد عدد السكان وتطورت الزراعة  
وأتسع مجالها لتوفير حاجات السكان ، وقامت المصانع لاستكمال انتاج  
بعض السلع نصف المصنوعة ، وهكذا ظهرت الصناعات الاستخراجية وبدأت  
الصناعات التحويلية تثبت أقدامها فى المرانى فى الفترة بين ١٨٧٠ حتى  
سنة ١٩١٤ وهى المرحلة الثانية ، ولكن حين نشبت الحرب أحست البلاد  
بخطورة الاعتماد على استيراد المعدات اللازمة لاستمرار نشاط الصناعات  
الاستخراجية ، فنشأت صناعات متعددة لتوفير هذه المطالب ، ويكفى أن  
نذكر أن صناعة استخراج الذهب قد أنفقت ٤٥ مليوناً من الجنيهات سنة  
١٩٥٦ على المصنوعات المصنوعة محليا و ٧ مليون جنيه على المنتجات  
الزراعية المحلية .

والاتجاه فى جنوب أفريقية الآن يرمى الى الفصل بين العناصر الثلاثة الرئيسية من سكان الاتحاد وهى الزنوج والملونين والبيض فى مواطنها ، يحظر شراء أو اقتناء الاراضى بواسطة فريق من السكان فى المناطق المخصصة للفريق الاخر من السكان ، كما أن التزاوج بين البيض والسود والملونين أصبح محظورا ، وهذا الفصل بين عناصر السكان المختلفة يتعارض مع الاتجاه السائد فى كثير من جهات أفريقية الأخرى التى ترغب فى التخفيف من حدة ضغط البيض السياسى والاقتصادى والاجتماعى على الوطنيين من السكان ، ان لجوء الجمهورية لهذه التشريعات ليقوم دليلا قاطعا على أن المسئولين فيها يرغبون فى الإبقاء على هذه المنطقة كوطن دائم للبيض يظلون سادته رغم عددهم الضئيل .

ويعد جنوب أفريقية مثلا فريدا لبلد يحكمه بل ويسكنه شعب أوربى ، يقبض على ناصية الأمور فيه بيد من حديد ، ويتركز السكان فى منطقة الترنسفال والأورانج الحرة حيث نشطت حركة التعديين فى إقليم الفلد ، وقامت المدن كمراكز لل عمران منذ وقت مبكر ، كما يحتشدون على السواحل الشرقية والجنوبية التى تتوافر فيها الثروات الزراعية والنشاط الصناعى ، ولكن الى جانب ممارسة الزراعة الكثيفة فى هذه الجهات توجد مناطق للوطنيين يمارسون فيها الزراعة المتنقلة وأخرى يقوم بها البوير بممارسة الزراعة القائمة على الاكتفاء الذاتى ، ورغم التفكير فى انشاء أوطان تسمى « باننوتوستان » خاصة بالبانتو ، فانه من المتعذر أن يحول ذلك دون الهجرة لا حاجة البيض لأيدى عاملة وفيرة رخيصة فحسب ، بل لضيق منازل الوطنيين بسكانها أيضا ، وستظل جمهورية جنوب أفريقية تمثل منطقة اغتصبت من افريقية ليفرض عليها حكم أجنبى غاشم ، تعيش غريبة عن القارة وعن سكانها الذين لا يقبلون أن يعامل الوطنيون بها معاملة تنطوى على الجفوة والتنكر للمبادئ الأساسية للإنسان وتستند على نوع من الايمان العميق بعدم تكافؤ الأجناس أو مساواة البشر فى الحقوق .

## الجزائر الأفريقية فى المحيط الهندى

تتناثر مجموعة من الجزائر أكبرها جزيرة مدغشقر على طول انكسارات عاصرت تكوين انكسارات موازية لها حدثت فى شرق أفريقية وفى غربها ، كانت مصحوبة بنشاط بركانى واسع النطاق .

وليس التشابه بين جزائر شرق أفريقية فى المحيط الهندى وغرب أفريقية فى المحيط الاطلنطى مقصورا على الظروف الجيولوجية ، بل أن طبيعة موقع كل منها جعل من كل المجموعتين حلقة اتصال بين أفريقية وآسيا ، فمذ كشف البرتغاليون فى القرن الخامس عشر هذه الجزائر ظلت تنهض بهذه الوظيفة فأصبحت مراكز للتموين وقواعد للسيطرة على السواحل القريبة ، ولكن بعد فتح قناة السويس سنة ١٨٦٩ أوت كسل منها للظلال ، فنأت عن مسالك التجارة والملاحة العالمية المطروقة ، وأصبحت أهميتها الدراسية تنحصر فى أنها تمثل مجتمعات متعددة الطبقات ، وملتقى عناصر متعددة الأصول والحضارة ، ورغم أنها ليست أفريقية تماما فدراستها مع أفريقية تجلو سمات الشبه بين القارة . هذه الجزائر تمثل عالما تمتزج فيه القارتان الأفريقية والآسيوية ، ليخرج منهما كيان متميز يمكن أن يطلق عليه عالم « المحيط الهندى » .

### جزائر كومورو :

جزائر بركانية تبلغ مساحتها ٢١٦٠ كم مربعا ، تستمد مميزاتا من مظاهرها البركانية المتعددة ومن انتشار الاسلام واللغة السواحلية بين سكانها . فقد نشأ بعد عصر الميوسين على طول انكسار يمتد من الشمال الغربى نحو الجنوب الشرقى مخروطات بركانية لا زال بعضها نشيطا مثل جبل كارتالا ( Kartala ) ويقدر ارتفاعه بـ ٢٥٠٠ مترا ) فى جزيرة كومورو الكبرى ، كما توجد أعمدة من البازلت يبلغ ارتفاعها ٨٠٠ متر فى جزيرة موهيلي Mohéli ، أما فى الجزيرة الكبرى فتنتشر بها اللابة الحديثة المسامية التى لم تسمح بعد بتكوين مجارى لصرف المياه سطحيا ، كما يغطى البعض الآخر الرماد البركانى ، ولذلك فان موارد المياه تختلف عن مياه الشرب التى ألف الناس استساغتها ، وعصير النرجيل فى المرتفعات

وأبار ضحلة تنتشر على الساحل حيث تطفو المياه العذبة فوق مياه البحر الملحة فضلا عن خزانات المياه ، أما الجزائر الأخرى التى تقادم فيها العهد على خروج البازلت فقد أصبحت التربة فيها سوداء كثيرة الصلصال ، تجرى المياه فوق سطحها ، ولا شك أن نشاط الانسان بأحراق النباتات لاستغلال الأرض بطريقة معينة تؤثر على خصوبة التربة وخصائصها ، ولكن أكثر أنواع التربة خصوبة هى التربة الرملية المنتشرة على سواحل الجزائر حيث تختلط المواد المنقولة بالمحلية .

ويختلف مقدار المطر اختلافا واضحا من جهة لأخرى فى أرجاء الجزيرة الواحدة لاختلاف طبيعة الرياح ، فالرياح الجنوبية الشرقية التى تمر على جزيرة مدغشقر مثلا جافة ، ورغم ما هو مألوف من تباين المطر من عام لآخر فى أفريقية المدارية ، فإن التفاوت فى المطر فى هذه الجزائر أشد وضوحا وأبعد أثراى حياة سكان جزيرة مثل كومورو الكبرى التى حرمت المياه السطحية الجارية ، أو الجزائر المنخفضة مثل جزيرة موهيلى .

وتتابع نطاقات النباتات الطبيعية من مانجروف السواحل الى الغابات التى تصل الى منسوب ٤٠٠ متر ، والتى اجتثت أكثرها لزراعة اللارجيل بدلا منها ، وتظل الغابات الطبيعية تنمو لارتفاعات أكثر حتى منسوب ٢٠٠٠ متر ، على حين تنمو أنواع فصائل الخليج الضخم فوق هذا المنسوب .

وتتنوع عناصر السكان من العرب الذين نزحوا اليها منذ القرن الثامن أو التاسع الميلاديين ثم من الفرس القادمين من شيراز فى القرن الخامس عشر ، كما جلب الافريقيون كأرقاء الى جزائر كومورو ، كما قدم عنصر الملايو شأن مدغشقر وبخاصة الى جزيرة أنجوان "Anjouan" كما هاجر السكالافا من جزيرة مدغشقر ، ثم توالى هجرات الاوربيين من البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين الذين اتخذوها منفى للمعارضين للثورة الفرنسية كما نقلوا اليها بعض سكان جزائر رنيون وبعض الهنود بل والصينيين .

وتتفاوت كثافة السكان بين الجزائر المختلفة ، فهى تتراوح بين ١٥٠ نسمة فى الكم الرابع فى جزيرة موهيلى ١٢٥٠ نسمة فى جزيرة مايوت ، ١٧٥٠ نسمة فى جزيرة كومورو الكبرى ، ٢٨٠ فى جزيرة أنجوان ،

ولكن داخل الجزائر نفسها تتفاوت الكثافة تفاوتاً واضحاً ، فتصغر الملكيات وتتفتت ، والواقع أن أكثر الأراضي الزراعية لا يملكها زراعيها ، فالشركات الزراعية والملكيات الكبيرة ، القليلة السكان والانتاج قد ضيقت الخناق على ما يزرعه المزارعون من الأرض ، ولذلك فالهجرة الى شمال شرق مدغشقر وجزائر زنجبار وبين الجزائر وبخاصة من أنجوان وكومورو الكبرى ومايوت واضحة سواء أكانت هجرة فصلية للعمل أو دائمة ، ومدنها تحمل الطابع الغربى فى تخطيطها وطراز معمار مبانيها ، وعاصمتها أجورى تقع على جزيرة بامانزى الصغيرة "Pamanzi" .

وتتباين طرق الانتاج وأغراضه ، فيزرع البنارجيسل فى السواحل المنخفضة الغنية كما يزرع أرز المرتفعات الذى أدى الى جرف التربة فى الجهات المرتفعة ، وتربى الماشية والماعز فى الجهات المرتفعة التى تخلو من ذباب تسي تسي ، وقد قدم المضاربون من أصحاب المزارع الكبيرة الذين تنافسوا فى اقتناء واحتجاز الاراضى التى بلغت ٣٥٪ ( ٢٠٠٠٠٠٠ فدان ) من مساحة الجزائر تاركين ٢٢٠٠٠٠٠ فدان لنحو ١٧٦٠٠٠٠ مزارع أى بمتوسط ١ ١/٢ فدان لكل مزارع ، وازاء تفكك المجتمع وضيق السكان بحرمانهم من أراضي المزارع الكبيرة أخذ أصحاب هذه المزارع يوزعون عليهم قطعاً صغيرة من الأرض ينتجون عليها محاصيل الغذاء ، ففى أنجوان ينتج ٣٢٠٠٠٠ من العمال الزراعيين ٠ هذه المحاصيل فى مساحة لا تربو على ٧٢٠٠٠٠ فدان فقط ، وتتألف الصادرات من محاصيل هذه المزارع الكبيرة ، وكان أولها قصب السكر ، فالبنارجيل فالبن والكاكاو ، وتتجه الآن نحو البذور الزيتية والسيزال والفانيليا والقرنفل ، وفضلاً عن أن هذه الجزائر تنافس مدغشقر فى أسواقها ، فان اكتظاظ السكان وضيق أسباب الرزق حتى أن ٩٠٪ منهم يحرمون من الملكية تتطلب إعادة توزيع الأراضي وتصفية كثير من المزارع الكبرى التى لا تزرع زراعة كثيفة أو جيدة ولا تنتج ما يحتاج اليه سكان الجزيرة ، كما أن اصلاح وتعمير بعض الجزائر مثل موهيلى وانشاء مشروعات للتوطين ضرورية للتخفيف من حدة الازدحام فى هذه الجزائر التى لا بد أن يستهدف الانتاج فيها مصالح السكان الضرورية بدلا من أن تكون جنة للمقامرين وأصحاب رعوس الأموال من الاوربيين وغيرهم .

## رنيون :

نشأت هذه الجزيرة البركانية على مرتفع بحرى يقع على طرفه الشمالى جزيرة سيشل ، وتعد رنيون إحدى المقاطعات الفرنسية ، وتقدر مساحتها بنحو ٩٦٤ كم مربعا يقطنها ٤٠٠٠٠٠ نسمة .

نشأت الجزيرة على براكين تقع على طول انكسار يمتد من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى ، منها بركان نشيط يوجد فى الجنوب الشرقى ، على حين تنتشر البراكين الخامدة التى دمرت عوامل التعرية فوهاتا فى الشمال الغربى ، وتقطع المنحدرات القريبة من البحر أو السفوح القلى للفوهات مجارى مائية قد حفرت وديانها صاعدة الى أعالى فوهات البراكين ، وان كانت خوائقها أكثر عمقا عند سفوح الفوهات على حين تلقى بمقادير كبيرة من الحمى فى صورة دالات عند أطرافها .

وتتراوح الامطار بين ١ ١/٢ متر وثلاثة أمتار تبعا لاستقبال السواحل للرياح مثل السواحل الشمالية الشرقية ، أو وقوعها عند منصرفها كما هو الحال فى السواحل الجنوبية الغربية ويعدل الارتفاع كثيرا من درجات الحرارة ، بل قد يسقط الصقيع فى فصل الجفاف فى البقاع الداخلى المرتفعة .

وكان أول من هبط بها من الناس الفرنسيون سنة ١٨٢٨ فاستخدمتها شركة الهند الشرقية الفرنسية قاعدة لتموين السفن المارة بالاغذية والمياه ، فنقل اليها الرقيق من أفريقية ، وأصبح محصول البن أول المحاصيل التجارية فى النصف الاول من القرن الثامن عشر ، مما تتطلب جلب عدد كبير من الارقاء الذين هرب بعضهم للإقامة فى داخل الجزيرة ، وحين هبطت أسعار البن تحولوا لمزراعة البهارات حتى سنة ١٨٣٥ حين أخذ القصب ينافسها منافسة جدية ، حتى أصبح سنة ١٨٦٠ يشغل ثلثى الاراضى الزراعية ، وقد أدى هذا التوسع الى جلب العمال الذين حلوا محل الارقاء حين الغى الرق ، فوفد عدد كبير منهم من جزائر كومورو وموزمبيق والهند والصين الهندية والصومال الفرنسية ومدغشقر ، حتى بلغت نسبة عدد المهاجرين الجدد ١/٣

سكان الجزيرة سنة ١٨٦٠ ، فلما اكتظ الساحل بالتهاجرين اليه أخذ  
الاوربيون الذين عرفوا بالببيض الفقراء ينتقلون للداخل .

وهكذا اقتحم سكان الساحل المناطق الجبلية للمرة الثانية بعد ان كان  
الارقاء قد هربوا اليها من قبل ، فزرعوا الخضروات المعتدلة بين منسوبي  
٦٠٠ و ١٠٠٠ متر فضلا عن محاصيل معتدلة اخرى كالجيرانيوم  
"Geranium" كما اقبلوا على تربية الماشية ، فطهروا الاحواض  
الداخلية من الغابات لزراعة الكروم ، ثم لمسوا الاهمية السياحية للمنطقة  
الداخلية بما فيها من غابات وفوهات براكين فانتشر استخدام السيارات  
ومدت الطرق الحديثة لتصل الى الينابيع المعدنية ، ولذلك تتابعت نطاقات  
واضحة لا نلمسها في جزائر كومورو الصغيرة المبرثة تتباين في النواحي  
الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والتاريخية .

ففي السهول الساحلية تنتشر مزارع قصب السكر الذي يمثل ٨٠٪  
عن قيمة صادرات الجزيرة ، ولكنه لا يعد نطاقا متصلا ، ففي الجنوب  
الشرقي تزرع الفانيليا رغم ما يلفظه البركان النشط هنا من حمم اللابة  
كما أنه قلما يزرع في الشمال الغربي لجفافه ، أما في الجنوب الغربي  
فيخفف قصب السكر من الساحل الجاف الذي تنمو به المراعى حتى منسوب  
٣٠٠ متر حيث تبدأ مزارع القصب في الظهور ، والواقع أن قصب السكر  
يزرع حتى منسوب ٩٠٠ متر في الجهات الجافة ، ٣٥٠ متر على  
المنحدرات الرطبة التي تستقبل الرياح ليحصل على حاجته من الرطوبة ،  
وقصب السكر الذي لا يسيطر على اقتصاديات الجزيرة سيطرته على  
اقتصاديات جزيرة موريشيوس ، يعانى من جمود نظام ملكية الارض وتخلف  
النظام الاجتماعى .

وسكان الساحل خليط من الاوربيين المتباينى الأصل ومن الارقاء من  
الافريقيين الذين حرروا ، فضلا عن الاسيويين الذين ينتمون لعناصر شتى ،  
كما ظهرت عناصر خلاسية ، وتقترن كثافة السكان التي تبلغ ٧٥ نسمة  
في الكم المربع بانخفاض مستوى المعيشة . وتوجد سنت دنيس St. Denis  
العاصمة هنا .

ويلى ذلك المنحدرات الداخلية التى يقطنها الزوج والبيض والعناصر الخلاسية كما تنتشر هنا الدساكر الصغيرة، ويزرع السكان الذرة والجيرانيوم والطباق والبن وبعض الفواكه . وقد أدى التوسع فى زراعة الجيرانيوم الى تقهقر الغابات لمسافة ٥ - ١٠ كم حتى بلغت زراعته مشسوب. ١٢٠٠ متر ، وسارت فى أثر هذا التوسع ظاهرة اكتساح التربة .

والى الداخل من الاقليم السابق توجد الاحواض أو المنخفضات التى تتخللها مراكز العمران المتفرقة ، ويمارس البيض الفقراء من سكان هذه البقاع زراعة الكروم . أما صناعة النبيذ الحمضى المذاق فيحتكرها الصينيون، وبعض هذه الاحواض رطب مثل حوض سلازى "Salazie" ، على حين يوجد حوضان اخران جافان ، وتنتشر بها جميعا زراعة الخضر والفواكه ، وقد ظل سكان هذه المناطق فى عزلة حتى مدت الطريق حديثا اليها .

والواقع أن رنيون تعاني من اكتظاظ سواحلها بالسكان حيث يوجد خمسون مزرعة كبيرة تضم كل منها ١٠٠٠ فدان ، رغم تنوع الغلات هنا نسبيا ، فلا زال الاعتماد على انتاج السكر واضحا .

#### مورينيسسيوس :

يغلب على سكانها العنصر الهندى ، وتعد مزرعة كبيرة لانتاج قصب السكر ، وقد شاهدت تزايدا فريدا فى عددا السكان فى الفترة الاخيرة .

مرت الجزيرة التى تقدر مساحتها بـ ٢٠٩٦٠٠ كم مربعا بثلاثة ادوار من النشاط البركانى فى الفترة بين منتصف الزمن الثالث وعصر البلايستوسين ، وهى تتكون من مخروط بركانى واحد كبير ، ولكن التعرية قد مزقته الى اجزاء لا يزيد منسوبها على ٩٠٠ متر ، ويتألف خط تقسيم المياه أو أكثر الجهات ارتفاعا من نحو عشرين فوهة بركانية تمتد من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى ، وقد تفتت مقذوفات اللابة لتتكون منها تربة خصبة ، واذا قورنت برينون نجد أن مظاهر النشاط البركانى تدل على نضوج أو تقدم فى مراحل تطورها .

ويتفاوت الارتفاع الذى تحمله الرياح الجنوب الشرقى بين ١ - ١٥ متر



على السواحل الجنوبية والشرقية الى ٥ متر عند منطقة تقسيم المياه  
و ٨٥ سم على السواحل الغربية ، وتتعرض الجزيرة للعواصف المدمرة .

تداول ملكية الجزيرة التي لم تكن مسكونة منذ أن كشفها البرتغاليون  
بين سنة ١٥٠٥ وسنة ١٥٢٨ - واتخذوها محطة للتموين في طريقهم للهند  
- الهولنديون ١٥٩٨ فالفرنسيون ١٧١٥ ثم البريطانيون ١٨١٠ .

حين انشئت مزارع قصب السكر في اخسر القرن الثامن عشر نقل  
١٥٠٠٠٠ من زنج شرق أفريقية وغربها على السواحل ، فأسكنوا على  
السواحل الشرقية حيث توجد المزارع ، ولكن تفرق هؤلاء ونزحوا الى غربي  
الجزيرة ليعملوا كمزارعين صغار وصيادين للأسماك وذلك بعد الغاء الرق ،  
كما جلب اليها عدد كبير من الهنود والصينيين وسكان مدغشقر ، فبلغ عدد  
الهنود النازحين اليها في الفترة سنة ١٨٢٤ وسنة ١٩٢٥ حوالي ١٠ مليون  
نسمة وتبلغ نسبة ذوى الأصل الهندي نحو ثلثي السكان الحاليين وهم  
٦٥٠٠٠٠٠ نسمة يمثل الهندوس ثلاثة أرباع الهنود ، وهم يعملون أجراء في  
مزارع القصب في الشرق والجنوب ، أما مسلمو الهنود والصينيين - وهم  
يعملون في الادارة والتجارة فيقيمون في الغرب حيث يتكون معظم السكان  
من الافريقيين والبيض والمولدين ويعرفون بالكريول و الاجراء "Creole"  
ويمارسون صيد الاسماك والزراعة في مزارع صغيرة أو يعملون أجراء ،  
أما الاوربيون من البيض الانقياء منهم يمثلون بقايا طبقة أرستقراطية من  
أصل فرنسي أو بريطاني فضلا عن بعض الموظفين البريطانيين ، ويتحدث  
السكان الفرنسية أو رطانة محلية منها ، ويدين أكثرهم بالكاثوليكية ، وأن  
كانت توجد لغات هندية تبلغ خمسة أهمها اللغة الهندوستانية ، فضلا عن  
اللغة الصينية واللغة الانجليزية .

وتكتظ الجزيرة بالسكان ، ويكفى أن نذكر أن متوسط كثافة السكان  
يبلغ ٥٠٠ نسمة في الكيلو متر المربع، وقد سيطر قصب السكر على اقتصاديات  
الجزيرة قرابة قرن ونصف ، وهي تنتج نحو ٦٠٠٠٠٠ طن سنويا منه ،  
ويمثل السكر ومصنقات صناعته الاخرى نحو ٩٥٪ من قيمة صادرات  
الجزيرة ، ويشغل قصب السكر ٨٥٪ من الاراضى الزراعية ، أو ٤٠٪ من

أراضي الجزيرة كلها ، وهو يزرع على المطر في السواحل الشرقية والجنوبية حيث التربة البركانية الخصبة في مزارع كبيرة تضم ٧٠٪ من مساحة أراضي قصب السكر في الجزيرة ، ويزرع على السواحل الغربية على الري في نطاق صغيرة ، ولكن عددا كبيرا من صغار الزراع يزرعون هذا المحصول ، فيقدر أن ٨٧٪ من زراعه يملكون أقل من خمسة أفدنة ، وهناك بون شاسع صغار الملاك وكبارهم ، وقد أدخل الفرنسيون زراعة الشاي في القرن التاسع عشر ، ولكن لما تبين للسكان أن قصب السكر أكثر ربحا لم يقبلوا على زراعته الا منذ سنة ١٩٤٥ ، كوسيلة للتخفيف من أخطار الاعتماد على قصب السكر ، ولما كانت الجهات المرتفعة النائية عن مراكز السكنى هي التي تصلح لمزراعته ، فزراعته تلقى مصاعب جمة أثناء جصاد قصب السكر لتوفير حاجتها من الايدي العاملة ، ويورث لويس العاصمة تتمتع بموقع على خليج طبيعي ومرفئ صالح ، وجوها حار رطب مرهق ، ولذلك لجأ أكثر السكان من الاثرياء الى سكنى منطقة Cusepipie التي تقع على ارتفاع ٥٠٠ مترا فوق منسوب البحر ، ولوريشيوس موقع استراتيجي ممتاز اذ تمر بها الطرق الجوية بين أفريقية وسيلان وأستراليا ، ولكن ضغط السكان الذي يضاعف من خطورته اعتماده الرخاء في الجزيرة على محصول واحد يعد من المشكلات الشائكة التي تواجه الجزيرة .

وتوجد جزر صغيرة تتبع ادارة موريشيوس ، مثل رودريجز Rodriguez ، ومجموعة الدابرا Admiralty ، وجزائر البحرية Admiralty ، وسيشل ، وتسكن هذه الجزائر عناصر مختلطة من الاوربيين والافريقيين يعتنقون الكاثوليكية ، ويقدر عددهم جميعا بنحو ١٦٠٠٠٠ نسمة ، واهمها سيشل التي تتألف من تسعين جزيرة تمتد بين خطى عرض ٤ ، ١٠ جنوبا ، وتتكون من صخور الجرانيت التي تبدو فوق سطح المياه بارزة من هضبة مغمورة وتسود الرياح التجارية الجنوبية الشرقية في الشتاء الجنوبي وهي ضعيفة فيما عدا شهرى يوليو وأغسطس حين يسقط المطر الغزير نسبيا . ويتألف السكان من المختفعين الفرنسيين أثناء الثورة الفرنسية ومن القادمين من جزيرة موريشيوس حتى استولى عليها البريطانيون سنة ١٨١٤ ، ثم أقبل على الهجرة اليها الرقيق الذين حرووا من شرق أفريقية وغربها على السواء للعمل في مزارع جوز الهند ، ومنذ ذلك الحين

أصبح هذا المحصول أهم المحاصيل الزراعية وهؤلاء الزنوج أهم عناصر السكان ، ويزرع فى المناطق الداخلية فى بعض الجزائر مثل ماهى Mahé الفانيليا ونخيل الزيت ، وتقع عاصمة سيشيل فى جزيرة ماهى على الساحل الشمالى الشرقى وتعرف باسم بورت فكتوريا Port Victoria ، والى جانب ماهى توجد جزيرة براسلين Praslin ، وهما الجزيرتان اللتان تقطنهما عناصر دائمة ، أما بقية جزائر سيشيل فتوجد بها مزارع لجوز الهند ، ولكن لا يستقر فيها السكان .

ملخص إحصائي للدول الإفريقية

تسمة/كم الكثافة	عدد السكان	المساحة بالكيلومتر: المربع	الدولة
١٠٠	٢٢ ٤٢٦ ٠٠٠	٢ ٢٨٢ ٠٠٠	الجزائر
٤٠	٤٤ ٧٩١ ٠٠٠	١ ١٨٤ ٠٠٠	إثيوبيا
٥٤	١ ٦٠٢ ٠٠٠	٢٣٩ ٦٠٠	أوغندا
١٧٥	٤ ٨٥٧ ٠٠٠	٢٧ ٨٠٠	بورندي
٣٦٠	٤ ١٧٨ ٠٠٠	١١٥ ٨٠٠	بينين
٢٦	٣٣ ٢٢١ ٠٠٠	١ ٢٢٤ ٠٠٠	جنوب أفريقية
٤	١ ١٧٤ ٠٠٠	٢٦٧ ٠٠٠	جاون
١٧	٣٧٦ ٠٠٠	٢١ ٧٠٠	جيبوتي
٦٤	٦٥٧ ٠٠٠	١٠ ٣٠٠	غامبيا
٢٥	٢٢ ٣٣٤ ٠٠٠	٩٣٩ ٧٠٠	تنزانيا
٥٩	١٤ ٠٥٢ ٠٠٠	٢٣٨ ٠٠٠	غانا
٢٥	٦ ٢٢٧ ٠٠٠	٢٤٥ ٩٠٠	غينيا
٢٥	٩٠٨ ٠٠٠	٣٦ ١٠٠	غينيا بساو
٢١	١٠ ١٥٤ ٠٠٠	٤٧٥ ٤٠٠	الكمبيرون
٣٧	٢١ ٤٨٣ ٠٠٠	٥٨٢ ٦٠٠	كينيا
٥	١ ٧٨٨ ٠٠٠	٣٤٢ ٠٠٠	الكونغو برازافيل
١٣	٣٠ ٨٦٢ ٠٠٠	٢ ٣٥٤ ٠٠٠	زائير
٢٠	٢ ٢٦٣ ٠٠٠	١١١ ٤٠٠	ليبيريا
٢	٣ ٧٤٠ ٠٠٠	١ ٧٦٠ ٠٠٠	ليبيا
١٧	١٠٣ ٥٧٠	٥٩٥ ٨٠٠	ملاشاي
٦٧	٧١ ٧٨٠	١١٩ ٣٠٠	ملاوي
٥٦	٢٢ ٤٥٢ ٠٠٠	٤٤٣ ٧٠٠	المغرب
٤٨	٤٧ ٩٨٤ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠	مصر
١	١ ٩٤٧ ٠٠٠	١ ٠٨٦ ٠٠٠	موريتانيا
١٨	١٤ ٣٤٢ ٠٠٠	٧٨٣ ٠٠٠	موزمبيق
٥	٦ ٣٠٢ ٠٠٠	١ ١٨٩ ٠٠٠	نيجر
١٠٧	٩٨ ٥٧٨ ٠٠٠	٩٢٣ ٠٠٠	نيجيريا
٢٠	٧ ١٢٨ ٠٠٠	٢٧٤ ١٠٠	بوركانوفاسو
٢٣٩	٦ ٢٧٧ ٠٠٠	٢٦ ٣٠٠	رواندا
٩٢	٦ ٨٩٨ ٠٠٠	٧٤٦ ٣٠٠	زامبيا
٨	٣ ٠٩٩ ٠٠٠	٣٨٩ ٤٠٠	زيمبابوي
٢٣	٦ ٦٢١ ٠٠٠	١٩٧ ٢٠٠	السنغال
٥	٣ ٦٧٢ ٠٠٠	٧٢ ٣٠٠	سيراليون

الكثافة نسمة/كم <sup>٢</sup>	عدد السكان	المساحة بالكيلومتر المربع	الدولة
٩	٢٢ ١٨١ ٠٠٠	٢ ٥٠٦ ٠٠٠	السودان
٧	٤ ٧٥٢ ٠٠٠	٦٣٧ ٧٠٠	الصومال
٥٤	٣ ٠٥٢ ٠٠٠	٥٦ ٦٠٠	توجو
٤	٥ ١٤٢ ٠٠٠	١ ٢٤٨ ٠٠٠	تشاد
٤٦	٧ ٢٣٧ ٠٠٠	١٥٥ ٨٣٠	تونس
٤	٢ ٦٣٩ ٠٠٠	٦١٧ ٠٠٠	وسط افريقية
٥١	١ ٥٦٠ ٠٠٠	٣٠ ٣٥٠	باسوتو
١٠٦	١ ١٤٩ ٠٠٠	٧١٢ ٢٠٠	بتسوانا
٥٠٩	١ ٠٦٧ ٠٠٠	٢ ٠٩٦	موريشيوس
٦٧	٨ ٣٢٣ ٠٠٠	١ ٢٤٠ ٠٠٠	مالي
٣٨	٦٧١ ٠٠٠	١٧ ٤٠٠	سوازيلاند
٣١	١٠ ١٥٥ ٠٠٠	٣٢٢ ٠٠٠	ساحل العاج
٦	٧ ١٠٨ ٠٠٠	١ ٢٤٧ ٠٠٠	انجولا
٥١	٢٠٥ ٠٠٠	٤ ٠٣٣	الرأس الأخضر
٣٣٩	٢٨٩ ٠٠٠	٧٩٧	ماديرا
٦٦	٦٤ ٠٠٠	٩٦٤	ساوتومي وبرسيب
١٣٠	٩٤٥ ٠٠٠	٧ ٢٩٢	جزر كناريا
٧٢٠	١٥٥ ٠٠٠	١٢٣	مستعمرات شمال افريقية
٢٨٥	٧٥ ٠٠٠	١٩	سبته
٦٥٦	٨٠ ٠٠٠	١٢	ميلة
٣٣	٦٩ ٠٠٠	٢٩٤ ٠٠٠	الصحراء الغربية
٩	٢٤٩ ٠٠٠	٢٨ ٠٥٠	غينيا الأسبانية
٣١	٢٦ ٠٠٠	٢ ٠٣٤	فرناتو بومانوبون
٧	١٨٦ ٠٠٠	٢٦ ٠١٧	ريوموني
١	٥٣١ ٠٠٠	٨٢٣ ٠٠٠	جنوب غرب افريقية



الكتاب الثاني

استراليا





# الياب الأول

## استراليا

### الفصل الأول

#### مقدمة :

تعد استراليا أبعد مراكز الحضارة الغربية أو الأصقاع التى استمدت عناصر سكانها من أوروبا عن موطن الحضارة الغربية فى شمال الأطلنطى فى غربى أوربى وشرق أمريكا الشمالية ، وإذا كانت بريطانيا تدين بالكثير فى العصور الحديثة لموقعها فى وسط نصف الكرة اليابس التى تعد مركزه وواسطة العقد فيه ، فقد عانت استراليا وجزائر المحيط الهادى القريبة منها الكثير من موقعها المتطرف النائى فى مركز نصف الكرة المائى الذى تعد ولنجتى فى نيوزيلنده نقط الوسط فيه ، فلا غرو أن عرفت استراليا فترة طويلة عند العالم المتمدين بأنها بلاد مزارع الأغنام الرحيبة ومناجم الذهب الغنية وبلاد الجفاف والكائنات الحية العجيبة فطلت فترة طويلة تمثل بلادا قصية يكتنفها الغموض ويحيطها سحر المجهول بهالة أسطورية • ولكن مالبتت هذه السحب الكثيفة أن مزقت ، وهذا الغموض أن تبدد وهذه العزلة التى كانت تمثل عقبة كبرى فى حياة سكان الجزيرة القارة أن ضعف أثرها • والواقع أن نصف الكرة الذى يحيط بنيوزيلنده والذى يضم استراليا لا يشمل الا الطرف الجنوبى من أمريكا الجنوبية والمناطق الجزرية وشبه الجزرية فى أطراف آسيا فى جنوبها الشرقى والقارة القطبية الجنوبية ، هذه هى جهات اليابس التى تقع فى مدى نحو ١٠٠٠٠ كيلومتر من نقطة الوسط •

تبدو قارة استراليا وقد ربضت على بعد ٨٠٠ - ١٠٠٠ كم من أقصى جنوب شرق آسيا تتخللها جزائر الهند الشرقية التى تحصر بينها عدد كبير من المضائق المائية التى تربو على خمسة عشر ، ولكن جزيرة غينيا الجديدة التى تبدو على مقربة من استراليا - إذ لا يفصلهما سوى مضيق يبلغ

اتساعه ١٤٥ كم - لم تمثل قنطرة عبور أو نقطة وثوب للحضارة الآسيوية لما يكتنف اجتيازها من ظروف شساقة : فغاباتها الكثيفة وطبيعتها الجبلية الوعرة ومناخها المرهق الذى تتفشى فى ظله الأمراض والايوثة ، فضلا عن تأخر سكانها وعزوفهم عن ركوب البحر قد أدت جميعها الى أن تجعل من استراليا صندوقا مغلقا وعالما قائما وحده ، قد انتبذ مكانا قصيا عاكفا على نفسه ، قابعا وراء عدد كبير من هذه الجزائر التى لم تمكنها ظروفها الطبيعية أو البشرية من أن تنهض بوظيفتها كحلقة اتصال بين هذه القارة القصية وبقية العالم .

ولكن ربما حملت روح المخاطرة التى امتاز بها قراصنة الملايو هؤلاء الملاحين المهرة الى شواطئ استراليا الشمالية ، ولكن ما أن طالعهم الساحل الشمالى الغربى بجفافه المنفر وجدبه ، حتى ارتدوا على أعقابهم وقد عقدوا العزم على ألا يعودوا .

كما أن هذه القارة التى تبدو كعالم قد خاض وسط المحيطات كانت يمنأى عن طرق الملاحة التى كانت تخترق عباب المحيطين الهندى والهادى ، وبخاصة بعد القرن الخامس عشر حين أخذت تتوافد سفن البرتغاليين والهولنديين وغيرهم متنقلة بين مستعمراتهم فى آسيا ، وأوطانهم فى أوربا سالكة طريق رأس الرجاء الصالح ، فتجنبت هذه السفن المرور بسواحل غرب استراليا الجافة الجرداء ، فلم يحاولوا بعد أن لمسوا جديها أن يقيموا بها وبخاصة حين قارنوها بما تفيض به جهات جنوب شرق آسيا من خيرات وما تدره من ثروات .

أما السواحل الشرقية التى تتعرض لهبوب الرياح الجنوبية الشرقية فقد كانت تدفع السفن بعيدا عن الساحل حينما أو تضطر السفن لأن تسير فى وجهها حينما آخر .

وقد تبادر الى الأذهان أن هذه السواحل التى وصل اليها كبار رجال البحر حين حملتهم الاقدار اليها ، ليست الا أجزاء من قارة واحدة تقع فى نصف الكرة الجنوبى ، على ضوء ما تردد فى كتابات الجغرافيين الذين ذهبوا الى أنه من الضرورى أن يوجد هناك يابس فى هذه المنطقة الجنوبية يتقابل المياه فى الجانب المناظر فى نصف الكرة الشمالى ، ولذلك حين أرسلت

بعثة جيمس كوك لاتخاذ جزيرة تاهيتى محطة لرصد كوكب الزهرة سنة ١٧١٩ م ، نيط به الى جانب تلك المهمة أن تتجول فى البحار الواقعة للجنوب من هذه الجزيرة لعلها تستطيع أن تثبت وجود هذه القارة أو تنفى وجودها نفيًا قاطعًا ، ولكن هذه القارة التى أطلق عليها القارة الجنوبية أو الأرض الجنوبية Terra Australis لم تكن غير ما كشفه كوك ، وظنه جزيرة لا علاقة لها بهذه القارة التى وطن العزم على كشفها اذا ما أتحت له فرصة القيام برحلة أخرى ، وقد أعلن على الملأ ضم هذه الأراضى الجديدة للتاج البريطانى ، ولكن كوك - شأن كثير من المكتشفين - لم يقدر هذا الكشف حق قدره ، فاعتذر للبحرية البريطانية عما ظنه تقصيرا منه فى الكشف عن الأراضى الجديدة ، فلم يعن بمتابعة كشفه بل قنع باتخاذ إحدى موانى جزيرة تسامانيا محطة يتزود منها بالمياه العذبة فى رحلته الى المحيط الهادى الأوسط .

ولكن أحد الأثرياء ممن رافقوا كوك فى رحلته ويدعى جوزيف بانكس "Joseph Banks" قد استرعى انتباه المسئولين البريطانيين الى أهمية هذا الكشف ، وحث على الافادة منه والمضى فيه ، فأقنعهم بسهولة باتخاذ هذه الأراضى الجديدة نقطة ارتكاز لمهاجمة المستعمرات الهولندية والاسبانية فى جنوب شرق آسيا ، فضلا عن قربها من الجهات المزدحمة التى تتوافر فيها الأيدى العاملة فى جنوب شرق آسيا وشرقها ، وقد ترك لحصافة وتصميم الحكام من البريطانيين أعباء تحويل هذه البلاد من منفى للمجرمين الى مستعمرة مزدهرة من مستعمرات التاج البريطانى .

تعد استراليا بتعميرها الحديث الذى لم يبدأ الا سنة ١٧٨٨ حقلا ضخما للتجارب فى منطقة جديدة ، كما تعد استراليا من وجهة نظر الجغرافى الذى يعنيه مدى التوفيق الذى اصابه الانسان ، فى ادراك أسرار بيئته بيئة مثلى يلقى فيها الانسان المستعمر الطبيعة وجها لوجه فتبدو الاطوار التى مر بها الانسان حتى استقر فيها .

واستراليا قارة طابعها البساطة : فثلثاها من النواحي البنيوية يتكون من كتلة صلبة قديمة فى الغرب والوسط ، فلم يتعرض للحركات التكتونية والنشاط والتعقيد فى البيئة الا الثلث الشرقى ، حيث تمتد الجبال فى شكل سهال بين الشمال والجنوب ، ولا تفقد القارة هذه البساطة من النواحي

البشرية بـ ٩٧٨٪ من سكانها من أصل بريطاني ، كما أنها تعد مثلاً لما يجنيه المناخ الحار الجاف حيث يسود منطقة واسعة تقدر بـ ٨٧٪ من مساحتها ، وقد قضى المهاجرون على السكان الاصليين الذين انزوا وصاروا حثيثا فى طريق الانقراض ، ويؤثر المهاجرون ونسلهم من السكان أن يقيموا فى المدن ، ولذلك تسكن نسبة كبيرة منهم فيها ، وقد يبدو ذلك غريبا اذا عرفنا أنها ليست بلدا صناعيا ومع ذلك فيقطن ٦٢٪ من سكانها فى المدن .

ويحتشد الشطر الاكبر من هؤلاء السكان فى مساحة صغيرة منها ، فركن القارة الشمالى الغربى يكاد يكون خاليا من السكان ، ولذلك فان من اليسير أن نميز من النواحي الاقتصادية بين استراليا المعمورة واستراليا التى تكاد تكون خلوا من العمران ، ويحدث الانتقال بين هذين القسمين فجأة ، فلا يستغرق أكثر من ٨٠٠ كم بين الساحل والصحراء ، ورغم أن كشف استراليا قد تم فى القرنين الماضيين ، فقد كان لتباعد اطرافها من الشرق للغرب تأثير واضح من شيوع أفكار خاطئة عن شطر كبير من استراليا القليلة العمران ، واذا كان قد لوحظ فى تعمير العالم الجديد نزوح ابناء كل شعب من الشعوب الاوربية المهاجرة للاقامة فى منطقة تسودها ظروف تشبه ما يسود اوطانها الاصلية فى أوربا ، فمن الطريف اقبال العنصر البريطانى الذى عاش فى الاقاليم المعتدلة الباردة وألفها على الهجرة الى بيئة حارة جافة فى كثير من جهاتها ، ولذلك فان النتائج التى ترتبت على محاولة هؤلاء السكان تدليل عقبات البيئة الجديدة تضى على هذه الهجرة لتعمير استراليا أهمية خاصة .

### الموقع :

تقع استراليا فى غرب المحيط الهادى الذى أصبح رغم اتساعه لا يعد من الناحية الاستراتيجية أو السياسية عقبة تفصل بين أمريكا الشمالية وبين استراليا كما ظهر واضحا فى الحرب العالمية الثانية . فقد أخذت الولايات المتحدة تتعاون مع بريطانيا فى وضع خططها الاستراتيجية للدفاع عن غربى المحيط الهادى وجنوب شرق آسيا متخذة من القواعد العسكرية فى استراليا خط دفاع مهم عن كل هذه المنطقة ، ولكن يجب ألا تذهب فى الاقلال من اثر

المساحة الكبيرة التى يمثلها المحيط الهادى. والتى تقدر بثلاث-مساحة سطح الأرض ، فلا زال المحيط الهادى بحرا يبلغ من الضخامة حدا يكاد يعجز

ولكن أهمية الموقع الجغرافى والعلاقات المكانية تعد مسألة نسبية متغيرة ، فلنا أن نتصور عظم المسافة التى قطعها البحارة من بريطانيا حتى يكتشفوا استراليا ، فنيوزيلنده تقع فى الجهة المقابلة من الكرة الأرضية لأستراليا احدى الدول الكبرى التى ساهمت فى الكشوف الجغرافية ، كما أن استراليا تمتد فى الجانب الآخر من الكرة الأرضية بالنسبة لبحر سراجوسا فى بحر الشمال ، كذلك نجد أنه رغم أن استراليا التى تمثل فى الواقع امتدادا نحو الجنوب الشرقى للكتلة الاوراسية الضخمة شأنها فى ذلك شأن أفريقية التى تمتد كشبه جزيرة من أوراسيا نحو الجنوب الا أن انتشار أرخبيل من الجزائر بين القارتين ، وامتداد اقليم الغابات المدارية المطيرة و اقليم السافانا القليل العمران فى شمال استراليا وقف حجر عثرة أمام الاتصال السهل بين كتلة استراليا وبقية العالم الاوراسى ، كما أن تاريخ آسيا قد ارتبط منذ وطأ تارضها أقدام المستعمر الاوروبى بتاريخ أوروبا لاعتبارات كثيرة ( وهى فى ذلك تختلف عن الظروف التى لابتست كشف استراليا وتعميرها ) وهكذا أصبحت كل من استراليا واليابس الاسيوى بل وجزائر اندونيسيا القريبة تعيش فى عزلة عن الأخرى ، وتقتنع بالعلاقات التى تقوم بينها وبين الدول الاوربية البعيدة عن مسرح الحوادث لفترة طويلة . ولكن عدوان اليابان وسيطرتها على معظم مناطق جنوب شرق آسيا وقت الحرب حتى أصبحت على ابواب استراليا التى كادت اليابان تجعل منها ساحة حرب ، قد فتحت ذهن الاستراليين على حقيقة أغفلوها ، وهى أنهم جزء من العالم الآسيوى الذى يجب أن يرقبوا مجرى الاحداث فيه ، وإذا كان قد مضى على آسيا حين من الدهر كادت قد زالمت دولها أسباب القوة ، فتخلى الكثير من مراكز القوة ومواطن الحضارات القديمة فى هذه القارة عن مكانتها فقد استرد بعضها قواه وأخذ يسير قدما نحو التقدم والرقى ، كما تخلص كثير منها من ريقة الاستعمار الأجنبى ، وأصبح لزاما على استراليا الا تعيش بمعزل عنها أو تخاطر بتجاهلها . وقد يكون من سبق الحوادث أن نتنبأ بأن ميزان القوى العالمية قد يفضى الى استرداد بعض مراكز الحضارة القديمة لقوتها وازدهارها فى جنوب آسيا وشرقها ، وأن المحيط الهادى قد أخذ يجتذب من المحيط الاطلنطى الشمالى سيادته ونشاطه

فى ميادين التجارة والسياسة والحضارة التى استأثر بها منذ الانقلاب الصناعى والكشوف الجغرافية ، ولكن ظهور الولايات المتحدة وروسيا السوفيتية اللتين تطلان على المحيط الهادى الشمالى ، وتتنازعان السيادة العالمية والسيطرة على هذا المحيط ، لن يدع هذه المنطقة التى تسمى أحيانا الشرق الأقصى فى نظر الاوربيين أو الشمال الأدنى فى نظر الاستراليين تسير شئونها فى اطار محلى كما كانت من قبل .

١٩٤٠

فقد استيقظت بعض الدول العملاقة كالصين والهند ، وتحررت دول أخرى كأندونيسيا وبرما ودول الصين الهندية ( ولاوس وكمبوديا وفيتنام ) ، وزحف النفوذ الأمريكى حتى أصبح يضرب حصارا عن كثب من مناطق شرق آسيا وجنوبها الشرقى ، بعد أن اعتصمت بعزالتها زمتا ، كما حملت اليابان الحرب الى أطراف استراليا الشمالية وكادت تسيطر عليها وتفتح أبوابها التى أغلقتها دونها سياسة استراليا البيضاء ، تلك السياسة التى تشعر دول آسيا المكتظة القربية منها انها سياسة احتكارية عدوانية ، كل ذلك لا يسمح للاستراليين أن يغمضوا عيونهم عن مصير الاحداث وسيورها فى هذا الشطر من العالم الذى تقع بلادهم على حافته ، ولا بد أن تدور فى فلكه أن كرها أو طوعا ، لأن عالمهم الصغير ليس الا جزءا منه .

وتضطرم هذه الجهات من اسيا القربية بمشاكل معقدة متنوعة ، فأكثر هذه الجهات بلاد زراعية أو لا تزال فى الأدوار الأولى لقيام نهضة صناعية اذا استثنينا اليابان . ولكن هذه البلاد جميعها تشكو من ازدحام السكان وانخفاض مستوى المعيشة يهدد سلامة الدول القسرية وأمنها ، مثل استراليا التى قد تبدو أرضا بكرا جديدة قد أنبثت بأرجائها - على سطح الأرض وفى باطنها - أنواع من الثروات لا تعوزها سوى الايدى العاملة التى تفيض عن حاجة بلاد الشمال فى جنوب وشرق اسيا الكتى تمثل كثرتها مشكلتها الكبرى .

وهكذا تضاعف اهتمام استراليا بعد الحرب بشئون المحيط الهادى واستراليا ، كما وثقت علاقتها بالهند ودول جنوب شرق اسيا بل واليابان ، واتسع نطاق تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية التى تشترك معها فى مجلس ANZUS الذى يضمها ونيوزلندا ، كما أنها عضو فى منطقة حلف

جنوب شرق آسيا SEATO اشتركت فى حرب فيتنام ، وقد أصبحت تعتمد فى دفاعها على الدفاع الجماعى .

تطورت استراليا من مزارع استعمارية ضخمة الى بلد كبير من دول الكومنولث البريطانى فى فترة قصيرة لا تتجاوز قرنا ونصف تقريبا ، فقد ظلت استراليا حتى سنة ١٩٠٠ عبارة عن مجموعة من المستعمرات التى نالت الحكم الذاتى ، ولكن لا يربط بعضها والبعض الاخر سوى الوضع الجغرافى وظروف التجارة وتشابه عناصر السكان والولاء والتبعية للتاج البريطانى ، ثم اتحدت هذه المستعمرات الست ، ولكن رغم الدستور المكتوب الذى ينص على هذا الاتحاد فقد ظل التفكك قائما ، فلم ينصهر هذا الاتحاد ليصبح اتحادا حقيقيا الا تحت مطرقة الاحداث ، وبفضل الازمات العالمية التى صنعت منه بلدا متحدا من بلدان الكومنولث البريطانى .

فأخذ هذا الاتحاد فى مطلع هذا القرن فقط يتحمل التبعات ويواجه وحده المشكلات الاقتصادية والسياسية ، ولما لم يكن قد نضج هذا الاتحاد بعد فقد عانى من الام النمو السياسى فى الداخل والثورة الاقتصادية والنضوج السياسى فى الخارج قبل أن ينخرط فى سلك المجتمع الدولى . وقد سار هذا التطور فى ببطء مطرد ، فاتبعت المبادئ والنظم التقدمية فى ميادين الحكم والتنظيم العمالى وسياسة الدولة الاقتصادية ، كما اشتركت قواتها فى الحربين العالميتين .

ورغم أنها تنعم بثمار ازدهار اقتصادى شمل كل قطاعات الاقتصاد بعد الحرب الا أن مستقبلها تشوبه بعض المخاوف منها زيادة نفقات الدفاع ، النهوض بالصناعة واستخراج المعادن فى اطار خطة موحدة رغم ما تتمتع به الولايات من استقلال ذاتى فى هذا الصدد وزيادة نفقات نقل السلع وأجور العمال فضلا عن صعوبة تصريف الخامات وانخفاض أسعارها فى السوق العالمية .

### البيئية :

كانت البحار تمتد فى وسط استراليا فى العصر الكمبرى لتفصل الكتلة القديمة فى الغرب عن المنطقة التى تعد أحدث فى الشرق ، فكانت

مياه البحار تغمر شطرا كبيرا من استراليا الجنوبية ومنطقة كمبرلى ، أما فى العصر السيلورى فقد انتقلت مياه هذه البحار الى الشرق لتغمر وسط سواحل كوينزلند ، ولكن ما أن حل العصر الديفونى حتى امتدت البحار شرقا لتغطى السواحل الشرقية الحالية ، وتعرضت مياه هذه البحار لتذبذب واسع المدى ، فتكونت خلجان بحرية ضخمة منها فى بعض الاحيان .

أما فى العصر الفحمى فقد نشأت سلاسل جبلية على اثر تعرض منطقة شرق استراليا لحركات عنيفة ، أما العصر البرمى فقد انتشرت المستنقعات التى نمت فيها انواع السرخسيات والطحالب التى تكثرت تدريجيا فى قاع بحر أخذ يهبط تدريجيا حتى بلغ سمك اللبد النباتى الذى نشأ نتيجة لتراكم هذه النباتات التالفة فيه أكثر من ٣٠٠ متر ، وهكذا تكونت حقول الفحم الضخمة فى هذه المنطقة ، ولم يأت آخر الزمن الثانى أى العصر الكريتاسى حتى أنبتت الصلصلة بين آسيا ونيوزيلنده من جانب وبين استراليا من جانب آخر ، كما يدل على ذلك تطور الكائنات الحية فى هذه المناطق الثلاثة تطورا مستقلا مختلفا كل عن الآخر .

وقد تعرضت القارة اثناء الزمن الثالث الى التعرية العنيفة فتحولت الى سهل تحاتى ، ثم ما لبثت السواحل الشرقية والجهات الجنوبية أن هبطت واتخذت القارة شكلها الحالى تقريبا .

ثم حدثت فى عصر الميوسين حركات عنيفة تمخضت عن تكون الجبال الشرقية ، وهبطت الأرض فى منطقة مصب مرى وشمالى خليج استراليا العظيم ، وانتشرت مظاهر النشاط البركانى ، فظهرت اللابة القلوية ممتدة من خليج باس حتى أقصى شمالى كوينزلند ، أعقبها نشاط كبير على السواحل أسفر عن خروج طفوح اللابة القاعدية على طول هذه السواحل .

أما فى عصر البلاستوسين فقد بقيت أراضى كوينزلند المنخفضة وحوض نهر مرى دون أن يطرأ على منسوبهما تغير يذكر ، على حين ارتفعت الجهات الشرقية والهضبة الغربية ، فأصبح منسوب المرتفعات الشرقية يتراوح بين ٣٠٠ - ٢٠٠٠ متر ، أما الهضبة الغربية فقد أصبح منسوبها نحو ٣٨٠ متر .



وتكونت براكين فى فكتوريا وجنوب شرقى استراليا ، والتوت الارض  
 حتى حوض مرى مما أدى الى احتباس مياه النهر حتى عادت فشقت طريقها  
 حتى شكل خانق عمقه نحو ٦٠ مترا ، كما انحدرت الارض نحو الشمال فى  
 المنطقة الواقعة فى خليج استراليا العظيم ، ثم أخذت تجف استراليا الغربية  
 وتزحف الصحراء لتفصل شرق القارة عن أطرافها الغربية ( انظر خريطة  
 برقم ٧٢ ) .

والواقع أن استراليا تخلو من مظاهر النشاط التكتونى الحديث ،



فالسلاسل الالتوائية الحديدية والبراكين النشيطة والانهار الجليدية الكبيرة والأخاديد الانكسارية لا تمثل - هذا ان كانت موجودة - ظاهرات شائعة . ولكن اذا كانت الحركات الانكسارية أو الالتوائية العنيفة الحديثة لم تعد مما يميز مظاهر السطح التي تمتاز بالمشابه والاطراد ، فان هذه القارة تأثرت كثيراً بالاندفاع والارتفاع ، وقد سلفت الاشارة الى ارتفاع نصف القارة الغربى تقريبا الى منسوب ٣٨٠ مترا تقريبا فى البلايستوسين ، أما الثلث الشرقى فقد تعرض لمجموعة من الالتواءات والانكسارات رفعتة الى منسوب يتراوح بين ٧٠٠٠ و ٢٣٠٠ متر ، على حين بقيت الجهات الوسطى فى حوض نهر مري والحوض الارتوازي دون أن تتأثر بهذه الحركة الرافعة .

وليس هذا داعيا لأن نعرض لدراسة ظروف التضاريس التى تسود القارة فى هذا الصدد إذ سوف نعرض لها حين نتناول الاقاليم الطبيعية بالدراسة :

### المناخ :

تعد استراليا التى تنحصر بين خطى طول ١١٣° ٩ و ١٥٣° ٣٩ شرقا وخطى عرض ٤١° ١٠ و ٣٩° ٨ جنوبا قارة مدارية جافة ، فنحو ٤٠٪ من مساحتها يمتد بين المدارين ، بل نقدر نسبة الاراضى ذات المناخ المدارى فى بعض الولايات مثل كوينزلند واستراليا الغربية والاقليم الشمالى أو Territory Northern بنحو ٥٣٪ .

فخلجانها قليلة ولا تتوغل البحار كثيرا فى داخلها ، بل أن امتدادها بين الشرق والغرب بصفة خاصة مما يباعد بين قلبها وبين تأثير البحار ، كما أن قلة تعرج سواحلها وقلة ارتفاعها بوجه عام قد جعل من موقعها بين خطوط العرض العامل الرئيسى الذى يحدد مناخها فامتدادها لمسافة قصيرة من الشمال للجنوب بين العروض المختلفة والذى لا نظير له فى القارات الاخرى - إذ لا يتجاوز ٢٦ درجة من ١٢° و ٣٨° جنوبا ) - قد تمخض عنه عدم تباين مناخى كثيرا .

### السطح :

ولا تعدو نسبة الأراضي التي يتجاوز ارتفاع سطحها عن ٦٠٠ متر ٧٪ ، أو ٢٨٠٠٠٠ كم مربع من مساحتها التي تقدر بنحو ثلاثة ملايين من الاميال المربعة ، بل ان هذه المناطق المرتفعة المحدودة المساحة لا تتخذ شكل السلاسل الجبلية الشاهقة التي تؤثر في المناخ تأثيرا قويا واضحا ، اذ يمثل اكثرها كتلا جبلية مرتفعة ، ويقع خمسة من بين هذه المناطق التي يزيد ارتفاعها على ٦٥٠ مترا - تقدر مساحتها كلها بنحو ١٠٣٠٠٠ ميلا مربعا - في الجهات الجافة ، ولذلك فان الارتفاع لم يعدل من ظاهراتها المناخية :

وأهم هذه المرتفعات في أهم الجهات الجافة هي همزلى Hamersley  
وبيترمان Petermann وماكدونال MacDonnall مسجريف  
Musgrave . فلندرز Flinders .

أما الجهات المرتفعة التي يصيبها أكثر من ٢٨ سم من المطر ، فخمسة اخرى تأثرت احداها بالارتفاع ، وهي أثرتون Atherton في كوينزلند ، قد تغيرت فيها ظروف الحرارة كثيرا لوقوعها في المنطق المدارية ، وتقدر مساحتها بنحو ٢٨٠٠٠ ميل مربع .

### توزيع اليابس والماء :

وقد سبقنا الإشارة الى أن استراليا قارة ذات سواحل قليلة التعاريج والخلجان ، اذا استثنينا خليج كارينتاريا في الشمال ، وخليج استراليا Great Australian Bight في الجنوب ، وتقع اكثر الجهات تعرجا بالقرب من هذين الخليجين ، فشبه جزيرة كيب يورك ، وهي أكبر أشباه الجزر في استراليا تمتد الى شرقى خليج كارينتاريا ، كما تقع الى شربه جزيرة إير شرقى خليج استراليا الكبير ، فضلا عن منطقة تتابع فيها الخلجان وأشباه الجزر وتحفها الجزر تدعى أحيانا « أرض الخلجان » Gulf Country .

ورغم ذلك نجد أن هذه السواحل في مجموعها محدودة ، اذ لا يتجاوز طولها ١٢٢١٠ ميل ، أى أن نحو كل ٢٤٤ ميلا مربعا من المساحة يقابلها

ميل من السواحل ، وهو يناظر ٧٥ ميلا مربعا فى أوربا ، ولكن رغم ذلك فان طبيعة القارة الجزرية قد جعلتها أقل حرارة من الأجزاء الأخرى من القارات الواقعة فى نفس العروض . وهى : أمريكا الجنوبية وأفريقية ، فخط الحرارة المتساوى ٧١م يصل الى خط عرض ٢٣ جنوبا فى أفريقية وأمريكا الجنوبية ، ولكنه لا يمتد جنوبى خط عرض ٣٠ جنوبا فى استراليا .

وإذا كانت استراليا قارة حارة بحكم طبيعة موقعها وامتدادها أكثر جهاتها بين المدارين من الشرق الى الغرب ، وضائلة تأثير البحار والارتفاع فى تعديل المناخ ، فانها قارة جافة أيضا كما يبدو من الجدول الآتى : -

توزيع متوسط المطر السنوى فى استراليا وتسمانيا

متوسط المطر السنوى	النسبة المئوية للأراضى التى يصيبها المطر
أقل من ٢٥ سم	٢٧ر٦
من ٢٥ - ٢٨ سم	١٩ر٩
من ٢٨ - ٥٠ سم	١٠ر٩
٥٠ - ٦٣ سم	٩ر١
٦٣ - ٧٦ سم	٧ر٣
٧٦ - ١٠١ سم	٦ر٦
أكثر من ١٠١ سم	٨ر٦

فدرت مساحة الصحارى فى استراليا بنحو ٨٧٪ من مساحة القارة ، فلا غرو أن وصفت استراليا بأنها القارة التى ذهبت ضحية مباحها ، ولا غرو أن قال لورد بريس Lord Bryce " أن الحكومة الاسترالية لا تؤجر أرضا للزراع بل مطرا ، فالانسان دائما يقبل على تعمير المناطق الجديدة ، حتى يصل الى المنطقة التى يرجح احتمال سقوط المطر الغزير ولو مرة فى بضع سنوات عجاف تعوض ما يقاسيه بل وما يصيبه من خسائر فى سننى الجفاف ، أى حين يراود الامل الانسان فى أن يأتى العام الذى يصيب الأرض اثناء المطر مرة أو مرتين ، فالذى يميز مناخ الجهات شبيهة الجافة

فى استراليا - وما كثر اتساعها - ما يتعرض له المطر من تفاوت كبير بحيث يصبح الاعتماد عليه عاما بعد آخر مغامرة غير محمودة العواقب ، فقد لاقت استراليا الكثير من الخسائر فى ثروتها من الماشية والاعناب بوجه خاص فى سبع سنوات جافة تعاقبت فى مطلع هذا القرن وفى أعقاب القرن الماضى ، ومن الطريف أن قلب القارة هنا موحد خال من العمران قد ضنت عليه الطبيعة بكل ما من شأنه أن يخفف من وطأة الجفاف ، فامتد فى شكل كتلة من اليابس متصلة لا تتخللها بحيرات أو أنهار سطوح مائية أو حتى جهات مرتفعة ، قد تصبح مصدرا للرطوبة فى قلب هذا اليابس الذى يبعد كثيرا عن البحر ، وربما تنفرد استراليا بذلك دون سائر القارات الاخرى ، فهذا التشابه والتجانس فى مساحات كبيرة داخل نطاق اقليم مناخى واحد مما يميز الجهات الجافة فى استراليا ، فاقليم جنوب غرب الولايات المتحدة مثلا لا يخلو من سلاسل جبلية عالية تسبب سقوط المطر فى منطقتها ، حتى تصبح منابع للانهار بفضول ما يذوب فى قممها من الثلوج التى تغطيها ، والواقع أن استراليا قد واجهت منذ أوائل عهدها بالعمران مشكلات عديدة تتلخص فى أن المناخ الجاف يسود فى منطقة واسعة اذا قورنت بالناطق التى يكفل فيها المطر الغزير أسباب الاستقرار والازدهار الاقتصادى ، فى وقت يقل فيه عدد سكانها عن الحاجة للتعمير مع حرصها على أن تطبق سياسة استبعاد العناصر غير البيضاء ، أى أن تجعل منها قسرة الرجل الأبيض دون منازع .

### التيارات البحرية :

يخرج من الشرق على مقربة من جزائر نيوكليدونيا تيار دعى هو التيار الاستوائى الجنوبى الذى يجلب الدفء لسواحل استراليا الشرقية . وسواحل جزيرة تسمانيا ، ويخرج من هذا التيار الذى يسمى تيار شرق استراليا فى الصيف شعبة تمر بتسمانيا خلال مضيق باس متجهة غربا لتمر على سواحل جنوب استراليا وهناك تيار آخر تدفعه الرياح الغربية يقع الى الجنوب مباشرة من التيار السابق ، وتزداد سرعة تيار شرق استراليا الذى يخضع فى اتجاهه أثناء مروره على سواحل غرب استراليا لاتجاه الرياح حتى يعود ليتصل بالتيار الاستوائى الجنوبى ويخرج من هذا للتيار شعبة تدخل نطاق نفوذ الرياح الموسمية الصيفية الشمالية الغربية ،

ويسمى بالتيار الموسمي الذي يجعل البحار الشمالية أكثر بحار العالم.. حرارة ° ولا يبدو بوضوح تأثير التيارات القطبية الباردة وازاحة الرياح لمياه الساخنة على سطح المحيطة لتحل محلها المياه الباردة السفلى على سواحل استراليا الغربية والشمالية الغربية ، فلا غرو أن أصبحت الجهات الواقعة فى شمال غرب استراليا أكثر جهات العالم حرارة فى الصيف °

أما فى الشتاء فيمر تيار استراليا الشتوى *Australian Winter Drift*

على السواحل الجنوبية متجها نحو الشرق ، وهو يسير بسرعة التيار الغربى الذى يسير الى جنوبيه ، وكن تقل سرعة هذا التيار الشتوى فى خليج استراليا العظيم حتى يصل الى مضيق باس ليقابل التيار الاستوائى الجنوبي فيمر فى البحار الواقعة شمال استراليا متجها نحو الغرب متأثرا بالرياح الموسمية الجنوبية الشرقية ويخرج منه فرع يتجه نحو الجنوب الغربى لينضم الى تيار استراليا الشتوى °

وليست السواحل الغربية أقل دفئا من السواحل الشرقية شأن القارات الاخرى ، فبرث على الساحل الغربى أكثر دفئا من سيدنى على الساحل الشرقى طول العام قريبا ، ويبلغ الفرق الحرارى السنوى ٣ م على الساحل الشرقى على حين لا يتجاوز هذا الفرق ٢ م على الساحل الغربى ° ولا يتضح الجفاف على الساحل الغربى شأن السواحل الغربية فى القارات الاخرى على طول مسافات طويلة فهو لا يظهر الا عند مدار الجدى أما السواحل الجنوبية فلا تتعرض لمرور التيار القطبى الجنوبى ان تظل تجف بها مياه التيارات الدفيئة °

وقد أسلفنا الحديث عن تأثير الارتفاع فى مناخ القارة ، وذكرنا ان تشابه مظاهر السطح وعدم انتشار السلاسل الجبلية المرتفعة فى الجهات العامرة من القارة لا يفسح المجال لعامل ليبدو أثر الارتفاع واضحا ، ولكن هذا لا يعنى أن أثر السطح ليس ملموسا فى عناصر المناخ الأخرى ، فالمرتفعات الشرقية فى ولاية كوينزلند حيث تبلغ كتلة جبال *Blendenker* منسوب ١٦٠٠ متر تعد أكثر جهات استراليا مطرا ، كما أن جبال الألب الاسترالية فى ليوسوث ويلز تضم قمة كوسكيسكو التى تعد القمة الجبلية الوحيدة التى يتوج سطحها الجليد الدائم ، فضلا على أن طبيعة فتكورية

الجبلية وما أفضت اليه من انخفاض الحرارة وغزارة الامطار كانت من أهم الاسباب التى اجتذبت المهاجرين من الاوربيين ، فالرياح الجنوبية الشرقية تسقط المطر الغزير على سفوح المرتفعات الشرقية فى كوينزلند ، وربما كان انخفاض مستوى السهول الوسطى من الاسباب التى ضاعفت من درجة الجفاف التى تعانيتها هذه الجهات الداخلية التى لا يعدو ارتفاعها ١٥٠ مترا فوق منسوب سطح البحر ، فأقل جهات استراليا مطرا وأشدّها جفافا هى المنطقة الواقعة تحت منسوب سطح البحر لا يصيبها أكثر من ١٠ سم كل عام أما الهضبة الغربية التى يتراوح منسوب سطحها بين ١٨٠ ر ٦٥٠ مترا فوق سطح البحر فتأثر الارتفاع فى مناخها محدود ، الا حيث تواجه الرياح حافة الهضبة فى الجنوب الغربى فى سلاسل دارلنج وسترنلج Darling Stirling حيث يغزر المطر :

### عناصر المناخ :


تمتد خطوط الحرارة المتساوية بانتظام من الشرق الى الغرب ، ترتفع فى الصيف وبخاصة فى الركن الشمالى الغربى عند ماريل بار Marble Bar فتصل الحرارة الى ٣٢٫٢م فى متوسطها ، وكن حيث يشتد جفاف المناخ عن المالوف ، قد تصل الحرارة فى تلك الجهات التى يقل فيها السحاب وتتعامد الشمس الى ٣٧٫٨ بل الى ٤٩م فى شهر يناير أشد شهور السنة حرارة ، وتصبح الجهات الواقعة شمال مدار الجدى حارة لا تقل حرارتها عن ٢٦٫٧ م ، وتقل الحرارة تدريجيا من الشمال الى الجنوب ومن الداخل الى الساحل ، وان كانت السواحل الغربية أكثر حرارة من الشرقية ، وعى حين يظل الجزء الشمالى الغربى حارا فى فبراير ومارس - اذ لا تهبط الحرارة دون ٢٦٫٧ م فى هذه الفترة - تهبط الحرارة دون ذلك فى شهر أبريل ، حين تصبح حرارة أكثر جهات استراليا نحو ٢١م وتظل السواحل الغربية أكثر حرارة من الشرقية ، كما تظل الجهات الجنوبية الشرقية أقل جهات القارة حرارة ، اذ تنخفض درجة الحرارة من ٢ ر ١٨ فى يناير الى ١٢٫٨ م فى أبريل على سواحل فكتوريا ، فاذا حل فصل الشتاء وهبطت الحرارة الى أدناها ، نجد أن الشمال الغربى لا يزل أكثر جهات استراليا حرارة اذ تقدر حرارته فى شهر يوليو بـ ٢٤ م ،

كما تظل الجهات الجنوبية الشرقية أقل جهات القارة مدارية إذ يصل متوسط الحرارة فى فكتوريا وجنوبى نيوزووث ويلز الى أقل من ١٠° م ، ولا زالت السواحل العربية أكثر دفئاً من الشرقية فى هذا الفصل .

وتعد الجهات الغربية والداخلية من استراليا أكثر مناطق القارة حرارة ، فتتعرض هذه البقاع لهبوب موجات حارة ترتفع درجة حرارتها عن ٣٧٫٨° م بل قد تصل الحرارة الى ٤٩٫٦° م ، وأكثر هذه الجهات حرارة هى مايلبار الواقعة على الساحل الشمالى الغربى حيث تصل الحرارة الى أكثر من ٣٧٫٨ م لفترة تصل الى ١٦١ يوماً متتالية أما فى الداخل فيؤدى الجفاف وقلة السحب الى ارتفاع حرارة رمال الصحراء حتى تصل الى ٥٥ م ، وهذه الحرارة التى تظل سائدة حتى الساحل الجنوبى غير محتملة رغم الجفاف ، وبخاصة أن دخان ما يشب من الحرائق فى غابات تلك الجهات يجعل الحر خانقا ، أما على الساحل الشمالى والشمالى الشرقى فكثافة الغابات وارتفاع نسبة الرطوبة وغزارة المطر وكثرة السحب تجعل الشتاء أكثر دفئاً والصيف أقل حرارة ، فلا تعدو النهاية الكبرى للحرارة ٣٧٫٨ م وقلما تربي عن ٣٦ م فى الصيف فى كيونز مثلاً ، ويحتل البريطانيون فى مزارع كوينزلند الكبيرة ظروف المناخ الحار حيث تتراوح بين ٢١ م فى يوليو ٢٧٫٨ م فى يناير ، ويجب الا تغفل أن جفاف مناخ الصحراء فى الصيف من العوامل التى تجعل احتماله ممكناً ، فيبلغ الفرق بين حرارة الترمومتر المبلل والجاف نحو عشر درجات ، ففى ملبورن لا تتجاوز درجة حرارة الترمومتر المبلل ٣٤ فى أكثر أيام الصيف حرارة .

ولا يعد المدى الحرارى كبيراً بوجه عام لصغر مساحة القارة وطبيعتها الجزرية ، فيفيد بنحو ١٥ م فى منطقة تمتد من يورك Bourke الى ماربل بار Barble Bar ، أما فى اشباه الجزر الشمالية مثل كمبرلى وداروينيا وكيب يورك فمدى الحرارة لا يتجاوز ٧ م ، فهو لا يربو على ٥ م فى ميناء دارون بينما يصل الى ١٢ م فى أدليدو ١٥ فى أليس سبرنج Alice Spring ، الواقع أن المدى الحرارى يتأثر بالمسافة بين المكان والبحر والارتفاع عن مستوى مسطح البحر .





### أقاليم القارة الرئيسية في أستراليا

الرطوبة النسبية :

تبلغ الرطوبة النسبية أدناها في الصيف الا على السواحل الشمالية القصوى حين تنخفض الحرارة في ذلك الفصل ، ومن المحتمل أن يسقط الصقيع خلال خمسة أشهر تنخفض في أثنائها الحرارة جنوبى خط يمتد بين برث وركهامبتن ، ولما كان متوسط الحرارة في تسمانيا - أشد جهات أستراليا برودة في الشتاء - لا يهبط دون ٧ فان سقوط الصقيع لا ينطوى على خطر كبير على محاصيل الجهات المعتدلة ، وقد أدى سقوط الصقيع في هذه الجهات الى اقتصار زراعة قصب السكر على الشمال ، وتتعرض منطقة الساحل الشرقى بين روكهامبتن وسيدنى لرياح باردة تهب من المرتفعات المجاورة ليلا ، أما في الربيع فتهب عليها رياح حارة متربة من الداخل .

## الضغط والرياح :

تمتد خطوط الضغط بوجه عام فى وسط استراليا من الجنوب الغربى نحو الشمال الشرقى ، ففى الوقت الذى نجد فيه الركن الشمالى الغربى يمثل قطب الحرارة فى الصيف يهبط فيه الضغط فى يناير الى ٢٩٧ بوصة ، ولكن نظرا لحركة الشمس الظاهرية يبتعد هذا المركز نحو الشمال الغربى بعيدا عن استراليا فى فبراير ومارس ، وان كان يعود ليرابط فى هذه المنطقة فى أكتوبر حيث يمثل حينئذ منطقة مغلقة . أما « القطب البارد » الذى يربط فى جنوب شرق القارة فى يوليو فيكون مركزا لضغط مرتفع يشمل نحو ربع استراليا الجنوبي الشرقى فى الفترة بين مايو وسبتمبر .

وحيث يسود الضغط المنخفض القارة فى الصيف يتراجع الضغط المرتفع دون المدارى ليرابط جنوبى القارة ، وتضعف قوة الرياح التجارية الجنوبية الشرقية بعد شهر سبتمبر لتحل محلها تدريجيا رياح موسمية تهب من الشمال الغربى ، وهى تشبه الرياح الموسمية الصيفية فى آسيا وان كانت أقل انتظاما وقوة منها ، وتهب هذه الرياح الحارة الرطبة بين ديسمبر ومارس ، ويجتذب مركز الضغط المنخفض فى شمال غرب القارة رياح جافة من الجنوب الشرقى تزداد جفافا كلما أوغلت فى الصحراء ، وتبعد الأعاصير المعتدلة عن القارة نحو الجنوب ، فلا تسبب سقوط المطر الا فى فكتوريا - ولو أن الاخطار أقل من أمطار الشتاء - وفى تسمانيا ، أما بقية الساحل الجنوبي فهو جاف مشمس بعيد عن تأثير هذه الأعاصير . ما فى الشمال فقد ذكرنا أن الرياح الموسمية الشمالية الغربية تهب بانتظام منذ شهر ديسمبر ، وان كانت جبهة التقاء هذه الرياح بالرياح المدارية الاخرى لا توغل كثيرا نحو الجنوب ، فلا تعدو خط عرض ٢١ على الساحل الشرقى فى كوينزلند ، ولكنها لا تتجاوز خط عرض ١٥ على الساحل الغربى . وتهب الرياح الجنوبية الشرقية فى أبريل بدلا من الموسمية حتى تحل محلها تماما فى مايو ، وهى جافة فى الشمال ، وتسود هذه الرياح التى يصحب هبوبها الجو المشمس الصحوى جنوب خط ٢٢ جنوبا ، على حين يصبح لا تهب ممطرة شمال خط عرض ٢٥ جنوبا ، وتسود الرياح الشرقية أيضا على ساحل نيوزسوث ويلز وان كانت تتعرض للتغيير الكبير فى اتجاهها ، أما فكتوريا

وتسمانيا فتهب الرياح الغربية التي تسبب سقوط بعض الامطار التي تقل عن  
١٠مطار الشتاء .

أما فى الشتاء فان منطقة الضغط المرتفع تنتقل نحو الشمال لتصل الى  
خط ٢٨ م جنوبا فى يوليو حين تسود أكثر جهات القارة الواقعة الى جنوب  
مدار الجدى ، والواقع أن مركز الضغط المرتفع يربط حينئذ فى شرق القارة  
الذى يتدرج هابطا نحو الشمال ، ويصبح الجو صحوا جافا ، وتهب الرياح  
التجارية الجنوبية الشرقية باطراد ، وهى جافة شمال مدار الجدى الا على  
الساحل الشرقى حيث تسبب سقوط الامطار ، ولكن تمر فى شمال نيوسوث  
ويلز وجنوب كوينزلند مراكز من اصداد الاعاصير الى الجنوب من محور  
الضغط المرتفعة فوق القارة ، ويصحبها الرياح العنيفة والامطار الغزيرة  
والسماى المحجبة بالسحب ، ويصبح اتجاه الرياح من الشمال الغربى  
والغرب بوجه عام ، لكنها تختلف من حيث قوتها واتجاهها ، ولكن هذه  
الاضطرابات فى جنوب نيوسوث ويلز وجنوب استراليا الغربية وعلى طول  
الساحل الجنوبى للقارة مصدر للانخفاضات الجوية التى تسود حينئذ  
جهات البحر المتوسط فى جنوب غرب استراليا الغربية وجنوب استراليا  
الجنوبية وفكتوريا وتسمانيا .

ولكن نظام الضغط يسود استراليا فى الشتاء بوجه خاص  
يتعرض لاضطرابات عنيفة بصفة منتظمة من الاعاصير وأصداد الاعاصير  
التي تغزو القارة من الغرب الى الشرق ، فيزداد قطر اصداد الاعاصير من  
الشرق للغرب اتساعا كلما سارت نحو الشرق حتى تغطى نحو نصف مساحة  
القارة ، ولا تتجاوز سرعتها ١٧ ميلا فى الساعة ، يرتبط هذا النظام من نظم  
ضغط المرتفع بقلة السحب وندرة الامطار وجفاف الرياح وانتشار التيارات  
الهابطة ، ولكن قد يتخلل مرور هذه الاصداد أو مراكز الضغط المرتفع  
انخفاضات جوية يتصل فيها ظروف المناخ فى الشمال بظروفه السائدة فى  
الجنوب ، وحينئذ تصيب بعض الامطار جهات استراليا الداخلىة التى يسودها  
الجفاف عادة وتنتج هذه الانخفاضات نحو الشرق فى جنوب كوينزلند  
ليسقط فى أثرها المطر الغزير ، ولكن قد تتخلل هذه الاصداد مناطق منخفضة  
تسببها من الضغط المرتفع فتتقف حائلا دون اتصال الضغط فى شمال القارة


وجنوبها ، وتمر هذه الاضداد عند خط ٢٨ جنوبا فى الشتاء فى يوليو ،  
وحيث تهب الرياح الجنوبية الشرقية الجافة من القارة شمال مدار الجدى ،  
أما على الساحل الشرقى فتهب الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة الممطرة ،  
ويهبط الضغط تدريجيا حتى تصل الى الضغط المنخفض فى الجنوب حيث  
تتلاحق الانخفاضات كل أسبوع تهب فى أثرها رياح من الغرب والشمال  
الغربى .

### المطر :

تعد توزيع المطر من حيث مقداره ومواسم سقوطه على مدار السنة  
وقيمته الفعلية من أهم عناصر المناخ بل عناصر البيئة الطبيعية كلها من حيث  
تأثيرها حتى لقد قيل « ان الحكومة الاستوائية لا تؤجر الارض للسكان وانما  
تؤجر المطر ”The Australian Government is not leasing land  
“but rainfall to the settlers” ن مقدار المطر لا يعد وحدة مقياسا  
يستدل منه على مدى صلاحية الارض للمعمران أو ملاءمتها لنوع معين من  
أنواع استثمار الارض ، فضمن المطر عاما بعد آخر وتوزيع سقوطه فى فترة  
قصيرة أو طويلة أثناء العام بحيث يتفق موسم سقوطه وفصل الحرارة أو  
البرودة فضلا عن مقدار الفقد عن طريق النتج أو البخار كما يدل عليه رطوبة  
الهواء الذى قد يقرب أو يئأى عن نقطة التشبع كل ذلك يعد عونا كبيرا على  
تقدير ما يسمى بفاعلية المطر Rainfall Effect veness فى استراليا الغربية  
يسقط فى بلدة روبيرون Reebourne ٢٧٥ سم من المطر سنويا فى  
المتوسط ، ولكن هذا القدر يتراوح بين ٤ سم كما حدث سنة ١٨٩١ وبين  
١٠٥ سم فى سنة ١٩٠٠ ، ولذلك فمثل هذه المنطقة لاتعد ملائمة لغير حرفة  
الرعى ، أما نورثان Northan التى تقع فى استراليا الغربية فمطرها  
القليل يسقط فى فصل الشتاء حين يزرع القمح مما يجعلها منطقة صالحة  
للزراعة ( أنظر خريطة رقم ٧٤ ) .

وتعد الجهات الجبلية التى تقع فى مهب رياح رطبة طول العام أكثر  
جهات استراليا مطرا ، فمنطقة هارفى كريك Harvey Creek التى تقع  
فى شمال شرق كوينزلاند بها نحو ٦٣٥ سم إذ تهب عليها الرياح الجنوبية

الشرقية الممطرة التي تصطدم بهضبة أثيرتون ، كما أن منطقة غرب تسمانيا الجبلية تقع فى مهب الرياح الغربية وأعاصيرها حيث يسقط بها نحو أربعة أمتار من الامطار فى العام . ولكن الى جانب غزارة الامطار فى الجهات الجبلية ، فان أكثر جهات استراليا مطرا هي أكثرها تعرضا للأعاصير بأنواعها ، فالمطر الصيفى فى الشمال يعزى الى هبوب الأعاصير المدارية التى لا تتجاوز « نورثرن تيريتورى » Northern Territory فى أقصى



( شكل ٧٤ )

امتدادها نحو الجنوب ، أما مطر الجنوب فى الشتاء فيعزى لتعرض هذه الجهات للأعاصير القطبية التى تتجه من الغرب الى الشرق ، اما فى الشرق حيث يسقط المطر الغزير فى الخريف بصفة خاصة فيرجع سقوطه لممر الأعاصير من الشمال الى الجنوب فى هذا الفصل بوجه خاص . وللعلاقة الرتيقة بين سقوط المطر والأعاصير ونظام الضغط ، فالشمال يمتد فى الصيف حين يسمح الضغط المرتفع الذى يتحرك الى جنوب القارة بممر الأعاصير المدارية ، والجنوب يمتد فى الشتاء حين ينتقل الضغط المرتفع نحو الشمال ليفسح المجال لممر أعاصير الرياح الغربية ، أما الجزء الداخلى

من القارة فلا يصيبه الا نذر يسير من المطر ، وتقدر مساحة المنطقة القاحلة أو الجافة بمليون ميل مربع أو ٢٨٪ من مساحة القارة حيث يقل المطر الساقط بها عن ٢٥ سم ، فقد تهب العواصف الراجعة ويسقط المطر ولكن ليتبخر قبل أن يصل للأرض لشدة التبخر ، ويوجد نطاق يتوسط بين الصدود الجنوبية لسقوط المطر الصيفى والحدود الشمالية للمطر الشتوى ، وإذا كانت أجزاءه الوسطى والغربية جافة فالشرقية يسقط بها المطر طول العام ، كانت أجزاءه الوسطى والغربية جافة فالشرقية يسقط بها المطر طول العام ، وهكذا يوجد ثلاثة أقاليم للمطر ، الشمالى والجنوبى والوسطى ، وإلى جانبها يوجد فى الشرق اقليم غزير المطر بسبب هبوب الرياح التجارية الشرقية والجنوبية الشرقية المطيرة ، وهى تأتي من شمال فى الصيف وتصبح حينئذ مرسمية أو شبه استوائية ، ويضاف الى رطوبة الرياح والارتفاع كثرة مرور الزوابع والأعاصير فى آخر الصيف ، ويصيب سواحل نيوزوت ويلز الشرقية أمطار بسبب هبوب الرياح من أضداد الأعاصير ، وما يخرج منها من رياح تمر على بحر تسمان ، أما السواحل الغربية فلا ينالها مطر يذكر ، بل يصل خط ٢٥سم للمطر المتساوى طول العام الى الساحل بين مدار الجدى وخليج شارك Shark Bay الذى ينتهى عنده اثر الرياح الغربية وأعاصيرها .

وإذا درسنا خطوط المطر المتساوى فى استراليا لتبين لنا ان أكثر الجهات جفافا فى المنطقة الداخلية المنخفضة الواقعة حول بحيرة اير حيث لا يتجاوز المطر الساقط ١٢٥ سم فى السنة ، وشكل القارة البيضاوى وسواحلها المنتظمة التى تتخللها مرتفعات تؤدى الى امتداد خطوط المطر المتساوى حول قلب القارة أو منطقة بحيرة اير ، وتتعاقب خطوط المطر المتساوى بسرعة لغزارة المطر فى الشرق ، إذ أنه فى المسافة التى تبلغ ٩٠٠ ميل يزداد المطر بمعدل ١٥ متر ، ويقدر متوسط زيادة المطر فى كل درجة أو ٦٩ ميلا بنحو ١٠ سم ، على حين تتباعد الخطوط فى الغرب حتى تصل الى ٢٥ سم على الساحل الغربى على طول مسافة تقدر بنحو ١٦٠٠ ميل وهكذا يصبح نصيب الدرجة من المطر نحو ٥ سم فقط .

والواقع أن انتظام شكل استراليا وخلوها من المرتفعات العظيمة يجعل توزيع المطر الفصلى يتبع انتقال الشمس الظاهرى الى حد كبير ، وان

كانت تتأخر عنه فترة من الوقت ، فنطاق المطر الغزير يبلغ أقصى امتداده للشمال بعد الانقلاب الشتوى بنحو خمسة أسابيع ، أما انتقال نطاق المطر الغزير بين الفصول المختلفة ذلك النطاق الذى ييسدو كهلال ينتشر على الأطراف الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية فى شهر أبريل فضلا عن الجهات الجنوبية الشرقية والجنوبية من القارة ، فهو يمتد فوق السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية فى الصيف ، والسواحل الشمالية الشرقية والشرقية والجنوبية الغربية فى الشتاء ثم تعود فى أكتوبر كما كان فى أبريل ، وهكذا يتفاوت نصيب الولايات المختلفة من استراليا من الامطار ، فلا يصيب ٧٠٪ من استراليا الغربية والجنوبية الا ١٠ متر أو أقل طول العام ، على حين يزيد متوسط المطر عن نصف متر طول العام فى نحو نصف مساحة كل من فكتوريا وتسمانيا ، ويظهر نصيب الولايات المختلفة من الامطار من الجدول الآتى :

#### تذبذبة المطر :

يتعرض المطر هنا لتذبذبة واسعة المدى ، بحيث أصبح الاعتماد عليه أمرا محفوفا بالمخاطر فى كثير من جهات استراليا ، وبخاصة فى الجهات الداخلية والغربية التى لا تكاد تصلح البتة للعمران ، حيث تسقط أقل من ٢٥ سم من المطر فى السنة ، أما الجهات التى يتراوح مطرها بين ٢٥ و ٧٥ سم - وبخاصة تلك التى تقع غرب نيوسوث ويلز وشمال فيكتوريا - فقد يغرى المطر الغزير فى احدى السنوات بمد نطاق العمران ، فتقوم الزراعة فى السنوات المواتية ، ولكن حين يخلف المطر الظنون وتتعاقب السنوات العجاف يطغى الدمار على هذه الجهات ، ولكن الجهات الداخلية فى استراليا تعاني من قلة الامطار وشدة البخر ونظام سقوط المطر فى صورة سيول غزيرة لا يسمح الا لنسبة ضئيلة من الامطار بالوصول الى مجرى نهر درالنج مثلا أعلى مدينة بورك "Bourke" ، ففى سيدنى فى الجنوب الشرقى تصل نسبة الانحراف عن المتوسط نحو ٢٠٪ ، أما فى الجنوب الغربى فى برث فلا تتجاوز ١٠٪ ، وفى الشمال الشرقى فى بركتون Burketown ٤٠٪ وأما فى أونسلو Onslow فى استراليا الغربية فتصل هذه النسبة الى ٥٠٪ ، أما أكثر الجهات استقرارا فى أمطارها وأقلها تذبذبا بين عام واخر ، فهى الجهات التى تتعرض للاعاصير

متوسط الأمطار السنوية في ولايات استراليا المختلفة (النسبة المئوية)

الجموع	الأقاليم الشمال	تسمانيا	استراليا الغربية	استراليا الجنوبية	كوينزلاند	فيكتوريا	نيوسوث ويلز	متوسط المطر السنوي
٢٢٦	١٤٧	—	٥٨	٨٢	١٢	—	١٩٧	١ — بوصة
١٩٨	٢٣٤	—	٢٣٤	٩٤	١٤٣	٢٣٤	٢٣٥	١٠ — بوصة
١٠٨	٩٧	٠٧	٦٨	٤٥	١٩٧	١٥٢	١٧٥	١٥ — بوصة
١١١	٦٦	١١١	٣٧	٢٢	١٨٨	١٧٩	١٤٢	٢٥ — بوصة
٧٣	٩٢	١١٤	٣٧	٠٨	١١٦	١٨	٩١	٢٥ — بوصة
٦٨	٤٧	٢٠٤	٣٣	٠٣	١١١	١٦١	٩٩	٤٠ — بوصة
٨٦	١٢٦	٥٦	٢١	—	١١٤	١٠٤	٦١	٤٠ + بوصة
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	الجموع



القطبية فى الجنوب الغربى والجهات المرتفعة فى الجنوب الشرقى والسواحل الشمالية حيث تبلغ نسبة الانحراف ٢٠٪ ، أما أكثرها تعرضا للتغير فهى الجهات الداخلية والاجزاء الشمالية الغربية .

أما البخر فهو عامل مهم جدا فى أستراليا ، وبخاصة فى مشروعات الري والانتفاع بالمياه الجارية ، فيقدر أن ٧٠٪ من مساحة أستراليا يسقط فيها من المطر طوال شهور السنة ما يقل عن مقدار البخر ، ولا يربو المطر عن البخر طول العام الا فى نطاق ساحلى ضيق على السواحل الشرقية جنوب برث ، كذلك يغلب على الظن أن المطر فى تسمانيا يزيد عن مقدار البخر .

### أنواع التربة :


تتأثر التربة الناضجة فى أستراليا بالمظرف المناخية السائدة ، وتتفق مع خطوط المطر المتساوى الى حد ما فى توزيعها ، فأزاع التربة السوداء والكستنائية والبودزول وغيرها تمتد فى شكل نطاق ضيق يتخذ شكل الهلال على طول السواحل فى الشرق والشمال والجنوب لتخفف بأنواع التربة الجافة فى مناطق الاستبس والصحراء التى تمتد الى الداخل فى الوسط والغرب . وأهم أنواع التربة هى :

١ - تربة البودزول Podzol تمتد فى شكل نطاق من الشمال الغربى على طول الساحل الشمالى حتى ملبورن على الساحل الشرقى ، وقد فقدت كثيرا من المواد الجبرية بفعل غزارة الامطار التى تزيد عن ٣٠ متر فى العام ، وقد تسقط الامطار فى الصيف كما هو الحال فى الشمال ، أو طول العام كما هو الحال فى الشرق أو فى الشتاء كما فى الجنوب . وقد تنمو الحشائش أو الغابات المدارية ، أما فى الجهات المرتفعة فقلما يتاح لها فرصة لتكوين تربة ناضجة ، وتتسبب التربة فى الجهات المنخفضة التى تحف بخليج كرينتاريا بمياه المد .

٢ - التربة الرمادية : تعد هى والتربة السوداء من أنواع التربة الانتقالية بين تربة البودزول وبين أنواع التربة فى الجهات الجافة

جغرافيا العالم

الصحراوية نحو ٣٨ - ٥٠ سم ، وهى تربة خصبة لان المطر لم يبلغ حدا من الغزارة بحيث يذيب المواد الغذائية فى الطبقات السطحية ، كما أنه لم يتضائل حتى يفضى الى تصاعد الاملاح الى السطح وتراكمها ( انظر خريطة رقم ٧٥ ) .



### توزيع الضأن فى أستراليا

( شكل ٧٥ )

ملاحظة : تبين الخطوط السميكة فى الداخل حدود أقاليم كيبين المناخية.

٣ التربة السوداء : أكثر أنواع التربة خصوبة وصلاحية للانتاج الزراعى فى أستراليا ، وهى توجد فى المنطقة الوسطى من المرتفعات الشرقية أى فى الجهات الدفيئة البعيدة عن الساحل ، لأن الساحل يتلقى الأمطار الغزيرة فى الصيف كما يصيبه قدر من المطر فى صبقية فصول السنة. مما يؤدي الى فقدان التربة لكثير من العناصر المغذية للنبات ، وبخاصة من المواد العضوية والاملاح القابلة للذوبان ، أما الظروف الملائمة لتكوين هذه

التربة التى تنتشر فى منطقة غنية باللافيا التى لفظتها البراكين فى الزمن الثالث فهى : سقوط المطر فى الربيع ليساعد على نشاط بكتيريا التربة بعد فترة ركودها فى فصل الشتاء ، وتوافر المطر بالقدر الذى يعوض البخر ، بيد أنه يجب ألا يصل حداً يؤدى الى ذوبان المواد القابلة للذوبان والتهام من التربة السطحية ، كما يجب أن تكفل الحشائش - وهى النباتات الطبيعية - الذى ينمو فى ظل هذه الظروف للتربة مورداً مضموناً من المواد العضوية فضلاً عن مقدرة التربة على الاحتفاظ بالمواد الجيرية . وتتراوح كمية المطر بين ٥٠ - ٧٥ سم تسقط على مدار السنة ، وان كانت تبلغ ذروتها فى الصيف ، والواقع أن المناخ ليس وحده المسئول عن توزيعها ، لأن الظروف المناخية السائدة فى هذه المنطقة تمتد فى شمالها وجنوبها أيضاً .

٤ - التربة الكستنائية : تعد امتداداً للتربة السوداء نحو الجنوب حيث يسقط المطر فى الشتاء بوجه خاص ، وتوجد هذه التربة فى جهات فكتسوريا ونيوسوث ويلز الداخلية ، كما توجد فى نطاق يمتد من الشمال الغربى نحو الجنوب الشرقى فى جنوب غرب استراليا .

٥ - تربة مالى Mallee : وهى تربة فسيديّة انقلما توجد فى جهة أخرى من جهات العالم ، وتنشأ هذه التربة فى الجهات شبه الجافة حيث يسقط المطر القليل فى الشتاء وتسود الكثبان الرملية ، وتعرض المنطقة لغزو مياه البحر الملحة التى تحملها الرياح الى الداخل ، وهذه التربة غنية بالجير الذى قد يبدو فى شكل قشرة سطحية ، وبخاصة اذا كانت الصخور الأصلية جيرية ، وهى توجد فى المنطقة الجيرية الشرقية والجنوبية الغربية .

٦ - تربة اللاتريت : أقدم أنواع التربة فى استراليا وأكثرها انتشاراً ، وتعد مثلاً لتربة نشأت فى ظل ظروف تختلف عن الظروف السائدة الآن اذا تكونت فى كنف مناخ مدارى رطب فى منطقة كان يمثل سطحها سهلاً تحتانياً ، فهذه التربة ما هى الا المستوى الاوسط من التربة الذى يعد الآن « حفرياً » . "Horizon B." بعدد أن أزلت عوامل التعرية الطبقيّة العليا أو السطحية منها ، ويقدر سمك هذه الطبقة الوسطى بـ ٨ - ١٣ متراً ، أما المستوى الاسفل فتبدو عليه آثار التعرض لحركة الرفع ، وهذه الطبقة التى فتتها عوامل التعرية حملتها-الرياح لتساعد فى تكوين الكثبان

الرملية فى الجهات الصحراوية الداخلية ، هذه النظرية فسر انتشار طبقة سطحية من الرمال لتغطى جهات متعددة من استراليا الجافة .

هذه التربة التى تمتاز بحموضتها ، لا ترجع الى عصر الميوسين حين كانت الظروف الملائمة التى تساعد على تكوينها متوافرة ، بل تكونت فى عصور متأخرة ولا زالت تتكون فى بعض المناطق حتى الآن . وقد ازليت الطبقة الوسطى لتبدو الطبقة السفلى التى تعرضت للذوبان ، وهى تتكون من الصلصال الطرى الضارب للون الأبيض ، أو من طبقة رملية صلبة أو من الصلصال الحديدي . وتوجد تربة اللاتريت التى ترجع للزمن الثالث فى (١) سهل رملى فى جنوب غرب استراليا الغربية فى شكل مثلث يمثل الخط الذى يصل بين خليج شارل والطرف الغربى لخليج استراليا العظيم ، وتغطى التربة سهولا تحاتية من عصر الميوسين فى مناطق متفرقة يبلغ قطرها بنحو ٢٠ كيلو متر (٢) شبه جزيرة اير حيث تتدرج تربة اللاتريت الى تربة من الرمال الرمادية ونم الطفل الرملى (٣) هضبة دنداس Dandas فى استراليا الغربية . (٤) شمال شرق تسمانيا . وتوجد كذلك فى هضبة آليس Alice فى ولاية كويتلاند فى مساحة يقدر طولها بـ ٢٥٠ ميلا تمتد على طول بين خطى ٢٠٥ - ٢٤٥ جنوبا ، وقد تأكلت الطبقة السفلى من تكوينات اللاتريت لتبدو أسفلها المواد التى تسقر فوقها تكوينات اللاتريت ، وهى تكون من الحجر الرملى والصلصال والحجر الجبرى التى تنتمى لعصور ما بين الفحمى والكريتاسى .

### التلال الرملية :

تنتشر التلال الرملية فى الجهات الداخلية الجافة ، وقد ثبت بعضها لما ينمو عليها من نباتات من الانواع التى تتحمل الجفاف فى أطراف من الصحراء الرطبة ، ولا زال البعض الاخم ينتقل كما فى منطقة Great Basin فى استراليا الغربية . وقد تكونت تلك الكثبان الرملية فى بدء العصر الحديث فى ظروف من الجفاف الشديد تشبه ما يسود الان فى هذه الأصقاع . ورمال الكثبان ذات لون أحمر شديد الحمرة ، كما تسود المناطق المنخفضة الواقعة بين الكثبان التربة الطفلية حينما والصلصالية حينما آخر تبعا لطبيعة الصخور التى ترتكز عليها هذه الكثبان وتحدها شمال بحيرة اير

وشمالها الشرقى منطقة كثبان تشبه منطقة التلال الرملية • وهى تدعى شمال غرب نيويسوث ويلز ، أما الصحراء الحصوية أو السرير فتوجد فى شمال غرب استراليا الغربية حيث تنتشر كتل الكوارتز المستتقة من صخور ما قبل الكامبرلى •

### التربة شبيهة الصحراوية :

أكثر أنواع التربة انتشارا ، فهى تسود فى وسط استراليا وغربها . فيما عدا مناطق الاطراف أو الكثبان الرملية ، وهى فقيرة فى مواردها العضوية كثيرة الاملاح ، ولكن أيا كانت فهى حسنة الصرف • وتتكون من مواد نقيقة الحبيبات ، وتصبح خصبة منتجة اذا توافرت المياه ، ولكن من الصعب المحافظة على خصوبتها ازاء اطراد زيادة ملوحتها تدريجيا •

### الأقاليم النباتية :

تعد استراليا قارة شبه جافة بوجه عام ، فلا غرو أن أكثر النباتات ليست من الانشجار ولكن من الشجيرات المتفرقة والاعشاب ، وقد وصفت استراليا بانها صحراء ، أو شبه صحراء ، بحيط بها نطاق من النباتات ، وهذه البساطة التى تميز توزيع الاقاليم النباتية ، تصحبها ظاهرة غريبة ، وهى أن كل النباتات تنتمى الى فصيلة أو فصيلتين ، فعلى حين تسود فى النطاق الخارجى أنواع الايكبوتوس تصبح الفصيلة السطحية هى وحدها التى تنتشر فى النطاق الاوسط • وتعد قلة الفصائل النباتية خاصية فريدة ، تنفرد بها استراليا من بين القارات • ولكن تتعدد أنواع كل فصيلة ، فقد بلغ عدد أنواع الايكبوتوس نحو ٣٦٥ نوعا تنمو فى ظل ظروف مناخية مختلفة ، فمثلا نوع Larrak ينهـو حيث يكون المناخ دفيئا ، والمطر  $\frac{3}{4}$  متر ، أما الكارى Karri فيجود حيث يصبح المناخ باردا •

أما أنواع Salmon Gum, Mallet Gum فهى تدهو حيث يتراوح المطر

يبين ٢٠ - ٣٠ سم ، وأهم الاقاليم النباتية هى :-

١ - الغابات المدارية المطيرة • تنمو الغابات شبه الموسمية فى جهات

محدودة هنا حيث يسقط المطر الغزير فترة طويلة من العام نسبيا . وتجريد التربة ، وقد كانت هذه النباتات تغطى جانبا كبيرا من شمال استراليا ووسطها فى منتصف الزمن الجيولوجى الثالث ، كما يدل على ذلك ما عثر على من نحو ١٠٠ نوع من أشجار النخيل التى تدعى Livixistna فى قلب الجهات الصحراوية بالقرب من عيون المياه فى سلاسل جبال ماكدولند . كذلك توجد أنواع من شجر الساج "Teak" بالقرب من بروكن هل وهى من الانواع التى تنمو فى غابات الملايو ولكنها قد أصبحت ملائمة لنمو فى ظل الظروف الجافة . وتبلغ هذه الغابات التى تشمل أنواعا تنمو فى غابات الملايو فى المنطقة الساحلية الغزيرة المطر فى شمال كوينزلند ، وتسمى هذه الاشجار بادغال الكروم Vine Scrubs وقد كانت تمتد جنوبا حتى نيوزوسث ويلز ، ولكنها اجتثت لتحل محلها مزارع لتربية ماشية الألبان .

وتكثر الانواع المتسلقة من الكروم ، والطفيلية ، والخيزران ، وهى ذات سيقان نحيلة مستقيمة متقاربة لا تنمو أسفلها حشائش تذكر .

ولا يمكن أن توصف هذه الغابات بأنها استوائية أو موسمية كثيفة ، فهى أشبه بالموسمية الجافة القليلة الكثيفة . ورغم أنها تجسود وتزدهر وبخاصة فى التربة البركانية الا أنها تنمو فى التربة الرملية من الجرانيت أيضا ، وهى لا تخلو من أشجار ذات أهمية اقتصادية ، مثل الأرز الأبيض وخشب الورد و Rosewood White Cedar .

٢ - اقليم السفانا البستانية : تمتد فى شكل نطاق يقع الى الداخل من الاقليم السابق بين جنوب خليج كارينتاريا غربا حتى نهر فكتوريا . وتنمو هنا الغابات المدارية الخفيفة التى تنفض أوراقها فى الفصل الجاف ، وهى تشبه ادغال الكاتنجا Caatingo فى البرازيل ، وتكثر الاشجار السطحية ، كما تنمو لها أشجار الايكلبتوس المتوسطة الطول الى جانب أشجار الشاي الاسترالية .

٣ - اقليم السفانا : تقل كثافة الاشجار فى السفانا البستانية حتى تقتصر على بقاع متفرقة منبثة وسط محيط من حشائش السفانا فى الجهات الداخلية ، وهذه الأشجار أما أن تكون من الايكلبتوس الدائم الخضرة أو من الجازورين ، أو من الأشجار السطحية . وفى اسراليا الغربية تتحول

حشائش السفانا الى انواع السنط المعروفة باسم الملجا Mulga التي تعد  
اشبه بالنباتات الصحراوية منها بحشائش ونباتات السفانا ، وتنتشر شجيرات  
Saltbush فى الجنوب ، أما فى الشمال الحشائش ذات قيمة كعلف  
للحيوان مثل حشائش Mitchell Grass, Blue Grass.

٤ - اراضى الأدغال : يمتد نطاق متوسط ال كثافة بين الغابات السفانا  
فى المناطق الساحلية والشمالية ، وبين مناطق الصحراء الداخلية ٠ فندرة  
الامطار وسقوطها غير المنتظم يحول دون نمو السفانا او الغابات فتتمسوا  
شجيرات دائمة الخضرة ، شديدة الاحتمال للجفاف ، وقد اختلطت بها  
حشائش قليلة عقب سقوط الامطار القليلة ، ويمكن أن نميز ثلاثة أنواع من  
هذه الادغال ، يقل فيها مقدار المطر الساقط عن ٣٠ متر ، بل عن ٣٥ سم ،  
فنوعا بمويجانو Brigalow ومالى Mallee يتحملان الجفاف  
على حين نجد أن النوع الثالث ويدعى ملجا Mulga يعد أشبه بالنباتات  
الصحراوية ، ولذلك فهو يتوغل فى الصحراء ٠ فنوع بريجالو بمثل  
شجيرات شوكية من أنواع السنط ، وهى لا تختلط بالحشائش التى لا ترعاها  
الحيوانات مما يؤدى الى انتشار شجيرات السنط تدريجيا لتصل محل هذه  
الحشائش ٠ وتوجد هذه الأدغال خلف السلاسل الساحلية الى جنوب خليج  
كاربننتاريا وتعد شجرة سنط بريجالو Brigalow acacia ونوعان آخران من  
الفصيلة السنطية نواة تلتف حولها أنواع دائمة من الاشجار ليتألف من  
الجميع أدغال كثيفة ٠

أما أدغال مالى فهى تنمو فى الجهات شبه الجافة ، فى ظل مناخ  
معتدل دفى فى جنوب القارة ، وجنوبها الغربى ٠ وتتكون هذه الادغال من  
أشجار نحيلة تنتهى بأوراق خضراء داكنة ملساء لا تنمو بينها حشائش ،  
ولذلك فان بقاء هذه الادغال من دون تغيير فى مظهرها فضلا بعد آخر يميزها  
بطابع خاص ٠٠ أما الملجا فمن الصعب تحديدها ، فهى تمثل بوجه عام  
نباتات الجهات شبه الصحراوية ، تنمو عند الحافة الغربية لهضبة استراليا  
الغربية فضلا عن حافتها الشرقية يسقط نحو ١/٢ متر من المطر فى المتوسط ،  
كما توجد فى منطقة المرتفعات الوسطى التى تفصل بين صحراء فكتوريا أو  
تظهر مبعثرة ، وقد تتحول الى بساط من أعشاب مزهرة قصيرة تنمو معها  
حشائش قليلة ، ولا يخلو من حشائش ذات قيمة غذائية كبيرة كعلف  
للالغنام ، بل والماشية ، ولو أنه يقتصر نموها على فصل المطر القصير ٠

### الإقليم الصحراوي :

تمتد الصحراء في أكثر جهات الهضبة الغربية ، وجزء كبير من السهول المنخفضة في الوسط ، وهي تكون من عدة صحارى ، وأهمها صحراء جيبسون ، وصحراء فكتوريا ، والصحراء الرملية الكبرى ، Great Sandy Desert وقد تنمو فيها أشجار السنط ، أو أعشاب في بقاع قليلة متفرقة ، وتعد مناطق نمو الملجأ ، أكثر جهات الصحراء غنى ، وقد توجد بعض غياض النخيل في السفوح الشمالية لجبال مسجروف .

### إقليم الحشائش المعتدلة الدفيئة :

وتنتشر في حوض مري دارلنج في استراليا الجنوبية ، حيث تنمو المراعى بحشائش التي تتخللها أشجار قليلة ، أو شجيرات تتخذ مظهر البساتين ، وقد كانت هذه النباتات تسود على الساحل الجنوبي الشرقي قبل أن تحل محلها المزارع وتنمو هنا أشجار البوكليبتوس التي تنتشر فيها الحشائش القصيرة والأعشاب الكثيفة التي تزهر في فصل المطر في الشتاء ، ولكنها في آخر الصيف تجف وتحترق ، وتقرب الظروف المناخية السائدة هنا تدريجيا مما يسود البحر المتوسط في الجنوب .

### الغابات المعتدلة الدفيئة في الجنوب الشرقي :

تمتد في السهول الساحلية بين مدارى الجدى ورأس مور Cape Moore في جنوب شرق استراليا ، وفي المرتفعات التي تقع الى الداخل منها ، وهي منطقة يسقط بها المطر طول العام موزعا توزيعا حسنا على مدار السنة ، وتنمو الأشجار الضخمة التي يبلغ ارتفاعها ١٠٠ متر على حين تمثل أشجار السرخسيات الأشجار القصيرة نسبيا ، وتغطي هذه الأشجار المتسلطة النباتات الأخرى : أما في الوديان ، فتتنمو أشجار أكثر ارتفاعا من السابقة ، وهي من نوع السرخسيات أيضا .

أما تسمانيا التي تتمثل في هضبة مرتفعة يسقط بها المطر الغزير وبخاصة على المنحدرات الغربية ، فتتنمو بها الغابات المخروطية ، أو حشائش الأستبس كل حسب موقعها .



## الفصل الثانى


### الاقاليم الطبيعية

للمطر أهمية كبرى فى تقدير مدى صلاحية الارض للمعمران ونوع استثمار الأراضى الذى يلائم الظروف الطبيعية السائد ، كما أنه له تأثير واضح تعكس على نوع النباتات الطبيعية التى تنمو فى جهات استراليا المختلفة . ولذلك فالمطر والنبات الطبيعى يعدان من أهم الظاهرات التى يمكن أن يقوم تقسيم استراليا على ضوءها الى وحدات أو اقليم طبيعية تسودها ظروف تجعل من كل اقليم وحدة متميزة لها طابعها وسماتها المميزة . شخصياتها الفريدة . ولكن يجب ألا نغفل شأن البنية ، فأستراليا التى تنقسم الى الكتلة القديمة الغربية و المنخفض الرسوبى الأوسط والمرتفعات الالتوائية فى الشرق يمكن أن تمثل الاقسام الطبيعية الكبرى التى تنقسم بدورها الى قسمين يفصل بينهما خط يفصل بين مناطق المطر الصيفى أو استراليا المدارية فى الشمال ومناطق المطر الشتوى فى الجنوب أو استراليا المعتدلة ( انظر خريطة رقم ٧٦ ) .

وأهم الاقاليم الطبيعية التى تضمها منطقة المرتفعات الالتوائية الشرقية هى : -

١ - اقليم كانبرا : يقع الى الغرب والجنوب من نيوكاسل وسيدنى ، فنيوكاسل أهم مناطق استخراج الفحم وأهم المراكز الصناعية به أما سدنى فهى أكبر مدن استراليا ، وتعد كانبرا مركز تلك المنطقة التى تمتد لمسافة ٦٠٠ كم على طول الساحل من الشمال للجنوب كما أنها تتوغل فى الداخل لمسافة ٢٥٠ كم أو أكثر . ورغم وعورة الأرض فإن هذه المنطقة تمثل التواء ضخما وعريضا ولذلك فإن الجبال الزرقاء Blue Mountains التى يربو ارتفاعها على ١٠٠٠ متر لا ترتفع الا تدريجيا ، وتحيط بسيدنى منطقة منخفضة مستديرة تخصل بين المدينة من جانب وبين الهمزة الداخلية من جانب آخر ، وقد ظلت منخفضة لأنها لم تتأثر بحركة الالتواء فى البلايستوسين ، وتسمى هذه المنطقة المنخفضة المكونة من تكوينات العصر

الترياسى باسم "Wisnamatta Stilstand" ، أما المنطقة الواقعة الى الغرب  
فهي تمثل التواء بسيطاً أدى الى ارتفاع التكوينات من الحجر الرملى الى  
نحو ١٣٠٠ متر فوق سطح البحر ، أما فى شمال سيدنى فقد حدث التواء  
بسيط أصغر منه أفضى الى نشاط نهر هوكسبرى Hawkesberny  
الذى يحتل واديا عميقا حديثا طغت عليه مياه البحر بعد ذلك فأصبح  
خليجا يدعى Broken Bay أما الى الجنوب فقد ارتفعت الارض كذلك  
تدرجيا حتى تجاوزت ٧٠٠ متر بالقرب من نهر شوكهافن Shaclhaven  
وهكذا نجد أن سيدنى تقع على طول محور هذه الالتواءات .



## أقاليم استراليا الطبيعية

أما الداخل فى المغرب فتمتد الجبال الزرقاء Blue Mountains التى تمثل  
التواء عتيقا يمتد محوره الرئيسى على الضفة الغربية من نهر نيبين  
Nepean River الأدنى ، وتتابع السلاسل الجبلية الالتوائية الى الغرب  
حتى تصل الى منسوب ١٣٠٠ متر عند جبل بندو Mount Bindo وقد صحبت  
تكوين هذه الالتواءات انكسارية ونشاط للمجارى المائية التى قطعت وديانها  
الهضبة ، وتفصل بين الهضبة الزرقاء Blue Plateau والهضاب الواقعة الى

لجنوب منطقة منخفضة نسبيا وان كانت قد تعرضت للانكسارات تسمى Lake George Gate بوابة بحيرة جورج، وقد أدى احد الانكسارات المستعرضة الى حبس مياه بحيرتى باتورست وجورج Lake Bathesurt, Lake George أما فى الركن الجنوبى الشرقى من نيوسوث ويلز فتوجد منطقة مرتفعة تعرضت للانكسار تسعى بوجه عام منارو Monaro توجد بها قمة كوسكيو Kosciuko أعلى قمم استراليا ، وهى ليست الا كتلة انكسارية مندفعة أو «هورست» ، وتمتد عبر الحدود داخل فكتوريا ، وتعد هذه الهضبة مصيفا جميلا ، وتنتشر فى هذا المصيف فى الجوانب الشرقية حقول الثلج التى تخفى فى الخريف ، ولكن آثار العصر الجليدى من ركام أو آثار نحت وحفر لا زالت ماثلة فى هذه الجهات .

ويسقط المطر فى الصيف فى الشمال ، أما فى الشمال الغربى فيسقط المطر بانتظام على مدار السنة ، أما فى الجنوب الغربى فيسقط شتاءا ، ولذلك تختلف فصل سقوط المطر وحدوث قمته بين بقعة وأخرى ، فعلى الساحل بين نيوكاسل وخليج جرفيس Jervis Bay يسقط أكثر المطر فى الخريف ، وقد يغزر سقوط الثلج فى الجهات المرتفعة ويؤدى امتداد المرتفعات من الشمال الى الجنوب الى اختلاف نباتات الجهات الساحلية الرطبة عن الجهات الداخلية ، كما أن المرتفعات تغطيها نباتات من نوع ثالث ، الواقع أن ادغال الساحل واحراجه تتحول الى غابات خفيفة كلما تجاوزنا المنحدرات الشرقية الرطبة للسفوح الغربية . وتصل نمو النباتات على منحدرات جبل كوسكيسكو الى ارتفاع ١٨٠٠ متر .

٢ - إقليم نيو انجلند : يقع شمال الاقليم السابق ، وهو من أكثر هذه الاقاليم الطبيعية اتساعا وان لم يكن أعظمها ارتفاعا ، وبينما يمتد طولها لمسافة ٢٠٠ ميل بعرض يقدر بـ ٤٠ ميلا يرتفع منسوبه الى ٩٠٠ متر ، ويتقرب المنطقة المرتفعة من الساحل عند بلنجن Bellingen . وتمثل حافة نيو انجلند الشرقية منحدرات انكسارية ، وقد شقت الانهار خنادق ضخمة فى أعاليها مثل نهري بلنجر باكلى Bacleay, Bellinger ، ويبدو أن مرتفعات نيو انجلند قد نحتت حتى أصبحت تمثل سهلا تحاتيا يقع فى منسوب سطح البحر قبل أن يدفع مرتفعا فتتكون منه سلاسل جبلية التوائية قد تعرضت للانكسار أيضا ، ولذلك تفاوت ارتفاع أجزاء نيو انجلند المختلفة

التي أصبحت تتألف من ثلاثة سهول تحاتية بين ١٤٠٠ و ١٣٠٠ و ٦٠٥٠ مترا . كما توجد ثلاث مناطق بركانية فى نيو انجلند ، وأهمها المرتفعات التي تغطيها صخور اللافا والتي تعرف باسم جبال سلسلة ليفرپول Liverpool Range وتقل الاشجار كثافة نحو الغرب من خط مطر ٥٥ سم ، فتتباعد الى الغرب من السلاسل الجبلية حيث تصبح مرتفعات نيو انجلند منطقة ممرجة ، وسهولا منخفضة يشق نهر مري بروافده طريقه عيسرها نحو الغرب .

٣ - اقليم فكتوريا : تنقسم ولاية فكتوريا الى ثلاثة اقاليم . الأول : مرتفعات فكتوريا الشرقية Eastern Highlands ، والتي تعد متممة للمرتفعات الواقعة فى جنوب شرق نيوسوث ويلز ، والسهول الشمالية التي تعد جزءا من حوض نهر مري ، ثم السهل الساحلى فى الجنوب الشرقى ، ويسمى سهل فكتوريا الكبير .

وتتألف المرتفعات الشرقية من كتل جبلية اندفعت على شكل هضاب انكسارية ، وعلى حين يرى البعض فى هذه الهضاب مرتفعات تغطيها اللابة من الزمن الأول ، يذهب البعض الآخر الى أنها تمثل - كما نذكرنا - كتلا انكسارية نتيجة لتعرض المنطقة لهذه الانكسارات ، ويغلب على الظن أن هذه المرتفعات الشرقية ليست سوى سهلا تحاتيا تكون فى العصر الكريتاسى ثم اندفع مرتفعا فى عصر البلايستوسين بصفة خاصة فانددر نحو الغرب ، وبقيت بعض جهاته مرتفعة فى صورة قمم منعزلة لقدرتها على مقاومة التعرية . ولما اندفع هذا السهل التحاتى أخذت الروافد العليا لنهر مري فى الشمال وأنهار الجنوب تخترق هذه المرتفعات ، وبخاصة جولبورث Goulburn فى الشمال وميتشل Mitchell فى الجنوب .

أما سهل فكتوريا الكبير فتغطيه اللابة ، ويبلغ متوسط ارتفاع الجزء الغربى منه نحو ١٦٠ مترا ، وتنتشر فيه بعض قمم بركانية ، وتوجد فى أرجاء هذا السهل بحيرات قد تتأثرت فى جهات قد انخفضت حديثا ، يمثلا ، خليج بورت فيليب جزءا من سهل فكتوريا الكبير الذى يمتد شرقا باسم سهول جيلاند Gippsland Plains

أما اقليم فكتوريا الغربى : فيتكون من سهل تحاتى ، من الزمن الثالث

تعرض لانكسار واندفاع غير متناسق ، فجبال جرامبيان Grampians فى الغرب ليست سوى كتلة انكسارية تنحدر نحو الغرب وتتخلل هذه المرتفعات مناطق منخفضة قد تعرضت فيها التواءات قديمة للنحت ، وتنتشر البحيرات والمستنقعات فى منطقة متسعة فى فكتوريا الغربية لما تعرضت له من خروج لابة غير منتظمة السطح ، وتجرى الانهار التى تتخللها البحيرات الملحة الضحلة نحو الشمال الغربى ، وذلك لأن الرواسب الكثيرة التى القتها روافد نهر مرى فى أول عهده بالجريان فى هذه البقاع قد طمرت مجارى الروافد التى لم تستطع أن تسترد نشاطها ، حتى بعد أن تعرضت المنطقة لارتفاع محدود لقلّة انحدارها ، وندرة مياهها .

وقد نشأت مدينة ملبورن ثانية مدن استراليا التى تعد منطقتها أهم مراكز العمران فى استراليا على الاطلاق فى هذا الاقليم ، ويمتد فى شمال شرق ملبورن بعض السنة من صخور الزمن الأول ، كما تحف بها من الشرق على طول السهل الساحلى صخور طفحية تتكون منها جبال داننونج Dandenong أما فى الغرب فقد غطى البازلت المنطقه السهلية فى البلايوسين ، ويبدو أن خليج بورت فيليب الذى يبلغ عرضه ٣٠ كم ليس الا أخدودا ، ينحصر بين انكسارين ، يمتدان من الشمال الى الجنوب . ويعد نهر يارا Yarra الذى يصيب فى هذا الخليج من الشرق نهرا معقبا فى تطوره ، إذ شق النهر خانقا عميقا فى المرتفعات التى تقع بالقرب من الساحل .

وقد نشأت المدينة سنة ١٩٣٥ فى أول الأمر ، شمال مصب نهر يارا حيث تصل مياه المد على مقربة من مسقط مائى صغير .

ويسقط المطر هنا شتاء نتيجة أعاصير الرياح العكسية التى تتأثر كثيرا بطبيعة السطح ، فاذا كانت خطوط المطر المتساوى تمتد موازية للساحل فان الجهات الغربية والشمالية الغربية أغزر مطرا من الشرقية والجنوبية الشرقية ، ويقل المطر نحو الشمال الغربى ، فأقل الجهات مطرا هى سهل ميلدورا Mildora الذى يمتد فى شكل نطاق جاف من جيرولنج Geolong الى Ararat . تقع فى ظل الطار لاعتراض جبال جرامبين Grampins والبرانس ، وتلال داليزفورد Daylesford ، وتنمى نباتات البحر المتوسط

التي لم تتأثر كثيرا بالعصر الجليدى القصير الامد فى هذه البقاع ، وتنمو الأذغال لتقاوم عواصف الرمال والرياح الشمالية .

٤ - **تسمانيا** : تتألف تسمانيا من صخور الزمن الاول التى تتركز على الجرانيت ، وقد تحول الجزء الاوسط والشرقى الى حوض طمرته تكوينات الفحم وغيرها ، ثم غطته تكوينات اللابة بعد ذلك . وتتكون الجزيرة من هضبة تقع فى الوسط ، تندرج من الشمال الغربى نحو الجنوب الشرقى حيث تنصرف مياهها عن طريق نهر دورنت Derwent .

وليست هذه الهضبة الا كتلة انكسارية مندفعة ، تنحصر فى شكل انكسار سلمى نحو الشمال الشرقى ، وتحف بها من الغرب والشمال والجنوب حافات مرتفعة ، أما من الشرق فتصبح أقل ارتفاعا . وتفصل عن الهضبة الوسطى كتلة بن لومند Ben Lomond الجبلية فى الشمال الشرقى التى يفصلها نهر تامار الذى يتجه موازيا لكل من وادى درونت السالف الذكر ، ووادى نهر جوردون الذى يفصل مرتفعات Arthur ووجمونه Wijmote الواقعة فى الجنوب الغربى عن بقية الهضبة الوسطى، وربما كان هذا الاتجاه الذى يغلب على وديان الانهار قد جاء نتيجة لوجود أخاديد انكسارية قديمة .

وهناك مظاهر عديدة تدل على حداثة تطور هذه الجهات الجيولوجى ، مثل ظهور البحيرات فى داخل الهضبة والركام الجليدى ، وأثار الجليد فى القمم الداخلية المرتفعة ، فضلا عن تعرج السواحل ، وكثرة الخواثق العميقة فى أنهار المنطقة الغربية ، كما تعد المنطقة الساحلية الشرقية حديثة التكوين ، فقد مزقتها أودية الانهار التى تنصرف نحو الشرق لتصب فى المحيط .

والواقع أن سقوط المطر الغزير ، وتعرض هذه المنطقة للارتفاع والانكسار على نطاق واسع فى أدى الى انتشار الخواثق والبحيرات ، وتعقد مظاهر السطح ونظام تصريف المياه .

تقع تسمانيا جنوب خط ٥٤° جنوبا ، ولذلك فهى تقع فى مهب الرياح العكسية بأعاصيرها . والواقع أنها تمثل منطقة الانتقال بين اقليم البحر

المتوسط بمطره الشتوى واقليم الامطار طول العام ، وبخاصة فى منطقة هيربارت . ويتأثر توزيع الامطار بنظام السطح ، فأكثر الجهات مطرا يقع فى جبل ليل Lyell فى المرتفعات الغربية حيث يسقط نحو ٢٩٠ سم ولكن الجهات المنخفضة الداخلية فى وادى نهر ماكيرى Macquaaric الأعلى تعد اقلها مطرا ( ٤٥ سم ) وتنمو هنا غابات الزان وأشجار الكافور التى تتحمل الجفاف ، ولو أن هذه الاشجار أشد ضخامة عنها فى جهات استراليا الأخرى . وفى الشرق والجنوب تنمو غابات الكافور فى الوديان العميقة ، كما تنمو على سفوح الجبال المرعى أو الغابات الالبية . أما فى الجهات الغربية المرتفعة فتتنمو الادغال التى تختلف عما ينمو فى الوسط والجنوب .

٥ - اقليم فلندرز Flinders : تمتاز استراليا الجنوبية بتباين مظاهر السطح فيها ، فقد تعرضت جهاتها الجنوبية الشرقية للانكسار وتكوين الاخاديد والبحيرات والخلجان المتعاقبة ، فهناك ثلاثة أشباه جزر تتعاقب مع ثلاثة خلجان وهى شبه جزيرة أير Eyre وخليج سبنسر وشبه جزيرة يورك وخليج سنت فنسنت وشبه جزيرة فليورى Fleurieu وخليج مصب مرى الذى طمرت رواسب نهر مرى جزءا منه ، وكان الساحل الجنوبى حتى البلايوسين يمتد نحو الجنوب من موقعه الحالى ، ولكن حدثت حركة رافعة فى ذلك العصر نشأت على أثرها جبال لوفتى ، ولذلك فان خط تقسيم المياه فى هذه المنطقة التى كانت تمثل سهلا تحاتيا قبل ذلك العصر الذى حدثت فيه حركة رافعة كان يقع الى الشمال من موقعه الحالى . وكانت الوديان التى تنحدر نحو الشمال تتعمق كثيرا نحو الجنوب وكانت التلال مستوية مستديرة تقع على ارتفاع ٤٠٠ متر ، ولكنها تعرضت لانكسارات فى الجنوب ، هبطت بسبب حركة هابطة فى الشمال ، وهكذا تكونت هناك سلسلة من التلال تتخللها أخاديد . ويسقط المطر الغزير الذى يعدو فى مقداره المتر فى جبل لوفتى Mount Loffy وفى أقصى الجنوب الشرقى ع ند بحيرة ليك Leake ويسقط بمنطقة بورت لنكولن Port Lincoln كمية كبيرة من المطر لامتدادها بارزة نحو الجنوب ، والمطر هنا شتوى يبلغ اقصاه فى شهر يونيو ، وتنمو غابات الكافور مثل أشجار الصمغ السكرى Sugar Gum والنعناع Peppermint وغيرها مختلطة بمناطق الحشائش وأشجار الجازورينا وبعض أشجار السنط ، أما الجهات المنخفضة فى الشرق والمنطقة الساحلية فتتنمو بها ادغال ماكى ، أما فى

الشمال شبه الجاف فتنمو أشجار الماكى القزمية والمجا الشجيرات الملحية Salt-dush, mulga dwarf mallee ويمثل حدها الشمالى منطقة القحط وهو متفق تقريبا مع هذا الحد الذى وضعه فى تقريره كويهر Coyher وسمى باسم Goyhers Line منذ ذلك الوقت ، وهو يتفق مع خط ٣٠ سم للمطر المتساوى ، وتربى الاغنام شمال خط ١٧٥ سم للمطر المتساوى والماشية جنوب خط ٢٥ سم للمطر المتساوى ، والقمح الذى يوجد جنوب خط ٣٧٥ سم للمطر المتساوى يزرع جنوبى خط ٢٥ سم للمطر المتساوى .

٦ - اقليم برسبين : ويقع هذا الاقليم شمالى الحد الفاصل بين الاقليم الذى يسقط فيه المطر شتاءا وذلك الذى يصيبه المطر فى الصيف ، وترتفع الأرض تدريجيا نحو الجنوب ، وتتألف البلاد هنا من عدة هضاب تعرضت للانكسار وهى تتكون من صخور قديمة للزمن الاول يوجد بها حوض صغير تنتمى تكويناته للعصر الترياسى ، وتنمو فى المنطقة الساحلية والمنحدرات الشرقية ادغال خفيفة "Brush timbers" على حين تنمو غابات الكافور الخفيفة فى المرتفعات والمنحدرات الغربية الممطرة التى تقل كثافتها تدريجيا نحو الغرب ، وتنمو هذه الغابات بين الساحل وخط مطر نصف متر المتساوى . ويسقط المطر فى الصيف كما يغزر فى المنطقة الساحلية .

٧ - شمال شرق كوينزلند أو اقليم تاونسفيل Townsville : تنقسم البنية فى كوينزلند الى ثلاثة نطاقات طويلة : نطاق متوسط عريض من السهل ذو الطبقات الافقية ينتمى للعصر الكرياتسى وتحتوى على مياه ارتوازية ، أما فى النطاق الغربى فتوجد الصخور القديمة المتلوية والصخور الطفحية ، أما المرتفعات الشرقية فتتكون من عدة تكوينات من الجرانيت فى الشمال والتكوينات الكريونية فى الوسط وصخور العصر الترياسى فى الجنوب ، وترتفع منطقة الساحل فجأة الى المرتفعات الداخلية . وتعد هضبة أثيرتون Atherton التى تقدر مساحتها بنحو اثنى عشر ألف ميل مربع صالحة لسكنى البيض لارتفاعها ، وتنتشر هنا مزارع البيض وبخاصة مزارع تربية ماشية الالبان . ويمتد منه قبالة الساحل شمال خط عرض ٢٤° جنوبا وعلى مسافة نحو ٥٠ كم الحاجز المرجانى الكبير لمسافة ٢٠٠٠ كم ، وقد يكون قد نشأ على الرصيف القارى الاسترالى أو على سلسلة التوائية هبطت تحت سطح البحر ، وعلى حين يبلغ متوسط عمق الميساه بين هذا الحاجز



والساحل نحو ٣٠ - ١٠٠ متر يبلغ عمق قاع المحيط الى الشرق من هذا الحاجز ٤٢٠٠ متر .

وعلى حين تنمو بعض الشجيرات على كثبان الساحل الرملية وأدغال المانجروف بالقرب من مصبات الانهار تنمو فى الداخل الغابات المدارية الكثيفة ، والتي تكثر بها النباتات المتسلقة والطفيلية والسرخسيات وترتفع هذه الاشجار الباسقة النحيلة بلحائها الرقيق ، ويمتد خط دقيق ليفصل بين النباتات المدارية وغابات الكافور الخفيفة .

وتغزر الأمطار فتمتد منطقة بيضاوية لمسافة ١٣٦ كم ويبلغ عرضها ٣٠ كم بين كيررنز وكارديويل Gardwell Cairns . وتتأثر الامطار بطبيعة المنطقة الجبلية ، وتسقط أكثر الامطار غزارة بسبب الأعاصير المدارية فى الصيف وبخاصة فى شهرى يناير وفبراير .

#### اقاليم السهول الوسطى :

٨ حوض مرى : يمتاز هذا الحوض ببنيته البسيطة ، فتمتد السنة من صخور رسوبية قديمة جدا فى شماله وغربه تتألف منها جبال سلسلة باربيير Barrier Bange وسلسلة جراى Grey Range .

أما فى الشرق فتمتد المرتفعات الشرقية ، وتتكون من صخور أقدم من السابقة ، وتغضى الرواسب الفيضية وبعض رواسب بحرية من الزمن الثالث المنطقة الجنوبية الغربية ، وهى تتكون من رواسب مستوية حملتها مياه الانهار كما حملت الرياح بعضها ، وتنحدر ببطء فى السهل شرق سلسلة باربيير Barrier Ranges الى نهر دارلنج ، ويمتد هذا السهل لمسافة طويلة نحو الجنوب حيث يبدو متصلا فى جنوب غرب نيو سوث ويلز ، أما سهل كوبر Cobar Plain فيقع على ارتفاع ١٥٠ مترا فوق منسوب سطح البحر ، وقد تعرض لارتفاع تدريجى أعقبه نحت وهبوط فى منطقة الأطراف حتى تكون فيها حوض ارتوازى ( انظر خريطة رقم ٥٦ ) .


يدل نظام جريان النهر على النضوج ، بل ان الانهار غير منتظمة الجريان فيما عدا نهر مرى الذى كف عن الجريان سنة ١٩٢٤ فقط ، فدارلنج

جغرافيا العالم

ولاخلاقان Lachlan يتحولان الى مجموعة من المنخفضات التي تركب فيها المياه ، كما ان نهر مرمبيدجى Murrumbidgey قد يعجز عن الاتصال بنهر مرى فى بعض الاحيان .

وقد تعرض ذلك الجزء من مجرى مرى الذى يسير داخل حدود استراليا الجنوبية للارتفاع فى اثناء البلايستوسين ، فتبدو على مظاهر النشاط والحيوية على نقيض الاجزاء الواقعة فى وسط نيوزوث ويلز حيث تنتشر المجارى المقطعة التى تسمى بيلابونجر التى تسمى Billabongs .

ويسقط المطر طول العام هنا ، وان كان يغرر فى شهر يونيو فى الداخل اى فى الغرب ، وتنمو فى منطقة التربة السوداء هنا انواع من الحشائش تنتشر المجارى المقطعة التى تسمى بيلابونجر Mitchell grass, blue grass واما انواع الكافور التى تتحمل الجفاف فهى من نوع المالى .



أحواض استراليا الامرتوازيم

٩ - الحوض الارتوازي الكبير : يقع فى شمال السهول الوسطى ، وتبلغ مساحته ٦٤٠ ألف ميل مربع ، وتنتشر السهول القليلة الارتفاع التى تختلف تربتها ، فبعضها تغطيه تربة رملية وتعرف محليا بالصحارى ، أما اذا كانت التربة طينية فانها تصبح أكثر عمراناً لصلاحيتها لتربية الاغنام والماشية . وتمتد وديان الانهار التى تغطيها الرواسب بين بعض المرتفعات المنخفضة مثل توش وديامنتينا Thomoh Diamantina وغيرهما ، وكما ترتفع الارض فى الجهات الشرقية تمتد منطقة مرتفعة نسبياً من الشرق الى الغرب عبر هذه السهول المنخفضة فى الجهات الشمالية .

وتتميز الادغال الشوكية التى تعرف باسم بريجالو Brigalow وتختلف أنواع هذه النباتات باختلاف التربة ، ويقل المطر الذى يسقط تدريجياً نحو الداخل .

١٠ - اقليم بحيرة آير : يقع جنوب الاقليم السابق فى أكثر جهات استراليا انخفاضا وجفافا حول بحيرة آير ، فجزء كبير من حوض بحيرة آير الذى تقدر مساحته بنحو مليون ونصف كيلو متر مربع يقع تحت منسوب سطح البحر بنحو ١٥٠ متراً ، وكثيراً ما تتعرض مياه الانهار التى تصب فى البحيرة للضياح بين الحصى الذى ينتشر فى قيعان الروافد قبل أن تصل الى البحيرة ، فتوجد رواسب دالات الانهار فى الشمال الشرقى كنهر ديامنتينا Diamantina وكوبرز كريك Coopers Creek ، وتنتشر هنا سلاسل الكثبان الرملية التى قد يبلغ طولها نحو ١٥٠ كم وارتفاعها نحو ١٥ متراً، ويتخلل هذه الكثبان التى تتابعد بنحو نصف كم منخفضات الملح مثل "Mulga" Saltbus .

### اقليم الكتلة الغربية :

١١ - اقليم سوان لاند "Swanland" وهو اسم يطلق على المنطقة المعتدلة فى الجنوب الغربى من استراليا الغربية ، وقد تعرض هذا الجزء لانكسار تمخض عن ظهور جبال دارلنج التى تمتد لمسافة ٣٠٠ كم محاذية للساحل وكما هبط السهل الساحلى على اثر ذلك ، ويمتد من السهل الساحلى وديان ضحلة كثيرة التعرج تختلط فيها الكثبان الرملية ومناطق

الصلصال والرمال ذات الاصل النهري ، ويقع فى أقصى الجنوب جبال ستيرلنج 'Sterling Range' الانكسارية التى تمتد لمسافة ٨٠ كم وتكون من صخور الكوراتزيت . وهذا الاقليم غنى بنباتاته المتوطنة ، فعلى الساحل حيث يسقط المطر الذى يبلغ  $\frac{3}{4}$  متر تتعاقب فيه ثلاث نطاقات يختلف فيها نوع اليوكالبتوس تبعاً لكمية المطر ، فعلى حين ينمو نوع معين منه فى اقليم توارت Tuart الى شمال برت وجنوبها ، تسود اشجار Jarrah الى الجنوب ثم الكارى Karri على الساحل الجنوبى ، أما فى النطاق الذى يتراوح مطره بين  $\frac{3}{4}$  و  $\frac{1}{2}$  متر فتنبو بعض الاشجار السنطية الصغيرة ، ويعتبر هذا الاقليم الذى يسوده مناخ البحر المتوسط صالحاً لتربية الماشية واطعام فى المنطقة بين الساحل وخط  $\frac{3}{4}$  متر المتساوى ، ولزراعة القمح بين خطى  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{1}{4}$  متر للمطر المتساوى .

١٣ - اقليم نلابور Nullabor : وهى المنطقة التى تحف بخليج استراليا العظيم ويسقط به نحو  $\frac{1}{2}$  متر ، ولكن طبيعته الارض المكونة من الصخور الجيرية التى تنتمى للزمن الثالث قد ادى الى كثرة الكهوف والجهات المنخفضة المعروفة محلياً باسم دونجاز "Dongas" التى تتوافر فيها التربة وتقترب المياه الباطنية من السطح مما يسمح بنمو بعض الشجيرات ، ولكن قلة المياه السطحية التى تتسرب فى الصخور الجيرية تجعل مطر الشتاء لا يسمح رغم انتظام سقوطه الا بنمو بعض الشجيرات التى تجود فى التربة الملحة مثل Satbush, bluebush وتمتد سكة حديد استراليا عبر هذه المنطقة لمسافة ٤٠٠ كم دون أن تغير من اتجاهها .

١٢ - شبه جزيرة اير : يحف بها من الشمال مجموعة من البحيرات الملحة التى يمتد جنوبها سلسلة جولىر Gawler Ranges التى حالت بين هذه البحيرات والانصراف نحو الجنوب ، وموارد المطر التى تصل الى نحو نصف متر تسقط فى الجنوب أى فى الطرف الجنوبى لشبه الجزيرة حيث تقوم زراعة القمح ، وقد نقلت المياه بواسطة خط من الانابيب من مورجان Morgan على نهر مرى حتى هويالاس Whyllaa حيث تقوم صناعة استخراج الحديد فى متاجم الملك Iron monarch فى منطقة ربوة ترون Tron Knob وتقوم هنا صناعات متعددة كصناعة السفن ، كما نشأ عفران حول هذه المنطقة لتوفير موارد المياه ينقلها اليها .

١٤ - اقليم البحيرات الملحة : وهى المنطقة الواقعة بين الكتلة الداخلية وبين منطقة سوانلاند فى الجنوب الغربى وتكثر السبخات كما تنتشر هنا البحيرات التى يغلب على الظن أنها كانت تمثل نظاما نهريا متصلا قبل البلايستوسين ، ثم انفصمت عراه نتيجة لارتفاع الارض ولاشتداد الجفاف. وتنتشر هنا الموائد الصحراوية فى هذا السهل التحتاى القديم ، ويسقط المطر القليل فى الشتاء ، وتنمو النباتات التى تتحمل الجفاف من السنط والسولت بش وغيرها .

١٥ - الاقليم الشمالى الغربى الجاف : تمتد هذه المنطقه بين نهري De Grey و Murchison ويتألف من ثلاثة أقاليم تتعاقب من الساحل الى الداخل ، وهى منطقة الساحل ومنطقة المنحدرات التى تندمج فى الهضبة الداخلية والهضبة الداخلية ، ويبلغ اتساع كل اقليم ١٠٠ ميل ، ويسقط حوالى ١/٢ متر فى الشتاء فى الجنوب وبخاصة عند الساحل ، كما يسقط المطر فى الصيف فى الشمال وفى الداخل ، وكثير من الانهار ليست دائمة الجريان ، وقد تزرع بعض الخضروات على مياه الرى من الانهار عند كارنافون . Carnarvon ، كما تربي الاغنام التى ترعى قريبا من الساحل وتنمو نباتات المانجروف بالقرب من السواحل والشجيرات التى تتحمل الجفاف وملوحة التربة فى الداخل ، ويسستخرج الذهب بالقرب من ميكاثرا Meekatharra .

١٦ - سلاسل جبال ماكدونل : اندفعت هذه المنطقة مرتفعة فى الزمان الثانى فتعرضت للتعرية ، وتمثل ثلاثة سلاسل جبلية تمتد من الغرب الى الشرق ما تخلف من نشاط عوامل النحت والتعرية . وهذه السلاسل الجبلية التحتائية هى Mushrave, MacDonnells, Davenport من الشمال الى الجنوب، وقد قطعت هذه السلاسل الجبلية اودية عميقة كما كشفت عوامل التعرية عن الصخور القديمة ، وقد توجد فى هذه الوديان التى حفرتها فى الصخور اللينة الكريتاسية ، حيث بعض الينابيع والبحيرات الدائمة القليلة تنمو بعض الحشائش التى تصلح للرعى ولكن عدم ضمان سقوط الامطار يعد عقبة كبرى، ويعد الجزء الغربى قليل الاهمية سواء للرعى أو للتعدين، لا يتجاوز متوسط المطر ربع متر يتأثر بعد المنطقة عن البحار ، ويسقط الكثير المطر حيفا .

١٧ - اقليم كلونكرى Gloncurry : تتكون المنطقة الواقعة الى

غربى هذه المدينة « كلونكرى » من سهل تحاتى قديم يتكون من صخور العصر  
السييلورى ، على حين تنتشر الى الشرق صخور العصر الكريتاسى الافقية.  
لتغطى موارد مياه غزيرة فى حوض ارتواى ، وتتصل المنطقة الغربية  
بمنطقة Barkly Tableland ، وتنمو نباتات الملجا فى الشرق والحشائش  
فى السهل الغربى ، كما تنمو اشجار الكافور القصيرة فى السهل الساحلى  
المنخفض . وتعد مدينة كلونكرى التى نشأت فى النصف الثانى من القرن  
الماضى كبرى المدن حيث يستخرج الذهب من مناجم مونت ايا . Mount Iya .  
ولكن الرعى غير الجيد لم يجعل حرفة الرعى ناجحة تماما ، فالطر لا يتجاوز  
نصف متر مما يجعل كثافة الماشية منخفضة .

١٨ - داروينيا Darwinnia : أطلق هذا الاسم نسبة لأهم مدن الاقليم.

وهى مدينة داروين ، ويتدرج هذا الاقليم الذى لا يرتفع منسوبه عن ٣٠٠  
متر فوق سطح البحر الا فى جزء يسير منه الى الاقليم الصحراوى فى  
الجنوب ، ويقدر المطر الساقط فى الجزء الشمالى بنحو ٤٠ سم . ويمثل  
هذا الاقليم سهلا تحاتيا تعرض للاندفاع الى اعلى فى الزمن الثالث مما أدى  
الى ارتفاع الارصفة البحرية وتعميق الانهار التى من أهم انهار استراليا  
لمجاريها ، ولكن ظلت الاجزاء الداخلية دون أن تقطعها مجارى الانهار ،  
والنباتات هنا من الانواع التى تتحمل الجفاف ، ان يسقط المطر القليل فى  
الصيف ، ولكن التربة الرملية الشديدة السامية واقتصار سقوط المطر  
على فترة قصيرة قد أدى الى ظهور خصائص الجفاف بوضوح على  
الحياة النباتية .

١٩ - اقليم كمبرلى : يمثل جزءا من السهل التحاتى القديم الذى

يصيبه نحو نصف متر من الامطار ، وقد أدت التعرية النهرية الى ظهور  
سلاسل جبلية تحاتية تمتد من الشمال الغربى نحو الجنوب الشرقى . ويحف  
بالساحل خلجان عميقة تمثل مصبات الانهار التى تعرضت لطغيان البحر .  
وتمتد حوض مياه ارتواى خلف مدينة بروم "Broome" التى حفرت فيها  
الآبار على عمق ٣٠٠ متر ، وتعد هذه المدينة مركزا لصيد اللؤلؤ كما توجد  
تربة بركانية فى شمال هذا الاقليم كما يسقط أكثر مطره فى الصيف ، وتقوم  
اقتصاديات المنطقة على صيد اللؤلؤ والتعدين وتربية الحيوانات ، ولكن

موقع الاقليم المتطرف وحرارة مناخه وجفاف الجزء الجنوبي منه يجعله غير صالح لسكنى البيض .

٢٠ - اقليم الصحراء : يتألف أكثر جهات الصحراء من الكتلة القديمة من صخور الزمن الاول وما قبله فيما عدا الجزء الجنوبي الشرقى الذى يحتل جانبا من الحوض الارتوازى العظيم الذى تغطيه الصخور الرملية الكريتاسية ، ورغم أن اسم « الصحراء » يعنى ندرة المطر الذى يهبط دون نصف متر فى السنة فى الجهات ، الا أن السكان هنا يقتصرون هذا الاسم على المناطق الرملية حيث تنمو نباتات فقيرة ، أما فى المناطق الطينية فتتنمو بعض شجيرات العلف مثل « ميتشل جراس » . ويتراوح ارتفاعها بين ٣٠٠ - ٣٥٠ مترا ، وتخنفى الانهار هنا ، كما تنمو النباتات القليلة فى مناطق مبعثرة ، وتسمى جهاتها المختلفة بأسماء خاصة ، ففى الشمال تسمى الصحراء Great Sandy Desert وفى الوسط بـ Gibson Desert وفى الجنوب يطلق عليها Great Victoria Desert كما توجد صحراء أرونتا Arunta ذات الشكل المستطيل فى الجنوب الشرقى ، وتختلف طبيعة الارض فى هذه الصحراء الاخيرة : ففى الشمال صخرية تشبه الصحراء التى تعرف بالحمادة ، أما فى الوسط فتشبه كثبان « العرق » المعروفة ، وتسمى الصحراء فى الجنوب الشرقى حيث يغطيها الحصى « الرق » أو السرير باسم Sturts, Stony Desert .





## الباب الثانى

### الفصل الأول

#### الرعى والثروة الحيوانية

حين بدأ تعمير استراليا سنة ١٧٨٨ حمل اليها كابتن فيليب الحيوانات المستأنسة كالماشية والأغنام وغيرها التى أصبحت فيما بعد من أهم موارد القارة الاقتصادية ، والواقع انه فى قارة حارة جافة الى حد كبير لا تجد الزراعة مجالا واسعا للانتشار ، على حين توجد منطقة واسعة من القارة لا تحول قلة الامطار فيها دون ملاءمتها لتربية الحيوان ، ومع ذلك فالزراعة تتقدم نحو مناطق الاطراف الجافة ببطء ، كما يحدث فى الجهات الداخلية من كوينزلند بوجه خاص من ناحية ، كما أن حدوث القحط يؤدى الى تنذب الثروة الحيوانية بعد سنة ١٨٩١ بصفة خاصة من ناحية أخرى ، ولكن سهولة توفير موارد المياه للأغنام قد ساعد على قلة تعرضها للتغير الواسع المدى شأن الانتاج الزراعى . وتبين الارقام الآتية تطور الثروة الحيوانية وتركزها فى المناطق الغنية التى تتوافر فيها الامطار ، كما فى ولاية فكتوريا التى تفوق ثروتها من الماشية ولايات استراليا الأخرى الثلاثة وهى استراليا الغربية والجنوبية ونورثرن تريتورى ، والواقع أن نيوسوث ويلز تعد أغنى ولاية فى استراليا فى ثروتها الحيوانية يليها كوينزلند ثم فكتوريا كما يظهر من الارقام الآتية : -

عدد رؤوس الماشية والضأن والخيول بالآلاف فى استراليا

الاجتعام	الماشية	الخيول	الضأن
٢٠٠١٣٥	٣٠٦٥٧	٤٣٢	١٨٦٠
٩٧٠٨٨١	١٠٠٣٠٠	١٠٥٣٢	١٨٩٠
٨١٠٩٧٦	١٣٠٥٠٠	٢٠٤١٦	١٩٢٠
١١٣٠٤٠٧	١٤٠٠٤٩	١٠٧٦٨	١٩٣٤
٩٥٠٧٢٣	١٣٠٤٢٧	١٠١٩٤	١٩٤٧
١٢٦٠٩٢٤	١٥٠٦٠١	٨٥٠	١٦٥٤
١٧٠٠٦٢١	١٧٠٠١٦	٥٢٠	١٩٦٥
١٦٦٠٩١٢	١٩٠٢٩٨	٤٧٩	١٩٦٨

توزيع الثروة الحيوانية فى ولايات استراليا ( بالمليون رأس )

النوع	نيوسوث ويلز	فيكتوريا	كوينزلاند	استراليا الجنوبية	استراليا الغربية	نمينا	تورينون تيرورى
الماشية	٢٥	١٥	٤٢	٢٥	٦٥	٢	١
الاجتعام	٤٧	١٥	١٩	٧	١٠٠	٢	٠
الماشية والاجتعام	٩١	٣٨	٦١	٣٢	١٦٥	٤	٠

ويمكن أن نميز ثلاثة أنواع من بيئات الرعى وهى مناطق المرعى الصيفى فى الشمال حيث تنمو الحشائش الطويلة الخصبة التى تصلح لتربية الماشية رغم أن كثافة الحيوان بها منخفضة ، ومناطق الامطار الشتوية التى تنمو بها الحشائش الغضة وتصلح لتربية الاجتعام بوجه خاص ، والمواقع ان المناطق الاخيرة تعد بفضل عدم تعرضها لاحداث القحط والجفاف ولسقوط امطارها فى فصل البرودة أكثر أهمية ، أما الجهات الجافة الداخلية حيث


«يقبل فيها المطر» عن  $\frac{1}{2}$  متر فتواجه حرفة تربية الحيوان فيها «مشكلة ندرة المياه»  
• وفقر المرعى وخشونته وهى تمثل البيئة الثالثة للمرعى .

ويمكن أن تقسم المراعى الى ثلاثة أقسام تبعا لغناها : المراعى الفقيرة  
وتشغل نحو  $\frac{2}{3}$  مساحة استراليا وتشمل اراضى المرعى حيث تنمو حشائش  
Saltbush, Bluebush فى استراليا الغربية حول خليج استراليا العظيم  
وتتمتد فى استراليا الجنوبية وفكتوريا ونيوسوث ويلز ، وترعى الحيوانات  
هنا الحشائش التى تنمو عقب المطر ولكنها فى فصل الجفاف تعتمد على  
أوراق وفروع الشجيرات الدائمة .

أما ادغال الملجا فتنمو فى جنوب غرب كوينزلند وحول منطقة الذهب  
فى كالجورلى فى أقصى الشمال الغربى ، وتنمو هنا شجيرات السندي  
القصيرة والملجا والحشائش التى تنمو عقب سقوط المطر ، وتنمو حشائش  
السافانا والغابات القليلة الكثافة فى المنطقة الشمالية بين بروم  
Bnoomer وتاونزفيل Townsivile وتشمل شمال غرب استراليا الغربية  
والنورثرن تريتورى وشبه جزيرة كيب يورك فى كوينزلند ويقتصر المرعى على  
حشائش الصيف الفقيرة طول العام ، وتنخفض مقدرة المرعى على استيعاب  
عدد كبير من الحيوانات لانخفاض خصوبة التربة وقصر فصل النمو وتذبذب  
أقطار الصيف ( انظر خريطة رقم ٧٨ ) .

أما المرتفعات الشرقية وجهات الجنوب الغربى من البانى حتى جيرالدتون  
ومن خليج سبنسر فى استراليا الجنوبية حتى كوكتون فى كوينزلند  
فتعد أكثر مراعى استراليا أهمية وأغناها وهى تشمل نحو  $\frac{1}{3}$  مساحة  
استراليا ، وهى تضم المنحدرات الداخلية للمرتفعات ويمكن أن نعتمد خط  
المطر المتساوى  $\frac{1}{2}$  متر يمثل الحدود الداخلية لهذه المنطقة .

ويوجد نوعان من المراعى فى مناطق الامطار الشتوية الاولى منطقة  
حشائش دانثونيا "Danthonia" وهى حشائش قصيرة قد تختلط بها الاشجار  
وتنتشر بين الشواطىء وخط  $\frac{1}{2}$  متر للمطر المتساوى ، وان كانت توجد فى  
الجهات التى يغزر فيها المطر عن ذلك ، وتحل هذه الحشائش فى الاراضى  
التي قطعت فيها الغابات ، فهى تعد خليطا من الحشائش والاعشاب البقولية



- توزيع المراعى في استراليا
- ١ - المراعى المعتدلة
  - ٢ - القمامات
  - ٣ - حشائش متشبث
  - ٤ - غابات الأوكالبتوس
  - ٥ - سهول بونيف
  - ٦ - حشائش الجهات الرطبة
  - ٧ - مناطق المنطاككتيتانه
  - ٨ - غابات الأمازون
  - ٩ - ملحج
  - ١٠ - سنباتس الغرب والجهات الرطبة
  - ١١ - غابات فتيهه نصفية
  - ١٢ - كشتبان مشا بتة
  - ١٣ - سهول ألبستر

ولما كانت هذه الجهات غزيرة المطر فتربى فيها الماشية بتوفير نباتات العلف من البرسيم والحبوب \*

أما مناطق المطر الصيفى فى وسط كوينزلند وجنوبها الشرقى فتتمتع فى النصف الشمالى لنيوسوث ويلز حيث تنمو بها حشائش الصيف الى جانب بعض حشائش الشتاء مما يضاعف من قدرتها على توفير المراعى الكثيفة ، أما فى استراليا الغربية وفى بعض جهات نيويسوث ويلز تنمو حشائش متشبث Mitchell وهى تتكون من حشائش تنمو كثيفة فى بقع متناثرة بين جهات خالية تغطيها الحشائش عقب سقوط المطر ، ولكن على الساحل الشرقى من جنوب سيدنى الى شمال أقصى شمال كوينزلند حيث يغزر المطر وتجدود .

التربية أحيانا ، فتربى مواشى الالبان التى تزرع محاصيل الحبوب والبعلف المختلفة لتوفير الغذاء لها .

ولكن هناك مشروعات للرى تعنى بتربية الحيوان وبخاصة الماشية .

وتعد كل من ولاية نيوسوث ويلز وفكتوريا حيث يربى  $\frac{3}{4}$  الماشية الحلوب أهم مناطق انتاج الالبان وبخاصة فى مناطق الساحل حول المدن الكبرى ، ولو أن بعض الزراع الذين ينتجون الالبان يزرعون القمح ويربون الضأن حيث يمكن أن تقوم الزراعة المختلطة فى بعض الجهات الداخلية . أما تربية ماشية اللحوم فتقوم فى مزارع واسعة فى كوينزلند حيث تنقل هذه الحيوانات وعمرها لم يتجاوز الثلاث سنوات الى الجنوب فى ولايتى فكتوريا ونيوسوث ويلز لتسدينها ، وتقوم صناعة حفظ اللحوم فى مدن كوينزلند الساحلية مثل تاوونزفيل وروكهامبتن وبون وجلادستون وبرسمبين . ولكن لهذه الحرفة أهمية خاصة فى الاقليم الشمالى Northern Territory ، إذ تعد الانتاج الرئيسى ، وتساوق الماشية التى تعاني من جفاف المرعى فى اثناء شهور يونيو ويوليو وحتى يناير أى فى الشتاء الى كوينزلند ومنها الى ولايات الجنوب الشرقى ، وتبلغ كثافة الماشية نحو عشرة رؤس فى الميل المربع .

أما الأغنام فتنتج الصوف الذى يعد المحصول النقدى الرئيسى فى استراليا ، وعلى حين لا تجد الأغنام المرعى الكافى فى الجهات الشرقية المرتفعة تجود أصوافها فى كنف هذه البيئة التى يميل فيها المناخ للبرودة ، ولكن فى كوينزلند يصعب الإبقاء على وجود الانتاج من الصوف شأن الصوف فى استراليا الغربية والجنوبية حيث يصبح الصوف خشنا لحرارة الجو وجفافه وكثرة غباره . ويتأثر توزيع الأغنام بالحرارة كما هو الحال فى كوينزلند إذ يعد خط  $٢٢^{\circ}$ م للحرارة المتساوى يمثل حدود تربية الأغنام فى هذه المنطقة ، كما يتأثر بالمطر لعلاقته الوثيقة بالمرعى وكفايته وجودته فإذ لوحظ أن منطقة تربية الأغنام الرئيسية فى استراليا تنحصر بين خطى مطر نصف و  $\frac{3}{4}$  متر المتساوى وبخاصة حول خط  $٦٢\frac{1}{2}$  سم للمطر المتساوى ولا تزال أكثر الأغنام تربى فى المزارع الكبيرة التى يزيد ما يربى فى كل عن ١٠٠٠ رأس ، وتقل نفقات تربية الأغنام هنا لدفء الشتاء . وأكثر الاغنام هنا من نوع المرينو ولذلك فاستراليا تنتج نصف صوف العالم ولا يتجاوز

ما يستخدم منه فى الصناعات الصوفية المحلية ٦٪ ويصدر الباقي لبريطانيا خاصة .

### الانتاج الزراعى

لا يصلح للزراعة فى استراليا الا مساحة محدودة لا تتجاوز ٤٠ مليون فدان أو نحو ٢٪ من مساحة القارة ، لا يزرع منها سوى ٢٠٤٢٦٠٠٠ فدان تقريبا ( ١٪ ) ، وذلك لأن قلة الامطار وتذبذبها وشدة البخر فى كثير من الجهات ، وقلة خصوبة التربة ووعورة السطح وارتفاعه فى بعض الجهات الأخرى مما يؤدى الى ضيق مجال التوسع فى الزراعة فتدل دراسة تطور المساحة المزروعة على حدوث فترة توسع سريعة منذ بدء تعمير استراليا استمرت حتى سنة ١٩٣٠ - ١٩٣١ أعقبها فترة أخذت الزراعة تنتشر أثنائها ببطء فى الجهات القديمة العهد بالعمران ، والواقع أن كوينزلاند واستراليا الغربية هما الولايتان التى تجتازان فترة توسع سريعة فى الزراعة، إذ تضاعفت مساحة الأرض المزروعة فيهما منذ سنة ١٩٢٠ فقط . وتتميز الزراعة فى استراليا بأن ظروفها قاسية ، فالجفاف وعدم اطمئنان الزراع الى سقوط قدر مضمون من الامطار عاما بعد آخر قد جعل شطرا كبيرا من غرب استراليا ووسطها مناطق غير صالحة للزراعة ، كما أن حدائث عهد استراليا بالزراعة قد أدى الى عدم ظهور أقاليم الزراعة فى شكل نطاقات متصلة الا نطاق القمح ، ورغم أن الظروف الطبيعية وبخاصة عدم خصوبة التربة فى بعض البقاع قد يحول دون تكوين نطاقات متصلة من الاراضى الزراعية فان مضى الزمن كفىل بانتشار زراعة المحاصيل فى صورة أقاليم مكتملة فى كثير من الأحيان . ويشغل القمح نصف مساحة الأراضى الزراعية أو نحو ٣٣٠٠٠٠٠٠ فدان تقدر قيمة محصولها بنحو ١/٢ - ٣/٤ قيمة المحاصيل الأخرى مجتمعة ، ويلى ذلك محصول الشوفان والشعير ونباتات العلف والفواكه والكروم والبطاطس وقصب السكر والذرة ، ولا تقل قيمة الخضروات ( ١٧٪ ) والفواكه ( ١٥٪ ) أهمية عن القمح ، أما قصب السكر فان قيمته لا تتجاوز ٥٪ من قيمة المحاصيل الزراعية جمعاء رغم ما تبذله الحكومة من معونة ومساعدات مالية ، أما قيمة الثروة الحيوانية فانها تزيد عن ضعف قيمة المحاصيل الزراعية كلها .

فالقمح الى جانب الحبوب الشتوية الأخرى كالشوفان والشعير تشغل

٦٦٣٪ من مساحة الأراضي الزراعية حيث تزرع معا فى نظام اقتصادى  
بواحد ٠ وينحصر نطاق القمح الشتوى فى استراليا بين خطى مطر ٢٥ سم  
و ٦٢٥ سم ، ويتكون هذا النطاق من ثلاث مناطق منفصلة ، فى استراليا  
الغربية يمتد النطاق فى شكل هلال بعد نحو ٣٠٠ كم للداخل من جيرالدتون  
Geraldton وهوبتون Hopetown وتقدر مساحة القمح هنا  
بنحو ٢٣٪ من مساحته باستراليا كلها ، أما فى استراليا الجنوبية فيزرع  
القمح على جانبى خليج سبنسر ، كما تتركز زراعة الحبوب الشتوية فى شبه  
جزيرة يورك وشبه جزيرة اير وشمال وشرق ألدريد حتى وادى مرى الأدنى ،  
وتشغل نحو ٢٠٪ من مساحة القمح فى استراليا ، أما بقية المساحة فتوجد  
فى فكتوريا فى مناطق مالى - وميرا Wimmera, Mallee وبين بنديجو  
والبرى Albury, Bendigo ، أما فى نيوسوث ويلز فيزرع فى ريفرينا  
Riverina والمنحدرات الغربية فى المرتفعات الشرقية ٠

ويعد القمح أو المحاصيل التى زرعها المستعمرون فى استراليا لتوفير  
الغذاء الضرورى لهم ، ثم ساعدت زيادة الأيدي العاملة وتوفر الأسواق  
بعد سنة ١٨٥٠ حين زاد عدد السكان الى ظهوره كمحصول تجارى يزرع  
على نطاق واسع للمتصدير ، وقد ساعد على ذلك سهولة استخدام الآلات فى  
أرض واسعة مستوية أو قليلة النموذج ، وتوفر وسائل النقل ، واستنباط  
أنواع من القمح تحتمل الجفاف ولذلك أمكن التوسع فى زراعتها ٠ والواقع  
أن أطول فصل النمو وتوافر ظروف الصيف الحار الجاف يكفل للزراع فرصة  
أطول للعمل ولا يرهق وسائل النقل ، كما أن هذا الجفاف لا يجعل من الحصاد  
مشكلة كما يساعد على قتل الحشائش ، وصفوة القول أن ظروف إنتاج  
القمح تسمح بالتوفير فى نفقات الأيدي العاملة حتى أن رجلا وصيبيا  
يستطيعان زراعة أربعمئة فدان قمحا ورعاية قطيع من الماشية ٠ فيزرع نحو  
٣٠٠ - ٤٠٠ فدان قمحا فى المزارع التى يبلغ متوسط مساحتها نحو ١٠٠٠  
فدان ، أما المحاصيل الأخرى وبخاصة الشوفان فتزرع فى مساحة تقدر  
بنحو ١٥٠ فدانا ، أما بقية المزرعة فتترك بورا ٠

وقد تجاوزت أراضي القمح نطاق ١/٢ متر للمطر المتساوى بعد سنة  
١٩٢٠ حين ارتفع سعر القمح ، ويعد تقسيم المراعى الى مزارع صغيرة  
لتوزيعها على الجنود المسرحين ، ولعدم صعوبة تطهير الأرض الجافة الا فى

الأراضى التى تغطيها أشجار أو نباتات المالى Mallee ، ولعدم الحاجة لرأس مال كبير لممارسة زراعة القمح فى هذه الجهات شبه الجافة ، ولكن انخفاض أسعار الحبوب بعد سنة ١٩٣٠ قد أدى الى اتباع الدورة الثلاثية وتوفير مياه الرى لتنويع الانتاج وبخاصة الانتاج الحيوانى ، وتراجعت حدود مناطق القمح فاختلفت زراعته من البقاع المتطرفة شبه الجافة •

أما الشوفان فيزرع فى الجهات الجنوبية الباردة وبخاصة فى تسمانيا وفى الجهات المرتفعة والساحلية فى ولايات الجنوب فى فكتوريا ونيوسوث ويلز ، ويستخدم علفا جافا وأخضرا ، وهى يكفى حاجة السوق المحلية •

أما الذرة الذى يزرع أكثره - وهى محدود المسافة - فى كوينزلند ونيوسوث ويلز فلم يقبل الأستراليون على زراعته لعدم حاجتهم اليه لا كعلف أو كغذاء للإنسان •

أما الشعير فيزرع أكثره الى الغرب من أديد فى مساحة محدودة وتنتشر حدائق الكروم التى تعتمد حينئذ على المطر فى ولايات استراليا المختلفة : استراليا الجنوبية وفكتوريا ونيوسوث ويلز واستراليا الغربية وكوينزلند ، فتزرع على منحدرات جبال فلندرز حيث يسقط نحو نصف متر من الأمطار وبخاصة حول تسادورا وكلا Wimmera Mallee كما تزرع الكروم على مياه نهر مرى شان منطقة ملدورا Mildura حيث تقوم مشروعات الرى فى إقليم مالى Mallee فى فكتوريا وفى إقليم رى Murrumbidgee مرمبىدى فى نيوسوث ويلز • كما تزرع أنواع الفواكه المتنوعة التى توجد فى ظل المناخ الحرارى المعتدل على السواء ، على حين يزرع الموز فى نيوسوث ويلز وأولى الولايات المنتجة للموالح ، كما الفواكه المعتدلة كالتفاح والكمثرى فأولى الولايات فى انتاجها هى فكتوريا يليها تسمانيا فنيوسوث ويلز •

وتبلغ مساحة القمح ٢٢٥ مليون فدان ، ٣ مليون فدان من الشوفان و ٥ مليون فدان من قصب السكر ، ٢٦ مليون فدان من الشعير و ٣ مليون فدان من الكروم •

أما قصب السكر فيزرع ٩٥٪ فى ولاية كوينزلند حول كيرنز Cairns



يمثل نحو ١٠ ٪ مساحة الاراضى الزراعية فى هذه الولاية ، وقد جلب بعض سكان جزائر المحيط الهادى من الملونين للعمل فى مزارع القصب ولكن لم يلبثوا أن أعيدوا الى ديارهم خشية أن يثيروا مشاكل اللون حين طبقت سياسة استراليا البيضاء . وتمنح الحكومة معونة الزراعة لأنها تجد أن الاستيطان البعض فى الجهات المسدارية لتعميرها ضرورى طبقا لسياسة الدولة ، ولما كانت زراعة القصب ترتبط بهذا الاستيطان فان تشجيع هذا اللون من الانتاج ضرورى .

وتقدر قيمة الانتاج الزراعى بـ ١٠ ٪ من قيمته الكلية ، ولكن لا زال يمثل ٧٠ ٪ من قيمة الصادرات وأهمها الصوف والقمح واللحوم والسكر ومستخرجات الألبان .


### الثروة المعدنية :

وقد تأثر الاقتصاد الاسترالى فى تطوره ، بل لا يزال يحمل الآثار والنتائج الضخمة التى ترتبت على استغلال ثروة القارة المعدنية ، فقد عثر على النحاس سنة ١٨٤٩ فى استراليا الجنوبية ، ثم أعقب ذلك الكشف عن الذهب منذ سنة ١٨٥١ ، فانتشر العمران فى الجهات الداخلية حيث قامت المدن ومدت السكك الحديدية ، ولا زالت بعض المدن تدين بوجودها لأهمية التعدين فى المنطقة الغربية فيها مثل بروكن هل وكالغورلى وكوينزتون ، كما أن نيوكاسل مثلا تعد مركزا للصناعات المعدنية ، أما بنديجو وويلارات فقد أصبحت مركزا للانتاج الزراعى والرعى ، وأكثر الجهات غنى بالمعادن هى الكتلة القديمة فى الغرب ، كذلك فان الجهات التى تحولت صخورها أو تعرضت للالتواء العنيف فى الشرق ينتظر أن تكون غنية بمعادنها ، وقد لعب الذهب دورا لا يقل خطورة عن الصوف فى تطور استراليا الاقصادى ، ورغم توقف مقدار ما يستخرج من بعض المعادن عن الزيادة فى انتاجها العالمى مثل القصدير والنحاس ، فان أكثر المعادن كالزنك والذهب والرصاص والفضة ظلت تساير هذا النمى فى انتاج العالم منها ، ويقدر أن قيمة ما يستخرج سنويا من المعدن نحو ٤٠ مليون جنيه وأن نصف قيمة ما يستخرج من الثروة المعدنية من القارة جمعاء حتى سنة ١٩٤٠ يرجع الى الذهب ، وتأتى استراليا فى المقام الخامس بين البلاد المنتجة للذهب ، وقد بدأ استخراجه سنة ١٨٥١ من الرواسب فى نيوزسوث ويلز وفيكوتوريا ،

ونكن ما ليث أن استنفذ الذهب ليتحول المعدنون الى عروق الذهب قى الكوارتز فى آخر القرن الماضى حين اكتشفت حقول الذهب فى كالجورلى وغيرها من حقول الذهب فى استراليا الغربية سنة ١٩٠٣ ، ولكن بعد سنة ١٩٣٠ ارتفع سعر الذهب فأعيد فتح المناجم القديمة واكتشفت أخرى جديدة ، ويستخرج الذهب من اقليم Norsmen الى جنوب كالجورلى ومن اقليم نيوتورا الى الشمال ومن اقليم مرتشيزون فى الشمال الغربى .

ولكن لا زالت مناجم كالجورلى أهمها جميعا . كما أن ارتفاع سعر الذهب أدى الى كشف مناجم جديدة فى اقليم بنديجو فى فكتوريا ، أما فى كوينزلند فيستخرج من Gympie and Mount Morgan Charters Towers ويستغل النحاس أيضا من Mount Morgan ، أما الفضة فتستخرج كمعدن ثانوى من مناجم الرصاص والزنك ، وأهم مراكز استخراج القصدير والفضة هى Rosebery and Mount Isa and Broken Hill ( انظر خريطة رقم ٨ ) .

ولا تعد استراليا غنية بالنحاس شأن افريقية أو أمريكا ، فهى تنتج



لمعدن اقليم استراليا

ما يسد حاجتها، وأهم مراكز التعدين مونتليل Mount Lyell فى تسمانيا ووالارومونتا Wallaroo, Moonta, فى استراليا الجنوبية بوراوجيل مورجان Mount Morgan, Burra ومناجم جبل ايزا Mont Isa ( فى Cloncurry ) فى كينزلند تنتج نصف الانتاج وفى كوبرا Cobar فى نيرسوث ويلز . وقد بلغ الانتاج فيها سنة ١٩٦٧ نحو ٩٠ الف طن من النحاس الخالص ، ويتم تكوين المعدن فى مونت ليل فى تسمانيا وفى بورت كمبلا Port Kembla جنوبى سيدنى .


ويعد حقل بروكز هل أكبر حقول العالم المنتجة للرصاص والزنك ، وقد انتج هذا الحقل منذ سنة ١٨٨٣ حتى سنة ١٩٤٣ أكثر من ٦١ مليون طن من الخام ، ولا يزال رغم قدمه لم يكتشف تماما . وقد بلغ مقدار الرصاص المستخرج بالتكوير ٣٧٥ الف طن والزنك ٤٠٠ الف طن .

أما الحديد فهو يكفى الاستهلاك المحلى ويستخرج من استراليا الجنوبية من تكوير Iron Knob, Iron Baron ربة ايرن وايرن بارون ، ومن استراليا الغربية من حقول يامبى Yampi Sound ، وتعد التكوينات الاولى أهمها ، وكانت تنقل الى نيوكاسل ولكن لم تلبث أن أقيمت المصاهر فى هوايالا Whyalla سنة ١٩٣٨ ( أنظر خريطة رقم ٨٢ ) . وقد بلغ الانتاج من الحديد الخالص ١٢ مليون طن سنة ١٩٦٧ .

أما ثروة استراليا من الفحم فهى تفيض عن حاجتها بل تعد أكثر بلاد المحيط الهادى الجنوبى غنى فى هذا النوع من الوقود ، وتقع مناجم الفحم فى شرق القارة وتسمانيا بوجه خاص ، أما الفحم الاسمر فيوجد أكثره فى فكتوريا ، ولكن هناك تجارة واسعة فى الفحم الذى يصلح لتوليد البخار وصناعة فحم الكوك لصهر الحديد وصناعة الصلب وهو يستخرج من نيرسوث ويلز فحسب . وتعد حقول نيوكاسل أعمق مناجم الفحم فى نيرسوث ويلز إذ تمتد حقوله لمسافة ٣٢٠ كم على طول الساحل ، وتنقسم حقول الفحم الى ثلاث مجوعات ، الحقل الشمالى حول نيوكاسل والجنوبى حول ايلوارا Illowarra والحقل الغربى عند لثجو Lithgow وينتج الحقل الشمالى ٦٥ مليون طن والجنوبى ١٩ مليون ، أما الغربى فينتج ٥١ مليون طن . أما حقول الفحم فى كوينزلند التى يبلغ الانتاج فيها نحو مليون طن سنويا ، فتستخرج فيها من الأجزاء الجنوبية والوسطى من الولاية ، وتشغل



السكان وعدم توفر موارد الحديد الجيد وحدثة عهد هذه البلاد الجديدة بالتقدم الصناعى الحديث ، ولكن بعد هذه البلاد وكثرة تكاليف النقل دفع الى اتباع سياسة الحماية الجمركية لتمكين هذه البلاد النائية المنعزلة من توفير ضرورتها ، فلا غرو ان أصبح الاسترالى يدفع ثمنا مرتفعا لكثير من السلع التى تنتجها البلاد .



### أقاليم أستراليا الاقتصادية

وإذا كان العمران فى أستراليا يتركز فى منطقتين لا تتجاوز مساحتهما ٤٠٠٠ كيلو متر مربع فى ولايتى نيوسوث ويلز وفكتوريا حيث يقطن ٢٦ مليون من السكان أو نحو ٤٠٪ من سكان أستراليا قاطبة ، فان هذه الجهات فقد اجتذبت أكثر المصانع وتركز بها النشاط الصناعى ، فيها يعمل ٧٦٧٪ من عمال الصناعة ( ١٩٤٠ - ١٩٤١ ) ، ويقدر إنتاجها الصناعى بنحو ٧٨٪ من قيمة الصناعات فى أستراليا كما يستغل فيهما نحو ٧٠٪ من قيمة المصانع فى أستراليا كلها ، ولم يكن هذا التوطن الصناعى فى جنوب القارة الشرقى محض مصادفة ، وإنما جاء ثمرة تضافر عوامل متعددة أهمها توافر القوة الحركية وفى مقدمتها فحم نيوسوث ويلز والقوة الكهربائية ، وانتشار الموانئ والمدن الكبيرة التى أصبحت منافذ طبيعية لمناطق الانتاج الزراعى للرعى فى الداخل ، ارتبطت فيما وراء البحار بخطوط ملاحية ، كما أن

هذه الموانئ نفسها قد سبقت غيرها من المدن والموانئ اجتذاب السكان .  
فتوافرت الأيدي العاملة ، وبخاصة بعد أن لتبعت الطرق الآلية فى الانتاج-  
فى الداخل ، فنزحت الى هذه المدن سعيا وراء الرزق ، وحين قامت الحرب  
ادت سياسة الدولة وتنظيمها للصناعة الى تركيزها فى منطقة الجنوب  
الشرقى .

والواقع أن الصناعة الاسترالية تطورت متأثرة بنظام الحماية بتواتر  
فترات الحروب التى انقطع أثناءها ورود السلع الصناعية من الخارج كما  
حدث فى الحربين العالميتين ، وقد أخذت هذه الصناعة تقلل من تكاليف  
الانتاج لتستطيع أن تخفض من الرسوم الجمركية كما حدث فى السلع  
المستوردة من بريطانيا ، وأهم المصنوعات هى السلع الإستهلاكية التى  
لا يتطلب انتاجها القيام بالعمليات الصناعية المعدة مثل الغلال المطحونة  
والسكر الخام والجلود والمعادن ومنتجات الألبان ، وأهم أسواقها هى  
نيوزيلند وجنوب أفريقية وجزائر المحيط الهادى والملايو ، وقد استهدفت  
سياسة البلاد الصناعية الكفاية الذاتية حتى تستطيع البلاد أن تصمد أمام  
الحصار الاقتصادى ، ولكنها عنيت أخيرا بالصناعات الحديدية والصلبية  
وصناعة الآلات والسيارات والكيمياويات والاجهزة الالكترونية والكهربائية  
حتى أصبح عدد عمال الصناعة ٣١ مليون كما أصبحت الصناعة تساهم  
ب ٣٠٪ من الدخل القومى .

#### المواصلات :

قد أدى ارتفاع مستوى المعيشة واتساع مساحة استراليا وتباعد  
بقاعها المختلفة ، ونشاط تجارة البلاد الخارجية ونزوح السكان للانتقال الى  
الاهتمام بتوفير وسائل النقل ، وقد كان النقل المائى فى طليعة أنواع النقل  
التي استخدمت ، وقد أدى انتشار مراكز العمران والمدن القديمة على  
الساحل وطول هذه السواحل التى لا تبعد عنها مناطق الانتاج الزراعى  
والرعوى الى جعل النقل على طول الشواطئ له أهمية قصوى ، فلا غرو  
ان وجدت السكك الحديدية منافسة من النقل البحرى أو النهري منذ عهد  
متقدم ، وتهتد خطوط السكك الحديدية التى تملك الولايات أكثرها فى شكل  
خطوط تقنصر على حدود الولاية التى قامت بإنشائها ، ان تخرج متفرعة من  
العاصمة أو الميناء الرئيسى ، فقلما تربط خطوط السكك الحديدية بين ولايتين

أو أكثر . وقد مد أول خط للسكك الحديدية سنة ١٩٥٠ بين سيدنى وبرماتتا Parramatta ، ولم يأت عام ١٩٧٥ حتى كانت العقبة التى تعترض الاتصال بالداخل قد زالت ، فانتشرت السكك الحديدية بسرعة فى العقد الأخير من القرن الماضى ورغم انه من الممكن الانتقال لمسافات طويلة بالسكك الحديدية الا ان اختلاف المقياس يؤدى الى تعذر النقل ، فتوجد شبكة صغيرة من السكك الحديدية تربط ملبورن ببيرسبين وهى تمتد داخل نطاق القمح . كما توجد شبكات صغيرة ، منعزلة تمتد حول برث وادليد ، أما فى كوينزلند فيبدو طابع الخطوط المنفردة التى تصل الموانئ بالداخل فى شكل ثلاث خطوط يمتد من تاونزفيل وروكهامبتن وپرسبين ، ثم هناك خطوط مشابهة تصل سيدنى بكندوبولين Condobolin وهاى Hay ومن ادليد الى اودناداتا Odnadatta أما فى الجنوب الغربى فيمتد خط من برث لافرتون Laverton ، ومن جيرالدتون الى ميكاثرا Meekatharra

وقد كان لنجاح خط سكة حديد كندا الباسفكية صدق قوى ، فأخذ المسئولون فى استراليا يتطلعون الى مد سكة حديدية عبر القارة لنشر العمران فى أرجائها ولكنهم لم يفتنوا الى مساحات شاسعة نادرة المطر أو جافة محدودة الامكانيات الاقتصادية ، فمد خط لمسافة ١٦٨٠ كم تخترق أرضا فقيرة بالقرب من خط ١٠ متر للمطر المتساوى ، وقد تم مده سنة ١٩٢٧ ، أما الخط الآخر الذى يصل أطراف القارة بعضها بالبعض الآخر ، فيصل سكة حديد داروين اودناداتا Odnadatta ، وهو يسير لمسافة ٨٠٠ كم لربط منطقة داروين القليلة العمران ، بالداخل ولذلك لم يكن هناك ما يبرر مد هذه السكة الحديدية سوى وعد قطعه الحكومة الفدرالية لربط داروين بادليد .

وقد أصبحت خطوط السكة الحديدية ذات مقياس موحد الآن لتيسير الاتصال بين أفراد القارة .

وقد أدت ظروف استراليا سواء بحكم موقعها المنعزل المتطرف بالنسبة لمناطق الحضارة والعمران ، أو لبعد المسافات بين مراكز السكنى والمدن فى الداخل - الى ارتفاع نصيب الفرد ، مما يثقل بالجرى سواء اكانت سلعا أو ركابا ؛ وينتشر استخدام الطائرات الصغيرة فى الاقليم الشمالى وفى استراليا الغربية بوجه خاص .

تطور العمران فى استراليا بفضل اتصالها فى موقعها المنعزل النائى  
بالبلاذ المتطورة اقتصاديا وحضاريا كبريطانيا ، ولذلك ارتبطت موانئها  
الحديثة التى يمثل أكثرها عواصم الولايات بالدول الأخرى بخطوط ملاحية  
منظمة ورغم ما طرأ على أهمية الصادرات من تغير فى القيمة النسبية  
لتذبذب المطر بين عام وآخر ، وما يحدث لأسعار السلع وبخاصة الصوف من  
تغيير ، فقد كان الصوف يحتل مركز الصدارة بين السلع المصدرة فى أكثر  
الأحيان ، وفى سنة ١٩٥٠ - ١٩٥١ بلغت قيمة الصوف نحو ٥/٣ قيمة  
الصادرات ، أما قيمة الغلات الرعوية التى تتضمن اللحوم والصوف والجلود  
والحيوانات الحية ومستخرجاتها فتمثل ٢٠٪ من صادرات استراليا ، أما  
الحاصلات الزراعية كالقمح والدقيق والسكر والشعير والفواكه والأرز  
والنبذ فتتراوح قيمتها بين ١٥ و ٣٠٪ من قيمة الصادرات بوجه عام ،  
ويمثل القمح نحو ٦٦٪ من الصادرات الزراعية ، أما منتجات المزارع من  
الطيور ومستخرجات الالبان فقد هبطت قيمتها من ١٠ - الى ٥٪ ، أما  
الصادرات الأخرى فهى المعادن ومنتجات المصانع ويمثل كل منها ١٠٪ من  
الصادرات ، وأولى الصادرات قيمة هو الصوف والقمح واللحوم البقوية  
ثم لحوم الاغنام والزبد والفواكه ومنتجاتها ، وأهم الصادرات من المصنوعات  
وسائل النقل والكيمياويات .

كانت بريطانيا تستورد من نصف الى ثلث قيمة صادرات استراليا ،  
كما ان استراليا عادة تستورد منها منتجات ليست دون ذلك قيمة ، ولكن  
ثانية الدول المستوردة من استراليا لا تحصل الا على نسبة ضئيلة لا تتجاوز  
عادة ٥٪ من قيمة الصادرات الاسترالية ، وأهم الدول المستوردة هى فرنسا  
وايطاليا وبلجيكا والولايات المتحدة ، أما الدول المصدرة لاستراليا فهى  
بريطانيا والولايات المتحدة والهند وكندا واندونيسيا والسويد والنرويج ،  
وأهم واردات استراليا هى الآلات بأنواعها والمنسوجات المختلفة ، ويبدو  
ان استراليا فى اتجاهها نحو التصنيع قد أخذت تتحول من بلاد تعتمد على  
تصدير المواد الخام والغذائية الزراعية والرعية لارتفاع مستوى معيشة  
السكان المتزايدين ، الى بلاد تحاول أن تسد حاجاتها على اختلافها قبل  
كل شئ .

ولكن الآن أصبحت أولى الدول المستوردة هى اليابان وبريطانيا



والولايات المتحدة ونيوزيلند والصين الشعبية وإيطاليا ، أما الدول المصدرة لها فأهمها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والمانيا الغربية وكندا .

### السكان :

وقدر عدد سكان استراليا بنحو تسعة ملايين سنة ١٩٥٤ ، ويرجح أن عددهم قد تجاوز الآن خمسة عشر مليونا ، وهو عدد ضئيل اذا قورن بالقارات الأخرى فى العالم ، كما أن كثافة سكانها التى لا تتجاوز ثلاثة أشخاص فى الميل المربع تقل كثيرا عن متوسط كثافة السكان فى العالم ، وقد سلفت الاشارة الى التباين الواضح بين كثافة الساكن فى جهات استراليا المختلفة ، فعلى حين يخلو نحو ١/٣ المساحة من السكان ، تصل كثافة السكان فى الثلث الثانى الى فرد فى كل ثمانية أميال مربعة ، كما يعيش نحو ٩٣٪ من سكانها على مسافة ١٠٠٠ كم على الساحل الشرقى بين كيرنز وشبه جزيرة إير كما يقطن ٦٪ من السكان فى الجنوب الغربى حيث يعيش ٦٠٪ منهم فى مدينة برت . أما الظاهرة الثانية فى توزيع السكان فاحتشادهم فى المدن ، ويكفى أن نذكر أن ٥٤٪ من السكان يعيشون فى عواصم الولايات الست وكذبوا العاصمة الاتحادية و ٢٠٪ فى المدن الصغرى ، أما سكان الريف فلا تتجاوز نسبتهم ٢٠٪ ، وعلى حين كان متوسط الزيادة فى سكان عواصم الولايات نحو ١٨٥٪ بلغت نسبتها ٢٢٪ فى مدن الاقليم ، بينما هبط عدد سكان الريف بنحو ١٢٪ فى الفترة بين الاحصائين الاخيرين ، ويقدر أن ١/٣ سكان كل من فكتوريا واستراليا الجنوبية يسكنون فى الحواضر الكبيرة ، ويربو هؤلاء على النصف فى نيوزسوث ويلز واستراليا الغربية ، ولا تهبط نسبة سكان المدن دون ٤٠٪ الا فى تسمانيا وكوينزلند والاقليم الشمالى ، وفى الاقليم الشمالى Northern Territory يقطن ٧٥٪ من السكان حول مناجم التعدين ، ومراعى الماشية والضأن . وتعزى ظاهرة ازدياد السكان على هرامش القارة ، وبخاصة فى الجنوب الشرقى حول مناطق المدن حيث تتركز حشود السكان فى عواصم الولايات التى تعد موانى هامة أيضا - الى قيام النشاط التجارى والانتاج الصناعى والانتاج الزراعى الكثيف جنبا الى جنب فى المناطق حول المدن التى كانت موانى وعواصم ادارية ومراكز للتجارة والانتاج الصناعى .

وقد كانت الزيادة فى عدد السكان فى الفترة الاخيرة بين ١٩٤٧ -

١٩٥٢ سرّبعة أن بلغ ١٨٪ أو ١٤ مليون نسمة ، فقد زادوا عن ٢١٤ر٠٠٠ نسمة سنة ١٩٥٢ ، وقد وضع مشروع لتشجيع الهجرة الى استراليا بعد الحرب كان من نتيجة زيادة السكان بنحو ٤١٤ر٠٠٠ سنة ١٩٤٩ - ١٩٥١ ، وتتكون أكثر العناصر المهاجرة التي يطلق عليها « الاستراليون الجدد » من اللاجئين من أوربا ممن اخرجتهم ظروف الحرب من ديارهم ، والواقع أن هذه الموجة من المهاجرين تعد أهم هجرة من غير العناصر البريطانية ، رغم أن استراليا لا زال سكانها البريطانيون الذين ولد أكثرهم في استراليا نفسها يمثلون السواد الأعظم من سكانها .

تظهر في دراسة فئات السن بين سكان استراليا ظاهرة ارتفاع نسبة صغار السن نسبيا في السنوات التي فتح فيها باب الهجرة ، كما أن نمو السكان البطيء قد أدى الى ارتفاع نسبة كبار السن أيضا ، فضلا عن أن نسبة الذكور في فئات السن ٣٥ - ٤٥ سنة ، ٥٥ - ٩٥ سنة في تعداد سنة ١٩٤٥ منخفضة نسبيا لارتفاع نسبة الوفيات من صرعى الحربين العالميتين ، كما تهبط نسبة فئات السن ١٥ - ١٤ لتأثير الازمة الاقتصادية وأوائل سنى الحرب في الهبوط بنسبة المواليد .

وعلى حين يعمل ٢٩٪ من السكان في الصناعة والبناء ١٩٪ بأعمال التجارة والمال ، لا تزيد نسبة من يعملون في الزراعة والرعى والتعدين اى بالحرف الاساسية عن ١٥٪ من العاملين من السكان ويتقاسم بقية السكان حرف النقل والمواصلات ( ٩٪ ) والصناعات والحرف الحديدية الأخرى ( ١٨٪ ) .

سكان استراليا ( ١٩٨٣ )	
٥٣٧٨٣٠٠	نيو ساوث ويلز
٤٠٥٣٤٠٠	فكتوريا
٢٤٨٨٠٠٠	كوينزلاند
١٣٤٧٧٠٠	استراليا الجنوبية
١٣٧٣٧٠٠	استراليا الغربية
٤٣٤٧٠٠	تسمانيا
١٣٦٨٠٠	الأرض الشمالية
١٠ر٠٠٤	العاصمة الاتحادية ( كاندرا )
١٥٤٥١٩٠٠	المجموع

## الفصل الثاني

### غينيا الجديدة

تعد أكبر الجزائر القريبة من استراليا وأهمها . وتنقسم مساحتها التي تقدر بنحو ١٧٥٦٠٠٠ كم<sup>٢</sup> إلى النصف الغربي الذي ضم لأندونيسيا ، ويعرف باسم أيريان "Irian" أما القسمان الباقيان أوار Territory of New Guinea وتضم شمال شرق جزيرة غينيا الجديدة ، وبعض جزائر أرخبيل سليمان ، وأرخبيل بسمارك ، وهي مستعمرة المانية سابقة وضعت تحت وصاية استراليا أما القسم الثالث الذي يمتد في جنوب شرق الجزيرة ، فقد كان محمية بريطانية منذ سنة ١٨٨٤ حتى سنة ١٩٠٦ حين أصبحت تابعة لاستراليا ، وسميت باسم Territory of Papua بعد أن كان يطلق عليها اسم غينيا الجديدة البريطانية ، وقد خضع القسمان الأخيران لاستراليا وأصبحا تحت إدارة واحدة منذ سنة ١٩٤٩ ، وتعد بابوا جزءا من استراليا أما إقليم غينيا الجديدة فقد وضعته الأمم المتحدة تحت وصاية استراليا ، وتبلغ مساحة الأولى ٤٢٤ر٤٠٠ كم مربع والثانية ٣٦٨٦٤٠ كم مربع .

تعد جزيرة غينيا الجديدة التي يبلغ طولها نحو ٢٥٠٠ كم وعرضها نحو ٨٠٠ كم أقل الجزائر الكبرى تقسدا ، وأكثرها تخلفا من النواحي الاقتصادية في العروض الدنيا والوسطى . فلا زال عدد كبير من ساكنها الوطنيين من القبائل يحيون حياة العصر الحجري القديم ، بل ما زال بعض جهات الجزيرة الجبلية الوعرة الداخلية لم يكتشف بعد . ويبلغ سكان بابوا ٦٠٠ر٠٠٠ نسمة من الوطنيين و ١٥ر٠٠٠ نسمة غيرهم ، أما سكان غينيا ف يبلغ عدد الوطنيين ١٦ مليون نسمة وغيرهم ٢٤ر٠٠٠ نسمة .

وتمتد مظاهر السطح في الجزيرة من الشرق إلى الغرب ، ففي أقصى الشمال توجد سلاسل جبلية يصل ارتفاعها إلى ٢٢٠٠ متر تمزق اتصالها الوديان والخلجان مثل خليجان Geetwinck و وادي نهر Mamberamo وولتا نهري سبيك Sepik ورامو Ramu ، وتنتشر هنسا البراكين

النشطة ومقدوفاتها المصهورة فى شكل أقواس من الجزائر تحف الساحل بين جزيرة نيوبريتان وويواك Wewak على الساحل الشمالى للزيرة ، وىلى هذه السلاسل الساحلية منخفض غير متصل يتألف من وديان الانهار وخليج ماككلور Meccluer ، ويغلب على الظن أن منخفض بلانيت Planet deep الذى يقع فى قاع المحيط جنوبى جزيرة نيوبريتان ليس الا امتدادا للمنطقة المنخفضة فى الجزيرة ، أما السلاسل الجبلية الرئيسية فتتمتد وسط الجزيرة ، وقد تغطى قممها الثلوج أو تقطعها الوديان الشديدة الانحدار وهى سلاسل متوازية ، تتسع فى طرفى الجزيرة ، أما فى الجنوب، فتتمتد هضاب منخفضة أو سهول متسعة تنتشر بها الرواسب الحديثة النهرية والبحرية والبركانية ، وتكتنف هذه السهول المستنقعية المستنقعات وتشققها الانهار المتسعة البطيئة الجريان .

وتتناوب الأمطار الموسمية الغزيرة ، فتهب الرياح الموسمية الشمالية الغربية على الساحل الشمالى حيث تتعامد عليه فى بعض جهاته فى الصيف .  
الجنوبى .

أما فى الشتاء الجنوبى فتهب الرياح الموسمية الجنوبية الشرقية على السواحل الجنوبية ، وقد يسقط نحو خمسة أمتسار من المطر فى بعض الجهات ، ولكن الجهات الداخلية ، وبخاصة الوديان المنعزلة ، والسواحل الموازية للرياح الموسمية فيصيبها قدر ضئيل نسبيا من الأمطار قد لا يتجاوز المتر الا قليلا ، كما هو الحال ، فى الساحل الشمالى الشرقى ، وساحل بورت مورسبى Port Moresby فى الجنوب وتنمو الغابات الاستوائية الكثيفة التى تنتمى فصائلها لما يكثر فى استراليا والملايو من الأنواع ، ولكن الجهات التى يقل فيها المطر تنمو بها حشائش السفانا التى تتخللها بعض الأشجار تسمى حشائش كوناي Kunai . وقد تنمو حشائش طويلة تشبه قصب السكر تدعى بيت بيت Pit Pit وقد أدى انتشار السكان فى الجهات الداخلية الى تدمير الغابات لأن أكثرهم يمارسون الزراعة المتنقلة ، فتنمو حشائش كوناي السالفة الذكر محلها .

والواقع أن شيوع استخدام الفأس الحديدية قد أدى الى انتشار

السافانا على حساب الغابات ، والى تعرض التربة للاكتساح على نطاق  
يزداد خطورة بمرضى الزمن . ولكن لم تتعرض غابات المانجروف فى الجهات.  
الساحلية المنخفضة أو المستنقعات ، أو غابات نخيل الساجر ، وغابات جوز.  
الهند على التلال والتشطوط الرملية للتدمير ، لأن مناطق السواحل لا تجتذب  
السكان كثيرا .

ويصعد هؤلاء السكان الهضاب والجبال الداخلية لاستغلال الغابات.  
المخروطية ، اذ يغطى المناطق المرتفعة كثيرا الطحالب وحشيشة البحر ، كما  
تنمو أشجار الكارو Kauri والأروكاريا أسفلها ، ورغم ندرة السكان.  
على الساحل فقد احتشد السكان فى بعض الجهات الداخلية حيث يمارسون  
الزراعة التى تنهك التربة .

ويسكن هذه الجزيرة والجزائر المحيطة بها عناصر متعددة ، تفسكن  
بدماء الأستراليين فى الجنوب الشرقى ، وقد تأثرت دماؤهم عناصر البابويين.  
الأصليين .

أما سكان الجهات الداخلية والغربية فهم من الأقزام . أما العناصر  
الميلانيزية فتسود فى الشرق ، وفى زائر أرخبيل بسمارك ، وجزائر سليمان.  
والسواحل التى بسهل الوصول إليها ، وكما تتعدد العناصر الجنسية تتعدد  
اللغات ، ويقدر عدد السكان بنحو ٢٥ مليون ، يسكن ٩١٠٠٠٠ نسمة منهم  
فى نصف الجزيرة الذى يتبع أندونيسيا ، ونحو نصف مليون يسكنون منهم  
بابوا Papua فضلا عن نحو مليون يقطنون فى إقليم غينيا الجديدة  
. Territory of New Guinea .

أما الميلانيزيون فيسكنون فى أرخبيل الجزائر القريبة ، على حين يقيم  
نحو ١٢٠٠٠ من الأوربيين الوافدين حديثا ، وهم يعملون فى الإدارة  
والتجارة فى المدن ، أو فى مراكز التعدين ، ومواطن المزارع الواسعة ويعد  
سكان غينيا الجديدة المختلطة دماؤهم من أقل سكان العالم تأثرا بالحضارة  
الغربية .

ويمارس السكان الزراعة المتنقلة ، فيختارون الأودية التى تغطى

الغابات الاستوائية والمعتدلة من البلوط ، ثم الزان حتى المراعى الألبية فى أرضها الغابات الكثيفة التى تنمو فى التربة الرسوبية الخصيبة ، وتتأخى أعلى الجبال ، ويستخدم السكان الفؤوس ، ويلجأون الى اضرام التيزان لتدمير الغطاء النباتى على تباينه حتى يصل لارتفاع ٢٥٠٠ متر تقريبا ، ويتخلف على اثر ذلك تربة غنية بالمواد العضوية والبوتاس ، وتقوم الزراعة وتنهض مراكز العمران فى الوديان المنخفضة بتربتها الرسوبية ، أو عند حافة غابات الزان حيث توجد تربة الغابات الغنية .

أما السكان من البدو فيعيشون عند المراعى الألبية حيث يصيدون الحيوان من غابات الزان ، ويحرقون بعض الأشجار ليزرعوا نوعا من نخيل الزيت يسمى Pandanus .

وعلى حين يزرع هؤلاء الزراع المتنقلون التارو وقصب السكر والموز ، والخضروات قريبا من مساكنهم ، مستخدمين آلات زراعية بسيطة ، مثل الفؤوس الحجرية ، والعصى للحفر وتقليب التربة ، وأخرى لتطهير الأرض من النباتات الطفيلية ، تقوم مزارعهم الكبيرة عند الحلية السفلى للغابات المعتدلة لانتاج البطاطا بصيفة خاصة . وتزرع الأرض بضع سنوات حتى تستنفذ خصوبتها وتعود غير صالحة للزراعة لتترك بورا فتعود الغابات للنمو من جديد .

أما الزراعة المتقدمة التى يستخدم فى ممارستها السماد العضوى والأخضر ، وتحفر المصارف للتخلص من المياه ، فتقوم فى الوديان المنخفضة ذات التربة الرسوبية ، وتزرع المحاصيل التى سلف الحديث عنها ، كما تزرع بعض الغلات مثل الطباق وقصب السكر والموز . وقد أدت الحرب الى اضطراب الزراعة وتدخل الإدارة فى إعادة تعمير بعض المناطق التى لحقها التخريب ، وتقوم مزارع واسعة لانتاج المطاط والأرز الجاف ، ولكن مزارع جوز الهند تعد أهمها اذ تقدر مساحتها بنحو ١/٣ مليون فدان ، فمزارع جوز الهند فى القسم الغربى ليست فى الواقع الا مزارع صغيرة .

ويضنح إقليم غينيا الجديدة ٨١٠٠٠ طن من جوز الهند ، ١٤ ألف طن

من الكاكاو ، ١٢٣٠٠ طن من البن و ١١٠ مليون قدم من الخشب ، ١٦٠٠ طن مط صادرات الفول السوداني و ٢١ من المطاط .

أما فى بابوا « فتقد مساحة مزارع المطاط بنحو ٢٦٠٠٠ فدان على حين تتجاوز مساحة مزارع جوز الهند نحو ٣٤٠٠٠ فدان قليلا ، وتنتج ٩ آلاف طن من الكوبرا ( لب جوز الهند ) و ٥٥٠٠ طن من المطاط وألف طن من حبوب الكاكاو و ١٥٠ طن من البن و ٢٧٨٨٠٠٠ مريع من الخشب .

أما الذهب فيعد أهم المعادن اذا استخرج من مناجمه فى منطقة موروبى Morobe ما قيمته ٣٠ مليون جنيه ، وأهم مراكز استخراجة بالقرب من مدينة واو Wau وأكثره يستخرج من الرواسب باستخلاصه بواسطة الكراكات الضخمة وقد أصاب معدات التعدين إلتخريب أثناء الحرب كما استنفدت التكوينات الغنية ، ولذلك يأتى فى المقام الثانى من المنتجات بعد جوز الهند الآن ، ويستغل من المعادن الأخرى الفضة والمنجنيز .

وتقوم التجارة بين الرديان وبين أندونيسيا بوجه خاص ، وأهم الموانى Rabaul ، وهى عاصمة إقليم غينيا الجديدة يليها بورت مورسبى Port Moresby عاصمة بابوا ، والواقع أن الموانى الصغيرة التى تصدر منتجات المناطق القريبة منها تنتشر على سواحل الجزيرة ، ورغم تعدد موارد هذه الجزيرة وضخامة امكانياتها ، فان استراليا تعدها عبئا ثقيلا يهبط كاهلها ، وقد الفت الادارة الاسترالية لجانا لدراسة ظروف الجزيرة وطاقتها الانتاجية ، ولكن لم يعد ذلك دور الدراسة وربما يعزى ذلك الى صعوبة الحصول على العمال الكفاء الذين يعملون لقاء أجر معين وندرة الأسواق وبعدها ، وتذبذب أسعار الحاصلات المدارية مما صرف كثير من أصحاب الأموال من الاستراليين عن استغلال أموالهم فى استثمار موارد الجزيرة ، والواقع أن امكانيات هذه الجزيرة لا زالت مدفونة لم تمتد اليها يد تستغلها كما أن مشاكلها لا زالت لم تتناولها يد الاصلاح ، ولكن وضع مشروع الخمس سنوات سنة ١٩٦٩ - سنة ١٩٧٣ لمضاعفة قيمة الصادرات سنة ١٩٧٣ ، يستهدف الاكتفاء الذاتى لسنة ١٩٨٠ ، وتعنى بالصناعة والمواصلات والخدمات ، وتصدر قيمة واردات بامبوا بـ ٥٠ مليون دولار من

المصنوعات والمشروبات والآلات ووسائل النقل والصادرات بـ ٩ مليون دولار من المطاط وجوز الهند .

### جزائر نيوزيلنده :

تمتد هذه الجزائر لمسافة ١٦٠٠ كم كما تقدر مساحتها بنحو ٢٦٨٧٠٠ كم مربع وقد وفد اليها منذ قرابة عشرة قرون جماعة من أصل بولينيزى ، نزحوا من وطنهم الاول فى جزائر المحيط الهادى ، وان كان يغلب على الظن أنهم كانوا يمارسون زراعة التارو واليام والكومار "Kumara" « البطاطا » الا ان ظروف الانتاج الزراعى لم تكن ميسورة ولذلك تحولوا الى صيادين للأسماك والطيور ، فوجدوا فى الخلجان وعذ الشواطىء ومصببات الانهار والمستنقعات حاجتهم من الطير والسماك ، ثم اهتدت اليه سفن شعب آخر من البولونزيين يدعون بالماورى Maori استطاعوا أن يزرعوا بعض ما جلبوه من غلاتهم المدارية كالتارو والبطاطا ، ولكن ظل اعتمادهم على منتجات البحيرات والانهار والمستنقعات وشواطىء البحر كبيرا للحصول على كثير من المواد الخام لصناعاتهم المختلفة ، وقد وجدوا صعوبة كبيرة فى اقلمة غلاتهم المدارية فى بيئة الجزيرة الجنوبية .

وقد اكتشف تسمان Tasman هذه الجزائر سنة ١٦٤٢ ، ولكن لم تعرف الا على يد كوك Cook الذى مر بها عدة مرات بين سنة ١٧٦٩ وسنة ١٧٧٦ ، وقد استرعت اهتمام صيادى عجول البحر ثم الحيتان فضلا عن أخشاب الكورى وبخاصة حوالى سنة ١٨٢٠ ، وقد ضمت بريطانيا هذه الجزائر اليها سنة ١٨٤٠ ، حين بدأ تعميرها .

ومن الطريف أن الاقبال على الهجرة كان أكثر وضوحا على الجزيرة الشمالية رغم كثافة غاباتها وكثرة سكانها من الماورى ، وكانت تصدر الدقيق والصوف ونوعا من الكتان المحلى ونوعا من صمغ شجر الكورى Kauri ثم تتابع اكتشاف الذهب فى الجزيرة الجنوبية ثم الشمالية بخاصة فى وايى Waihi جنوب شرق أوكلند ثم توسع السكان فى انتاج القمح فى سهول كنتزبرى وبخاصة فى آخر القرن الماضى ، ولكن ما لبثت





## البنية :

تتكون الجزيرة الجنوبية وبخاصة الجزء الجنوبي والسواحل الغربية من الصخور الجبلورية القديمة التي تظهر على سطح الأرض ، هنا ، على حين تختفى فى الجزيرة الشمالية ، ويحف بهذه التكوينات القديمة صخور أحدث امنها ، أكثرها يرجع الى العصرين الترياسى والجوارسى ، وذلك فى الربع الشمالى الشرقى من الجزيرة الجنوبية ، وتتكون السلسلة الرئيسية فى الجزيرة الشمالية وتسمى رواهينى Ruabine من هذه الصخور ، كما تظهر فى سلسلة جبال باترسون Paterson جنوبى أوكلاند .

ويحيط بهذه السلسلة تكوينات تنتمى لعصر الميوسين والعصر الكريتاسى ، وربما كان سبب هذا التوزيع تعرض هذه المنطقة للتواء محدب أدى الى نحت الجزء الجنوبى ، فظهرت الصخور القديمة على حين ظل الجزء الشمالى تغطيه صعور أحدث . ومن الظواهر المهمة أنها كثيرا ما تتعرض لاضطرابات تكتونية من زلازل وبراكين والتواءات وانكسارات ، قد تكون كثيرة منها فى آخر الزمن الثالث ، حين تعرضت البلاد لانكسارات عنيفة اندفعت على أثرها كتل من الأرض ، والواقع أن عوامل التعرية قد أزلت كثيرا من التكوينات اللينة التى كانت تعطى انحاء الجزر قبل الزمن الثالث ، وقد تعرضت هذه البلاد لدورات من الانخفاض والارتفاع ، وتكثر البراكين فى الجزيرة الشمالية وان كانت لا تخلو الجزيرة الجنوبية من عدد كبير منها ، فتمتد البراكين على طول خط من خطوط التصدع فى البنية فى التصقيع حتى فى الجهات المنخفضة فى الصيف ، ولذلك يلحق الضرر البليغ بالفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى ، وتسطع الشمس ساعات طويلة رغم ما قد يظنه البعض ، ويعزى ذلك الى انتشار المرتفعات التى تبدد السحب ولا تسمح بتراكمها فى طبقات الجو السفلى والوسطى ، ويغزر المطر على المنحدرات الغربية والمناطق الجبلية ، وبخاصة فى الجزيرة الجنوبية حيث تتسع مساحة هذه المناطق ، ويبلغ المطر الساقط نحو ٢٢٥متر وان كان يصل أحيانا متر بل ٧٥ متر فى بعض البقاع ، أما فى السهول والمنحدرات الشرقية فيقل المطر حتى يصل الى متر بل نصف متر أحيانا .

ولا يقل ما يسقط من الامطار عن المتر فى العام فى الجزيرة الشمالية، فكما أنه لا يبلغ المطر من الغزارة ما يبلغه على السواحل الغربية للجزيرة الجنوبية ، الا أنه لا يهبط كذلك الى مقداره على السواحل الشرقية لها .

ورغم أن مناخ الجزيرة الشمالية يشبه مناخ البحر المتوسط فيغزر المطر فى الشتاء وبخاصة فى يوليو ، فان فصل الصيف لا يخلو من المطر .

أما فى الجزيرة الجنوبية فيتوزع المطر بانتظام على مدار السنة أى لا يتركز فى فصل معين هذا ، وان كان المطر أغزر على الساحل الغربى فى فصل الصيف عنه على النصف الشرقى من الجزيرة .

والواقع أن انخفاض حرارة المناخ واعتداله ورطوبته وغزارة المطر وانتظامه يميز نيوزيلنده عن استراليا ، ولذلك فالحياة النباتية أكثر تنوعا وغنى .

وتعد محاصيل العلف أهم المحاصيل الزراعية فى نيوزيلنده ، ويزرع أكثرها الى جانب الحبوب والفواكه فى سهل كنتربزى الذى يبلغ طوله ٢٤٠ كم وعرضه ٨٠ كم ، ويزرع التفاح والخوخ والكمثرى والعنب وغيرها الى جانب الطباق وبخاصة حول نلسن Nelson وديندين Dunedin .

وقد ساعدت ظروف المناخ من مطر غزير وقلة بخر الى جانب الطبيعة الجبلية الى توفر ظروف توليد الكهرباء التى تستخدم فى صناعات مستخرجات الألبان والحفظ والورق وطحن الغلال والتعدين .

ويتجاوز عدد السكان ٢٧ مليون نسمة بقليل يتضمنون بعض عناصر الماوى الذين يقدر عددهم بنحو ٢١٥٠٠٠ نسمة ولا يزيد عدد الذين احتفظوا بنقاء دمائهم وعلى ٤٥٠٠٠ ، ورغم أن عددهم قد أخذ يزيد فى الفترة الاخيرة ، فان تزاوجهم مع الاوربيين سينتهى بهم حتما للانقراض كعنصر أو سلالة لها مميزات الخاصة .

وقد زاد اشتراك نيوزيلند حديثا فى شئون آسيا والمحيط الهادى ، فقد أصبحت عضوا فى حلف يضم استراليا والولايات المتحدة ANZUS وعضوا فى خطة كولبو Colombo Plan لتنمية موارد آسيا الاقتصادية ، وفى مجلس الدول الآسيوية ودول المحيط الهادى ASPAC وفى منظمة حلف جنوب شرق آسيا SEATO ، ودخلت فى اتحاد جمركى مع استراليا ، سنة ١٩٦٥ ينتهى سنة ١٩٧٤ بالغاء الرسوم الجمركية بين البلدين كما منحت جزيرة ساموا سنة ١٩٦٢ الاستقلال بعد أن كانت تحت وصايتها •

## المراجع عن أفريقيا

### كتب عامة عن جغرافية أفريقيا :

- R. Harrison Church & others : Africa and The Island. Geographies : An Intermediate Series, Longmans, 1964.
- L. Dudley Stamp : Africa, A Study in Tropical Development. John Wiley & Sons, Inc., New York, London, 5th ed., 1960.

### اقتصاديات أفريقيا :

- Walter Fitzgerald : Africa, A Social, Economic & Political Geography of its Major Regions 9th ed. by W.C. Brice, 1961.
- G.H.T. Kimble : Tropical Africa, 2 Vols., New York, 1960.

### الجيولوجية :

- R. Furon, Geology of Africa, 1963.
- - R. Furon and G. Daumain. Carte Géologique Internationale de l'Afrique, International Geological Congress.

### البنية والنواحي الجيومورفولوجية :

- L.C. King : The Morphology of the Earth, 1962.
- L.C. King : South African Scenery, 2nd Ed., 1951.
- De Toit : The Geology of South Africa, 2nd Ed., London, 1939.
- Willis, Bailey, East African Plateau and Rift Valeys Washington, 1936.

### المنـاخ :

- W.G. Kendrew : The Climates of the Continents, 4th Ed., 1953.
- A.A. Miller : Climatology, 8th Ed. 1953.
- Brooks, C.E.P. : and Mirrlees, S.T.A., A Study of the Atmospheric Circulation over Tropical Africa. Mcteor, Office, London, 1932.

### النبات والتربة :

- R.W.J. Keay : Vegetation Map of Africa South of the Sahara, 1959.
- J. Phillips : Agriculture and Ecology in Africa, 1959.
- Shantz, H.L., & Marbut, C.F., The Vegetation and Soils of Africa, New York, 1923.
- Pole Evans, I.B., The Plant Geography of South Africa, Year Book of South Africa, Pretoria, 1918.
- F.A. Van Baren : Tropical Soils, The Hague, 1959.
- Report of the 2nd Inter-African Soils Conference at Leopoldville, 1954.

### السكان :

- G.P. Murdock, Africa : Its Peoples and their Culture History, New York, 1959.
- L.H. Cann and P. Duignan, White Settlers in Tropical Africa, 1962.
- C. Darly Fordée (Ed.) Ethnographic Survey of Africa.
- International Union For the Scientific Study of Population.
- International African Institute.  
Problems in African Demography, Paris, 1960.
- J. Phillips, Agriculture and Ecology in Africa, 1959.
- W. Hance, African Economic Development 1958.
- Perham M. & Simmon African Discovery, London 1942.

### بلاد المغرب :

- J. Despois, l'Afrique du Nord, 1949.
- J. Despois, ta Tunisie du Nord, 1961.
- Bernard A., Afrique Septentrionale et Occidentale Tome XI, Géographie Universelle, Paris, 1938.

### ليبيا :

- J. Célrier, Le Maroc, 1948.
- J. Despois, Development of Land Use in Northern Africa, in L.D. Stamp (Ed.) A History of Land Use in Arid Regions, UNESCO, 1961, pp. 219-38.

- International Bank for Reconstruction : The economic Development of Libya, Baltimore, 1960.
- S.G. Willimott & J.L. Clarke (Eds.) Field Studies in Libya, Durham, 1960.
- Brichant, M.A., A Broad Outline of the Geology and of the Mineral Possibilities in Libya UNO Mission in Libya, Report No. 5, 1952.
- Despois, J., Le Djebel Nefousa (Tripolitania) Paris, 1935.
- Despois, J. Mission Scientifique du Fezzan, Paris 1948.
- Fantoli A. "Le Pioggie della Libya" Roma 1952.
- Hey, R.W. The Geomorphology and Tectonics of the Gebel Akhdar, Geol. Magazine, vol. 93, 1956.
- U.N.O. (F.A.O.) "Report to the Government of Libya on Agriculture" F.A.O. Rep. No. 21, 1952.

- جغرافية ليبيا : الدكتور عبد العزيز طريح ، الاسكندرية سنة ١٩٦٢ •
- الامكانيات الزراعية لطرابلس : محاضرة أقيمت بالمرسم الثقافي للجامعة الليبية سنة ١٩٦٤ - سنة ١٩٦٥ •
- البترول فى ليبيا ودوره فى الاقتصادى الليبى محاضرة أقيمت بالمرسم الثقافى للجامعة الليبية سنة ١٩٦١ - ١٩٦٢ •
- موارد المياه الباطنية فى الجبل الأخضر - دراسة جيوهيدرولوجية - اقتصادية - مجلة كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية - العدد الثانى سنة ١٩٦٥ •
- « الانتاج الزراعى فى طرابلس الغرب بليبيا » من أبحاث المؤتمر الجغرافى الغربى - القاهرة - يناير الدراسات السابقة بقلم الدكتور جمال الدين الدناصورى •

### حوض النيل :

- J. Ball. Contribution to the Geography of Egypt, Cairo 1939.
- J. Besançon, L'Homme et le Nile, 1957.
- R.R. Platt & M.B. Hefny, Egypt : a Compendium, New York, 1958.
- G. Hamdan, Studies in Egyptian Urbanism, Cairo, 1959.
- K.M. Barbour, The Republic of the Sudan, 1961.
- J.D. Tothill (Ed.). Agriculture in The Sudan, 1948.
- J.H.G. Lebon, 'Lansc-use mapping in the Sudan', Economic Geography, 1959, 60-70.

— J.H.G. Lebon & B.C. Roberston, The Jebel Marra, Darfur, and its Region, Geographical Journal, 1961, 30-49.

- « منطقة القاهرة الصناعية » محاضرة ألقيت في المرسم الثقافى للجمعية الجغرافية سنة ١٩٥٧ القاهرة .  
— « دراسات فى جغرافية مصر » مشروع الألف كتساب تأليف الدكتور جمال الدين الدناصورى وآخرون - القاهرة سنة ١٩٥٨ .  
— « الأقاليم الزراعية فى السودان » محاضرة المرسم الثقافى فى سنة ١٩٦٠ القاهرة .

### الحبشة والصومال :

- E.W. Luther, Ethiopia To-day, 1958.  
— G.C. Las, 'The Geography of Ethiopia', The Ethiopia Observer, 1962, 82-134.  
— F. Ullen droff, The Ethiopians, 1959.  
— F.J. Simoons, Nothwest Ethiopia : Peoples and Economy, Madison, 1960.  
— International Bank for Reconstruction & Development, The Economy of the Trust Territory of Somalia Land, New York, 1957.  
— J.A. Hunt, A General Survey of the Somaliland Proclorate, 1944-1950, 1951.  
— M. Karp, The Economics of Trusteeship in Somalia, Boston, 1960.

### غرب افريقية والصحراء الكبرى :

- R.J. Harrison Church, West Africa, 4th ed., 1963.  
— J. Richard-Molard, Afrique Occidentale Francaise, 2e ed., 1952.  
— J. Richard-Molard, Problèmes Humains en Afrique Occidentale Francaise, 2e. ed., 1952.  
— J. Richard Molard, Problèmes Humains en Afrique Occidentale, 1958.  
— Bruce F. Johnston, The Staple Food Economic of Western Tropical Africa, Standford, 1958.



أفريقيا الوسطى :

- E.A. Boateng, A. Geography of Ghana, 1959.
- René Pélissier "Les Territoires Espagnoles d'Afrique". La Documentation française, 3 January, 1964.
- E. Guernier, Cameroun. Togo, Encyclopédie Coloniale et Maritime, 1951.
- E. Guernier, Afrique Equatoriale française, Encyclopédie Coloniale et Maritime, 2nd ed., 1960.
- Virginia Thompson & Richard Adolf. The Emerging States of French Equatorial Africa, 1960.
- Le Congo Belge, Infor Congo, 2 Vols., Brussels, 1959.
- Atlas général du Congo, Académie royale des sciences, coloniales, Brussels, 1948-58.
- F.C.C. Egerton Angola in Perspective, 1957, Part 2.
- Irene S. Van Dongen, 'Angola', Focus, October, 1956.
- C. Robequain, Madagascar et les bases dispersées de l'Union française, 1958.
- O. Hatzfeld, Madagascar, Que Sais-je ? 1952.

شرق أفريقيا :

- F. Dixey, The East African Rift System.
- W.H.G. Dickins & G.M. Hichman, The Lands and peoples of East Africa, 1960.
- J.M. Pritchard, A. Geography of East Africa, 1962.
- E.W. Russell (Ed.), Natural Resources of East Africa, Nairobi, 1962.
- A. Gordon Brown (Ed.), Year Book & Guide to East Africa, London, Annual.
- Report of the East African Royal Commission, 1953-1955 Cmd, 94 75, H.M.S.O., 1955.

أفريقيا الوسطى والجنوبية :

- W.V. Brelsford (Ed.) Handbook to the Federation of Rhodesia and Nyasaland, 1960.
- F. Dohenham, Nyasaland, the Land of the Lake, H.M.S.O., 1955.

- C.H. Thompson and H.W. Wooddruff, Economic development of Rhodesia and Nyasaland, 1954.
- A.J. Hanna, The story of the Rhodesias and Nyasaland, 1960.

#### جنوب أفريقيا :

- J.H. Wellington, Southern Africa, 2 vols., 1955.
- M.M. Cole, South Africa, 1961.
- C.R. van der Merwe, Soil groups and sub-groups of South Africa, Pretoria, 1941.
- South African Weather Bureau, Climate of South Africa, Pretoria, 1957.
- N.C. Pollock and Swanyie Agnew. An Historical Geography of South Africa, 1963.
- Official Year Book of the Union of South Africa, No. 30, 1960.

#### استراليا عامة :

- Andrews, J.W. Australian Resources and their Utilisation, Sydney, 1956.
- Australian Environment, Melbourne, 1950.
- Official Year-Book for the Commonwealth of Australia, Canberra (annual).
- Kenneth B. Cumberland : South West Pacific, Methuen, London, 1962.
- Griffith Taylor : Australia, Methuen, London, 1961.
- Australia, New Zealand and the Southwest Pacific K.W. Robinson, London, 1962.
- Freeman, O.W. (ed.) Geography of the Pacific, Wiley, N.Y., 1951.
- Wadham, S.M. and Wood, G.J : Land Utilization in Australia, Melbourn University Press, 1950.
- Wood, G.L. (ed.) Australian Its Resources and Development, Macmillan, 1947.

#### استراليا الطبيعية :

- Ashton, H.J. and Maher, J.V. ; Australian Forecasting, and Climate, Melbourne, 1951.

- David, Sir T.W.E. The Geology of Australia, E. Arnold & Co., London, 1950.
- Laseron, C.F.L. The Face of Australia. Angus and Robertson, Sydney, 1954.
- Prescott, J.A. : The Soils of Australia in Relation to Vegetation and Climate C.S.I.R. Bulletin 52.
- Prescott, J.A. : A Soil Map of Australia C.S.I. & R.O. Bulletin 177, Melbourne, 1944.

اقتصاديات استراليا :

- Buchanan, R.O. : The Pastoral Industries of New Zealand Institute of British Geographers Publication No. 2, 1935.
- Commonwealth Dept. of National Development, Division.
- The Structure and Capacity of Australian Manufacturing Industries, Melbourne, 1952.

غينيا الجديدة :

- Reed, S.W. : The Making of Modern New Guinea, New York, 1943.
- Huetz de Lempis, A. : 'La Nouvelle Guinée,' Les Cahiers de Quatre-Mer, Vol. 9, No. 33, 1956, pp. 5-35.
- Klein, W.C. (Editor) : New Guinea. The Hague, Vol. 1, 1953, Vol. 2, 1954.



## فهرست

١	تقديم
٣	مقدمة

### الكتاب الأول

#### أفريقية

#### الباب الأول

١١	الفصل الأول : البنية
٣٨	الفصل الثاني : المناخ
٥٩	الفصل الثالث : السكان والجماعات والاستعمار فى أفريقية

#### الباب الثانى

٨٥	الفصل الأول : بلاد المغرب
١٠٢	الفصل الثانى : الأقاليم الطبيعية

#### الباب الثالث

١٤٣	الفصل الأول : ليبيا
١٥٣	الفصل الثانى : حوض النيل
١٧٩	الفصل الثالث : اثيوبيا والصومال

#### الباب الرابع

٢١١	الفصل الأول : مقدمة
	الفصل الثانى : الأقسام السياسية والأقاليم الطبيعية فى الصحراء الكبرى
٢٢٦	

#### الباب الخامس

#### غرب أفريقية

٢٥٢	الفصل الأول : مقدمة
-----	---------------------

٢٩٥ . . . الفصل الثاني : الأقاليم الطبيعية والأقسام السياحية

## الباب السادس أفريقية الوسطى

٣٤٥ . . . . . الفصل الأول : مقدمة  
٣٨٢ . . . . . الفصل الثاني : افريقية الاستوائية  
٤٠٩ . . . . . الفصل الثالث : مدغشقر أو جمهورية ملجاشي

## الباب السابع شرق أفريقية

٤٢٧ . . . . . الفصل الأول : حدود المنطقة  
٤٦٧ . . . . . الفصل الثاني : افريقية الوسطى الجنوبية

## الباب الثامن

٤٧٣ . . . . . الفصل الأول : جنوب افريقية  
٤٩٤ . . . . . الفصل الثاني : اقتصاديات جنوب افريقية

## الكتاب الثاني

### استراليا

### الباب الأول

٥٢١ . . . . . الفصل الأول : مقدمة  
٥٥٣ . . . . . الفصل الثاني : الأقاليم الطبيعية

## الباب الثاني

٥٦٩ . . . . . الفصل الأول : الرعى والثروة الحيوانية  
٥٨٧ . . . . . الفصل الثاني : غينيا الجديدة  
٥٩٧ . . . . . المسرّاجع

## فهرس الخرائط

١٦	• • • • • • • • • •	١	بنية أفريقية
٢٦	• • • • • • • • • •	٢	تضاريس أفريقية
٤٧	• • • • • • • • • •	٣	توزيع المطر السنوى فى أفريقيا
٤٨	• • • • • • • • • •	٤	مواسم سقوط المطر فى أفريقية
٤٩	• • • • • • • • • •	٥	الأقاليم المناخية فى أفريقية
٦١	• • • • • • • • • •	٦	السلالات البشرية من سكان أفريقية
٩١	• • • • • • • • • •	٧	التكوين الجولوجى لشمال غرب أفريقية
٩٩	• • • • • • • • • •	٨	المطر فى شمال غرب أفريقية ونظام تصريف المياه
١٢٦	• • • • • • • • • •	٩	مدينة فاس
١٢٨	• • • • • • • • • •	١٠	مدينة مراكش
١٣٠	• • • • • • • • • •	١١	الجزائر وضواحيها
١٣٣	• • • • • • • • • •	١٢	مدينة تونس
١٣٧	• • • • • • • • • •	١٣	اقتصاديات شمال غرب أفريقية
١٣٩	• • • • • • • • • •	١٤	اقتصاديات تونس
١٤٤	• • • • • • • • • •	١٥	قطاع فى طرابلس من الشمال للجنوب
١٤٥	• • • • • • • • • •	١٦	طريقة استغلال الأراضى فى إقليم برقة
	• • • • • • • • • •	١٧	توزيع المزارع الليبية والايطالية وحدود الزراعة فى طرابلس الشمالية
١٤٧	• • • • • • • • • •	١٨	الأقاليم الزراعية الرئيسية بالسودان
١٦٢	• • • • • • • • • •	١٩	الأقاليم النباتية فى الحبشة والصومال
١٩١	• • • • • • • • • •	٢٠	الأقاليم المناخية فى الحبشة والصومال
١٩٤	• • • • • • • • • •	٢١	تضاريس الصحراء الكبرى
٢١٣	• • • • • • • • • •	٢٢	الطرق الاستراتيجية وطرق القوافل الصحراوية فى شمال أفريقية
٢٢٥	• • • • • • • • • •	٢٣	التكوين الجولوجى فى جنوب تونس والجزائر الشرقية فى شمال أفريقية
٢٤١	• • • • • • • • • •	٢٤	موريتانيا
٢٥١	• • • • • • • • • •	٢٥	بنية غرب أفريقيا
٢٥٩	• • • • • • • • • •		

صفحة	مسلسل
٢٦٨	٢٦ المدى الحرارى السنوى فى ساحل أفريقية
٢٧١	٢٧٠ الأقاليم المناخية فى ساحل غرب أفريقية
٢٨٤	٢٨ الأقاليم الزراعية فى غرب أفريقية
٢٨٩	٢٩ الثروة الحيوانية فى غرب أفريقية
٢٩٢	٣٠ المواصلات فى غرب أفريقية
٢٩٧	٣١ السنغال وغامبيا
٣٠٤	٣٢ غينيا
٣٠٦	٣٣ سيبيراليون ( اقتصادية )
٣٠٩	٣٤ ليبيريا السطح والأقاليم
٣١٠	٣٥ ليبيريا اقتصادية
٣١٥	٣٦ فولتا العليا
٣١٧	٣٧ النيجر
٣٢٠	٣٨ مالى
٣٢٣	٣٩ غانا « أقاليم طبيعية »
٣٢٤	٤٠ غانا « اقتصادية »
٣٣١	٤١ مشروع فلتا فى غاناه
٣٣٢	٤٢ توجو وداهومى
٣٣٤	٤٣ ساحل العاج « الأقاليم ومناطق الانتاج »
٣٣٥	٤٤ كثافة السكان فى غرب أفريقية
٣٣٧	٤٥ نيجيريا
٣٤٠	٤٦ لاجوس
٣٤٧	٤٧ اقتصاديات انجولا
٣٥٠	٤٨ أنجولا « المعادن ومراكز العمران وتوليد الكهرباء والاستيطان والسكك الحديدية »
٣٥٦	٤٩ أفريقيا الوسطى « خريطة جيولوجية »
٣٦٢	٥٠ الكونغو برازفيل وجابون « اقتصادية »
٣٦٧	٥١ قطاع طولى للكونغو - أوبانجى - سانجا - نجوكو
٣٧٨	٥٢ رواندى وبوروندى - تشاد
٤٠٤	٥٣ الكيمرون
٤١٢	٥٤ ملجاش « البنية والتضاريس »



صفحة	مسلسل
٤١٩	٥٥ الأقاليم النباتية فى مدغشقر
٤٢٢	٥٦ اقاليم مدغشقر الطبيعية
٤٢٩	٥٧ جيولوجية شرق أفريقية
٤٣٢	٥٨ الأخدود ومناطق العمران فى شرق أفريقية
٤٥٠	٥٩ موزمبيق
٤٦٥	٦٠ موزمبيق « اقتصادية »
٤٦٩	٦١ الزراعة والتعدين فى روديسيا
٤٧٥	٦٢ قطاع عبر سلاسل الكاب الالتوائية والكارو الأعلى
٤٧٧	٦٣ التكوين الجيولوجى لجنوب أفريقيا
٥٠٢	٦٤ حقول الفحم ومناجمه فى جنوب ترانسفال وناثال
٥٠٢	٦٥ مناطق التعدين فى جنوب أفريقية « قطاع جيولوجى »
٥٢٩	٦٦ بنية استراليا
٥٣٧	٦٧ اقاليم التربة الرئيسية فى استراليا
٥٤١	٦٨ متوسط المطر السنوى
٥٥٤	٦٩ اقاليم استراليا
٥٦٢	٧٠ أحواض استراليا الارتوازية
٥٧٢	٧١ توزيع المراعى فى استراليا
٥٧٨	٧٢ المعادن الفلزية فى استراليا
٥٨٠	٧٣ خامات الفحم والحديد فى استراليا
٥٩٣	٧٤ جيولوجية نيوزيلندا